

## 보건진료원의 보건의료서비스 공급에 관한 관계요인 분석

대한간호학회 제18권 제2호, pp. 153~161. 1988

김 영 임

공급자 측면에서 보건진료원의 보건의료서비스 공급수준을 파악하고 본 연구의 분석들을 중심으로 서비스공급에 영향을 주는 요인을 규명하고자 실시한 결과를 간단히 요약하면 다음과 같다.

첫째, 보건진료원의 보건의료서비스공급을 직무를 중심으로 본 결과 1차진료 서비스의 수행이 가장 높으며 다음이 가족계획서비스 지역사회건강관리, 모자보건서비스의 순으로 나타났다. 한편 전체 서비스중 예방보건서비스의 비율은 22.1%로서 진료 서비스에 비해 그 수행수준이 훨씬 낮음을 보이고 있다.

둘째, 개인속성요인, 지역사회 인구학적 환경요인 그리고 업무관련요인으로 설명되는 종속변수에 대한 변량은 직무중심 서비스 공급에 있어 지역사회건강관리에서 63%, 모자보건서비스에서 58%, 그리고 가족계획서비스에서 42%, 1차 진료서비스에서 17%를 나타내며, 예방보건서비스 수행에 대해 62%를 나타내 독립변수들의 예방관련서비스공급에 대한 설명의 기여도가 큼을 잘 보이고 있다.

세째, 각 종속변수에 대한 독립변수들의 설명력은 종속변수별로 차이를 보이는데 지역사회건강관리에서는 접촉가구 비율의 기여가 가장 크며, 보건진료원 경력이나 결혼상태변수의 기여가 큰 반면 모자보건서비스에서는 결혼상태를 포함한 연령, 종경력, 예방보건서비스에 대한 태도 등의 개인속성요인과 1일 근무시간변수의 기여가 큰 것으로 나타났다. 가족계획서비스에서는 결혼상태와 1일 근무시간변수의 기여가 크며 예방보건서비스 수행에 대해서는 업무실적 처리방법, 1일 근무시간, 65세 이상 인구비 결혼상태 및 보건진료원 경력이 유의한 변수로 설명에 기여하고 있어 종합하여 보면 공통적으로 기혼의 보건진료원 경력자의 개인속성이 예방보건서비스공급을 크게 설명한다고 할 수 있다. 또한 접촉가구비율이나 1일 근무시간, 업무실적 처리방법도 중요한 변수로써 예방보건서비스공급 향상에 기여할 수 있다고 보여진다.

한편 1차 진료서비스에 대해서는 두 가지 변수(접촉가구비율과 진료소수입)에 의해 설명되고 있는데 1차진료 서비스인 경우 독립변수들에 크게 영향받지 않는다고 할 수 있으며, 예방관련서비스 결정을 더 잘 설명한다고 할 수 있다.

1차 보건의료개념에 입각하여 우리나라의 보건진료원 제도가 얼마나 충실히 이를 반영하는가에 대한 문제를 가지고 이 중 공급자의 보건의료서비스 공급측면에서 분석을

시도했던 결과를 중심으로 고찰하며 보면

첫째, 보건진료원의 서비스공급이 1차 진료서비스에 치중되어 있고 예방보건서비스 활동은 아직 미약한 수준에 있다고 할 수 있다.

둘째, 보건진료원의 서비스공급중 1차 진료서비스보다는 예방관련서비스에서 개인 속성인이나 업무관련요약의 영향이 더 큰 것으로 보인다. 즉 1차 진료서비스공급에 있어서는 개인속성요인 등 독립변수들과는 상관이 크지않으며 진료소운영과 직결되는 진료소수입에 크게 의존된다는 것이다. 이는 보건진료원간 동질성있는 1차 진료서비스공급을 의미할 수 있으며 또한 진료소 운영에 무리가 없는 수준에 이르러야 예방보건서비스공급에의 여력이 생긴다는 의미로도 해석할 수 있다. 따라서 현재의 진료소 수입금에만 의존되는 진료소운영체제에 있어 포괄적인 1차 보건의료서비스의 공급 향상은 기대하기 어려운 것이다.

세째, 예방보건서비스에 기여하는 요인은 결혼상태, 보건진료원경력등의 개인속성 요인들의 기여도가 크다. 이는 현행 동일한 보건진료소 운영체제속에서 비슷한 여건 일지라도 보건진료원이 배치되어 경력이 쌓이고 안정될수록 점차 예방보건서비스공급이 원활해짐을 추론할 수 있는 것이다. 따라서 보건진료원 경력자에 대한 사기양양과 격려로써 양적 및 질적으로 향상된 포괄적 보건의료서비스공급을 기대할 수 있을 것이다.

## 보건진료원의 치료적서비스와 지역 사회개발 활동조사연구

연세대학교 간호학연구소 논문집 제12집, 1989, 별책.

김모임 · 조원정 · 김의식 · 이경자 · 장은희 · 박정숙 · 강해신 · 김진선

본연구는 보건진료원의 직무수행 현황을 파악하고 이에 영향을 미치는 제 요인을 분석하고자 시도하였다.

조사기간은 1986년 8월부터 10월까지였으며, 조사방법은 경기도 지역에 근무하는 보건진료원을 대상으로 설문조사를 실시하였다. 본 조사에 응한 사람은 166명으로 전체 대상자의 76.5 % 가 응답하였다.

자료처리는 SPSS 프로그램을 이용하여 빈도, 백분율, 평균치, 표준편차와 단계적 다변인 회귀분석 및 정준상관관계 분석을 하였다.

### 1. 보건진료원 일반적 특성

#### 1) 인적 특성

보건진료원의 평균연령은 37.8세였으며 30대 연령군이 33.0 %로 가장 많았다. 결