

8. 월경과 수업과의 관계를 보면 두군간에 유의한 차이없이 불편하지만 수업은 가능한 것이 실내수업에서는 57.6%, 실외수업에서는 54.3%였으며, 전혀 불편없다가 실내수업이 26.5%, 실외수업이 29.5%, 몹시 불편하여 수업받기 어렵다가 실내수업에서 6.0%, 실외수업 8.6%로 나타나 월경시 실외수업과 실내수업간에서 의미있는 차이점은 나타나지 않았다.

9. 초경시 처리방법은 다른이에게 물어보아 해결한 것이 68.2%였으며, 당황해하다가 식구에게들켜 해결된 것이 12.6%, 혼자 쉽게 해결한 것이 11.9%였다.

10. 생리 및 육체적 변화에 대한 의논대상자로서는 어머니가 66.2%, 언니 24.5%, 친구 13.2%, 기타 4.6%였으며 선생님은 1.3%로서 가장 하위로 나타났다.

이상과 같은 결과로서 성교육은 초등교육 과정에서부터 정규교과과정으로 다루어져야 할 것과 이들 어머니에게도 정확하고 체계적인 생리교육을 실시하여 가정에서도 적극적인 성교육을 실시토록 할 것을 제언한다.

일부 고등학생들의 흡연에 대한 조사연구

적십자 간호 제2권, 1979.

방영옥

1978년 12월 2일~14일 사이에 서울의 4개 남자 고등학교 학생 744명을 대상으로 흡연상태와 흡연에 관한 지식, 태도를 조사한 결과는 다음과 같다.

1. 현재 흡연중인 학생이 31.05%, 흡연경험이 있는 학생이 25.81%, 전혀 흡연을 하지 않는 학생이 43.15%였다.
2. 처음 흡연연령은 14세~16사이가 37.59%로 가장 많았고 그 동기는 호기심으로 한 경우가 32.87%, 친구와 어울리기 위해서가 32.16%였다.
3. 흡연시 기분은 죄책감이 들었다에 31.68%, 특별한 감정은 없었다에 31.20%였다.
4. 처음 흡연장소로는 교외가 32.86%로 가장 많았고 자기집은 27.42%였다. 흡연시 대상자로는 친구와 같이(43.97%)가 가장 많았고 혼자서가 24.35%나 되었다.
5. 주로 흡연하는 장소로는 자기집을 택하였고(28.60%), 그 이외의 교외(22.46%), 친구집(18.68%), 학교(15.60%)등을 이용했다.
6. 학생의 흡연실시를 부모 모두 모르는 경우가 40.66%로 모르는 경우가 많았으며, 부모 모두 알고 있는 경우는 24.11%였다.
7. 현재의 흡연정도는 일정치 않다가 30.73%, 1일 3~6개가 29.55%, 1일 1~3개

가 25.06 % 였다.

8. 가족중 흡연자로는 아버지가 28.1 % 로 가장 많았고 형이 20.5 % , 조부가 10.94 % 순이었다.

9. 흡연이 인체에 해롭다는 사실에 대해서는 81.85 % 가 그 유해성을 인정하였고 모른다가 8.33 % , 아니다가 9.82 % 였다.

10. 담배의 성분에 Nicotin 이 있다고 알고있는 경우는 84.27 % , 모른다가 7.13 % , 아니다가 8.60 % 였고 Ammonia 에 대해서는 55.38 % 에서 모른다고 하였다.

11. 흡연이 인체에 미치는 영향에 대해 · 압의 원인이 되는 사실과(60.76 %) 심장병을 악화시킨다(42.47 %) , 근육과 신경을 자극한다(66.08 %) , 기관지염을 악화시킨다(51.61 %)는 사실을 알고 있었다.

12. 흡연에 대한 태도에서는 남자는 담배를 피울줄 알아야 한다에서와 여성의 흡연은, 불량한 것이다에서 각각 60.48 % , 64.11 % 로 긍정적 대응이 나타났으며 그 이외의 모든 항목에서는 그렇다와 모두 비슷하게 나타났다.

13. 흡연경험이 있는 학생의 성적과 흡연을 안하는 학생의 성적과는 무관한 것으로 나타났다.

14. 흡연경험이 없는 학생보다 흡연경험이 많은 학생의 가정에 흡연자수가 많은 것으로 나타났다.

15. 부모가 흡연을 하고 있는 학생의 62.5 % 가 흡연경험이 있었고 부모가 흡연을 안하는 경우에는 55 % 의 학생이 흡연을 안하고 있었다.

16. 가족중 흡연자의 수가 2명이상일때 78.4 % , 3명 이상일때 75.00 % , 4명이상일때 100 % 의 흡연경험이 있는 것으로 나타났다.

일부 농촌 중학생의 건강흥미 분석

간호학회지 제10권 제1호, 1979.

신공범 · 이광자

본 조사는 지역사회 간호 실습 교육계획의 일환으로 이루어지고 있는 학교 건강교육 내용선정 및 내용개발을 위한 체계적 과정의 하나로써 학습자에 의해 표현되는 건강흥미를 조사하였다. 본 조사도구로는 Eastern Kentucky 대학의 Ramsdell 에 의해 고안된 건강흥미검사(Health Interest Inventory)를 수정하여 적용하였다. 본 조사대상은 경기도 남양주군 수동면에 위치한 수동중학교 남녀 학생 358명을 대상으로 하였다. 본