

광주시내 일부 국민학교 학생의 월경실태 조사

조대병설간호전문 논문집, 1982.

박공채 · 박재경 · 오순옥

1982년 10월 20일부터 동년 10월 30일까지 광주 시내에 소재한 국민학교 아동(여아) 1,048명중 초경을 경험한 62명에 대한 월경실태를 조사한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 초경을 경험한 아동은 전체의 5.9 %였으며 초경연령분포는 9세부터 12세까지로 이중 12세가 51.6 %로 가장 높은 비율을 나타냈고 초경평균 연령은 11.4 % 세였다.
2. 초경경험자의 월경 지식은 「들어 본 적이 있다」가 59.7 %이고 「들어 본 적이 없다」가 33.8 %로 나타났다. 월경지식경로에 대해서는 초경경험자는 「어머니」로부터가 51.9 %로 가장 높았으며, 전조사대상자는 「선생님」으로부터가 34.7 %로 가장 많았다.
3. 초경을 대하는 어머니의 태도는 「긍정적인 태도」가 58.1 %로 가장 높았다.
4. 월경시 신체증상은 「있다」가 74.2 %이고 「없다」가 25.8 %로 나타났으며, 신체증상이 있을시 가장 높은율은 「참고 견디기」가 74.0 %로 나타났다.
5. 월경으로 인해서 학교를 결석 또는 조퇴해 본 적이 있는 학생이 9.7 %이고 90.3 %가 없는 것으로 나타났다.
6. 월경간격은 「불규칙」이 38.7 %로 가장 높았고, 월경지속기간은 「5~6일형」이 32.3 %로 가장 높았다.

이상의 조사결과에서 많은 수의 아동들이 월경에 대한 지식 부족으로 초경을 당할시 아직도 당황하는 경우가 상당수였으나 초경을 대하는 어머니의 태도는 대부분이 교육적이며 긍정적인 태도를 보였고 월경으로 인한 학습활동은 큰 불편이 없는 것으로 나타났다.

전라남도 국민학교 보건시설 및 건강평가에 관한 조사

중앙의학 제42권 제3호, 1982.

박 인 혜

1979년 8월 16일부터 9월 10일 사이에 전라남도내의 192개국민학교 양호교사를 대상으로 국민학교 보건시설 및 건강평가에 관한 조사를 실시하여 다음과 같은 결과를 얻었다.

1. 응답자들의 교육경력은 3년이하가 과반수이상(66.7%)을 차지하였고 과반수이상(60.9%)이 임상경험이 없었다.

2. 학생수는 2,000명미만이 75.5%로 대부분을 차지하였으며, 양호실의 크기는 19평이하가 과반수이상(64.0%)을 차지하여 국민학교 시설기준령에 미치지 못함을 나타내었다.

3. 보건시설 및 비품구비는 양호실 비품이 19개이하가 86.4%, 신체검사용기구는 14개이하가 80.3%, 치치용기구는 9개이하가 78.6%, 구비된 약품으로는 14개이하가 88.0%, 응급처치함은 4개 이하가 68.2%로 나타났다.

4. 신체검사 실시사항은 체격검사를 모두 실시한 학교가 40.6%, 체질검사를 모두 실시한 학교가 65.5%, 체력검사를 모두 실시한 학교가 44.8%, 혈액형검사를 모두 실시한 학교가 51.6%, 흉부 X-선 검사는 간접촬영을 실시한 학교가 43.8%, 기생충검사를 모두 실시한 학교가 57.3%로 나타나 전반적으로 신체검사의 철저한 실시가 되고있지 못함을 보였다.

5. 신체검사결과 발견된 시각장애, 청각장애, 정신박약, 지체부자유아에 대한 교육 실시상황은 정상아보다 관심을 두어 가르친다가 64.1%로 나타났다.

서울, 지방간 고등학교 학생들의 성교육에 관한 인식 및 태도 조사연구

순천간호전문 논문집 제7집, 1982.

송 경 숙

본 연구는 학교 보건 교육중 성교육 실시에 대한 서울, 지방간 남여 고등학생들의 인식 및 태도를 파악, 분석함으로써 보다 효과적인 보건교육을 시행할 수 있도록 학교 보건 교육 대책 수립에 기초자료를 제공함에 그 목적을 두었다.

연구 대상은 총 957명으로 서울특별시 내 인문계 남여 고교생 474명 전라남도 S 시내 인문계 남여 고교생 483명을 대상으로 하였다.

자료는 자기기록식(self - recording)으로 작성된 질문지에 의하여 1982년 10월 13일부터 동년 10월 25일까지 13일 간 수집되었다.

본 연구의 주요 결과 및 결론은 다음과 같다.