

일부지역 국민학교 양호실 이용실태 조사

순천간호전문 논문 제7집, 1982.

장 인 옥

본 연구의 목적은 학동들의 대부분의 건강을 담당하는 양호실을 이용한 학생들을 중심으로 학년별, 성별, 계절별, 증상별에 따른 이용도를 알아봄으로써 학교보건의 중요성을 재인식하고 학교보건사업에 다소나마 보탬이 되고져, 서울시내 모 국민학교의 양호실을 이용한 1,246명을 대상으로 1981년 3월부터 1981년 12월까지 양호일지를 사용하여 조사하였다.

연구 결과를 요약하면

1. 전체 총학생수에 대한 양호실 이용도는 50.8% (1,246명)였다.
 2. 학년별로는 5학년이 26.0% 가장 높고 1학년이 9.0%로 가장 낮았다.
 3. 성별로 보면 여학생이 51.4%, 남학생이 48.6%로 비슷한 양상을 보였고 여학생 중에서는 5학년(26.3%)이 가장 높았고, 1학년(8.6%)이 가장 낮았다. 남학생중에서는 5학년(25.7%)이 가장 높았고 1학년(9.4%)이 가장 낮았다.
 4. 계절별로 보면 봄(32.7%), 여름, 가을, 겨울의 순이었고 봄 가을에는 남학생, 여름, 가을에는 여학생이 높았다.
 5. 증상별로 보면 외상(35.2%), 소화기질환, 두통의 순으로 나타났다.
- 학년에 따라 보면 1학년, 2학년, 3학년, 6학년에서는 외상이 4학년, 5학년에서는 소화기질환이 높게 나타났다.
- 계절에 따라 보면 봄, 겨울에는 외상, 여름과 가을에는 소화기질환이 높게 나타났다.

2. 제 언

전국의 대도시 지역과 농촌내지는 소도시 지역의 국민학교 양호실을 대상으로 두 지역간의 이용도를 비교 조사하여 학교보건의 중요성을 재강조함이 바람직하다고 생각한다.

도시와 농촌지역 고교생들의 인구 및 가족계획관 비교