

되었다. ($p < 0.05$)

가설3：“대상자의 경제 상태에 따라 건강관리 실천은 차이가 있을 것이다.”는 채택되었다. ($p < 0.05$)

가설4：“보호자의 교육정도에 따라 건강관리 실천은 차이가 있을 것이다.”는 부결되었다.

중학교 여학생들의 건강행위에 영향을 미치는 변인분석

대한간호 제26권 제1호, 1986

최정숙

A. 결론

본 연구는 학생들의 건간행위를 파악하고 이에 영향을 미치는 요인으로 건강지식, 건강에 대한 관심도, 통제성격, 가족원 상호관계, 생활형편, 건강상태, 삶의 태도, 가족의 건강관리등과의 관계를 확인하기 위하여 연구를 대상으로 시도하였다.

연구대상은 서울시내 일 여자중학교 3학년 학생 303명을 본 연구의 대상으로 하였다.

연구도구는 건강행위를 측정하기 위해서는 기경숙에 의해 개발한 질문지를 사용하였으며, 통제위성격을 측정하기 위해서는 Wallston 과 Wallston 이 개발한 도구를 사용하였다.

자료수집은 1986년 9월 23일~26일까지이며 담임교사의 협조를 얻어 준비된 설문지에 기록케 한후 즉석에서 회수하였다. 본 연구를 통하여 얻어진 결과는 다음과 같다.

1. 일반적 특성

대상자의 일반적인 특성으로 가구주의 교육정도는 고졸이상이 60.8 %로 나타났으며 동거가족수는 평균 3.1명이고 가족의 생활형편은 보통정도로 사는 가족이 79.5 %였으며 건강상태는 대체로 건강한 경우가 55.8 %를 보였고 삶의 태도는 대체로 긍정적인 경우가 42.2 %로 나타났다.

2. 건간행위 측정에 관하여

건강행위를 4개 영역 즉 개인위생 및 일상생활습관, 전염병관리, 사고예방, 정신건강 측면으로 나누어 측정한 결과 전염병관리영역의 평점이 가장 높게 나타났으며 가장 낮은 영역은 정신건강영역으로 나타났다.

3. 가설검증

1) 제1가설：“건강지식이 높을수록 학생들의 건간행위는 잘 일어날 것이다”는 채택

되지 않았다($\gamma = 0.0877$, $p > 0.05$).

2) 제2가설：“건강에 대한 관심도가 높으면 높을수록 건강행위 정도는 높을 것이다”는 채택되었다($\gamma = 0.6129$, $p < 0.01$).

3) 제3가설：“내적통제 위성격일수록 건강행위 정도는 높을 것이다”는 채택되었다($\gamma = 0.2958$, $p < 0.01$).

4) 제4가설：“가족원 상호관계가 좋으면 좋을수록 건강행위는 높을 것이다”는 채택되었다($\gamma = 0.4819$, $p < 0.01$).

4. 기타검증

건강행위와 제변수들간의 단계적중회기 분석을 한 결과 건강에 대한 관심도만으로 37.56% 설명이 가능하였고 여기에 가족원 상호관계, 가족의 건강관리, 지식정도, 타인성향, 건강상태, 내적성향등의 변수를 추가하였을 때 48%의 설명이 가능하였다.

B. 제언

1. 건강행위에 가장 영향을 미친 건강에 대한 관심도에 관한 구체적 개발연구가 필요하다고 본다.

2. 건강에 대한 관심도를 높히기 위한 체계적인 프로그램의 준비가 필요하다고 본다.

3. 건강행위의 실천도를 높히기 위해 영향을 미치는 변수의 규명을 좀더 광범위하게 다각적으로 다루어져야 할 것이다.

양호교사의 업무수행자신감과 수행정도에 관한 조사연구

조선대병설 간전논문집 제8집, 1987

김정효 · 장혜숙 · 정영주

본 연구는 전남지역의 전체 양호교사 242명의 업무수행자신감과 수행정도를 파악하기 위하여 1986년 9월부터 12월에 걸쳐 설문조사한 결과 자료수집이 가능한 146명의 설문지를 분석하였다.

대상자 146명의 자료는 ANOVA, Pearson Correlation Coefficient 통계방법으로 분석한 결과로 다음과 같다.

1. 양호교사들의 평균연령은 32.7세였으며 양호교사경력은 평균 9년이었고 임상경력은 대부분 없었다.