

교육에 관한 가정통신문 발송횟수($p < 0.01$), 양호실 이용자수($p < 0.05$)가 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

양호실 관리의 영역에서는 연령($p < 0.05$), 과거 임상경력($p < 0.05$) 학급수($p < 0.05$), 학생수($p < 0.05$), 가정통신발송 횟수($p < 0.01$)가 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

보건교육의 영역에서는 보건조직의 유무($p < 0.05$), 과거 임상경력($p < 0.05$), 과거 보건경력($p < 0.05$), 건강관리 할애시간 비율($p < 0.05$), 보건교육 할애시간 비율($p < 0.001$)이 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

환경관리의 영역에서는 연령($p < 0.01$), 양호교사 현경력($p < 0.01$), 호봉수($p < 0.01$), 보건교육에 관한 가정통신문 발송횟수($p < 0.01$), 가정통신물 발송 전체횟수($p < 0.001$), 건강관리 할애시간 비율($p < 0.05$), 보건교육 할애시간 비율($p < 0.05$), 양호실 사용면적($p < 0.05$)에 따라 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 학교보건조직 운영의 영역에서는 학급수($p < 0.05$)가 상관관계가 있는 것으로 나타났다. 건강관리의 영역에서는 학급수($p < 0.05$), 보건교육에 관한 가정통신문 발송 횟수($p < 0.001$), 가정통신문 발송 전체($p < 0.01$), 건강관리 할애시간 비율($p < 0.05$)이 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

학교간호업무 전체에서는 연령($p < 0.05$) 과거 임상분야 경력($p < 0.05$), 과거 보건분야 경력($p < 0.01$), 학급수($p < 0.05$) 학생수($p < 0.05$), 보건교육에 관한 가정통신문 발송 횟수($p < 0.05$), 가정통신문 발송 전체 횟수($p < 0.05$), 건강관리 할애시간 비율($p < 0.05$), 보건교육 할애시간 비율($p < 0.01$), 양호실 사용면적($p < 0.05$)이 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

B. 제 언

본 연구자는 국민학교 양호교사와 그 업무실태를 분석하고 다음과 같은 제언을 하고자 한다.

1. 양호교사 스스로 학교 인구의 건강을 향상시키기 위한 자질향상에 적극적이어야 할 것이다.
2. 양호교사가 학교인구의 건강을 지키기 위하여 요구되는 제도적 지원이 충분해야 할 것이다.
3. 가정·학교·지역사회의 공동노력과 학생·교사·보건의료인 학부모들의 올바른 역할수행이 이루어져야 할 것이다.

서울시 국민학교 양호교사들의 학교간호 업무수행 자신감에 관한 연구

김 은 희

본 연구는 서울지역 국민학교 양호교사의 업무에 관한 실태를 파악하고 학교 간호업무 개선점을 모색하기 위한 기초자료를 제공하기 위하여 시도되었다.

연구대상은 서울시내 국민학교에 근무하는 양호교사중 연구에의 목적을 이해하고 참여에 수락한 98명이었다.

연구도구는 문헌고찰을 통하여 얻은 자료를 근거로 연구목적의 달성을 위하여 작성된 질문지를 사용하였고 3차에 걸쳐 수정·보완하였다. 자료수집은 1986년 8월 13일~10월 30일까지였으며 서울시 교육위원회의 협조로 설문지를 배부한 후 대상자의 직접기록에 의하여 수집하였으며 본 연구를 통하여 얻어진 결과는 다음과 같다.

1. 양호교사의 일반적 특성

대상자의 평균연령은 35.9세였고 현경력은 평균 9.2년이였다.

양호교사를 제외한 과거 경력으로 임상분야 경력이 평균 3.4년, 보건분야 경력이 평균 0.3년이였다.

간호교육 배경으로는 전문대학 이상이 7.24%였고 결혼상태는 기혼이 89.8%였다. 종교는 76.5%가 있는 것으로 나타났고, 국공립학교에 94.8%가 근무하고 있었으며, 99.0%가 양호교사 단독업무를 보고 있었다.

2. 학교보건 자원에 관한 실태

양호교사 1인당 학생수는 2,630명, 학급수는 49.3학급, 교원수는 54명이였다.

학교보건 연간 총 예산은 30~59만원의 빈도가 제일 높았고 그 중 의약품 구입비가 제일 많았다.

반면 전체 예산 중 보건예산의 차지 비율을 58.2%가 모르고 있었다.

학교보건 조직은 74.2%가 없었다.

양호실 방향은 42.9%가 중앙에, 88.9%가 1층에 위치하고 있었다.

양호실 활용조건은 93.9%가 단독사용이었고 10평 이하의 면적이 71.6%였다.

3. 학교 간호업무 실태

월 평균 양호실 이용자수는 413명이였다. 목적별 이용자 중 소화기계의 빈도가 제일 높았다.

가정통신문 연간 발송횟수는 15.9회였고 보건교육의 빈도가 제일 많았다.

학교간호 업무별 할애시간 중 양호실 관리에 많은 시간이 사용되고 있었다.

4. 학교간호 업무별 수행 자신감 정도

학교간호 업무별 수행 자신감 정도는 아주 자신없다에 1점, 자신없다에 2점, 자신 있다에 3점, 아주 자신있다에 4점을 주어 비교한 결과 전체적으로는 2.74였으며, 양호실관리가 2.92, 보건교육이 2.85, 사업계획 및 평가가 2.84, 건강관리가 2.71, 학교보건조직 운영이 2.38이었다.

5. 학교간호 업무수행 자신감 제변수들간의 상관관계 학교간호업무 사업계획 및 평가 수행의 자신감 영역에서는 통계적으로 유의한 차이를 나타낸 것이 없었다.

양호실관리 수행의 자신감 영역에서는 양호실관리 할애시간비율($p < 0.05$)이 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

보건교육 수행의 자신감 영역에서는 결혼여부($p < 0.01$), 종교의 유무($p < 0.05$), 보건교육 가정통신문 발송횟수($p < 0.05$), 양호실관리 할애시간비율($p < 0.05$)이 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

환경관리 수행의 자신감 영역에서는 간호교육배경($p < 0.05$), 양호실 위치($p < 0.01$), 보건교육 가정통신 발송횟수($p < 0.05$), 총가정통신 발송횟수($p < 0.01$) 건강관리 할애시간 비율($p < 0.01$), 양호실관리 할애시간 비율($p < 0.05$), 양호실 사용면적($p < 0.01$)이 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

학교보건조직운영 수행의 자신감 영역은 양호실 관리 할애시간비율($p < 0.05$), 건강관리 할애시간비율($p < 0.01$)이 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

건강관리 수행의 자신감 영역은 의약품 구입비율($p < 0.05$), 총 가정통신 발송횟수($p < 0.01$), 양호실 이용자수($p < 0.01$), 건강관리 할애시간 비율($p < 0.001$) 양호실관리 할애시간 비율($p < 0.001$)이 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

전체 학교간호업무 수행의 자신감은 결혼여부($p < 0.05$), 양호실의 위치($p < 0.05$), 양호실관리 할애시간 비율($p < 0.01$), 건강관리 할애시간 비율($p < 0.001$) 사업계획 및 평가 수행자신감($p < 0.001$), 양호실관리 수행 자신감($p < 0.001$), 보건교육 수행 자신감($p < 0.001$), 환경관리 수행 자신감($p < 0.001$), 학교보건조직운영 수행 자신감($p < 0.001$), 건강관리 수행 자신감($p < 0.001$)이 상관관계가 있는 것으로 나타났다.

B. 제 언

본 연구자는 국민학교 양호교사와 그 업무수행 자신감을 분석하고 다음과 같은 제언을 하고자 한다.

1. 양호교사 스스로 학교인구의 건강을 책임지기 위한 자질향상에 적극적이어야 할 것이다.

2. 양호교사가 학교인구의 건강을 지키기 위하여 요구되는 제도적 지원이 충분해야 할 것이다.

3. 가정, 학교, 지역사회의 공동노력과 학생, 교사, 보건의료인, 학부모들의 올바른 역할수행이 이루어져야 할 것이다.