

실 이용 횟수는 월 평균 814건, 일평균 33건이었다. 월별 이용율에 있어서는 큰 차이가 없었으나 7, 8, 12월에 이용자가 많고(8.5%), 2월에 이용율이 가장 낮았다(7.9%).

7. 의무실 이용 건강문제와 주요 증상은 외상이 14.4%로 가장 많았고 두통이 12.6%, 소화 불량 10.1% 순이었다. 이들 중 병원에 의뢰한 환자의 비율은 1.5%였다.

## 산업간호진단 및 사업계획의 일 연구

대한간호 제26권, 제4호, pp.30~40, 1987

전경자 · 신현선

본 연구는 근로자 509명인 전선제조업체를 대상으로 산업체에서 실시된 정기검진 및 작업환경 결과를 분석하였다.

실제로 산업체 현장에서 간호사업을 전개하는 데는 이론적인 원칙을 능가하는 많은 다양성과 변화가 존재할 것이다.

따라서 이론적 틀을 기초로, 산업체를 분석하여 체계적인 간호사업계획을 수립하는 과정이 갖는 한계를 느끼지 않을 수 없다. 예를 들어 당해년도의 사업목표를 설정하는데 있어서 그 사업을 양적으로 측정, 표현할 수 있는 현실적인 기준등이 마련되어 있지 못하다는 것이다. 또한 실제 산업체에서 고유의 방법으로 개발되고 있는 간호방법들을 수렴하지 못한 점도 있다.

그러나 이와같은 이론이 갖는 한계들은 실천을 통해 문제 제기를 받고, 평가 됨으로써, 보다 발전된 실천을 전개시킬 수 있는, 다음 단계의 이론으로 성숙해 가리라 생각된다. 앞으로, 다양한 경험과 이론적 틀을 갖고 이같은 시도가 이어지기를 바란다.

## 서울시 산업간호사의 업무수행 정도에 영향을 주는 요인분석

중앙의학 제52권 제11호, 1987

정연강 · 권혜진

본 연구는 서울시의 산업체에 근무하는 간호사의 업무수행 정도에 미치는 영향을 주