

실 이용 횟수는 월 평균 814건, 일평균 33건이었다. 월별 이용율에 있어서는 큰 차이가 없었으나 7, 8, 12월에 이용자가 많고(8.5%), 2월에 이용율이 가장 낮았다(7.9%).

7. 의무실 이용 건강문제와 주요 증상은 외상이 14.4%로 가장 많았고 두통이 12.6%, 소화 불량 10.1% 순이었다. 이들 중 병원에 의뢰한 환자의 비율은 1.5%였다.

산업간호진단 및 사업계획의 일 연구

대한간호 제26권, 제4호, pp.30~40, 1987

전경자 · 신현선

본 연구는 근로자 509명인 전선제조업체를 대상으로 산업체에서 실시된 정기검진 및 작업환경 결과를 분석하였다.

실제로 산업체 현장에서 간호사업을 전개하는 데는 이론적인 원칙을 능가하는 많은 다양성과 변화가 존재할 것이다.

따라서 이론적 틀을 기초로, 산업체를 분석하여 체계적인 간호사업계획을 수립하는 과정이 갖는 한계를 느끼지 않을 수 없다. 예를 들어 당해년도의 사업목표를 설정하는데 있어서 그 사업을 양적으로 측정, 표현할 수 있는 현실적인 기준등이 마련되어 있지 못하다는 것이다. 또한 실제 산업체에서 고유의 방법으로 개발되고 있는 간호방법들을 수렴하지 못한 점도 있다.

그러나 이와같은 이론이 갖는 한계들은 실천을 통해 문제 제기를 받고, 평가 됨으로써, 보다 발전된 실천을 전개시킬 수 있는, 다음 단계의 이론으로 성숙해 가리라 생각된다. 앞으로, 다양한 경험과 이론적 틀을 갖고 이같은 시도가 이어지기를 바란다.

서울시 산업간호사의 업무수행 정도에 영향을 주는 요인분석

중앙의학 제52권 제11호, 1987

정연강 · 권혜진

본 연구는 서울시의 산업체에 근무하는 간호사의 업무수행 정도에 미치는 영향을 주

는 요인을 분석하기 위하여 시도되었다.

1986년 8월 25일부터 9월 30일까지 88명의 산업간호사를 대상으로 직접 면접과 1주일 동안의 업무기록을 통하여 수집된 자료를 분석하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 연구대상 : 연구대상자가 속해 있는 사업체의 규모는 300~1,000명이 39.6%, 업종은 제조업이 50.5%로 가장 많았다. 1인당 평균 대상 근로자수는 114.7명이었다. 대상 간호원의 평균 연령은 28세, 전문대졸이 64.8%로 많았다. 미혼이 63.7%, 현직 경력 평균은 2년 8개월이며 대체로 업무에 만족하고 있었다. 월평균 보수는 39만원, 의무실 독립은 76.9%이었다. 보건관리자는 촉탁 60.4%이었고, 경영주는 산업간호에 대하여 대부분 긍정적이었다.

2. 업무수행정도에 영향을 미치는 요인 : 간호사의 연령 30~34세에서 업무수행 정도가 높고, 25~29세는 낮게 나타났으나 유의하지 않았다. 대졸이상의 학력자는 전문대졸보다 업무수행정도가 높았으나 유의한 차이는 없었다. 4년의 경력을 가진 간호사의 업무수행 정도가 높았으며, 1년미만은 낮게 나타났으나 유의하지 않았다. 취업동기가 사명감인 경우 대체로 높은 수행정도를 나타내었지만 유의하지 않았고, 간호제공과 환경관리업무에서는 취업동기간에 유의한 차이를 나타내었다($p < 0.01$).

업무에 대하여 만족하는 경우 업무수행 정도가 높았지만 유의하지 않았다. 산업간호사의 근무여건중 근무시간이 9시간 이하인 경우와 의무실이 독립되어 있는 경우 수행정도가 높았지만 유의하지 않았다. 경영주가 산업간호의 필요성을 인식한 경우 수행정도가 높아 유의한 결과를 나타내었다($p < 0.05$). 보건관리자가 전담인 경우 업무수행정도가 높으며, 특히 복지후생업무정도가 높은 결과를 나타내어 유의하였다($p < 0.05$).

서울시 산업간호사의 업무에 관한 조사연구

대한간호, 제26권 제5호, 1987

정연강 · 권혜진 · 조동란

본 연구는 서울시의 산업체에 근무하는 간호사의 업무분석을 위하여 시도되었다. 이를 위해 1986년 8월 25일부터 9월 30일까지 91명의 산업간호사를 대상으로, 직접 면접과, 1주일 동안의 업무기록을 통하여 수집된 자료를 분석하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 연구대상

연구대상자가 속해 있는 사업체의 규모는 300~1,000명이 39.6%이었고 업종은 제