

용면, 제3요인은 지지면, 제4요인은 자아존중면으로 명명하였으며, 각각의 요인들은 보건담당자의 사기에 제1요인 41.8% 제2요인 8.8%, 제3요인 6.6%, 제4요인 5.7%의 설명력을 갖는 것으로 나타났다.

충청지역 산업보건 관리실태와 건강관리 보건담당자의 사기에 관한 조사연구

충남의대 잡지, 제15권, 1988

김태숙 · 김종임

본 연구는 충청지역 산업체의 보건관리 실태와 건강관리 보건담당자의 사기를 알아보기 위해 시도되었다.

1987년 8월에 63개 충청지역 산업체를 임의추출하여 질문지법을 사용하여 자료를 수집하였고 다음과 같은 결론을 내리고자 한다.

1. Webb's Scale에 의해 조사된 각 산업체의 보건관리실태는 백분률로 환산하여 46%였으며 목표와 조직에 대한 긍정적 점수분포는 63%를 나타내었다.
2. 건강관리 보건담당자의 특성을 보면 산업간호사가 21%였으며, 연령분포는 20~34세가 가장 많은 수를 차지하고 있었다.
3. 건강관리 보건담당자의 사기를 측정 한 결과 67%를 나타내었다.
4. 산업 보건관리 실태와 건강관리 보건담당자의 사기간의 상관관계는 통계적으로 유의하지 않았다.

위와 같은 결과에서 다음과 같은 제언을 하고자 한다.

산업보건관리실태를 측정하는데 우리나라 실정에 더욱 적합한 도구의 개발이 필요하며, 건강관리 보건담당은 업무수행능력이 갖추어진 산업간호사로 이루어져야 하며 근로자들의 보다 질적인 산업체 건강관리가 이루어 질 때 국민건강의 향상을 가져올 수 있으리라 사료된다.

일부지역 여학생근로자의 영양실태 조사

중앙의학, 제53권 제8호, 1988.

안 태 성