

白癩風・白駁風의 治療에 對한 文獻的 考察

姜 暲 竣*・安 徹**

I. 緒 論

肺에 熱이 몰려 있는데 또 風邪가 겹으로 皮膚를 傷하게 하면 熱과 風邪가 서로 어울려 독한 邪氣가 되어 腠理에 머물러 있게 된다. 이것이 衛氣와 相搏되면서 흩어지지 못하면 皮膚에 주름이 잡히면서 白斑點이 생긴다. 이것을 白癩風이라 한다.³⁾ 白癩風을 現代醫學에서는 癩風(어루레기, Tinea versicolor)이라 하며 Malassezia furfur 라는 眞菌이 原因菌이며 慢性으로 經過하기 쉬운 表在性 眞菌症(superficial mycosis)이다.⁵⁾

白駁風은 肺에 있는 風邪가 皮膚 사이를 往來하면서 오래도록 없어지지 않기 때문에 생기며 흔히 얼굴이나 목에 생기는데 여기저기 흰 斑點이 생기며 혈지도 않고 가렵지도 않다.³⁾ 現代醫學에서는 白斑症이라하며 正確한 原因은 아직 未詳이나 現在까지 說明되는 病因으로서는 免疫說, 神經體液說, 멜라닌細胞 自家 破壞說 等の 3가지가 가장 有力하다⁵⁾

白癩風과 白駁風은 慢性的이며 難治에 屬하는 皮膚疾患인데 姜³⁾은 이들 疾患의 原因・症狀를 研究 考察하였으나 治療에 대해서는 研究 考察하지 않았으므로 白癩風, 白駁風과 關聯된 東西洋의 文獻 21種을 調査 整理하였던 바 有意하였기에 報告하는 바이다.

II. 資料 및 方法

1. 資 料

白癩風, 白駁風과 關聯된 東西洋의 文獻 21種을 選定하여 治法에 關한 內容을 收集하였다.

2. 方 法

(1) 白癩風과 白駁風을 나누어 治方을 調査 整理하였다.

(2) 白癩風과 白駁風의 治方은 內服藥, 外用藥으로 나눠 調査 整理하였다.

(3) 白癩風과 白駁風의 內服藥은 다시 處方名이 있는 것과 없는 것으로 나눠 調査 整理하였다.

(4) 灸治療法도 調査 整理하였다.

III. 資 料

A. 西洋醫學의인 觀察

1. 臨床皮膚科學⁵⁾

어루레기(癩風, Tinea versicolor)

치 료

여러 종류의 국소 항진균제의 치료에 잘 반응하지만 재발을 잘 하고 만성으로 경과하므로 지속적으로 수주간에 걸쳐 도포하며 Wood 등 검사로 추적 관찰하여 재발 여부를 파악해야

* 慶熙大學校 韓醫科大學 外官科學教室

** 세제한의원 원장

한다. Imidazole 유도체, tolnaftate, haloprogin 등 국소 항진균제 이외에 20% sodium thiosulfate, 25% selenium sulfide 등도 효과적이며 ketoconazole 을 내복하는 것도 효과가 있다.

白斑症(vitiligo)

치 료

아직도 완전한 치료법의 개발은 미진한 상태로서 환자들은 미용상 내지는 정신적 압박을 받고 있으므로 이들을 잘 설명하여 이해시키도록 한다. 또한 적절한 백반부의 일광차단제 사용으로 일광손상을 막으며 더 나아가 color contrast 를 줄이도록 한다. 현재까지 가장 각광을 받고 있는 치료는 psoralen 을 이용한 자외선치료법과 스테로이드劑이다.

1) 광화학요법(Photochemotherapy)

광감작제인 psoralen(8-MOP, 8-methoxypsoralen) TMP(trimethylpsoralen) 을 내복한 후 日光이나 장파자외선(UVA)을 조사한다(PUVA). TMP가 8-MOP보다 광독성이 적으므로 피부형Ⅲ이나Ⅳ에서 일광을 광원으로 하는 경우 경구 TMP가 더 좋다. 치료는 대개 일주일에 2-3회씩 시행하는데 광선조사 24시간 후에 약간 홍반이 나타나는 광선량으로부터 시작하여 차차 증량하여 홍반을 유지시키는 범위내에서 적당 조사한다.

백반부위가 광범위하지 않고 대개 직경 10cm 이하의 작은 범위인 경우 0.1~0.3% 8-MOP 용액의 국소도포후 광선이나 장파자외선을 조사하는 국소 광화학 요법으로도 좋은 효과를 낼 수 있다. Psoralen 치료시 색소침착은 대개 수주 후에 시작되나 좋은 효과를 얻기 위해서는 100회 이상의 장기간에 걸쳐서 시행하여야 한다. 색소침착이 되는 경우 대개 병소의 모낭주위에서 시작하여 주의로 파급되

기도 하고 병소의 가장자리에서 시작하여 중앙부로 파급되어 들어오기도 한다. 이러한 치료는 물론 소아나 임신부는 피하는 것이 좋고 광과민 피부질환, 간질환, 백내장, phenothiazine 등 광과민 약물을 복용하는 경우 등에서는 사용하지 않는 것이 좋다.

2) 스테로이드 치료

국소도포나 triamcinolone 을 이용한 국소 주사는 적은 범위인 경우 유용하고 광범위한 부위에 확산된 경우 스테로이드를 전신 투여하는데 장기 치료이므로 부작용을 염두에 두어야 한다.

3) 기 타

Hydroquinone 제제 등으로 전신형 경우 남아 있는 색소를 제거하기도 하며 미용상 문제가 되는 부위는 covermark나 적당한 화장품 등의 사용으로 cover 시키도록 한다. 상처를 받은 후 Koebner 현상이 올 수 있으므로 피부가 상처를 받지 않도록 하며 phenol 이나 catechol 을 함유하는 물질을 사용하는 경우 내지는 직업에 종사하는 경우 주의를 요한다.

2. 最新診斷과 治療¹⁾

癬風(어루러기)

1) 治療方針

① 身體를 잘 洗淨하고 땀을 자주 딱아 乾燥돼 있도록 하고 내의를 자주 바꾸어 입도록 한다.

② 基礎疾患의 治療, 免疫抑制劑(특히 steroid劑)의 사용에 유의한다.

③ 일반적으로 患者自身이 治療가 된 것으로 判定하고 治療를 中止하는 傾向이 있는데 治療判定은 菌學的 檢査로서 결정하도록 한다.

2) 藥物療法

一般的으로 本症에서는 藥劑間에 特異한 차이가 그렇게 많지는 않다고 한다.

(處方例)

- 1) Clotrimazole
- 2) Tolnaftate
- 3) 5% 살칠酸알콜液
- 4) Selenium disulfide

尋常性白斑(Vitiligo Vulgaris)

〈處方과 治療〉

1. PUVA療法

Psoralen을 內服 혹은 外用하여 長波長의 紫外線(UVA)을 조사한다. 이 치료법은 全病型에 有效하다. 皮疹이 광범할 때에는 methoxsalen을 內服하고 한국성일 때에는 1% 옥소라렌로션을 外用하고 30分 후에 紫外線을 照射한다. 통상 1주에 2회 실시한다. 線量은 피부가 變경계 潮紅되는 정도가 좋다. 그런데 태양광선의 照射時에는 線量의 가감이 곤란하며 강한 皮膚炎을 일으키는 경우가 있으므로 조심해야 한다. 그리고 內服에 있어서는 눈의 보호에 세심하게 주의하도록 환자를 지도해야 한다.

2. 副腎皮質 hormone 外用療法

鳥狀으로 비교적 小型의 白斑이 생긴 型으로서 비교적 초기의 것에 有效하다. beta-methasone-valerate cream과 fluocinonide 연고 등을 사용한다. 이 방법은 PUVA 療法일 때에 일어나는 周邊部의 정상피부에 色素沈着을 일으키지 않으며 치료과정에 있어서 美容上의 문제가 적은 점이 잇점이나 藥劑의 부작용으로서 비교적 속히 皮膚萎縮과 血管擴張이 나타나므로 주의하도록 해야 한다.

3. Carpronium chloride 液의 外用療法

특히 dermatome에 일치하여 配列한 型에 使用되고 있다. 一過性인 發赤 發汗을 일

으키는 경우가 있으므로 小兒에 使用할 때에는 특히 注意를 요한다.

B. 東洋醫學의인 觀察

1. 千金翼方¹⁴⁾

治白癩白駁浸淫癢瘍著類及胸前方 大醋於甌底磨硫黃令如泥又以八角附子截一頭使半就甌底重磨硫黃使熟夜臥先布拭病上令熱乃以藥傅之重者三度又方 硫黃 水銀 礬石 龍墨

又方 石硫黃 附子 鐵精

灸法 五月五日午時灸膝外屈脚當文頭隨年壯兩處灸一時下火不得轉動

治頭項及面上白駁浸淫漸長有似於癬但無瘡方

乾鰻鱺魚炙脂塗之先洗拭駁上外把刮之令小瘡

痛拭燥然後以魚脂塗之一塗便愈難者不過三塗之佳

又方 取生木空中水洗之食頃止

又方 桂心末唾和傅駁上日三

又方 白芨 當歸 附子 天雄 黃芩 乾薑 躑躅

2. 外臺秘要¹⁷⁾

廣濟療白癩風方

苦參 露蜂房 松脂 附子 防風 梔子人 烏蛇脯 木蘭皮

又方

黑油麻 生地黃 桃人

又方

礬石 硫黃

千金療白癩風方

酒服生胡麻油

又方

礬石 硫黃

千金療白癩風方

酒服生胡麻油

又方

指上令破 搗羅摩白汁塗之

崔氏療白癩風神效方

雌黃 木蘭皮 白朮 苦參 芎藭 麻黃 山茱萸 甘草

狗脊 枳實 秦艽 沙參 細辛 牛膝 白斂 人參
當歸 薯蕷 白芷 防風 附子 桑耳子
古今錄驗療抱白癩風 商陸散方
生商陸根 白斂 天雄 黃芩 乾薑 附子
躑躅花

又療白癩風 附子膏方
附子 天雄 烏頭 防風
又方

羅摩草煮以拭之 取差

集驗療頸項及頭面上白駁 侵淫漸長有似癬 但無瘡 可療之方

乾鰻鱺魚脂以塗之

又方

取蛇蛻皮熟摩之數百過 棄皮置草中

又療身體白駁方

取木空中水洗之 搗桂屑唾和傅駁上。

古今錄驗療面白駁方

弊帛 蟬蛻 蒂 甌荷 脯脂 履底 蛇皮

又方

荷葉裹鮓合葉相和 更裹令大臭爛 先拭令熱 傅之

又療舉體苦白駁 經年不差 此風虛 生菖蒲酒方

陸地菖蒲 天門冬 天雄 麻子人 茵芋 乾漆

乾地黃 遠志 露蜂房 苦參 黃耆 獨活 石斛

柏子人 蛇皮 大蓼子

3. 證治準繩¹⁶⁾

白癩風

夫肺有壅熱又風氣外傷於肌肉熱與風交并邪毒之氣伏留於腠理與衛氣相搏不能消散令皮膚皴起白斑點故名白癩風也

烏蛇散 治身體頭麻及生白癩風

烏蛇 白僵蠶 獨活 天麻 胡麻子 天南星 白附子

川烏頭 桂心 防風 細辛 枳殼 蟬蛻

防風湯 治白癩風

防風 地骨皮 山梔子 王不留行 荆芥穗

惡實 人參 生乾地黃 甘草

苦參散 治肺藏久積風毒皮膚間生白癩不止

苦參 松脂 附子 梔子仁 木蘭皮 露蜂房
烏蛇

摩風膏 一治白癩風

附子 川烏頭 防風 凌霄花 躑躅花 露蜂房

又方

硫黃 蜜陀僧 膩粉 乳香 杏仁 白僵蠶
治白癩風

紅灰薰草 蒼耳根莖 茄子根莖

治白癩風胡桃塗之

胡桃 硫黃 白礬

治白癩風

附子 硫黃 鷄子

玉粉膏 治白癩風

白礬 硫黃

治白癩風如雪色

硫黃 香墨

三聖膏 治白癩風

硫黃 黃丹

治白癩風

草烏 芭豆

紫桂散 治白點漸長如癬

桂

又方

羅葡白汁 生白礬

又方

楸木白皮

治白癩風淋洗

桑柴灰

白駁

病源論云風白駁者面及頸項身體皮肉色變白與肉色不同亦不痒痛謂之白駁此亦是風邪搏於皮膚血氣不和所生也 夫白駁者是肺風流注皮膚之間久而不去之所致也多生於項面點點斑白但無瘡及不搔痒不能早療即使浸淫也

治面上風白駁

弊帛 蟾頭 蛇蛻皮 故麻鞋底 苕帚 飯帶

治白駁

硫黃 草決明 半夏 柝樹皮 蛇蛻皮

又方

雄黃 硫黃 附子

又方

雌黃 硫黃 蛇蛻皮

又方

硫黃 川烏頭

又方

桂心

又方

取樹孔中水溫熱洗之然後搗桂心牡蠣等分

又方

先用新布擦令赤用醋摩巴豆塗之

又方

鰻鱺魚脂

治白駁 用蛇蛻燒末醋調敷上

4. 東醫寶鑑²¹⁾

癩風癩瘍風白駁

凡人身體皮肉變色赤者謂之紫癩白者謂之白癩或謂之癩瘍風白駁者浸淫漸長色白似癬但無瘡也皆因風搏皮膚血氣不和所生宜胡麻散蒼耳散追風丸三黃散加減何首烏散如聖膏

胡麻散

胡麻子 苦參 荆芥穗 何首烏 威靈仙 防風

石菖蒲 惡實 甘菊 蔓荆子 白茯苓 甘草

蒼耳散

蒼耳葉日乾為末酒服

追風丸

何首烏 荆芥穗 苦參 蒼朮

三黃散

雄黃 硫黃 黃丹 天南星 白礬枯 蜜陀僧

治紫癩風方

官粉 硫黃

加減何首烏散

何首烏 蔓荆子 石菖蒲 荆芥穗 苦參 威靈仙

甘菊 枸杞子

如聖膏

附子 硫黃

治赤白汗斑方

雄黃 硫黃 全蝎 白僵蠶 白附子 蜜陀僧

麝香 生薑

5. 壽世保元¹¹⁾

紫癩風，白癩風，乃因心火汗出，及醉飽並浴後毛竅開時，乘風揮扇得之，扇風侵逆皮膚所致，宜服胡麻散，或追風丸，外以洗擦藥滌之。

論紫白癩風并癩，及面上酒瘡，又名粉瘡面刺，俱可服之

胡麻散

胡麻子 白芷 何首烏 防風 升麻 威靈仙

蔓荆子 甘菊花 苦參 川當歸 川芎藭 牛蒡子

荆芥穗 薄荷葉 片黃芩 白茯苓 白芍 黃連

治白癩風用雄鷄腎 白果仁

治汗斑方

白蓮花 半夏

治紫癩風，白癩風，即如今汗斑之類

白附子 雄黃 蜜陀僧

治紫白癩風神方

雄黃 雌黃 硫黃 白礬 白礬

治白癩風方 用杜茯苓子

6. 衛生寶鑑²⁰⁾

加減何首烏散 治紫白癩風

7. 外科大成¹³⁾

白駁癩，生於頸面，延及遍體，其色駁白，亦無痛痒，形如雲片，宜先刮患處至燥痛，取鰻魚脂敷之，三上自效，內服浮萍丸，蒼耳膏等，或可奏效。

浮萍丸

浮萍

蒼耳膏

蒼耳鮮者，連根帶葉

癩瘋，俗名汗斑也，紫因血滯，白因氣滯，皆由熱體被風濕所侵，留於腠理，搔之起皮而不痛，此從外來，治宜汗之，如紺珠丹，松漆丸，浮萍，蒼耳之類，再灸夾白穴，擦八葳靈散，自當獲效，非若白駁癩之難療也。

紺珠丹

茅朮 全蝎 石斛 明天麻 當歸 甘草

川芎 羌活 荆芥 防風 麻黃 北細辛

川烏 草烏 何首烏 明雄黃

松漆丸

漆樹頭 松節 皂角刺

八葳靈散

大附子 川烏 草烏 雄黃 硃砂 紅砒 硫黃

麝香

灸夾白穴法

先以墨塗兩乳頭，次令兩手直伸夾之，染黑處是穴灸二七壯，或針刺出血，亦愈

浮萍茯苓丸

浮萍，茯苓

8. 石室秘錄²²⁾

張公曰，凡人生白癩風，與紫癩風者，乃暑熱之時，人不知而用日晒之手巾，擦其身中之汗，便成此病，雖無害，而最難愈，方用 蒼耳子，防風，黃芪

9. 醫宗金鑑¹⁵⁾

紫白癩風無痒痛，白因氣滯紫血凝，熱體風侵濕相搏，毛竅閉塞發斑形

(注)此證俗名汗斑，有紫，白二種，紫因血滯 白因氣滯，總由熱體風邪，濕氣，侵入毛孔，與氣血凝滯，毛竅閉塞而成，多生面項，癢點游走，延蔓成片，初無痒痛，久之微痒，初起宜萬靈丹汗之，次以胡麻丸常服，外用蜜陀僧散擦患處，令汗出，風濕自解，古今治法雖多，取效甚少，得此證者，當忌魚腥，煎炒，火酒，動風，發物

胡麻丸

大胡麻，苦參，防風，石菖蒲，威靈仙，白附子 獨活 甘草

蜜陀僧散

雄黃 硫黃 蛇床子 蜜陀僧 石黃 輕粉

萬靈丹

茅山蒼朮 麻黃 羌活 荆芥 防風 細辛

川烏 草烏 川芎 石斛 全蝎 當歸 甘草

天麻 何首烏 雄黃

白駁風生面頸間，風邪相搏白點癩，甚延遍身無痒痛，治宜消風塗脂痊

(注)此證自面及頸項，肉色忽然變白，狀類癩點，并不痒痛，由風邪相搏於皮膚，致令氣血失和，施治宜早，若因循日久，甚者延及遍身，初服浮萍丸，次服蒼耳膏，外以穿山甲片先刮患處，至燥痛，取鱧鱺魚脂，日三塗之，一方取樹孔中水溫洗之，洗後搗桂心，牡蠣等分為末，面油調塗，日三夜一俱效

10. 驗方新編²¹⁾

白癩風 又名白駁風多生頭面白如雲片者是 用白鱈油茶之無則取白鱈曬乾煎枯取油擦之即愈 又方

土疾黎子 生磨為末

外用小麥

又方

猪肝

11. 萬病醫藥顧問¹⁸⁾

紫白癩風類

(病源)

風邪濕氣侵入，熱體之人，經風邪濕氣，侵入毛孔，與熱相結，凝留不解，氣血阻滯，毛竅閉塞，多發面項癢點，游走蔓延成片，有紫白二種，紫因血滯，白因氣滯，是謂紫白癩風病，此病俗名汗斑。

(病狀)

蔓延皮片 紫白癩風病多生面項，發出癢點，有紫

白二種，紫因血滯，白因氣滯，遊走蔓延成片，初無痛癢久之微癢。

(變證)

脂水時流，紫白癩風病失治，風熱鬱結益甚，癩點蔓延益多，癢甚抓破，則脂水時流，沾及衣服

(療法)

⊖ 蔓延成片之療法

紫白癩風病多生面項，發出癩點，有紫白二種，紫因血滯，白因氣滯，遊走蔓延成片，初無痛癢，久之微癢，初起宜萬靈丹汗之，次之胡麻丸常服，外以蜜陀僧，散擦患處，令汗出風濕自解

⊖ 脂水時流之療法

紫白癩風病失治，風熱鬱結益甚，癩點蔓延益多，癢甚抓破，則脂水時流，沾及衣服，宜時以蜜陀僧散擦患處，可緩緩收功

(調養)

⊖ 忌食動風發物，紫白癩風病忌煎炒炙爆，膏染厚味，蝦蟹魚腥海味，鷄羊肉，火酒蚌蛤河豚等動風發物

⊖ 忌坐臥濕地，紫白癩風病患者忌坐臥濕韓，不可當風而臥，使風濕不侵，病易痊也。

⊖ 忌用手搔 紫白癩風病癢時忌用手搔，以手甲有毒，抓則毒延入內，病不愈也。如癢極不可忍時，宜以蜜陀僧散擦之，即能止癢，神效。

白駁風類

(病源)

風邪搏膚，風邪搏於皮膚，致令氣血失和，自面及頸項肉色，忽然變白，狀類癩點，是謂白駁風病

(病狀)

肉色變白 白駁風病自面及頸項，肉色忽然變白，狀類癩點，並不癢痛。

(變證)

延及遍身，白駁風病失治，風邪深伏，無由出路，白癩益多，延及遍身，雖不癢痛，有損美觀。

(療法)

⊖ 肉色變白之療法，白駁風病自面及頸項，肉色忽然變白，狀類癩點，並不癢痛，施治宜早，初服浮萍丸。次服蒼耳膏，外以穿山甲片，先刮患處，至燥痛，取鱧鱺魚脂，日三塗之，一方耳樹孔中水溫洗之，洗後搗桂心牡蠣等分為末，面油調塗，日三夜一，俱效

⊖ 延及遍身之療法，白駁風病失治，風邪深伏，無由出路，白癩益多，延及遍身，雖不癢痛，有損美觀，速以穿山甲片先刮患處，至燥痛，取鱧鱺魚脂日三塗之，甚效。

(調養)

⊖ 忌食動風發物，白駁風病忌食豬羊牛肉，蚌蛤河豚，蝦蟹海腥，鷄鵝火酒，煎炒炙爆，膏染厚味等動風發物。

⊖ 施治宜早 白駁風病施治宜早，乘其病根未深，可一鼓而平，若因循失治，病根深伏，難痊可也。

⊖ 不可當風而臥 白駁風病患者宜自謹慎，切不可當風而臥以臥熱後，毛孔齊開，風邪襲入，病益劇也。
12. 癩藥集成方³⁾

(聖惠方)

肺에 熱이 물려있는데 또 風邪가 겉으로 皮膚를 傷하게 하면 熱과 風邪가 서로 어울려 독한 邪氣가 되어 滕理에 머물러 있게 된다. 이것이 衛氣와 相搏되면서 흩어지지 못하면 피부에 주름이 잡히면서 白斑點이 생긴다. 이것을 白癩風이라 한다.

白癩風으로 온몸에 斑點이 생기면서 가려운 症狀을 치료하는 處方 黑油麻 桃仁 生乾地黄 白癩風을 치료하는 處方

먼저 生布로 白癩風이 생긴 곳을 약간 벗어질 정도로 문지른 다음 羅摩의 白汁을 내어 바르면 3회를 넘지 않아 낫는다.

(父方1) 生胡麻油

(父方2) 楸木白皮

本朝經驗：酸漿草

(叉方 3) 桑柴灰

(千金方)

非頭露

(本草)

疾藜花

鍼灸法

(資生經)

白癩風에는 양쪽 가운데손가락 본마디에서 밖으로 오목한 곳에 뜸을 3壯 뜨며 낮지 않으면 다시 뜬다. 白駮風, 白癩風에는 午日 午時에 무릎을 구부릴 때 생기는 바깥쪽 금 끝에 나이만큼 뜸을 뜬다. 양쪽을 같이 뜨면서 움직이지 말아야 한다. 또한 白癩風, 白駮風, 浸淫瘡, 癩瘍風 등이 머리, 목, 가슴에 생겼을 때는 두 젖꼭지 사이의 중간에 나이만큼 뜸을 뜨면 낫는다.

(聖惠方)

白駮風은 肺에 있는 風邪가 皮膚 사이를 往來하면서 오래도록 없어지지 않기 때문에 생기는 것이다. 흔히 얼굴이나 목에 생기는데 여기저기 흰 斑點이 생기며 혈지도 않고 가렵지도 않다. 初期에 치료하지 않으면 빨리 퍼진다.

얼굴에 생긴 白駮風을 치료하는 處方

幣扇, 蟬頭, 苕帶, 甌帶, 脂脯, 故麻, 鞋底, 蛇蛻皮

(叉方) 蛇蛻皮

(外臺秘要)

온몸에 생긴 白駮風을 치료하는 處方

蛇蛻皮

(本草)

白駮風을 치료하는 處方

鱧鱗魚

鍼灸法

白癩風과 同一

13. 證治概要¹²⁾

汗斑亦稱紫白癩風, 初起顔面, 頸部或全身其他部位出現圓形或橢圓形之斑點, 并不痛痒, 亦無鱗屑, 逐漸擴大, 則周圍邊緣皮色加深, 此證雖風邪搏於皮膚而起, 發病之始, 氣液即不能輸布於皮毛(患處局部), 但少全身症狀, 與熱盛津傷之證不同, 內服宜疏風活血, 用刺疾藜 何首烏, 旱蓮草, 丹蔘, 白附子, 甘草, 外用, 蛇床子 土大黃, 蜜陀僧, 雄黃, 硫黃, 苦蔘, 輕粉.

玉紅膏

當歸 白芷 甘草 紫草 桃仁 血竭 輕粉 麻油 白蜡

14. 醫宗損益⁸⁾

癩風癩湯風白駮

人肉變色赤者謂之紫駮白者謂之白癩或謂之癩瘍風皆由風搏皮膚血氣不和所生

烏蛇酒

烏蛇 防風 桂心 白疾藜 五加皮 乾地黃 天麻 牛膝 枳殼

15. 東醫臨床要覽²⁾

(類別)

紫白癩風(癩瘍風, 白斑病, 白駮風)

(部位)

全身

(病因)

風濕侵入, 氣血瘀滯(紫色은 血滯, 白色은 氣滯)

(症狀)

皮膚에 白色 혹은 紫色의 斑點이 發生하여 游走하는데, 곧 全身에 퍼져서 片狀을 이루며 간혹 약간의 가려움을 느끼기도 하는 경우.

(治療法)

(內治) 胡麻丸 혹은 保安萬靈丹으로 發汗시킨다.

(外治) 蜜陀僧散, 白駁片, 黃靈藥

胡麻丸

當歸, 乾地黃, 何首烏, 黑胡麻, 白芍, 牡蠣

白駁片

紫草, 降真香, 金錢重樓, 白藥子, 白薇, 蒼朮

烏賊骨 紅花 桃仁 生首烏 龍膽草 刺蒺藜 甘草

黃靈藥

火硝 枯礬 水銀

16. 方證新編⁴⁾

白斑 및 白癜風

胡麻丸 保安萬靈丹

外治 蜜陀僧散 白駁片

17. 中醫臨床手冊¹⁰⁾

白斑病中醫稱 “白駁風”, “俗稱”, “白癜風”

(診查要點)

一. 患處皮膚色素消失, 界限清楚, 毛髮多同時變白 邊緣有色素沉着

二. 可發於全身各部, 經過緩慢, 歷久不變, 偶亦有自行消失的

三. 無疼痛等自覺症狀

(治療方法)

一. 內服藥 白駁片

二. 外用藥 25% 補骨脂酊, 25% 菟絲草酒精, 茶藥後最好用日光晒 20 分鐘. 或紫外線照 2~3 分鐘, 對紫外線過敏者忌用.

三. 單方草藥

白蒺藜 或 潼蒺藜

紫背浮萍

蒼耳莖, 葉, 子

18. 中醫外科學¹⁰⁾

(病因病理)

多由熱體被風濕所侵, 鬱於皮膚腠理所致, 或因汗衣著體, 復經日晒, 暑濕侵體毛竅而成.

(治療)

用蜜陀僧散乾撲, 或用二號癬藥水 或 10% 土槿皮酊 或 1~3% 克霉唑軟膏外搽, 亦可紫外線照射.

(護理與預防)

爲了防止傳染和復發, 病人所着汗衫, 短褲宜煮沸消毒

19. 漢方外科⁶⁾

白駁風

療法

食餌療法 및 生活樣式: 豬, 羊, 牛肉, 조개, 복, 새우, 술, 燻製肉 등을 忌하고 바람을 避하고 安靜하는 것이 좋다.

藥物療法

① 初期: 浮萍丸을 먼저 投與하고 다음에 蒼耳膏을 投與한다.

② 患部를 잘 긁어내고 疼痛할 때: 땀장이 자주 바르는 것이 좋다.

③ 蛇退를 태워 粉末하여 醋에 調製하여 붙이거나 蛇退皮로 맛사아지하는 것이 좋다.

灸法: 膝外屈脚處를 年壯으로 灸하고 浸淫이 되었을 때는 兩乳間을 年壯으로 灸하는 것이 좋다.

紫白癜風

療法

食餌療法 및 生活樣式: 食餌療법은 白駁風과 同一하고, 生活樣式은 濕한 곳을 避하여 風濕의 侵入을 防止하여야 한다.

藥物療法

① 初期: 萬靈丹, 胡麻丸, 蒼耳膏, 浮萍茯苓丸 등을 投與하고 患部에는 蜜陀僧散, 八寶靈散을 바른다.

② 蒼耳散 追風丸 三黃散 加減何首烏散 등을 投與한다.

③ 百一選方(赤芍藥 當歸 苦參 赤土)

IV. 白癩風, 白駁風의 治方分析

1. 白癩風의 內服藥

(1) 處方名이 있는 境遇

No	處方名	頻度數
1	商陸散 ¹⁷⁾	1
2	附子膏 ¹⁷⁾	1
3	烏蛇散 ¹⁶⁾	1
4	防風湯 ¹⁶⁾	1
5	苦參散 ¹⁶⁾	1
6	胡麻散 ⁷⁾	1
7	追風丸 ⁷⁾⁶⁾	2
8	加減何首烏散 ⁷⁾⁶⁾	2
9	胡麻散 ¹¹⁾	1
10	紺珠丹 ¹³⁾	1
11	松漆丸 ¹³⁾	1
12	浮萍茯苓丸 ⁶⁾¹³⁾	2
13	萬靈丹 ²⁾⁴⁾⁶⁾¹⁶⁾¹⁸⁾	5
14	胡麻丸 ²⁾⁴⁾⁶⁾¹⁵⁾¹⁸⁾	5
15	烏蛇酒 ⁸⁾	1

(2) 處方名이 없는 境遇

① 千金翼方¹⁴⁾

白芨 當歸 附子 天雄 黃芩 乾薑 龜鱉

② 外臺秘要¹⁷⁾

④ 苦參 露蜂方 松脂 附子 防風 梔子
烏蛇脯 木蘭皮

⑤ 黑油麻 生地黃 桃仁

⑥ 雌黃 木蘭皮 白朮 苦參 川芎 麻黃 山
茱萸 甘草 狗脊 枳實 秦艽 沙參 細辛 白斂 人
參 當歸 薯蕷 白芷 防風 附子 皂耳子

③ 石室秘錄²²⁾

蒼耳子 防風 黃芪

④ 證治概要¹²⁾

白疾黎 何首烏 旱蓮草 丹參 白附子

⑤ 漢方外科⁶⁾

赤芍藥 當歸 苦參 赤土

2. 白癩風의 單方藥

(1) 外臺秘要¹⁷⁾

生胡麻油

(2) 東醫寶鑑⁷⁾

蒼耳葉

(3) 壽世保元¹¹⁾

土疾黎子

(4) 外科大成¹³⁾

浮萍, 蒼耳連根帶葉

(5) 醫宗金鑑¹⁵⁾

蒼耳連根帶葉

(6) 驗方新編²¹⁾

土疾黎子

(7) 鄉藥集成方³⁾

生胡麻油

(8) 中醫臨床手冊¹⁹⁾

白疾黎, 潼疾黎, 紫背浮萍, 蒼耳莖葉子

(9) 韓方外科⁶⁾

蒼耳連根帶葉

3. 白癩風의 外用藥

(1) 千金翼方¹⁴⁾

① 硫黃 水銀 礬石 龜墨

② 石硫黃 附子 鐵精

③ 鱧鱺魚脂

④ 桂心末

(2) 外臺秘要¹⁷⁾

① 礬石 硫黃

② 羅摩白汁

③ 附子膏: 附子 天雄 烏頭 防風

④ 羅摩草

(3) 證治準繩¹⁶⁾

① 摩風膏: 附子 烏頭 防風 凌霄花 鱧鱺

花 露蜂房

- ② 硫黃 蜜陀僧 膩粉 乳香 杏仁 白僵蠶
- ③ 紅灰 覆草 食耳根莖 茄子根莖
- ④ 胡桃 硫黃 白礬
- ⑤ 附子 硫黃 鷄子
- ⑥ 玉粉膏：白礬 硫黃
- ⑦ 硫黃 香墨
- ⑧ 三黃膏：硫黃 黃丹
- ⑨ 草烏 芭豆
- ⑩ 紫桂散：桂
- ⑪ 蘿蔔白汁 生白礬
- ⑫ 楸木白皮
- ⑬ 桑柴灰

(4) 東醫寶鑑⁷⁾

① 三黃散：雄黃 硫黃 黃丹 天南星 白礬 枯蜜陀僧

② 官粉 硫黃

③ 如聖膏：附子，硫黃

④ 雄黃 硫黃 全蝎 白僵蠶 白附子 蜜陀僧

麝香 生薑

(5) 壽世保元¹¹⁾

① 雄鷄腎，白果仁

② 白蓮花 半夏

③ 白附子 雄黃 蜜陀僧

④ 雄黃 雌黃 硫黃 白砒 白礬

(6) 外科大成¹³⁾

八威靈散：附子 川烏 草烏 雄黃 硃砂 紅

砒 硫黃 麝香

(7) 醫宗金鑑¹⁵⁾

蜜陀僧散：雄黃 硫黃 蛇床子 蜜陀僧 石黃 輕粉

(8) 驗方新編²¹⁾

白鱧油 豬肝 小麥

(9) 萬病醫藥顧問¹⁸⁾

蜜陀僧散

(10) 鄉藥集成方³⁾

① 楸木白皮

② 酸漿草

③ 桑柴灰

④ 韭頭露

⑤ 蒺藜花

(11) 證治概要¹²⁾

① 蛇床子 大黃 蜜陀僧 雄黃 硫黃 苦參 輕粉

② 玉紅膏：當歸，白芷，甘草，紫草，桃仁，血竭，輕粉，麻油，白蜡

(12) 東醫臨床要覽²⁾

① 蜜陀僧散

② 白駁片：紫草 降真香 金錢重樓 白藥子 白薇 蒼朮 烏賊骨 紅花 桃仁 生首烏 龍膽草 刺蒺藜 甘草

③ 黃靈藥：火硝 枯礬 水銀

(13) 方證新編⁴⁾

① 蜜陀僧散

② 白駁片

(14) 韓方外科⁶⁾

① 蜜陀僧散

② 八威靈散

③ 三黃散

4. 白駁風斗 內服藥

(1) 處方名이 있는 境遇

① 外臺秘要¹⁷⁾

生菖蒲酒：乾地黃 遠志 露蜂房 苦參 黃芪 獨活 石斛 柏子人 蛇皮 大蓼子

② 東醫寶鑑⁷⁾

白癩風斗 同一

③ 醫宗損益⁸⁾

白癩風斗 同一

④ 東醫臨床要覽²⁾

白癩風斗 同一

⑤ 方證新編⁴⁾

白癩風斗 同一

(2) 處方名이 없는 境遇

① 千金翼方¹⁴⁾

白癩風斗 同一

② 外臺秘要¹⁷⁾

幣帛 蟬頭 帶 甌帶 脯脂 履底 蛇皮

③ 證治準繩¹⁶⁾

幣帛 蟬頭 蛇蛻皮 故麻鞋底 苕帚 甌帶

④ 鄉藥集成方³⁾

幣帛 蟬頭 苕帚 甌帶 脂脯 故麻 鞋底

蛇蛻皮

5. 白癩風斗 單方藥

(1) 東醫寶鑑⁷⁾

白癩風斗 同一

(2) 外科大成¹³⁾

① 浮萍丸：浮萍

② 蒼耳膏：蒼耳連根帶葉

(3) 醫宗金鑑¹⁵⁾

外科大成斗 同一

(4) 驗房新編²¹⁾

白癩風斗 同一

(5) 萬病醫藥顧問¹⁸⁾

外科大成斗 同一

(6) 中醫臨床手冊¹⁹⁾

白癩風斗 同一

(7) 韓方外科⁶⁾

外科大成斗 同一

6. 白癩風斗 外用藥

(1) 千金翼方¹⁴⁾

白癩風斗 同一

(2) 外臺秘要¹⁷⁾

① 鱧鱺魚脂

② 蛇蛻皮

③ 桂屑

④ 幣帛 蟬頭 帶 甌帶 脯脂 履底 蛇皮

⑤ 荷葉

(3) 證治準繩¹⁶⁾

① 幣帛 蟬頭 蛇蛻皮 故麻 鞋底 苕帚 甌帶

② 硫黃 草決明 柎樹皮 蛇蛻皮

③ 雄黃 硫黃 附子

④ 雌黃 硫黃 蛇蛻皮

⑤ 硫黃 川烏頭

⑥ 桂心 牡蠣

⑦ 巴豆

⑧ 鱧鱺魚脂

⑨ 蛇蛻燒末

(4) 東醫寶鑑⁷⁾

白癩風斗 同一

(5) 壽世保元

鱧鱺魚脂

(6) 醫宗金鑑¹⁵⁾

① 鱧鱺魚脂

② 桂心 牡蠣

(7) 驗方新編²¹⁾

白癩風斗 同一

(8) 萬病醫藥顧問¹⁸⁾

醫宗金鑑斗 同一

(9) 鄉藥集成方³⁾

① 幣帛 蟬頭 苕帚 甌帶 脂脯 故麻 鞋底

蛇蛻皮

② 蛇蛻皮

③ 鱧鱺魚

(10) 東醫臨床要覽²⁾

白癩風斗 同一

(11) 方證新編⁴⁾

白癩風斗 同一

(12) 韓方外科⁶⁾

① 뱀장어 기름

② 蛇退

7. 白癩風, 白駁風의 灸法

(1) 千金翼方¹⁴⁾

五月五日五時灸膝外屈脚當文頭隨年壯兩處
灸一時下火不得轉動(白癩風과 白駁風)

(2) 外科大成¹³⁾

灸夾白穴法: 先以墨塗兩乳次冷兩手直伸夾
之 染點處是穴 灸二七壯 或 針刺出血, 亦愈(白
癩風)

(3) 鄉藥集成方³⁾

① 양쪽 가운데 손가락 본마디에서 밖으로
오목한 곳에 뜸을 3壯 뜨며 낮지 않으면 다
시 뜸다(白癩風)

(4) 韓方外科⁶⁾

千金翼方과 同一(白駁風)

V. 總括 및 考察

白癩風과 白駁風은 서로 다른 疾病임에도 不
拘하고 治療하는 藥物이나 鍼灸 治療法은 大同
小異하였다.

孫¹⁴⁾은 白癩風과 白駁風을 나누지 않고 같
이 治療했는데 處方名이 없는 處方 1種과 4가
지의 外用藥을 記錄하였다.

王¹⁷⁾은 白癩風과 白駁風을 나누어 治療했
는데 內服藥으로 商陸散 1種과 處方名이 없
는 處方 3種, 單方藥 1種 그리고 外用藥 4種
으로 白癩風을 治療했고 白駁風은 內服藥으로
生葛蒲酒 1種과 處方名이 없는 處方 1種 그리
고 外用藥 5種으로 治療했다.

王¹⁶⁾은 白癩風과 白駁風을 나누어 治療했
는데 內服藥으로 烏蛇散 防風湯 苦蔘散 3種과
13種의 外用藥으로 白癩風을 治療했고 白駁風
은 處方名이 없는 處方 1種과 9種의 外用藥
으로 治療했다.

許⁷⁾는 白癩風과 白駁風을 나누지 않고 治

療했는데 內服藥으로 胡麻散 追風丸 加減何首
烏散 3種과 1種의 單方藥, 그리고 4種의 外
用藥으로 治療했다.

龔¹¹⁾은 白癩風만 取扱했는데 內服藥으로 胡
麻散追風丸 2種과 1種의 單方藥 그리고 外用
藥 4種으로 治療하였다.

羅²⁰⁾는 內服藥인 加減何首烏散 1種으로 白
癩風을 治療하였다.

祁¹³⁾는 白癩風과 白駁風을 나누어 治療했
는데 內服藥으로 紺珠丹 松漆丸 浮萍茯苓丸 3
種과 1種의 單方藥 그리고 1種의 外用藥으로
白癩風을 治療했고 白駁風은 單方藥 2種으로
治療했다.

陳²²⁾은 處方名이 없는 處方 1種으로 白癩
風을 治療했다.

吳¹⁵⁾와 陸¹⁸⁾은 白癩風과 白駁風을 나누어
治療했는데 內服藥으로 萬靈丹 胡麻丸 2種과
外用藥 1種으로 白癩風을 治療했고 白駁風은
單方藥 2種과 外用藥 2種으로 治療했다.

李²¹⁾는 單方藥 1種과 外用藥 3種으로 白癩
風과 白駁風을 같이 治療하였다.

鄉藥集成方³⁾에는 白癩風과 白駁風을 나누
어 治療했는데 單方藥 1種과 外用藥 5種으로
白癩風을 治療했고 白駁風은 外用藥 3種으로
治療했다.

歐¹²⁾는 內服藥으로 處方名이 없는 處方 1
種과 外用藥 2種으로 白癩風을 治療하였다.

黃⁸⁾은 內服藥 烏蛇酒 1種으로 白癩風과 白
駁風을 함께 治療했다.

金²⁾은 白癩風과 白駁風을 같이 治療했는데
處方名이 있는 處方 胡麻丸, 萬靈丹 2種을 內
服藥으로 外用藥 3種으로 白癩風과 白駁風을
治療했다.

宋⁴⁾도 金²⁾과 거의 같고 外用藥 黃靈藥을
언급하지 않았다.

中醫臨床手冊¹⁹⁾에서는 白癩風과 白駁風을 나누지 않고 같이 治療했는데 內服藥으로 白駁片 1種과 2種의 外用藥으로 治療하였다.

顧¹⁰⁾는 外用藥 4種으로 白癩風을 治療하였다.

蔡⁶⁾는 白癩風과 白駁風을 나누어 治療했는데 內服藥으로 萬靈丹 胡麻丸 浮萍茯苓丸 追風丸 加減何首烏散 5種과 處方名이 없는 處方 1種 그리고 單方藥 1種과 外用藥 2種으로 白癩風을 治療했고 白駁風은 單方藥 2種과 外用藥 2種으로 治療했다.

VI. 結 論

調査 整理한 19種의 韓方 文獻中에서 白癩風과 白駁風을 分類하여 治療한 文獻은 7種, 分類하지 않고 治療한 文獻은 7種, 白癩風만 治療한 文獻은 5種이었다.

1. 白癩風의 內服藥으로는 萬靈丹과 胡麻丸이 가장 많이 使用되었고 單方藥으로는 浮萍과 蒼耳膏, 그리고 外用藥으로는 蜜陀僧散이 가장 많이 使用되었다.

2. 白駁風의 內服藥으로 萬靈丹과 胡麻丸이 가장 많이 使用되었고 單方藥으로는 浮萍과 蒼耳膏 그리고 外用藥으로는 鰻鱺魚脂가 가장 많이 使用되었다.

3. 白癩風과 白駁風의 灸治療는 3回였다.

參 考 文 獻

1. 金東輝外 5 : 最新診斷과 治療, 서울, 藥業新聞出版局, pp.541-542, 552-553, 1986.
2. 金定濟外 1 : 東醫臨床要覽, 서울, 書苑堂, p.277, 349, 373, 392, 1977.
3. 世宗朝命撰 : 鄉藥集成方, 서울, 永林社,

- pp.97-101, 1987.
4. 宋炳基 : 方證新編 서울 東南出版社, p.84, pp.250-251, p.258, pp.267-268, p.613, 1983.
5. 李惟信 : 臨床皮膚科學, 서울, 麗文閣, p.125, pp.207-209, 1987.
6. 蔡炳允 : 韓方外科, 서울, 高文社, pp.294-296, 1986.
7. 許 浚 : 西醫寶鑑, 서울, 南山堂, p.285, 287, 1986.
8. 黃道淵 : 醫宗損益, 서울, 醫藥社, pp.282-283, 1976.
9. 姜基洪 : 白癩風과 白駁風에 對한 文獻의 考察, 慶熙大學校 大學院, 碩士第二期中間發表
10. 顧伯康 : 中醫外科學, 北京, 人民衛生出版社, pp.263-265, 1987.
11. 龔廷賢 : 壽世保元 下卷, 臺北, 宏業書局, pp.664-665, 1986.
12. 歐陽錡 : 證治概要 北京 人民衛生出版社, p.88, 1982.
13. 祁 坤 : 外科大成 臺北 文光圖書有限公司, pp.48-49, 319-320, 1979.
14. 孫思邈 : 千金翼方 臺北 集文書局, p.269, 1977.
15. 吳 謙 : 醫宗金鑑 外科心法要訣, 北京, 人民衛生出版社, pp.389-391, 1982.
16. 王肯堂 : 證治準繩 四卷 瘍醫, 臺北, 新文豐出版公司, pp.368-369, 1979.
17. 王 燾 : 外臺秘要 上卷, 臺北, 國立中國醫藥研究所, pp.426-428, 1964.
18. 陸青節 : 萬病醫藥顧問 下卷 皮膚科, 서울, 書苑堂, pp.10-11, 1978.
19. 醫藥衛生出版社編 : 五官, 皮膚科常見病 中醫臨床手冊, 香港 pp.74-75, 1976.

20. 羅天益：衛生寶鑑，香港，商務印書館，p. 116, 1981. p.528, 1986.
21. 李遜齊：驗方新編，上海，上海啓新書局，p.29, 1984.
22. 陳士鐸：石室秘錄 下卷 서울, 書苑堂