

辛芩衝劑로써 過敏性 鼻炎 367例를 治驗한 臨床總結

編 輯 室

過敏性 鼻炎은 最近에 비교적 發病率이 높은 痘元에 理想의 治療藥物이 거의 없다. 1979年에 上海中醫學 藥院에서 上海中醫研究所 연구원이 提供한 處方에 도움을 받아서 “辛芩衝劑(原名過敏衝劑)”를 만들었다. 그리고 上海市第一人民醫院耳鼻咽喉科와 協力하여 實驗실 및 임상실험에서 모두 過敏性 鼻炎 200例를 治療하였는데 總有效率이 80%가 되었다. 한편 1983年 1月부터 上海紹一醫院, 長征醫院, 第一人民醫院, 中醫研究所, 第三人民醫院, 瑞金醫院, 第六人民醫院, 虹口區中心醫院등의 眼耳鼻咽喉科醫院에서 臨床試用이 확대되어 그 중 資料가 整理되고 系統化된 367例中 總有效率이 80.1%가 되었다.

臨 床 觀 察

一. 病例選擇

아래의 診斷標準에 근거해서 治療의 病例를 관찰하였다.

1. 鼻癢, 鼻塞, 재채기, 鼻流清涕, 嗅覺기능減退 或은 衰失 等을 포함한 典型的 發作症狀이 있다.

2. 季節性 或은 年中 反復해서 發作하는 特徵이 있다.(但 病程은 1年以上)

3. 檢查過程中에서 鼻粘膜의 水腫, 苍白한色, 暗紫色 等이 있다.

鼻分泌物中에서 好酸細胞 或은 血液中에서 好酸細胞가 많이 증가된 것을 찾을 수 있다. 위의 조항에 符合된 경우를 治療對象으로 삼았다.

二. 處方組成

細辛, 黃芩, 荊芥, 防風, 白芷, 蒼耳子, 石菖蒲, 桂枝, 黃芪, 白朮

三. 用 法

“辛芩衝劑” 30g을 每日 3차례 복용하며 兒童은 用量을 적당히 減한다 20日을 1回의 治療過程으로 定하였다.

四. 一般資料

性別를 기록한 301例中에서 男性이 194例, 女性이 107例, 年齢으로는 最小가 5歲 6個月, 最大가 81歲. 病程으로는 短은 경우가 1個月, 오래된 경우는 50年이 넘는다.

五. 治療效果標準과 治療效果

1. 顯效：化學試驗指標가 正常으로 恢復되고, 症狀이 全部 緩解되고, 鼻粘膜水腫이 好轉되고 色澤도 好轉됨.

2. 有效：2개 以上의 症狀이 消失되고, 發病횟수가 減少되고 鼻癢 鼻塞時間이 短縮됨.

3. 無效：各 項目에 變화가 없음.

367例中에서 顯效者는 84例(22.9%) : 有効者 210例(57.2%), 無效者 73例(19.9%), 總有效率은 80.1%(表1을 참고할 것).

한편 “Chlorpheniramine敏衝劑”를 사용한 21例와 비교한 結果는 表2에 있다. “Chlorpheniramine敏衝劑의 有効率은 28.5%이다.

六. 其 他

367例中에서 藥物中인 81例의 肝기功能及 小便검사를 測定하였는데 辛芩衝劑는 肝腎에 影響이 없는 것으로 證明되었다.

表 1. 各各의 醫院의 治療效果情況表

	例 數	顯 效	有 效	無 效	總 有 效	
					例 數	總有效率 %
紡 織 一 院	70	8	57	5	65	92.9
長 征	54	3	36	15	39	72.2
市 三	45	14	17	14	31	68.9
市 一 中 醫 研 究 所	50	23	20	7	43	86.0
瑞 金	42	7	23	12	30	71.4
虹 口	40	16	16	8	32	80.0
市 六	38	8	25	5	33	86.8
眼 耳 鼻 喉 科 醫 院	28	5	16	7	21	75.0
合 計	367	84	210	73	294	80.1

表 2. 兩衝劑의 有效率對照表

	例 數	顯 效 有 效				無 效	
		例 數	%	例 數	%	例 數	%
辛 苓 衝 劑	367	84	22.9	210	57.2	73	19.9
Chlorpheni-ramine 敏衝劑	21	2	9.5	4	19.0	15	71.4

分析과 理解

一. 季節性 發病의 治療

長征, 虹口, 市三醫院의 資料에 의하면 季節性 發病者의 有效率은 74.1 %이다. (表 3을 참고할 것)

二. 鼻粘膜의 色澤과 治療效果와의 關係

眼耳鼻喉科, 市三, 長征醫院의 觀察에 의하면 粘膜의 色澤이 苍白한 경우의 治療率은 67.4 %로 粘膜의 色澤이 淡紅한 경우의 治療率 64.7 %보다 약간 좋았다.

三. 血中好酸性 細胞의 絶對值과 治療效果의 關係

眼耳鼻喉科醫院, 市一醫院, 中醫研究所의 資料에 의하면 服藥前에 血中好酸性細胞의 絶對值를 溢定한 경우가 72例인데 血中好酸性細胞의 絶對值가 $300/\text{mm}^2$ 보다 큰 경우가 30例이다. 服藥後 그중 9例에서 顯效, 13例에서 有效, 總有效率은 90 %이다. 血中好酸性 細胞의 絶對值가 $300/\text{mm}^2$ 보다 작은 경우에 有效率이 높다. (表 4를 참고할 것) 市一醫院, 中醫研究所 資料에 의하면 血中好酸性 細胞의

絕對值가 正常值의 患者보다 높은 23例中에서 治療後 18例에서 正常恢復되었고 個別의로는 1232 /mm²가 되는 환자가 22/mm²로 낮아진 경우가 있었다.

四. 鼻分泌物의 塗布標本好酸性 細胞와 治療效果와의 關係

鼻分泌物의 塗布標本好酸性細胞의 陽性率은 높지 않다. 市一, 虹口, 眼耳鼻喉科醫院의

資料에 의하면 陽性인 경우의 有效率이 약간 높다.(表 5를 참고할 것)

五. 治療有效者的 鼻內 변화

患者의 症狀改善이 비록 분명하지만 病理變化의 명확한 변화는 드물다. 개인에 따라서 黏膜의 色澤性質이 正常化되고 鼻甲이 縮小되는 경우가 있다.

表 3.

例 數	顯 效		有 效		無 效		
	例 數	%	例 數	%	例 數	%	
常 年 性	82	24	29.3	35	42.7	23	28.0
季 節 性	54	9	16.7	31	57.4	14	25.9

表 4.

例 數	顯 效		有 效		無 效		
	例 數	%	例 數	%	例 數	%	
< 300 /mm ²	42	14	33	17	40	11	26
> 300 /mm ²	30	9	30	18	60	3	10

表 5.

例 數	顯 效		有 效		無 效		
	例 數	%	例 數	%	例 數	%	
(-)	57	23	40.4	22	38.6	12	21.0
(+)	37	14	37.8	18	48.6	5	13.5

結論

一. “辛芩衝劑”를 사용해서 얻은 8개 醫院의 367例 過敏性鼻炎 臨床觀察資料에 따르면, “辛芩衝劑”는 확실히 一定한 治療效果가 있으며 平均有效率은 80.1% 이다.

二. “辛芩衝劑”는 一般抗過敏藥物에서 나타나는嗜睡反應이 없고 또 Hormone 製劑에서 볼 수 있는 身體的 影響이 없다. 服藥期間中에 특별한 副作用은 없었다. 個人에 따라 輕微한 胃部不快感이 있으나 적당한 對症藥物로 處治한 후 계속 本 藥劑를 使用할 수 있었다.