

藥物 配合에 따른 藥效 變化에 對한 考察

- 2味에서 4味로 構成된 處方을 中心으로 -

盧永範*·康舜洙**

〈 目 次 〉

| | |
|-----------|----------|
| I. 緒論 | IV. 考察 |
| II. 研究方法 | V. 結論 |
| III. 研究內容 | VI. 參考文獻 |

I. 緒論

黃帝內經의 素問·至真要大論篇¹⁾에서 方劑構成은 二味以上 多味의 藥材가 治療原則에 依하여 配合되어 治病의 目的에 그 效用을 發揮한다고 하여 處方이 뚜렷한 法則에 依해 立方이 된 것임을 說明하고 있다.

그러나 現今 臨床에서는 處方의 構成原則에 對한 充分한 理解와 檢討 없이 기존의 處方에 痘証을 맞추는 結果로 方劑學의 理論的 發展과 臨床應用이 複雜되어 감을 볼 수 있다.

그래서, 筆者는 藥物配伍의 變化가 方劑의 效能과 主治에 영향을 미친다는^{6,10,11)} 點에 착안하여 藥物配伍의 變化를 理解하면 處方構成의 原則를 發見하는데 도움이 될 것으로 認識되어 方劑의 基本單位라고 볼 수 있는 君·臣·佐·使로 구성된 2味에서 4味로만 된 處方만 발췌하여 각 藥物들의

七情關係, 氣, 味, 歸經, 效能을 比較함으로써 處方에 적용된 法則을 發見하고자 本論文에 착수하였다. 또한, 君·臣·佐·使의 活用度를 調查하고同一 藥物이 他 藥物과 配合됨으로써 어떤 方向으로 藥效가 전환되는지를 究明하고자 하였다.

이렇게 함으로써, 多味로 配合된 處方의 原則과 性格을 分析할 수가 있으며, 單一 藥物의 效能이 총체적으로 弊化되며 또한, 새로운 處方을 구성할 수 있는 方向을 제시할 수 있다고 보여져 本研究에 臨하게 되었다.

II. 研究方法

- 1) 臨床의으로 다양하게 活用되는 藥物로 2味에서 4味로 구성된 處方만 對象으로 하였으며 가능한 君·臣·佐·使의 法則으로 구성된 處方을 對象으로 하였다.

* 圓光大學校 大學院 韓醫學科

** 圓光大學校 韓醫科大學 方劑學教室

- 2) 處方名이 湯, 丸, 散等을 모두 포함하여 對象으로 삼았으며 傷寒論 處方은 活用度가 높은 것만 발췌하여 對象으로 삼았고, 本 研究에서는 用量을 無視하였다.
- 3) 漢方醫學大辭典 中 藥方篇과 方藥合編 그리고 中醫方劑學, 常用漢方方劑, 金匱要略, 醫方集解等을 參考로 하였으며, 2味에서 4味로 구성된 處方中君·臣·佐·使가 좀더 명확하고 活用度가 높은 基本方을 對象으로 하였다.
- 4) 處方의 各各 藥物에 對한 氣, 味, 歸經 및 效能을 要約整理하여 相互藥物을 比較하였고 相須, 相使, 相制等의 七情關係들을 分析하였다.
- 5) 各 處方을 나열하여 單一藥物을 추적하여 相須藥으로서 藥效의 變化를 모았으며 相須藥物中 研究內容에 누락된 것은 他冊에서 參考로 記載하였다.

III. 研究內容

| 處方名 | 藥物 | 味 | 氣 | 歸經 | 效能 | 適應證 |
|------|---------|-------|----|------------|----------------|---------------|
| 理中湯 | 人蔘 | 微甘 | 溫 | 肺, 脾 | 補五臟之陽, 補元氣 | 治太陰腹痛 自利不渴 |
| | 白朮 | 苦, 甘 | 微溫 | 脾, 胃 | 除濕益氣, 補脾 | |
| | 乾姜炮 2.0 | 辛, 甘 | 熱 | 脾, 腎, 膀胱 | 逐寒邪而止痛, 溫中補陽 | |
| | 甘草炙 1.0 | 甘 | 微溫 | 脾, 胃, 肺 | 溫中, 補脾益氣 | |
| 白虎湯 | 石膏 5.0 | 辛, 甘 | 寒 | 肺, 胃 | 解熱, 止渴(除煩) | 治陽明 |
| | 知母 2.0 | 苦 | 寒 | 肺, 胃, 腎 | 治消渴, 煩熱 | 汗多, 煩渴 |
| | 甘草 0.7 | 甘 | 平 | 脾, 胃, 肺 | 清熱, 補脾益氣調和 | 脈洪大 |
| 小承氣湯 | 大黃 4.0 | 苦 | 寒 | 胃, 大腸, 肝 | 下瘀, 獄火, 攻積導滯, | 裡症小熱 |
| | 厚朴 | 苦, 辛 | 溫 | 脾, 胃, 大腸 | 寬胸導濕, 行氣溫中, | 小實小滿 |
| | 枳實 1.5 | 苦 | 寒 | 肺, 大腸 | 破積下痛, 消痞 | 宣後大者 |
| 真武湯 | 白茯苓 | 甘, 淡 | 平 | 心, 脾, 肺 | 利水, 補心, 益脾 | 少陰病 |
| | 白芍藥 | 苦酸 | 涼 | 肝, 脾 | 制肝, 補脾, 鎮痙痛 | 腹滿痛 |
| | 附子炮 3.0 | 辛, 甘 | 熱 | 心, 脾, 腎 | 溫中止痛, 遂風寒濕邪 | 小便利或下利 |
| | 白朮 2.0 | 甘, 苦 | 微溫 | 脾, 胃 | 除濕益氣, 補脾 | 或嘔 |
| 四逆湯 | 甘草炙 3.0 | 甘 | 微溫 | 脾, 胃, 肺 | 溫中, 補脾益氣 | 治三陰 |
| | 乾姜炮 2.5 | 辛, 甘 | 熱 | 脾, 腎, 膀胱 | 逐寒邪止痛, 溫中補陽 | 脈遲身痛, 及 |
| | 生附子 | 辛, 甘 | 熱 | 心, 脾, 腎 | 溫中止痛, 遂風寒濕邪 | 四肢厥冷 |
| 梔子湯 | 梔子 | 苦 | 寒 | 心, 肝, 肺, 胃 | 除煩瀉火, 止血 | 治汗下後虛煩不眠 |
| | 豆蔻 | 辛, 甘 | 寒 | 肺, 胃 | 疎散除煩 | 心中懊惓 |
| 生脈散 | 麥門冬 2.0 | 甘, 微苦 | 寒 | 心, 肺, 胃 | 滋陰, 清熱, 潤肺, 生津 | 暑月常服 |
| | 人蔘 | 微苦, 甘 | 溫 | 肺, 脾 | 補五臟之陽, 補元氣 | 代熟水飲之 |
| | 五味子 1.0 | 酸 | 溫 | 肺, 腎 | 斂肺滋腎, 生津斂汗 | |

藥物配合에 따른 藥效 變化에 對한 考察

| 處方名 | 藥 物 | 味 | 氣 | 歸 經 | 效 能 | 適 應 證 |
|-------|------------------|------|----|-------------|----------------|-----------------|
| 黃連解毒湯 | 黃連 | 苦 | 寒 | 心, 肝, 胃, 大腸 | 清熱, 清心除煩, 鴻火 | 治傷寒大熱 |
| | 黃芩 | 苦 | 寒 | 心, 肺, 腹, 大腸 | 鴻火 | 煩熱不得眠 |
| | 黃柏 | 苦 | 寒 | 腎, 膀胱 | 清濕熱, 鴻火 | 一切熱毒 |
| | 梔子 1.25 | 苦 | 寒 | 心, 脾, 肺, 胃 | 除煩鴻火 止血 | |
| 益元散 | 滑石 6兩 | 甘, 淡 | 寒 | 胃, 膀胱 | 利尿, 止渴 | 治中暑, 吐瀉下痢 |
| | 甘草 1兩 | 甘 | 平 | 脾, 胃, 肺 | 清熱, 補脾益氣, 調和 | 止渴, 除煩 解百藥邪毒 |
| 當歸補血湯 | 黃芪 5.0 | 甘 | 微溫 | 脾, 肺 | 益氣, 止汗, 利尿 | 肌熱大渴, 目赤 |
| | 當歸 2.0 | 甘, 辛 | 溫 | 肝, 心, 脾 | 補血, 調經 | 脈洪大 |
| 當歸承氣湯 | 當歸 | 甘, 辛 | 溫 | 肝, 心, 脾 | 補血, 調經, 潤腸 | 治燥之上藥 |
| | 大黃 2.0 | 苦 | 寒 | 胃, 大腸, 肝 | 下瘀, 鴻火, 攻積導滯 | 亦治血結 |
| | 芒硝 0.7 | 辛, 苦 | 大寒 | 胃, 大腸, 三焦 | 清熱通便, 潤燥軟堅 | |
| | 甘草 | 甘 | 平 | 脾, 胃, 肺 | 清熱, 補脾益氣, 調和 | 便閉 |
| 平胃散 | 蒼朮 | 辛, 苦 | 溫 | 脾, 胃, 肺 | 補脾燥濕, 升陽散鬱 | 和脾, 健胃 |
| | 陳皮 | 辛, 苦 | 溫 | 脾, 肺 | 理氣健脾, 燥濕化痰 | |
| | 厚朴 | 苦, 辛 | 溫 | 脾, 胃, 肺, 大腸 | 寬胸導濕, 行氣溫中 | |
| | 甘草 ¹⁾ | | | | | |
| 枳朮丸 | 白朮 2.0 | 苦, 甘 | 微溫 | 脾, 胃 | 除濕益氣 補脾 | 治痞消食 |
| | 枳實 1.0 | 苦 | 寒 | 肺, 大腸 | 破積下痰, 消痞 | |
| 對金飲子 | 陳皮 3.0 | 辛, 苦 | 溫 | 脾, 肺 | 理氣健脾, 燥濕化痰 | 治酒食傷 |
| | 厚朴 | 辛, 苦 | 溫 | 脾, 胃, 肺, 大腸 | 寬胸導濕, 行氣寬中 | |
| | 蒼朮 | 辛, 苦 | 溫 | 脾, 胃, 肺 | 補脾燥濕, 升陽散鬱 | |
| | 甘草 | | | | | |
| 升麻葛根湯 | 葛根 2.0 | 甘, 辛 | 平 | 脾, 胃 | 發汗解肌, 解熱止瀉, 止渴 | 治溫病及 |
| | 白芍藥 | 苦酸 | 涼 | 肝, 脾 | | 時令感冒 |
| | 升麻 | 甘, 辛 | 涼 | 肺, 大腸 | 發汗, 解熱, 升發 | |
| | 甘草 | | | 脾, 胃 | | |

註 1) 甘草, 人參等 反復되는 藥物들은 效能 및 氣味等을 以下 생략하였다.

藥物配合에 따른 藥效 變化에 對한 考察

| 處方名 | 藥物 | 氣 | 味 | 歸經 | 效能 | 適應證 |
|-------|--------------------------|-------------------|--------------|----------------------------------|--|-----------------|
| 瀉白散 | 桑白皮 地骨皮 甘草 | 甘 甘, 淡 | 寒 寒 | 肺 肺, 肝, 腎 | 瀉肺, 鎮咳, 利尿, 行水 清涼, 解熱, 退熱除煩 | 治肺實 |
| 千緒湯 | 半夏 南星炮 圣角炙 甘草炙 | 辛 苦, 辛 辛 | 溫 溫 溫 | 脾, 胃 肺, 肝, 脾 肝, 胃 | 消痰, 止嘔, 消痞散結 燥濕化痰, 祛風解痙 祛痰止咳, 通竅開竅 | 治痰喘 |
| 回生散 | 藿香 陳皮 | 辛 辛, 苦 | 微溫 溫 | 脾, 胃, 肺 脾, 肺 | 快氣和中, 開胃止嘔 理氣健脾, 燥濕化痰 | 治露亂 吐瀉 |
| 雙補丸 | 熟地黃 菟絲子 810 | 甘 辛, 甘 | 微溫 平 | | 補血, 滋陰 補肝腎, 益精髓, 煙精寒 | 平補氣血 不燥不熱 |
| 神香散 | 丁香 白豆子 | 辛 辛 | 溫 溫 | 脾, 胃, 腎 肺, 脾 | 溫中降逆, 溫腎助陽 下氣止嘔, 溫中化濕 | 治嘔噦脹滿 痰飲, 脾虛 |
| 三拗湯 | 麻黃 杏仁 甘草 | 辛, 苦 苦 | 溫 溫 | 肺, 膀胱 肺, 大腸 | 發汗解表, 宣肺平喘利水 止咳喘, 潤腸通便 | 治感風寒 咳嗽鼻塞失音 |
| 小健中湯 | 白芍藥 5.0 桂枝 3 甘草炙 1 | 苦酸 辛, 甘 | 涼 溫 | 肝, 脾 心, 肺, 膀胱 | 制肝補脾(鎮痙痛) 發汗解肌, 溫通經脈, 通陽化氣 | 治虛勞裏急 腹痛 |
| 當歸承氣湯 | 當歸 大黃 芒硝 甘草 | 甘, 辛 苦 辛, 苦 | 溫 寒 大寒 | 肝, 心, 脾 胃, 大腸, 肝 胃, 大腸, 三焦 | 補血, 調經, 潤腸 下瘀 滌火 攻積導滯 清熱通便, 潤燥軟堅 | 治陽狂 奔走 |

藥物配合에 따른 藥效 變化에 對한 考察

| 處方名 | 藥 物 | 氣 | 味 | 歸 經 | 效 能 | 適 應 證 |
|-----------|-----------|-------|-----|-------------|--------------------|----------------------------------|
| 莎 萎 散 | 香附子 4.0 | 辛, 微苦 | 平 | 肝, 三焦 | 理氣解鬱, 調經止痛 | 治衄血 |
| | 川 萎 2.0 | 辛 | 溫 | 肝, 膽 | 活血行氣 祛風止痛 | |
| 導 赤 散 | 生地黃 1.0 | 甘, 苦 | 寒 | 心, 肝, 腎 | 清熱涼血, 生津止渴 | 治小腸熱 小便不利 |
| | 木 通 1.0 | 苦 | 涼 | 心, 小腸, 膀胱 | 降火利水, 通氣下乳 | |
| | 甘 草 1.0 | | | | | |
| 四君子湯 | 人 蔘 | 微 甘 | 溫 | 肺, 脾 | 補五臟之陽, 補元氣 | 補真氣虛弱 治氣短氣少 |
| | 白 朮 | 苦, 甘 | 微 溫 | 脾, 胃 | 除濕益氣, 補脾 | |
| | 白 茯 苓 | 苦, 淡 | 平 | 心, 脾, 肺 | 利水, 補心, 益脾 | |
| | 甘 草 | | | | | |
| 七 氣 湯 | 半 夏 3.0 | 辛 | 溫 | 脾, 胃 | 降逆止嘔, 消痞散結, 燥濕祛痰 | 治七情鬱結 心腹絞痛 |
| | 人 蔘 | 微 甘 | 溫 | 肺, 脾 | 補五臟之陽, 補元氣 | |
| | 肉 桂 | 辛, 苦 | 熱 | 腎, 脾, 膀胱 | 溫中補陽, 益火消陰, 通經, 催生 | |
| | 甘草炙 0.7 | | | | | |
| 四 七 湯 | 半 夏 2.0 | 辛 | 溫 | 脾, 胃 | 降逆止嘔, 消痞散結, 燥濕祛痰 | 治七氣凝結 狀如破絮或 如梅核喀不 嚥不下胸痞 |
| | 赤茯苓 1.6 | 甘, 淡 | 平 | 心, 脾, 肺 | 分利濕熱, 行水 | |
| | 厚 朴 1.2 | 辛, 苦 | 溫 | 脾, 胃, 肺, 大腸 | 寬胸導濕, 行氣寬中 | |
| | 蘇 葉 0.8 | 辛 | 溫 | 肺, 脾 | 發汗解表, 行氣寬中 | |
| 安 蟻 理 中 湯 | 白 朮 1.0 | 苦, 甘 | 微 溫 | 脾, 胃 | 除濕益氣, 補脾 | 治脾虛 蟲痛 |
| | 乾 干 | 辛, 甘 | 熱 | 脾, 腎, 膀胱 | 逐寒邪而止痛, 溫中補陽 | |
| | 人 蔘 | 微 甘 | 溫 | 肺, 脾 | 補五臟之陽, 補元氣 | |
| | 白 茯 苓 0.7 | 甘, 淡 | 平 | 心, 脾, 肺 | 利水, 補心, 益脾 | |
| 交 感 丹 | 香附子 | 辛, 微苦 | 平 | 肝, 三焦 | 理氣解鬱, 調經止痛 | 治諸氣鬱滯 能水火升降 |
| | 白 茯 神 | 甘, 淡 | 平 | 心, 脾, 肺 | 寧心安神, 利水 | |
| 四 柱 散 | 木 香 | 辛, 苦 | 溫 | 肺, 肝, 脾 | 行氣止痛, 健脾消食, 止痢 | 治元臟虛寒 大便滑泄 |
| | 白 茯 苓 | 甘, 淡 | 平 | 心, 肺, 脾 | 利水, 補心, 益脾 | |
| | 人 蔘 | 微苦甘 | 溫 | 肺, 脾 | 補五臟之陽, 補元氣 | |
| | 附子炮 | 辛, 甘 | 熱 | 心, 脾, 腎 | 溫中止痛, 遂風寒濕邪 | |

藥物配合에 따른 藥效 變化에 對한 考察

| 處方名 | 藥物 | 氣 | 味 | 歸 經 | 效 能 | 適應證 | |
|-----------|--------|------|----|-------------|------------------|---------------------------|--|
| 茱連丸 | 吳茱萸 | 辛, 苦 | 溫 | 肝, 胃 | 溫中散寒, 理氣止嘔 | 治赤白痢 | |
| | 黃連 | 苦 | 寒 | 心, 肝, 胃, 大腸 | 清熱, 清心除煩, 滌火 | | |
| 黃芩 芍藥湯 | 黃芩 | 苦 | 寒 | 心, 肺, 胆, 大腸 | 滌火燥濕, 止血安胎 | 治下痢膿血身熱 腹痛 脈洪數 | |
| | 白芍藥 | 苦酸 | 涼 | 肝, 脾 | 制肝補脾, 鎮痙痛 | | |
| | 甘草 | 甘 | 平 | 脾, 胃, 肺 | 清熱補脾益氣調和 | | |
| 玉屏風散 | 白朮 | 甘, 苦 | 微溫 | 脾, 胃 | 除濕益氣, 補脾 | 治表虛自汗 祛風解表, 勝濕解痉, 止瀉止血 | |
| | 防風 | 辛, 甘 | 溫 | 膀胱, 肺, 脾 | 益氣, 止汗, 利尿 | | |
| | 黃芪 | 甘 | 微溫 | 脾, 肺 | | | |
| 二陳湯 | 半夏 | 辛 | 溫 | 脾, 胃 | 降逆止嘔, 消痞散結, 燥濕祛痰 | 通治痰飲 | |
| | 陳皮 | 辛, 苦 | 溫 | 脾, 肺 | 理氣健脾, 燥濕化痰 | | |
| | 赤茯苓 | 甘, 淡 | 平 | 心, 脾, 肺 | 分利濕熱, 行水 | | |
| | 甘草炙 | 甘 | 微溫 | 脾, 胃, 肺 | 溫中, 補脾益氣 | | |
| 香連丸 | 黃連 | 苦 | 寒 | 心, 肝, 胃, 大腸 | 清熱, 清心除煩, 滌火 | 治赤白膿血下痢 脹痛及諸痢 | |
| | 木香 | 辛, 苦 | 溫 | 肺, 肝, 脾 | 行氣止痛, 健脾消食, 止痢 | | |
| 芍藥 甘草湯 | 白芍藥 | 苦, 酸 | 涼 | 肝, 脾 | 制肝補脾, 鎮痙痛 | 治腹痛 | |
| | 甘草炙 | 甘 | 微溫 | 脾, 胃, 肺 | 溫中補脾益氣 | | |
| 縮泉丸 | 烏藥 | 辛 | 溫 | 脾, 肺, 腎, 膀胱 | 順氣止痛, 散寒溫腎 | 治胞氣不足小便頻數 | |
| | 益智仁 | 辛 | 溫 | 脾, 腎 | 補腎固精, 溫脾止瀉 | | |
| 四物湯 | 熟地黃 | 甘 | 微溫 | 肝, 腎 | 補血滋陰 | 通治血病 | |
| | 白芍藥 | 苦, 酸 | 涼 | 肝, 脾 | 制肝補脾(鎮痙痛) | | |
| | 川芎 | 辛 | 溫 | 肝, 胆 | 活血行氣, 祛風止痛 | | |
| | 當歸 | 甘, 辛 | 溫 | 肝, 心, 脾 | 補血 調經 潤腸 | | |
| 三白湯 | 白朮 | 甘, 苦 | 微溫 | 脾, 胃 | 除濕益氣, 補脾 | 治一切泄瀉 | |
| | 白茯苓 | 甘, 淡 | 平 | 心, 脾, 肺 | 利水 補心 益脾 | | |
| | 白芍藥 15 | 苦, 酸 | 涼 | 肝, 脾 | 制肝補脾, 鎮經痛 | | |
| | 甘草炙 | 甘 | 微溫 | 肝, 胃, 肺 | 溫中, 補脾益氣 | | |

藥物配合에 따른 藥效 變化에 對한 考察

| 處方名 | 藥物 | 氣 | 味 | 歸 經 | 效 能 | 適 應 證 |
|--------------|---------|-------|---|-------------|----------------|--------|
| 佛手散 | 當 歸 6.0 | 甘, 辛 | 溫 | 肝, 心, 脾 | 補血, 調經, 潤腸 | 臨月服之 |
| | 川 莖 4.0 | 辛 | 溫 | 肝, 膽 | 活血行氣, 祛風止痛 | 縮胎易產 |
| 芎歸湯 | 川 莖 5.0 | 辛 | 溫 | 肝, 膽 | 活血行氣, 祛風止痛 | 治產前後 |
| | 當 歸 5.0 | 甘, 辛 | 溫 | 肝, 心, 脾 | 補血, 調經, 潤腸 | 諸疾及血暈 |
| 甘桔湯 | 桔 梗 3.5 | 苦, 甘 | 平 | 肺, 胃 | 清喉利膈, 去痰排膿 | 治咽痛 |
| | 甘 草 1.5 | 甘 | 平 | 脾, 胃, 肺 | 清熱, 補脾益氣調和 | |
| 手拈散 | 草 果 | 辛 | 溫 | 脾, 胃 | 溫中, 散寒濕, 鬱滯 | 治九種痛 |
| | 玄胡索 | 辛, 苦 | 溫 | 肝, 胃 | 活血祛瘀, 鎮痛, 通經 | 及心脾痛 |
| | 五靈脂 | 苦, 甘 | 溫 | 肝, 脾 | 散血止痛 | |
| | 沒 藥 | 苦 | 平 | 肝 | 破血止痛 | |
| 連附六一湯 | 黃 連 6.0 | 苦 | 寒 | 心, 肝, 胃, 大腸 | 清熱, 清心, 除煩瀉火 | 治熱鬱胃 |
| | 附子炮 1.0 | 辛, 甘 | 熱 | 心, 脾, 腎 | 溫中止痛, 新陳代謝促進 | 胸痛 |
| 桔 梗 枳 角 湯 | 桔 梗 | 苦, 辛 | 平 | 肺, 胃 | 清喉利膈, 去痰, 排膿 | 治痞氣胸滿 |
| | 枳 角 2.0 | 苦, 辛 | 涼 | 肺, 脾, 大腸 | 破積下痰, 胸滿 | 不利 |
| | 甘 草 1.0 | 甘 | 平 | 脾, 胃, 肺 | 清熱, 補脾益氣調和 | 煩悶欲死 |
| 芷 貝 散 | 白 芷 | 辛 | 溫 | 肺, 脾, 胃 | 鎮痙, 鎮痛通鼻, 排膿 | 治乳房結核 |
| | 貝 母 | 苦, 甘 | 涼 | 肺 | 鎮咳, 去痰, 排膿 | |
| 三 瘡 湯 | 車前子 | 甘 | 寒 | 腎, 膀胱 | 消炎利尿, 止瀉, 明目鎮咳 | 治膀胱氣腫痛 |
| | 小茴香 | 辛 | 溫 | 腎, 膀胱, 胃 | 散膀胱冷氣, 理氣開胃 | |
| | 沙 蘿 | 甘, 微苦 | 涼 | 肺, 肝 | 養陰, 止咳, 除瘡 | |
| 枳 莖 散 | 枳 實 | 苦 | 寒 | 肺, 大腸 | 破積下痰, 消痞 | 治左脇刺痛 |
| | 川 莖 | 辛 | 溫 | 肝, 胆 | 活血行氣, 祛風止痛 | |
| | 甘 草 | 甘 | 平 | 脾, 胃, 肺 | 清熱, 補脾益氣調和 | |
| 失 笑 散 | 五靈脂 | 苦, 甘 | 溫 | 肝, 胃 | 散血 止痛 | 治產後 |
| | 蒲黃炮 | 甘 | 平 | 肝, 心包 | 活血祛瘀 | 兒枕臍腹痛 |

藥物配合에 따른 藥效 變化에 對한 考察

| 處方名 | 藥 物 | 氣 | 味 | 歸 經 | 效 能 | 適 應 證 |
|-----|-----|----|-------|-------------|-----------------|-------------------------|
| 香蘇散 | 香附子 | 平 | 辛, 微苦 | 肝, 三焦 | 理氣解鬱, 調經止痛 | 治氣鬱兼 飲食物 停滯 |
| | 蘇葉 | 溫 | 辛 | 肺, 脾 | 發汗鮮表, 行氣寬中 | |
| | 陳皮 | 溫 | 辛, 苦 | | 理氣健脾, 燥濕化痰 | |
| | 甘草 | | | | | |
| 桂枝湯 | 桂 枝 | 溫 | 辛, 甘 | 心, 肺, 膀胱 | 溫經通脈, 去風止汗 | 治表虛證 |
| | 白芍藥 | 涼 | 苦, 酸 | 肝, 脾 | 制肝補脾, 鎮痙痛 | |
| | 甘草 | | | | | |
| 麻黃湯 | 麻 黃 | 溫 | 辛, 微苦 | 肺, 膀胱 | 發汗, 利尿, 止喘息, 止痛 | 治表實證 (發汗鮮表, 宣肺平喘) |
| | 桂 枝 | 溫 | 辛, 甘 | 心, 肺, 膀胱 | 溫經通脈, 去風止汗 | |
| | 杏 仁 | 溫 | 甘, 苦 | 肺, 大腸 | 止喘, 潤燥通便 | |
| | 甘 草 | | | | | |
| 一氣丹 | 人 蔘 | 溫 | 微苦, 甘 | 肺, 脾 | 補五臟之陽, 補元氣 生津 | 治脾胃虛寒, 不時易瀉 腹痛, 陽萎怯寒 |
| | 附 子 | 熱 | 辛, 甘 | 心, 脾 | 溫中止痛, 遂風寒濕邪 | |
| 一抹散 | 南 星 | 溫 | 苦, 辛 | 肺, 肝, 脾 | 燥濕化痰, 祛風鮮症 | 治乾癬不愈 |
| | 草 煙 | 溫 | 苦, 辛 | 心包, 三焦 | 治諸風 | |
| 一奇散 | 當 歸 | 溫 | 甘, 辛 | 肝, 心, 脾 | 補血, 調經, 潤腸 | 治產後頭痛 |
| | 川芎 | 溫 | 辛 | 肝, 膽 | 活血行氣, 祛風止痛 | |
| 二甘湯 | 生甘草 | | | | | 治胃熱, 食後汗下如雨 |
| | 炙甘草 | 微溫 | 甘 | 脾, 胃, 肺 | 溫中, 補脾益氣 | |
| | 五味子 | 溫 | 酸 | 肺, 腎 | 斂肺滋腎, 生津斂汗 | |
| | 烏 梅 | 溫 | 酸 | 心包, 肝, 脾, 胃 | 斂肺固腸, 止渴止吐 | |
| 二仁丸 | 杏 仁 | 溫 | 苦 | 肺, 大腸 | 止吐喘, 潤腸通便 | 治老人氣秘 |
| | 麻子仁 | | | | | |
| | 枳 角 | 涼 | 苦, 辛 | 肺, 脾, 大腸 | 破積下痰, 胸滿 | |
| | 訶子肉 | | | | | |
| 二生湯 | 生附子 | 熱 | 辛, 甘 | 脾, 腎, 心 | 溫中止痛, 遂風寒濕邪 | 治冷痰咳嗽 |
| | 生半夏 | 溫 | 辛 | 脾, 胃 | 消痰止嘔, 消痞散結 | |

| 處方名 | 藥 物 | 氣 | 味 | 歸 經 | 效 能 | 適 應 證 |
|-------|--------------|----|------|-------------|-----------------|--------------------|
| 二母石膏湯 | 知 母 | 寒 | 苦 | 肺, 胃, 腎 | 消渴, 煩熱 | 治外感 |
| | 貝 母 | 涼 | 古, 甘 | 肺 | 鎮咳, 去痰, 排膿 | 燥痰咳嗽 |
| | 石 膏 | 寒 | 辛, 甘 | 肺, 胃 | 解熱, 止渴(除煩) | |
| 二妙散 | 黃柏炒 | 寒 | 苦 | 腎, 膀胱 | 清濕熱, 滌火 | 治濕熱下注 |
| | 蒼朮 (米泔浸炒) | 溫 | 辛, 苦 | 脾, 胃, 肺 | 補脾燥濕, 升陽散鬱 | 筋骨痛, 脚膝無力 或足膝紅腫 |
| 二味拔毒散 | 雄 黃 | 溫 | 辛 | 肝, 胃 | 解毒, 殺蟲 | 治風濕諸病 |
| | 白 磬 | 寒 | 酸 | 脾 | 止血止瀉, 祛痰 | 紅腫痛痒 |
| 二腎散 | 陳 皮 10 | 溫 | 辛, 苦 | 脾, 肺 | 理氣健脾, 燥濕化痰 | 治積塊 |
| | 甘 草 4 | | | | | 少食 |
| 二參湯 | 人 蔘 | 溫 | 微, 甘 | 肺, 脾 | 補五臟之陽, 補元氣 | 治胃經虛火 |
| | 玄 蔘 | 寒 | 苦 | 肺, 胃, 腎 | 消炎, 解熱, 鎮靜, 治咽喉 | 牙癟腐爛 |
| 二神丸 | 補骨脂炒 4.0 | 大溫 | 辛, 苦 | 腎, 脾, 心包 | 治腎冷精流 | 治脾胃虛弱 全不進食 |
| | 肉豆蔻 2.0 | 溫 | 辛 | 大腸, 胃 | 止瀉, 固大腸 | |
| 二神散 | 海金砂 7.0 | 寒 | 淡 | 小腸, 膀胱 | 利水通淋 | 治諸淋急痛 |
| | 滑 石 5.0 | 寒 | 甘, 淡 | 胃, 膀胱 | 利尿, 止渴 | |
| 二海丸 | 海藻(酒洗) | 寒 | 苦, 鹹 | 肝, 胃, 腎 | 消痰結, | 治氣癭 |
| | 昆布(酒洗) | 寒 | 苦, 鹹 | 肝, 胃, 腎 | 散癰瘤, | |
| 二黃酒 | 黃 茄 | 寒 | 苦 | 心, 肺, 膽, 大腸 | 瀉火, 清濕熱 | 治上焦火旺 |
| | 黃 連 | 寒 | 苦 | 心, 肝, 胃, 大腸 | 清熱, 清心除煩, 滌火 | 頭面大腫, 目赤 |
| | 甘 草 | | | | | 腫痛, 口舌, 耳鼻熱盛 |
| 二黃膏 | 黃 柏 | 寒 | 苦 | 腎, 膀胱 | 清濕熱, 滌火 | 治一切腫毒 |
| | 大 黃 | 寒 | 苦 | 胃, 大腸, 肝 | 下瘀瀉火, 攻積導滯 | |
| 丁香柿蒂散 | 丁 香 | 溫 | 辛 | 脾, 胃, 腎 | 溫中降逆, 溫腎助陽 | 治諸吃噫 |
| | 柿 蒂 | 平 | 苦, 滾 | 胃 | 降氣止嘔 | 嘔吐痰涎 |
| | 青 皮 | 溫 | 苦, 辛 | 肝, 膽 | 疏肝破氣, 散積和滯 | |
| | 陳 皮 | 溫 | 辛, 苦 | 脾, 肺 | 理氣健脾, 燥濕化痰 | |

藥物配合에 따른 藥效 變化에 對한 考察

| 處方名 | 藥 物 | 氣 | 味 | 歸 經 | 效 能 | 適 應 證 |
|-------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|------------------------------|--|---------------------------|
| 人 蔘 丁香散 | 人 蔘 丁 香 藿 香 | 溫 溫 微溫 | 微苦, 甘 辛 辛 | 肺, 脾 脾, 胃, 腎 脾, 胃, 肺 | 補臟之陽, 補元氣 溫中降逆, 溫腎助陽 快氣和中, 開胃止嘔 | 治妊娠惡阻 胃寒嘔逆 翻胃 吐食 |
| 人 蔘 車前湯 | 人 蔘 車 前 子 | 溫 寒 | 微苦, 甘 甘 | | | 治膀胱氣弱 小便不利 |
| 三才丸 | 天 門 冬 乾 地 黃 人 蔘 | 寒 寒 | 苦 甘 | 肺, 腎 心, 肝, 腎 | 清肺熱 補陰, 補血, 凉血 | 治虛勞, 氣陰不足 咳嗽氣短 精神不振 |
| 三 子 養親湯 | 蘇 子 白 芥 子 萊 菴 子 | 溫 溫 甘 | 辛 辛 辛 | 肺 肺 脾, 胃, 肺 | 降氣消痰, 定喘滑腸 祛痰利氣, 散結消腫 行滯消食, 降氣祛痰 | 治食痰積滯 |
| 三妙散 | 檳 檳 蒼朮(生) 黃柏(生) | 溫 溫 寒 | 辛, 苦 辛, 苦 苦 | 胃, 大腸 脾, 胃, 肺 腎, 膀胱 | 宜利臟腑壅滯 補脾燥濕, 升陽散鬱 清濕熱, 灸火 | 治臍痛, 濕癬 |
| 三奇散 | 枳 角 防 風 黃 茜 | 涼 溫 微溫 | 苦, 辛 辛, 甘 甘 | 肺, 脾, 大腸 膀胱, 肺, 脾 脾, 肺 | 破積下痰, 胸滿 祛風解表, 勝濕解痙 益氣, 止汗, 利尿 | 治痢後下重 |
| 三拗湯 | 甘草(不炙) 麻黃(不去根節) 杏仁(不去皮尖) | 溫 溫 溫 | | 肺, 膀胱 肺, 大腸 | 發汗, 利尿, 止喘息, 止痛 止咳 · 潤燥通便 | 治感冒風邪 咳嗽痰多 |
| 三 物 茵 陳 蒿 湯 | 茵 陳 梔 子 石 膏 | 陳 子 膏 | 寒 寒 寒 | 心, 肝, 肺, 胃 肺, 胃 肺, 胃 | 除煩瀉火, 止血 解熱, 止渴(除煩) | 治黃疸 |

藥物配合에 따른 藥效 變化에 對한 考察

| 處方名 | 藥物 | 氣 | 味 | 歸 經 | 效 能 | 適 應 證 | | |
|---------------|----------------------|----------|---------------|-----------------------------|--|---------------------------|-----------------------------|-----------------|
| 乾 干 人 蘑 半 夏 丸 | 乾 干 人 蘑 半 夏 | 熱 溫 | 辛, 甘 辛 | 脾, 腎, 膀胱 脾, 胃 | 逐風寒邪而止痛, 溫中補陽 降逆止嘔, 消痞散結, 祛痰 | 治妊娠嘔吐不止 | | |
| 大半夏湯 | 半 夏 人 蘑 | 溫 | 辛 | 脾, 胃 | 降逆止嘔, 消痞散結, 祛痰 | 治虛寒反胃 吐食 | | |
| 大 黃 附 子 湯 | 大 黃 炮 附 子 細 辛 | 寒 热 溫 | 苦 辛, 甘 辛 | 胃, 大腸, 肝 心, 脾, 腎 心, 肝, 肺, 腎 | 下瘀瀉火, 攻積導滯 溫中止痛, 逐風寒濕邪 發散風寒, 祛風止痛, 溫肺化痰 | 治寒積便秘 | | |
| 大黃黃連瀉心湯 | 大 黃 黃 連 | 寒 寒 | 苦 苦 | 胃, 大腸, 肝 心, 肝, 胃, 大腸 | 下瘀瀉火, 攻積導滯 清心除煩, 瀉火 | 治邪熱壅滯 心下痞 | | |
| 天 地 煎 | 天 門 冬 熟 地 黃 | 寒 微溫 | 苦 甘 | 肺, 腎 心, 肝, 腎 | 清肺熱 補血, 滋陰 | 治血虛, 咳嗽 | | |
| 木通枳角湯 | 木 通 枳 角 | 涼 涼 | 苦 苦, 辛 | 心, 小腸, 膀胱 肺, 脾, 大腸 | 降火利水, 通氣下乳 破積下痰, 胸滿 | 治泄瀉不止 | | |
| 六 郁 湯 | 香附子(童便浸) 蒼朮(米泔浸) 川 芎 | 平 溫 溫 | 辛, 微苦 苦, 辛 辛 | 肝, 三焦 脾, 胃, 肺 肝, 膽 | 理氣解鬱, 調經止痛 補脾燥濕, 升陽散鬱 活血行氣, 祛風止痛 | 治氣郁, 胸脇痛 | | |
| 甘 草 麻 桂 湯 | 甘 草 黃 桂 | 草 黃 枝 | | 溫 溫 | 辛, 微苦 辛, 甘 | 肺, 膀胱 心, 肺, 膀胱 | 發汗利尿, 止喘息, 止痛 溫經通脈, 祛風止汗 | 治寒濕腹脹 身重身冷無汗 |
| 四妙丸 | 黃 柏 蕙 苞 仁 蒼 朮 牛 膝 | 寒 微寒 溫 酸 | 苦 甘, 淡 辛, 苦 苦 | 腎, 膀胱 脾, 胃, 肺 脾, 胃, 肺 肝, 腎 | 清濕熱, 瀉火 利水滲濕, 除濕瘡, 排膿 補脾燥濕, 升陽散鬱 功專下達, 逐瘀, 強筋 | 治濕熱下注 兩足麻木, 足脛 濕疹痒痛 | | |

藥物配合에 따른 藥效 變化에 對한 考察

| 處方名 | 藥 物 | 氣 | 味 | 歸 經 | 效 能 | 適 應 證 |
|-------|--------------------------|------------------|---------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|------------------|
| 白芍湯 | 白芍藥 酸棗仁 烏 梅 | 涼 平 溫 | 苦, 酸 甘, 酸 酸 | 肝, 脾 心, 脾, 肝, 胆 心, 脾, 肝, 肺, 脾 | 制肝補脾, 鎮痙痛 安神定志, 神經鎮靜 斂肺固腸, 止渴止吐 | 治肝虛自汗 |
| 芎烏散 | 川 芎 烏 藥 | 溫 溫 | 辛 辛 | 肝, 膽 脾, 肺, 腎, 膀胱 | 活血行氣, 祛風止痛 順氣止痛, 散寒溫腎 | 治氣厥頭痛 頭目昏眩 |
| 杏仁煎丸 | 杏 仁 胡桃肉 | 溫 溫 | 甘, 苦 甘 | 肺, 大腸 肺, 腎 | 止咳, 潤燥通便 補腎強腰膝 斂肺定喘 | 治老年肺喘 咳嗽不已 |
| 扶中湯 | 山 藥 炒白朮 龍眼肉 | 平 微溫 平 | 甘 甘, 苦 甘 | 脾, 胃, 肺, 腎 脾, 胃 心, 脾 | 補脾胃, 益肺腎 除濕益氣, 補脾 補心安神, 養血益脾 | 治泄瀉不止 |
| 青皮散 | 青 皮 大腹皮 | 溫 微溫 | 苦, 辛 辛 | 肝, 膽 脾, 胃, 大腸, 小腸 | 疎肝破氣, 散積和滯 行氣寬中, 利水消腫 | 治氣結腹脹 |
| 知母石膏湯 | 知 母 石 膏 葛 根 甘 草 | 寒 寒 平 平 | 苦 辛, 甘 甘, 辛 甘 | 肺, 胃, 腎 肺, 胃 脾, 胃 脾, 胃 | 除渴, 止煩 解熱止渴 發汗解肌, 止瀉, 止渴 | 治燥火所致的上消症 |
| 定志丸 | 石菖蒲 遠 志 白茯苓 人 蘿 | 溫 溫 平 平 | 辛 苦, 辛 甘, 淡 甘, 淡 | 心, 脾 腎 心, 脾, 肺 | 開發心陽 治健忘 利水補心益脾 | 治心氣不足 |
| 澤瀉湯 | 澤 瀉 白 朮 | 微寒 微溫 | 甘, 淡 甘, 苦 | 腎, 膀胱 脾, 胃 | 利水滲濕, 泄熱 除濕益氣, 補脾 | 治心下有支飲 其人若冒眩者 |

| 處方名 | 藥 物 | 氣 | 味 | 歸 經 | 效 能 | 適 應 證 |
|-------|--------------------------|---------------|----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|----------------|
| 參附湯 | 人 蔘 炮附子 | 熱 | 辛, 甘 | 心, 脾, 腎 | 溫中止痛, 遂風寒濕邪 | 治元氣 大虧 陽氣暴脫 |
| 枳 實 散 | 枳 實 白芍藥 | 寒 涼 | 苦 苦, 酸 | 肺, 大腸 肝, 脾 | 破積下痰, 消痞 制肝補脾, 鎮痙痛 | 治產後腹痛 |
| 枳實散 | 枳 實 肉桂 | 寒 熱 | 苦 辛, 甘 | 肺, 大腸 腎, 脾, 膀胱 | 破積下痰, 消痞 溫中補陽益火消陰通經 | 治胸背痛 |
| 茯苓湯 | 炒白朮 茯 苓 | 微溫 平 | 甘, 苦 甘, 淡 | 脾, 胃 心, 脾, 肺 | 除濕益氣, 補脾 利水, 补心, 益脾 | 治濕熱泄瀉 |
| 茵陳蒿湯 | 茵 陳 梔 子 大 黃 | 微寒 寒 寒 | 苦 苦 苦 | 脾, 胃, 肝, 膽 心, 肝, 肺, 胃 胃, 大腸, 肝 | 清利濕熱, 退黃 除煩瀉火, 止血 下瘀, 瀉火, 功積導滯 | 治濕熱黃疸 |
| 荆芥湯 | 荆芥穗 桔 梗 甘 草 | 溫 平 | 辛 苦, 辛 | 肺, 肝 肺, 胃 | 祛風, 解表 清喉利膈, 去痰, 排膿 | 治風熱壅肺 咽喉腫痛 |
| 荆芥散 | 荆芥穗 桃 仁 | 溫 平 | 辛 苦, 甘 | 肺, 肝 心, 肝, 大腸 | 祛風, 解表 破血祛瘀, 潤腸通便 | 治產後風虛 血暈 |
| 黃芩瀉白散 | 黃 芩 桑白皮 地骨皮 甘 草 | 寒 寒 寒 | 苦 甘 甘, 淡 | 心, 肺, 膽, 大腸 肺 肺, 肝, 腎 | 瀉火 瀉肺, 鎮咳, 利尿, 行水 清涼, 解熱, 退熱除煩 | 治肺火而咳嗽 |
| 解暑三白湯 | 白茯苓 澤 濕 白 朮 | 平 微寒 微溫 | 甘, 淡 甘, 淡 甘, 苦 | 心, 脾, 肺 腎, 膀胱 脾, 胃 | 利水, 補心, 益脾 利水, 渗濕, 泄熱 除濕益氣, 補脾 | 治冒暑作瀉 |

IV. 考 察

效果的인 處方의 構成은 오랜 臨床經驗과 理論的研究를 通하여 이루어져 왔으며 어떤 處方이 目標로 하는 效能을 나타내려면 그 構成藥劑間의 相互作用에 對한 究明이 이루어져야 한다고 생각된다.

單一藥物이 여러 成分을 含有하고 있으나 어떠한 藥物을 만나느냐에 따라서 特定成分으로 그 效能이 발휘되어지는데 이는 곧 藥物間의 相對作用으로 藥效가 方向轉換되는 것이라 보여진다.

單一成分으로 疾病을 治療하는 西醫學과는 달리 二味以上의 藥物이 含有하고 있는 여러 成分들이 複合的으로 配合하여 뚜렷한 方向의 治療藥으로 活用되는 方劑는 어떤 原則에 의하여 構成되어지며 既存處方의 探究, 分析을 通하여 이러한 原則를 發見해야 된다고 생각된다.

본 研究內容中 100 餘方은 今世에 임상에서 널리 활용되는 處方의 根幹을 이루며 임상응용시 이 범주에서 合方되고 變用되었다고 생각되어 그 處方의 構成原則을 찾아보고자 분석하였다.

處方의 構成 原則은 “君·臣·佐·使” 네개의 부분으로 나뉘어 진다. 君藥은 主治療, 이것은 主證 혹은 病因과 主要治療作用의 藥物이다. 臣藥은 輔助藥이며 主藥의 作用이 더욱 발휘되도록 하며, 佐藥은 主藥을 協助하고 兼證을 治療한다. 혹은 主藥의 藥物의 毒性과 烈性을 消減시키고 혹은 反佐作用의 藥物이다^{4, 6, 10, 11, 12)}. 이처럼, 君·臣·佐·使에 對한 定義가 있으나 이는 基本的인 規律로 認識되어지며 보다 重要한 것은 엄격한 藥物의 配伍에 있는 것으로 생각된다.

藥物의 配合方法은 主로 相須와 相使의

두 가지의 方法으로 概括할 수 있으며 相須藥은 效能이 類似한 藥物을 配合하여 相互協同作用을 이용해서 治療效果를 높이는 配合方法이다. 氣와 味 및 歸經도 비슷하게 나타난다. 例를 들면 人蔘配黃耆하면 強補氣하고, 大黃配芒硝하면 強瀉下하고, 黃芩配黃連하면 災火, 清熱作用을 強化시켜준다. 또한, 相使藥은 效能이 다른 藥物을 配合하여 效果를 增進시켜주는 것으로 氣와 味 및 歸經이 相異하게 나타나는 경우가 많다. 例를 들면 黃耆合茯苓하면 黃耆의 补氣에 茯苓의 利水作用이 도와준다. 白朮合枳實하면 消痞作用을 強化시켜 주는 것이다.

同一 藥物이 他 藥物과 配合됨으로 因해 藥效가 선택적으로 발휘됨을 알 수가 있고, 또한, 하나의 痘을 치료하기 위해서 치유되는 기전에 적합한 藥物들로 配合 구성되어 지는 것으로 보여진다. 예를 들면, 治咽痛을 위하여 解毒劑인 甘草와 消炎劑인 桔梗이 配合되는 것을 볼 수가 있다^{註4)}.

藥物의 친화력을 각 處方에서 相對的으로 계속 만나는 것을 알 수가 있었다. 이것을 效果的으로 配合되는 藥物로 확인하기 위해서 한 藥物을 각 處方을 中心으로 계속 考察하여 정리를 해보았다^{註2)}. (참고: 本研究에서 누락된 配合 藥物도 참고적으로 정리에 포함시켰다)^{註3)}

註1) 甘草, 人蔘等 反復되는 藥物들은 效能 및 氣味等을 以下 생략하였다.

註2) 藥物의 性格이 分明하게 파악이 可能한 한 藥物만 配合된 것만 발췌 정리 하였음.

註3) 藥物配合의 效能은 處方의 作用증을 參考하였고多少 主觀性이 개재되었고, 근거자료가 불분명한 것도 포함을 시켰음.

註4) 甘桔湯 處方의 分析임.

藥物配合에 따른 藥效 變化에 對한 考察

| | | |
|-----|---------------------------------------|---|
| 黃 茜 | 得當歸 活血，得白朮 補氣，得防風 其功益大。 | 獨 活 得細辛頭痛頭暈目眩。 |
| 甘 草 | 得桔梗清咽喉。 | 羌 活 得當歸 骨節酸痛。 |
| 人 蔘 | 得升麻補上焦之元氣，得茯苓補下焦 之元氣，得麥門冬生脈，得乾姜補氣。 | 防 風 得葱白能通行周身。 |
| 沙 蔘 | 得麥門清肺熱。 | 藁 本 得木香治霧露之中於上焦，得白芷療 風濕。 |
| 丹 蔘 | 得山楂，益母草，清產後瘀血發熱 | 升 麻 得柴胡引生氣上升，得葛根發陽明之 汗。 |
| 玄 蔘 | 得甘草桔梗止咽痛，得牡蠣，貝母治 療癰。 | 白 芝 得貝母，瓜蔞治乳癰，得辛夷，細辛 治鼻病。 |
| 白 朮 | 得枳實滌飲消痞，得條芩安胎。 | 柴 胡 得益氣藥則升陽，得清氣藥則散邪。 |
| 蒼 朮 | 得防風發汗，得黃柏勝濕，得香附快 中下二焦之氣，得梔子解性之燥。 | 麻 黃 得桂心治風痺冷痛。 |
| 黃 精 | 得枸杞子補精益氣。 | 荆 芥 得石古治風熱頭痛。 |
| 遠 志 | 得茯苓入腎通陽，得山棗仁通心安神。 | 蘇 葉 得砂仁安胎，得木瓜，厚朴治寒濕腳 氣，得藿香，爲藥濕中止痛，得香附 解肌，得桔梗，枳角，利隔寬腸，得 萊菔子，杏仁消痰定喘，得桔梗治梅 核氣。 |
| 牛 膝 | 得肉荳蓉益腎，得杜仲補肝，性下行 滑竅。 | 前 胡 得桔梗治痰熱咳逆。 |
| 甘 菊 | 得枸杞子下行恍腎。 | 天 麻 得川芎補肝，得白朮去濕。 |
| 五味子 | 得半夏治痰，得阿膠定喘，得吳茱萸 治五更腎泄。 | 秦 芒 得獨活，桂心治產後中風，得柴胡， 甘草治勞熱。 |
| 天門冬 | 得熟地黃入腎，得人蔘，五味子，枸 杞子生脈。 | 威靈仙 得木瓜治腰脚諸病。 |
| 麥門冬 | 得五味子攝肺腎之津液。 | 釣鈎藤 得甘草治癆疾。 |
| 款冬花 | 得貝母，百部治肺實鼻塞，得黃連口 中疳瘡，得紫苑良。 | 當 歸 得人蔘，黃芪補氣生血，得大黃芒硝 則寒滑大腸。 |
| 紫 菟 | 得款冬，百部，烏梅治久咳，得白前， 半夏治水氣喘逆。 | 白芍藥 得人蔘補氣，得當歸養血，得白朮補 脾，得川芎瀉肝，得甘草治腹痛，得 黃連止痢 |
| 桔 梗 | 得甘草清利咽喉。 | 生地黃 得木通導小腸之熱。 |
| 馬兜鈴 | 得甘草治肺氣喘急。 | 熟地黃 得砂仁行氣。 |
| 白 前 | 得桔梗，桑白皮治咳嗽吐血。 | 續 斷 得當歸治勞傷腰痛 |
| 半 夏 | 得茯苓，甘草治伏暑引飲，得黃連， 括蔞治結胸。 | 益母草 得山楂炒黑治產後惡露不行。 |
| 貝 母 | 得桔梗下氣，得白芷消癰。 | 艾 葉 得香附治少腹痛，得阿膠治產後下 血。 |
| 天花粉 | 得人蔘，麥門冬治消渴飲水。 | |
| 夏枯草 | 得香附，甘草治目珠疼痛，得香附， 貝母治馬刀。 | |

| | | | |
|-----|---|-----|--|
| 延胡索 | 得川棟子治熱厥心痛，得茴香治小兒盤腸痛。 | 砂 仁 | 得白朮，條芩 能安胎。 |
| 紅 花 | 得去風藥治六十二種風，得補益藥生新血。 | 白豆久 | 得砂仁 甘草治小兒吐乳， 得砂仁，丁香，陳皮治反胃。 |
| 三 積 | 得蓬朮治渾身，得大黃治痃癖，得丁香治反胃。 | 肉豆久 | 得木香附子治久瀉不止。 |
| 大 黃 | 得杏仁療傷損瘀血。 | 香附子 | 得木香則散滯和中，得山梔子能降鬱火，得茯苓能交心腎，得茴香，補骨脂能引氣歸元，得厚朴則決壅消脹，得艾葉能緩子宮，得高良姜治心脾冷痛，得烏藥治痙攣，得黃連治百病。 |
| 黃 蕈 | 得厚朴，黃連止腹痛，得白朮安胎，得柴胡退寒熱，得芍藥治痢。 | 木 香 | 得黃連治帶下，得檳榔 下焦氣滯。 |
| 黃 連 | 得枳實 滬痞滿，得烏梅，川椒安蛇，得木香治帶下 治肝膽鬱火。 | 藿 香 | 得滑石治暑月泄瀉。 |
| 知 母 | 得麥門清肺止渴，得地黃 滋腎潤燥，得人蔘 治妊娠子煩。 | 茴 香 | 得川棟子治腎消飲水，得杏仁，葱白治膀胱疝痛。 |
| 龍胆草 | 得柴胡 治目疾，得蒼耳子 治耳中諸竇症。 | 良 干 | 得茯苓治胃寒噫逆。 |
| 防 己 | 得黃柏 知母 去下焦濕腫 | 金銀花 | 得當歸治熱血痢。 |
| 澤 瀉 | 得白朮治支飲。 | 蒲公英 | 得忍冬治乳癰。 |
| 車前子 | 得牛膝 疏肝之性 導引利水，得菟絲子 升清降濁，能補虛明目 催生下胎。 | 牛蒡子 | 得荆芥治咽喉不利，得甘草治喉痛，得薄荷治風熱鼻炎。 |
| 茵 陳 | 得山梔子療熱黃，得附子治陰黃，得車前子治眼目濕熱赤腫。 | 茯 苓 | 得人蔘能下氣，得半夏能滌飲。 |
| 香 蕤 | 得厚朴治傷暑寒証，得白朮治暑濕水腫。 | 茯 神 | 得酸棗仁能安神。 |
| 附 子 | 得麻黃發中有補，得人蔘能留陽氣，得熟地黃能固元陽，得乾薑，桂枝溫經散寒，通經墮胎，無乾薑 不熱，得甘草則性緩，得肉桂則補命門真火。 | 桂 枝 | 得白芍藥，甘草能利營衛。 |
| 川 烏 | 得梔子治疝氣，得乾姜治陰毒傷寒，得木香治冷氣洞泄。 | 山茱萸 | 得熟地黃補腎虛，得五味攝精氣。 |
| 破故紙 | 得菟絲子治下元虛勞，得杜沖 胡桃治腎虛腰痛，得茯苓，沒藥定心補腎，得茴香治小便無度，得蕙子治腎漏。 | 酸棗仁 | 得人蔘，茯苓治盜汗。 |
| 蛇床子 | 得五味，菟絲子療陽痿，得烏梅治產後陰脫。 | 桑白皮 | 得地骨皮 鴉肺，得白茯苓利水。 |
| 菟絲子 | 得茯苓，黃連治白濁遺精，得牛膝治腰脚痛，得車前子治難產橫生。 | 山梔子 | 得滑石 治血淋溺閉，得茵陳治五黃。 |
| 益智仁 | 得烏藥治小便頻數。 | 黃 柏 | 得肉桂治咽痛，得蒼朮治濕瘻，得牛膝治濕熱上行，得細辛瀉膀胱火，得知母滋陰降火。 |
| | | 枳 實 | 得白朮去痰飲，得瓜萎消痞結，得皂角通大便。 |
| | | 枳 膜 | 得桔梗治虛秘，得甘草治婦人體肥難產。 |
| | | 厚 朴 | 得蒼朮治濕滿，得黃連治帶下，得杏仁能下氣定喘。 |
| | | 檳 榴 | 得枳實治傷寒痞滿，得木瓜治腳氣衝心，得木香調氣，得黃芩，枳殼寬腸。 |

| | |
|-----|--|
| 槐 花 | 得鬱金治小便血, 得荆芥治大便血, 得山梔治酒毒下血, 得條芩治血崩, 得牡蠣治赤白帶. |
| 烏 藥 | 得沈香治胸腹冷氣, 得益智仁治小便 頻數. |
| 五加皮 | 得地骨皮治虛勞, 得牡丹皮治婦人血 風. |
| 吳茱萸 | 得乾姜治噃酸, 得黃連, 白芍治赤白 下利, 得茯苓治痰飲. |
| 川 椒 | 得地黃, 調養真元, 得白茯苓補益心 腎, 得烏梅治蛔蟲. |
| 丁 香 | 得柿蒂治吃逆. |
| 沒 藥 | 得乳香治跌撲損傷睡痛. |
| 杏 仁 | 得門冬能心肺 |
| 陳 皮 | 得白朮補脾, 得甘草補肺, 得杏仁治 大腸氣閉, 得半夏治濕痰. |
| 龍 骨 | 得遠志治健忘, 得蓮子治滑精. |

4) 藥物의 共力作用으로 效力を 增大시킬
수 있으며 疾病의 기전을 파악하고
藥物의 配合을 研究한다면 創方도 可
能하리라 思料된다.

VI. 參考文獻

- 馬元臺·張隱庵合註: 黃帝內經, 民國 66 年.
- 張錦清外: 中醫方劑學, 合北, 樂群出版社.
- 久保道德外: 漢方醫藥學, 東南出版社.
- 尹吉榮: 東醫臨床方劑學, 明寶出版社.
- 漢方醫學大辭典(藥方篇), 人民衛生出版社.
- 申佶求: 申氏本草學, 壽文社.
- 汪認庵: 醫方集解, 旋風出版社.
- 許鴻源·許照信編著: 常用漢方方劑, 華安出版社.
- 陳師文等編: 太平惠氏和劑局方, 旋風出版社.
- 辛民教: 臨床本草學, 南山堂.
- 康舜洙: 方劑學會誌創刊號, pp.10-13.
- 漢方製劑의 歸經·八綱, 一中社.
- 張仲景著蔡仁植譯: 金匱要略精解, 韓林院.
- 黃度淵: 方藥合編, 醫藥社.

V. 結 論

以上에서 君·臣·佐·使로 이루어진 2 味에서 4 味로 구성된 104 方을 比較 考察한結果는 아래와 같다.

- 君·臣·佐·使는 각 處方에 絶對的으로 적용된 것이 아니며 立方에서 原則의規律로 이해되어야 한다고 생각된다.
- 한 藥物에 内在된 빼은 效能이 어떤 藥物과 配合되어지느냐에 따라 선택적效能이 발휘됨을 알 수가 있었다.
- 相須와 相使關係가 主로 處方에 活用이 되었으며 친화력이 있는 藥物끼리만 配合이 可能한 것으로 보아서 무리한 處方의 合方과 加減에 신중을 要할 필요성을 느꼈다.