

小 兒 胎 熱

又川 朴 寅 商*

原因：小兒 初生後 一個月 以內的 모든 瘡疹은 胎毒이 淺部에 있는 것이며 一, 二歲 後에 나타나는 病은 胎毒이 深部에 있는 것이다.

證治：外用藥도 여러가지 있으나 그 使用이 不便하고 큰 效果도 없음을 經驗하였다.

內服으로는 五福化毒丹, 犀角地黃湯, 防風通聖散 酒製爲末 每一錢式 水煎服 三十貼效라 하였고 大連交飲, 生料四物湯, 牛黃散 등 그 어느 것도 좋을 것으로 思料되나 小兒이기 때문에 長期服用시키는데에 어려움을 겪을 것이다.

本人의 經驗으로는 犀角消毒飲을 愛用한 바, 三, 四貼 내지 五, 六貼 服用하면 完治되는 例가 많았다.

問題는 犀角인데, 동물 보호 때문에 犀角을 못 쓰게 하고 있는 事情도 있지만, 너무 高價여서 患者에게 負擔이 많이 가서 有感스럽기 한이 없다. 筆者의 經驗으로는 '牛角'을 倍量 使用하면 效果가 있는 것을 體驗하였다. 近來 動物實驗한 結果만을 가지고 其 效能이 全部인

것처럼 發表하고 있으나, 나는 人體에 直接 試用하여서 效果를 보았으니 試用하기를 勸告하는 바이다. 牛角을 服用하여도 별다른 副作用이 없어서 安心하고 使用하여도 無妨하다.

近來에는 衛生施設이 잘 되어있어 과거 같이 皮膚疾患을 앓는 사람이 감소되었으나 종종 胎熱로 고생하는 兒童을 볼 때 안타깝다.

아래의 處方은 筆者가 小兒胎熱에 즐겨 사용하는 處方이다. 여러분께 臨床에 도움이 될까 하여 실는다.

加減消毒飲

牛蒡子 四錢

荊芥

防風 各 二錢

甘草 一錢

牛角 三錢

* 熱多者는 加 生地黃 一 내지 二錢을 하면 좋다.

* 大田 東一韓醫院