

术散，每日三次，每次半包，枣汤送服，调补巩固20天而康复。随访3月，未见复发。

四、脾虚肝旺，痰气郁结 共26例。临床多发于脾肾虚弱，情躁易怒的儿童。证见面色萎黄或晦暗无华，精神不振，乳食懒进，或食后腹胀，大便不调，易哭易怒，夜睡不宁，常于恼怒啼哭时猝然气声不复，神昏肢厥，苏醒后常喉间痰鸣，舌淡、苔油腻，脉弦滑，指纹色青滞。此乃脾虚不运，聚液生痰，肝郁气滞，疏泄失常，痰气搏结，宗气不畅，遂致怒哭伤肝，气血逆乱而成。治宜疏肝理脾，散结化痰法。逍遥散酌加石菖蒲、天竺黄、枳实、神曲等主之。如孙××，男，29个月，1983年5月8日初诊。2月前患腹泻后，神萎，面黄暗无华，不思乳食，肠鸣腹胀，大便不调，夜睡不安，易哭易怒。4月25日因母外出未

携，居家啼哭过甚，突然气死，遂在当地医院就诊，服鲁米那、维生素B₆ 5天，无效。近一周来发病三次，每次发作前恼怒哭嚎，渐致哭声不出，气息不续，舌硬肢强，神昏而厥，厥复之后，咽间有痰，哭而不已，舌淡、苔薄腻，脉沉弦，指纹色青滞。此乃脾虚肝郁，痰气搏结，治宜疏肝理脾，化痰散结法，予逍遥散加减。处方：柴胡(醋炒)、炒枳实、茯苓、炒白术各9克，炙甘草4.5克，天竺黄12克，石菖蒲、当归、白芍、神曲各6克。水煎频服，日一剂，连服四剂，送冲苏合香丸1/4丸，日二次。亦囑令儿喜悦，易忤情志，避免啼哭。12日二诊：服后未见发作，夜卧安静，易怒啼哭少，照方四剂。17日三诊：诸症消失，舌脉纹色正常。予逍遥丸，日三次，每次半丸熬服，巩固治疗20天，家长来告，愈后未再发作。

银翘蒿芩汤治疗小儿感冒高热186例

浙江中医学院附属门诊部 杨季国

叶舟子

笔者在临证中，应用自拟之银翘蒿芩汤治疗小儿感冒高热186例，取得满意效果。方药组成：银花、连翘、青蒿、黄芩、芦根、僵蚕。加减：无汗者加淡豆豉、薄荷或苏梗；咳嗽甚者加前胡、杏仁、竹沥半夏、浙贝；咽红疼痛者加蝉衣、牛蒡子；夏令发病者加藿香、佩兰；胃有食滞者加神曲、鸡内金等。186例中，男113例，女73例；年龄最大者为11岁，最小者为14个月。就诊时体温最高40.3℃，最低为39.2℃。经单用银翘蒿芩汤治疗而体温降至正常的有157例，此类患儿一般在服药后2小时体温有明显下降。体温恢复正常的时间，最短者为24小时，最长者为5天。如治黄×，男，20个月。1990年6月12日诊。肺气素虚，屡感外邪，而致高热。近日新感，高热已2天，体温达40.1℃，无汗，咽红，咳嗽不爽，胃纳欠佳，大便稍干，溲黄。舌红，苔白腻，指纹色紫。治拟清热宣肺豁痰。拟银翘蒿芩汤加味：银花、连

翘、僵蚕、竹沥半夏、杏仁、神曲各6克，青蒿10克，炒淡芩、前胡、藿香各5克，鲜芦根15克，薄荷(后下)3克，蝉衣2克。药后汗微出，体温渐退，至翌日体温降至正常，唯有咳嗽，喉中痰鸣。舌淡红、苔白腻。拟宣肺豁痰为主。竹沥半夏、杏仁、浙贝、僵蚕、神曲各6克，前胡、炒牛蒡子、化橘红、炒竹茹、炒淡芩各5克，蝉衣2克。进3剂而愈。

小儿为“纯阳之体”，感受外邪后极易从阳化热，高热之症，每易出现。且邪热炽盛，心火、肝风、肺热交相煽动，变证遂生。故而，小儿感冒一旦出现高热，急急清退其热，当为首务。银翘蒿芩汤，药用银花、连翘清热解毒，轻宣透表；青蒿、黄芩透泄郁热，而青蒿气味芬香，微微发汗，退热尤长；芦根清热生津；僵蚕疏风化痰。六药相伍为用，共奏退热之功。用治小儿感冒高热之证实属对症方药。