

分流法治疗小儿尿频症

姜润林

杏苑集

小儿尿频症，其病机责之脾肾虚弱者众，治都以温补脾肾、固涩止频之法。笔者则拟分流疗法，收到满意疗效。

发汗宣肺 李××，女，14岁，1986年3月28日诊。小便频数2月余。初感畏寒无汗，咳嗽尿多，身痛困乏，自服银翘解毒片，身痛得已，惟畏寒无汗依然，且尿频逐渐加重，日夜达10余次之多，渐不能控制尿意，多次查尿常规正常，服西药镇静剂效鲜。诊见患儿面色㿠白，恶寒。舌质淡，苔薄白，脉沉缓。证属凉遏阳气，肺卫失宣，气化失司，津液直趋膀胱。治以温阳发汗。处方：炙麻黄10克，制附片6克，甘草3克。嘱服药后蒙被以汗出为度。2剂后，通身汗出，浑身顿觉轻松，畏寒消失，尿次明显减少，且能控制尿意。续3剂，尿次正常。以五苓散出入调理周余，诸症若失。

汗尿同源，共为人体津液所化，其化汗则从腠理外泄而出，化尿则从膀胱泌别而溲。气化正常，

则排泄有序。本例患儿初属少阴伤寒，失于正治，凉遏阳气，致气不化津，直趋膀胱，故用麻黄附子甘草汤，发汗启水津之上源，俟汗出，玄腑通，津液得归正化，不治尿而尿自治矣。

通腑缩泉 许××，女，10岁，1988年3月16日诊。罹患尿频半载余，时轻时重，严重时每小时二三十次之多，近发作1周。诊见：小便频数，昼夜行20余次，口干口苦，夜寐不宁，大便干结。舌红，苔薄黄根糙，脉弦细。证属肠胃燥热，脾津不足，水湿偏渗膀胱。治以通便泄热，润肠摄尿。麻子仁丸加减：火麻仁、杏仁、白芍、生军（后入）各10克，枳壳、川朴各6克，覆盆子、桑螵蛸各12克。上方进3剂后，解渴便4次，小便次渐减少，原方生军易熟军，续服6剂，尿频止，苔糙转润，余症悉除，继以麻子仁丸巩固1月，追访至今未见复发。

大肠、膀胱同居下焦，大便赖肠中津液载舟以行，小便俟膀胱水液盈满气化以溲。本例患儿尿频而便艰，乃脾胃燥热，不能为胃行其津液，反使津液下趋，偏渗膀胱，肠津亏乏所致。故用麻子仁丸润肠泄热，通腑缩泉，俾腑气通，津液行，尿频得以自己。

六味汤加味治疗小儿慢喉喑

徐克信

杏苑集

笔者采用六味汤（《喉科秘旨》）加味治疗40例慢喉喑患儿，获得满意的疗效。40例中，男28例，女12例。年龄最大8岁，最小3岁。病程最长3年，最短20天。全部患儿均有不同程度的持续性发音嘶哑，若高声发音或感受风寒，或过食生冷则嘶哑更甚，但咽喉很少有疼痛的感觉，食欲不振，面色㿠白无华，舌质淡，苔白或薄腻。其中6例有咽喉部不适感，粘痰不易咯出。从能配合喉镜检查

的患儿来看，见声带苍白，闭合不全，或声门有粘痰附着，少数患儿声带稍有充血。方药组成：苏叶、荆芥、防风、蝉衣、细辛、炙甘草、桔梗、淡干姜、杏仁、制半夏、陈皮、茯苓。若喉痒有异物感加麻黄；声带充血水肿加胖大海，去干姜。40例患儿经治疗，发音恢复正常33例，嘶哑减轻4例，无效3例。小儿慢喉喑据临床观察，患儿均属元阳不足，复感风寒或过食生冷，导致寒邪滞留，肺气郁闭，脾失健运，无以鼓动声门而发声嘶哑。正如《千金要方》中云：“风寒之气客于中，滞而不能发，故喑不能言。”所以用温通宣肺、健脾化痰之六味汤加味治疗，效如桴鼓。