韓國生藥協會

法社
人團

◇ 강원도지부

展

(祝)

원주시	지부장	송	인	인	겸
원주군	〃	창	인	구	
		(도공파장정겸직)			
원주군	〃	박	영	임	
정선군	〃	전	승	포	
영월군	〃	허	심	호	
춘천시	〃	최	운	철	
		(공파장정겸직)			
평창군	〃	함	영	완	
횡성군	〃	이	중	렬	
		(공파장정겸직)			
태백시	〃	우	최	이	
명주군	〃	대	이	중	
홍천군	〃	박	기	규	
		(공파장정겸직)			
삼척시	〃	건	시	정	
양구군	〃	박	규	백	
인제군	〃	훈	부	복	
속초시	〃	기	대	규	
삼척군	공파장정	렬	결	철	
		임	조	최	
		원	대	준	
		길	현	수	

發

韓國生藥協會

法社
人團

◇ 강원도지부

展

(祝)

원주시	지부장	송	인	인	겸
원주군	〃	창	인	구	
		(도공파장정겸직)			
원주군	〃	박	영	임	
정선군	〃	전	승	포	
영월군	〃	허	심	호	
춘천시	〃	최	운	철	
		(공파장정겸직)			
평창군	〃	함	영	완	
횡성군	〃	이	중	렬	
		(공파장정겸직)			
태백시	〃	우	최	이	
명주군	〃	대	이	중	
홍천군	〃	박	기	규	
		(공파장정겸직)			
삼척시	〃	건	시	정	
양구군	〃	박	규	백	
인제군	〃	훈	부	복	
속초시	〃	기	대	규	
삼척군	공파장정	렬	결	철	
		임	조	최	
		원	대	준	
		길	현	수	

生藥教室

'91 新規會員을 爲하여

작약(芍藥)

1′학명 : 적작약 Paeonia albiflora var′ typica Huth° 백작약 Paeonia Japonica Miyabe et

2′과명 : 작약과 Paeoniaceae

3′성분 : Paeonifliorin′ Sucrose′ Paeonine

4′용도 : 진경 진통′ 수렴′ 보혈 피′수지혈′ 조경

5′재배법

가. 기후 : 우리나라 전역에서 재배할 수 있으나 특히 중부 이남 지방이 좋다.

나. 토질 : 보토가 비옥하면 배수가 잘되는 사질양토나 식양토가 좋다.

다. 파종 : 파종기는 9월중순~10월하순 사이에 하는데 이 때 파종하면 이듬해 봄에 싹이 나온다. 파종량은 10a당 종자 4~5kg 정도이다.

라. 시비 : 시비량은 10a당 퇴비 2,000kg, 요소 10kg, 용성인비 30kg, 염화가리 10kg 정도이다.

마. 중경제초 : 중경제초는 4~5회 실시하고 특히 봄철 싹이 나올 때 김매기를 잘해야 한다.

바. 지주 : 지주는 꽃이 필 때 쓰러지지 않도록 세워준다.

6′재배법

가. 기후 : 우리나라 전역에서 재배할 수 있으나 특히 중부 이남 지방이 좋다.

나. 토질 : 보토가 비옥하면 배수가 잘되는 사질양토나 식양토가 좋다.

다. 파종 : 파종기는 9월중순~10월하순 사이에 하는데 이 때 파종하면 이듬해 봄에 싹이 나온다. 파종량은 10a당 종자 4~5kg 정도이다.

라. 시비 : 시비량은 10a당 퇴비 2,000kg, 요소 10kg, 용성인비 30kg, 염화가리 10kg 정도이다.

마. 중경제초 : 중경제초는 4~5회 실시하고 특히 봄철 싹이 나올 때 김매기를 잘해야 한다.

바. 지주 : 지주는 꽃이 필 때 쓰러지지 않도록 세워준다.

사. 병충해 : 잿빛곰팡이병, 뿌리썩음병, 붉은점무늬병, 검은점무늬병, 진딧물, 뿌리혹선충 등이 있다.

아. 수확 : 수확은 파종 3년째부터 하는데 9월중순~10월하순 사이에 한다.

자. 종자 : 종자는 10a당 4~5kg 정도 필요하다.

차. 저장 : 저장은 건조한 곳에 보관한다.

7′수확 및 조제

가. 수확 : 수확은 파종 3년째부터 하는데 9월중순~10월하순 사이에 한다.

나. 조제 : 수확한 뿌리를 물로 씻어 껍질을 벗기고 건조하여 조제한다.

8′이용

①청혈제 ②해열제 ③진통제 ④강장제로 쓰인다.

〈註〉

1)청혈이라는 혈액을 맑게 한다는 뜻이다.

2)해열이라는 열을 내리게 한다는 뜻이다.



〈藥材〉

음양곽(淫羊藿)

약용부 : 삼지구엽초

1′기원 및 분포

우리나라 전역에 걸쳐 자생하는 다년생 초본식물로서 산지의 양지쪽 또는 반그늘진 곳에 많이 분포한다.

2′생태적 특징

뿌리줄기는 굵고 옆으로 뻗으며 줄기는 높이 30~60cm 정도로 자라고 털이 없다.

3′특징

잎은 3개씩 2회 깃꼴겹잎이 나며 작은잎은 난형 또는 피침형으로 길이 3~5cm, 너비 2~3cm 정도이며 가장자리에 가시 같은 톱니가 있다.

4′채취

꽃은 4~5월에 피며 백색 또는 연한 홍색을 띤다.

5′조제

열매는 삭과로 5~6월에 익으며 종자는 많은 편이다.

6′재배법

가. 기후 : 우리나라 전역에서 재배할 수 있으나 특히 중부 이남 지방이 좋다.

나. 토질 : 보토가 비옥하면 배수가 잘되는 사질양토나 식양토가 좋다.

다. 파종 : 파종기는 9월중순~10월하순 사이에 하는데 이 때 파종하면 이듬해 봄에 싹이 나온다. 파종량은 10a당 종자 4~5kg 정도이다.

라. 시비 : 시비량은 10a당 퇴비 2,000kg, 요소 10kg, 용성인비 30kg, 염화가리 10kg 정도이다.

마. 중경제초 : 중경제초는 4~5회 실시하고 특히 봄철 싹이 나올 때 김매기를 잘해야 한다.

바. 지주 : 지주는 꽃이 필 때 쓰러지지 않도록 세워준다.

사. 병충해 : 잿빛곰팡이병, 뿌리썩음병, 붉은점무늬병, 검은점무늬병, 진딧물, 뿌리혹선충 등이 있다.

아. 수확 : 수확은 파종 3년째부터 하는데 9월중순~10월하순 사이에 한다.

자. 종자 : 종자는 10a당 4~5kg 정도 필요하다.

차. 저장 : 저장은 건조한 곳에 보관한다.

7′수확 및 조제

가. 수확 : 수확은 파종 3년째부터 하는데 9월중순~10월하순 사이에 한다.

나. 조제 : 수확한 뿌리를 물로 씻어 껍질을 벗기고 건조하여 조제한다.

8′이용

①청혈제 ②해열제 ③진통제 ④강장제로 쓰인다.

〈註〉

1)청혈이라는 혈액을 맑게 한다는 뜻이다.

2)해열이라는 열을 내리게 한다는 뜻이다.

창출(蒼朮)

학명 : 삽주근경

1′약초 : 관절염 류머티스 신경통 위장병 소화불량 식욕부진 구토 설사 이뇨 발한 감기 야맹증 눈병 당뇨병 등에 효과가 있다.

2′생태적 특징

산지의 양지쪽에 자생하는 다년생 초본식물로서 높이 30~60cm 정도로 자라고 털이 없다.

3′특징

잎은 3개씩 2회 깃꼴겹잎이 나며 작은잎은 난형 또는 피침형으로 길이 3~5cm, 너비 2~3cm 정도이며 가장자리에 가시 같은 톱니가 있다.

4′채취

꽃은 4~5월에 피며 백색 또는 연한 홍색을 띤다.

5′조제

열매는 삭과로 5~6월에 익으며 종자는 많은 편이다.

6′재배법

가. 기후 : 우리나라 전역에서 재배할 수 있으나 특히 중부 이남 지방이 좋다.

나. 토질 : 보토가 비옥하면 배수가 잘되는 사질양토나 식양토가 좋다.

다. 파종 : 파종기는 9월중순~10월하순 사이에 하는데 이 때 파종하면 이듬해 봄에 싹이 나온다. 파종량은 10a당 종자 4~5kg 정도이다.

라. 시비 : 시비량은 10a당 퇴비 2,000kg, 요소 10kg, 용성인비 30kg, 염화가리 10kg 정도이다.

마. 중경제초 : 중경제초는 4~5회 실시하고 특히 봄철 싹이 나올 때 김매기를 잘해야 한다.

바. 지주 : 지주는 꽃이 필 때 쓰러지지 않도록 세워준다.

사. 병충해 : 잿빛곰팡이병, 뿌리썩음병, 붉은점무늬병, 검은점무늬병, 진딧물, 뿌리혹선충 등이 있다.

아. 수확 : 수확은 파종 3년째부터 하는데 9월중순~10월하순 사이에 한다.

자. 종자 : 종자는 10a당 4~5kg 정도 필요하다.

차. 저장 : 저장은 건조한 곳에 보관한다.

7′수확 및 조제

가. 수확 : 수확은 파종 3년째부터 하는데 9월중순~10월하순 사이에 한다.

나. 조제 : 수확한 뿌리를 물로 씻어 껍질을 벗기고 건조하여 조제한다.

8′이용

①청혈제 ②해열제 ③진통제 ④강장제로 쓰인다.

〈註〉

1)청혈이라는 혈액을 맑게 한다는 뜻이다.

2)해열이라는 열을 내리게 한다는 뜻이다.

白蘇葉(紫蘇)

학명 : 자소엽

1′약초 : 감기 기침 가래 구토 설사 식욕부진 등에 효과가 있다.

2′생태적 특징

산지의 양지쪽에 자생하는 다년생 초본식물로서 높이 30~60cm 정도로 자라고 털이 없다.

3′특징

잎은 3개씩 2회 깃꼴겹잎이 나며 작은잎은 난형 또는 피침형으로 길이 3~5cm, 너비 2~3cm 정도이며 가장자리에 가시 같은 톱니가 있다.

4′채취

꽃은 4~5월에 피며 백색 또는 연한 홍색을 띤다.

5′조제

열매는 삭과로 5~6월에 익으며 종자는 많은 편이다.

6′재배법

가. 기후 : 우리나라 전역에서 재배할 수 있으나 특히 중부 이남 지방이 좋다.

나. 토질 : 보토가 비옥하면 배수가 잘되는 사질양토나 식양토가 좋다.

다. 파종 : 파종기는 9월중순~10월하순 사이에 하는데 이 때 파종하면 이듬해 봄에 싹이 나온다. 파종량은 10a당 종자 4~5kg 정도이다.

라. 시비 : 시비량은 10a당 퇴비 2,000kg, 요소 10kg, 용성인비 30kg, 염화가리 10kg 정도이다.

마. 중경제초 : 중경제초는 4~5회 실시하고 특히 봄철 싹이 나올 때 김매기를 잘해야 한다.

바. 지주 : 지주는 꽃이 필 때 쓰러지지 않도록 세워준다.

사. 병충해 : 잿빛곰팡이병, 뿌리썩음병, 붉은점무늬병, 검은점무늬병, 진딧물, 뿌리혹선충 등이 있다.

아. 수확 : 수확은 파종 3년째부터 하는데 9월중순~10월하순 사이에 한다.

자. 종자 : 종자는 10a당 4~5kg 정도 필요하다.

차. 저장 : 저장은 건조한 곳에 보관한다.

7′수확 및 조제

가. 수확 : 수확은 파종 3년째부터 하는데 9월중순~10월하순 사이에 한다.

나. 조제 : 수확한 뿌리를 물로 씻어 껍질을 벗기고 건조하여 조제한다.

8′이용

①청혈제 ②해열제 ③진통제 ④강장제로 쓰인다.

〈註〉

1)청혈이라는 혈액을 맑게 한다는 뜻이다.

2)해열이라는 열을 내리게 한다는 뜻이다.

自然生藥(연재)

백출(白朮)

학명 : 삽주근경

1′약초 : 관절염 류머티스 신경통 위장병 소화불량 식욕부진 구토 설사 이뇨 발한 감기 야맹증 눈병 당뇨병 등에 효과가 있다.

2′생태적 특징

산지의 양지쪽에 자생하는 다년생 초본식물로서 높이 30~60cm 정도로 자라고 털이 없다.

3′특징

잎은 3개씩 2회 깃꼴겹잎이 나며 작은잎은 난형 또는 피침형으로 길이 3~5cm, 너비 2~3cm 정도이며 가장자리에 가시 같은 톱니가 있다.

4′채취

꽃은 4~5월에 피며 백색 또는 연한 홍색을 띤다.

5′조제

열매는 삭과로 5~6월에 익으며 종자는 많은 편이다.

6′재배법

가. 기후 : 우리나라 전역에서 재배할 수 있으나 특히 중부 이남 지방이 좋다.

나. 토질 : 보토가 비옥하면 배수가 잘되는 사질양토나 식양토가 좋다.

다. 파종 : 파종기는 9월중순~10월하순 사이에 하는데 이 때 파종하면 이듬해 봄에 싹이 나온다. 파종량은 10a당 종자 4~5kg 정도이다.

라. 시비 : 시비량은 10a당 퇴비 2,000kg, 요소 10kg, 용성인비 30kg, 염화가리 10kg 정도이다.

마. 중경제초 : 중경제초는 4~5회 실시하고 특히 봄철 싹이 나올 때 김매기를 잘해야 한다.

바. 지주 : 지주는 꽃이 필 때 쓰러지지 않도록 세워준다.

사. 병충해 : 잿빛곰팡이병, 뿌리썩음병, 붉은점무늬병, 검은점무늬병, 진딧물, 뿌리혹선충 등이 있다.

아. 수확 : 수확은 파종 3년째부터 하는데 9월중순~10월하순 사이에 한다.

자. 종자 : 종자는 10a당 4~5kg 정도 필요하다.

차. 저장 : 저장은 건조한 곳에 보관한다.

7′수확 및 조제

가. 수확 : 수확은 파종 3년째부터 하는데 9월중순~10월하순 사이에 한다.

나. 조제 : 수확한 뿌리를 물로 씻어 껍질을 벗기고 건조하여 조제한다.

8′이용

①청혈제 ②해열제 ③진통제 ④강장제로 쓰인다.

〈註〉

1)청혈이라는 혈액을 맑게 한다는 뜻이다.

2)해열이라는 열을 내리게 한다는 뜻이다.

본초상담

〈22〉

〈續〉

3′귀가 울리면 신장이 나빠진 것

이명은 신장의 양허해서 온다. 이것은 그림모토 이명은 나이 젊은 사람보다 노인에게 많다는 것이 특징이다. 그림모토 이명은 나이 젊은 사람보다 노인에게 많다는 것이 특징이다. 그림모토 이명은 나이 젊은 사람보다 노인에게 많다는 것이 특징이다.

한방에서 보는 이명은 신장의 양허해서 온다. 이것은 그림모토 이명은 나이 젊은 사람보다 노인에게 많다는 것이 특징이다. 그림모토 이명은 나이 젊은 사람보다 노인에게 많다는 것이 특징이다. 그림모토 이명은 나이 젊은 사람보다 노인에게 많다는 것이 특징이다.

한방에서 보는 이명은 신장의 양허해서 온다. 이것은 그림모토 이명은 나이 젊은 사람보다 노인에게 많다는 것이 특징이다. 그림모토 이명은 나이 젊은 사람보다 노인에게 많다는 것이 특징이다. 그림모토 이명은 나이 젊은 사람보다 노인에게 많다는 것이 특징이다.

한방에서 보는 이명은 신장의 양허해서 온다. 이것은 그림모토 이명은 나이 젊은 사람보다 노인에게 많다는 것이 특징이다. 그림모토 이명은 나이 젊은 사람보다 노인에게 많다는 것이 특징이다. 그림모토 이명은 나이 젊은 사람보다 노인에게 많다는 것이 특징이다.

한방에서 보는 이명은 신장의 양허해서 온다. 이것은 그림모토 이명은 나이 젊은 사람보다 노인에게 많다는 것이 특징이다. 그림모토 이명은 나이 젊은 사람보다 노인에게 많다는 것이 특징이다. 그림모토 이명은 나이 젊은 사람보다 노인에게 많다는 것이 특징이다.

한방에서 보는 이명은 신장의 양허해서 온다. 이것은 그림모토 이명은 나이 젊은 사람보다 노인에게 많다는 것이 특징이다. 그림모토 이명은 나이 젊은 사람보다 노인에게 많다는 것이 특징이다. 그림모토 이명은 나이 젊은 사람보다 노인에게 많다는 것이 특징이다.

한방에서 보는 이명은 신장의 양허해서 온다. 이것은 그림모토 이명은 나이 젊은 사람보다 노인에게 많다는 것이 특징이다. 그림모토 이명은 나이 젊은 사람보다 노인에게 많다는 것이 특징이다. 그림모토 이명은 나이 젊은 사람보다 노인에게 많다는 것이 특징이다.

한방에서 보는 이명은 신장의 양허해서 온다. 이것은 그림모토 이명은 나이 젊은 사람보다 노인에게 많다는 것이 특징이다. 그림모토 이명은 나이 젊은 사람보다 노인에게 많다는 것이 특징이다. 그림모토 이명은 나이 젊은 사람보다 노인에게 많다는 것이 특징이다.