

急驚風の 症狀 및 治法에 對한 文獻的 考察

李熙晟* · 李進容** · 金德坤**

I. 緒 論

驚風은 小兒科에서 매우 흔한 疾患으로 痧, 痘, 疳과 함께 兒科 四大證을 이루며 이중에 서도 急驚風은 發病이 突發的이고 病勢의 變化가 迅速하며 病情이 危重하고 때로 生命에 도 위협을 주므로 “小兒之病 最重惟驚”이라 하였다.¹¹⁾

小兒는 臟腑가 薄弱하고 氣血이 未充하고 神志도 怯弱하므로 여러가지 原因에 의해 쉽게 驚風이 發하는데 그 主要 病因은 感受六淫의 外因, 暴受驚恐의 內因 및 乳食積滯의 不內外因 等이다.

急驚風의 基本病理는 內有實熱과 外挾風邪로 風火가 相搏하는 것이니 心主火肝主風이 根本 病巢가 된다. 즉 心火가 盛해지면 肝風이 動하게 되며 肝風이 動하면 心火는 더욱 暴甚해져 發泄되지 못하고 急激하게 抽搐이 發하는 陰虛陽盛之證이다. 心藏神하고 肝臟魂하는 二臟이 交爭하게 되면 氣血이 紊亂해지고 痰涎이 併發하여 百脈이 凝滯하게 되어 諸竅가 막히고 意識이 昏迷해지며 四肢에 瘈瘲이 오게 되어 搐(肘臂伸縮, 動搖不定), 搦(十指開合 搦之不已), 掣(肩膊抽掣 勢如相撲), 顛(頭身手足 顛動不止), 竄(兩眼上視 目直似怒),

視(左右斜視 露睛不活), 反(身仰向後 頸項強直 角弓反張), 引(四肢牽引 臂若開弓)의 八候가 나타난다. 이와같이 四證 八候로 表現되는 急驚風의 實際 臨床的 症狀 및 治法에 關하여 文獻的 考察을 하고자 한다.

II. 本 論

1. 症 狀

1) 太平聖惠方²⁵⁾

○其候… 遍身壯熱 痰涎壅滯 四肢拘急 筋脈抽掣 項背強直 牙關緊急 是也.

2) 小兒藥證直訣¹⁹⁾

○小兒急驚者 本因熱生於心 身熱面赤 引飲口中氣熱 大小便黃赤 劇則搐也.

○發過則如故

○男爲陽而本發左, 女爲陰而本發右

3) 三因極一病證方論²⁴⁾

(急慢驚風證治)

○小兒驚癇 俗云驚風 有陰陽二症 身熱面赤而發搐搦 上視牙關硬 陽症也.

4) 閻氏小兒方論¹⁹⁾

○急驚由有熱 熱即生風 又或因驚而發則 目上目筋 涎潮搐搦 身體與口中氣皆熱 及其發定 或

* 서울 성행韓醫院

** 慶熙大學校 韓醫科大學

睡起即了了如故 此急驚證也。

5) 活幼心書²³⁾

○面紅 卒中渾身熱 脣黑 牙關氣如絕 目翻 搐搦 喉有痰 此是急驚容易決。

○男左女右 手足搐者 即為順症 男右女左 手足搐者 即為逆症 故難治也。

6) 醫學綱目⁷⁾

急驚屬木火土實 木實則搐而有力 及目上視 動筋頻捷 土實則身熱面赤 而不吐瀉 偃睡合睛 亦有因驚而發者 以致牙關緊急 壯熱涎潮 竄視反張 搐搦 顫動脣口 眉眼眨引 口中氣熱 頰赤脣紅 二便秘結 脈浮數緊 此內有實熱 外挾風邪

7) 保嬰撮要⁸⁾

○急驚風之候 牙關緊急 壯熱涎湧 竄視反張 搐搦顫動 口中氣熱 頰赤脣紅 脈浮洪數者 此肝經血虛 火動生風

8) 景岳全書¹⁸⁾

○壯熱痰壅 竄視反張 搐搦顫動 牙關緊急 口中氣熱 頰赤脣紅 飲冷便結 脈浮洪數 此肝邪風熱 陽盛陰虛證也

9) 入門¹⁷⁾

○發搐牙關緊 潮熱 秘渴壅痰涎 以面赤脣紅 渾身壯熱 口中氣亦熱 作渴引飲 大便秘 小便赤 脈浮數洪索

10) 六科準繩¹⁴⁾

○急驚之候 亦曰 真搐 牙關緊急 壯熱涎潮 竄視反張 搐搦顫動脣口 眉眼眨引 頻併口中氣熱 臉赤脣紅 大小便黃赤 其脈浮數洪緊

○男搐左視左 女搐右視右 男眼上竄女眼紅 竄 男握拇指出外 女握拇指入裡 男引手挽左直右曲 女引手挽右直左曲 凡此皆順反之則逆 亦有先搐左而後雙搐者 但搐順則無聲 搐逆則有聲 其指紋彎弓入裡者順 反外者逆 出入相半者 難痊。

11) 醫門寶鑑²²⁾

○急驚也 牙關緊急 壯熱涎潮 視反張 搐搦

顫動脣口 眉眼眨引頻併

12) 嬰童百問⁶⁾

○急驚之候 牙關緊急 壯熱涎潮 竄視反張 搐搦顫動 脣口眉眼 眨引頻併 口中熱氣 頰赤脣紅 大小便黃赤 其脈浮數洪緊

13) 東醫寶鑑⁴⁾

○牙關緊急 壯熱涎潮 竄視反張 搐搦顫動 口中熱氣 頰赤脣紅 大小便黃赤 其脈浮數洪緊

14) 醫宗金鑑¹²⁾

○急驚觸異心驚熱 或由風鬱火生風 暴發痰盛或熱極 壯熱煩急面脣紅 痰壅氣促牙關噤 二便秘澀脈洪數

15) 吳氏兒科學¹³⁾

○小兒初起有惡寒 微熱之象 繼則驟然四肢抽掣牙關緊閉 項背強硬 漸至壯熱無汗 面紅目赤 痰升氣促 此急驚風也 甚者頭痛如劈 起臥不安 角弓反張 手足厥冷 其間或兼嘔吐 或兼泄瀉 或大便堅結 或小溲不利 則因人而 互異亦有僅見搐搦之狀 急驚風最重之證 狀見目睛翻轉 手足攣急 頭反至背 口噤不開者 多屬不救 此急驚風證 狀之一斑也。

16) 萬病醫藥問²¹⁾

○痰壅氣促 急驚風病 多由暴發 身體壯熱 心中煩急 面紅脣赤 痰涎壅結 呼吸促迫 牙關噤急不開 二便秘澀 脈象洪數 涕淚俱無

17) 濟衆新編¹⁾

○聞不常聲及六畜聲而驚由內熱 或挾風邪而成實也 牙關緊急 搖頭 竄視 張口出舌 角弓反張 身體掣顫 手足搐搦 四肢攣攣 十指閉合 此八候俱全十無一生 男搐左視左眼上竄 女搐右視右眼下竄

○搐有真假 假者搐搦反張斜視而牙關不緊是外感風寒內傷飲食挾驚而成也 頻發不死

18) 兒科證治²⁰⁾

○壯熱不已 兩眼直視或斜視 口脣撮動 牙關緊閉 痰鳴氣促 頸項強直 四肢抽搦 或持續不

已，苔薄白或黃厚 脈浮數或弦數 指紋青紫相兼

2. 治法

1) 巢氏諸病源候論¹⁰⁾

○小兒驚者 由血氣不和 熱實在內 心神不定 所以發驚 甚者掣縮變成癇

○又小兒變蒸 亦微驚 所以然者 亦由熱氣所爲 但須微發驚 以長血脈 不欲大驚 大驚乃灸驚脈 若五，六十日以灸者 驚復更甚。

生百日後 灸驚脈 乃善耳。

2) 太平聖惠方²⁵⁾

○夫小兒急驚風者 由氣血不和 內有實熱 爲風邪所乘 干於心絡之所致也。心者 神之所舍 主於血脈。若熱盛則血亂 血亂則氣竝於血，氣血相竝 又被風邪所搏 故驚而不安也。

○小兒急驚風 灸前頂一穴，三壯 在百會前一寸。若不愈 須灸兩眉頭及鼻下人中一穴 炷如小麥大。

3) 小兒藥證直訣¹⁹⁾

○蓋熱甚則風生 風屬肝 此陽盛陰虛也 故利驚圓主之以除其痰熱 不可與巴豆及 溫藥大下之 恐苦虛熱 不消也

4) 閻氏小兒方論¹⁹⁾

○當其搐勢漸減時與 鎮心治熱藥一二服 候驚勢已定須與以藥下其痰熱 利下痰熱 心神安寧 即愈

5) 三因極一病證方論²⁴⁾

○陽證用涼藥

6) 東垣十種醫書¹⁶⁾

○外物驚宜鎮心以黃連安神丸

○若氣動所驚 宜寒水石安神丸 大忌防風丸 治風辛溫之藥 必殺人何也 辛散浮溫熱者火也 能令母實 助風之氣盛 皆殺人也。

○因驚而泄青色 先鎮肝以硃砂之類 勿用寒涼之氣 大禁涼驚丸

○風木旺必克脾胃當先實其土 後瀉其木 闕孝忠編集錢氏方以益黃補土悞矣。辛熱助火 火旺土愈虛矣。青橘皮瀉肺金 丁香辛熱大瀉肺與大腸 脾實當瀉子 今脾胃虛反更瀉子而助火 重虛其土 殺人無疑矣。

○其風木旺證 右關脈洪大 掌中熱 腹皮熱 豈可以助火瀉金 如寒水來乘脾土 其病 嘔吐 腹痛 瀉痢青白 益黃散聖藥也。

○今立一方 先瀉火補金 然後 再大補其土 是爲 神治之法。

7) 活幼心書²³⁾

○治之之法 先以五苓散加黃金·甘草 水煎 或百解散 發表次通心氣 木通散 三解散 疏滌肝經 安魂退熱 牛蒡湯 防風湯主之。

○驚風既除之後 輕者投半夏圓 重者下水晶丹 與之去痰 免成癡疾 但不可用大寒涼藥治之 熱去則寒起 亢則害 承乃制 若倉卒之間 驚與風證俱作 只用五苓散加辰砂末 薄荷湯調服 少解其證 益五苓散內有 澤瀉導小便 心與小腸爲表裡 小腸流利 心氣得通 其驚自滅 內有桂木 得桂則枯 是以有抑肝之氣 其風自停 況佐以辰砂 能安神魂 兩得其宜。

○大略要解熱涼心肝 後用平和湯散調理

○大抵治搐之法 貴以寬氣爲妙氣 順則搐停 此自然之理。

8) 醫學綱目⁷⁾

○治法宜涼宜瀉而用涼驚利驚等丸 亦有因驚而發者 以致牙關緊急 壯熱等證 此內有實熱 外挾風邪 當截風定搐 若痰熱尙盛 宜微下之 痰熱既泄急宜調養胃氣 搐定而痰熱少退則 宜調補脾氣

9) 保嬰撮要⁸⁾

○大抵此症屬肝經血虛 風火相搏 而善行數變者爲多 若不養肝血 不補脾氣 純用祛風化痰之藥 則脾益虛 血益損 邪氣延綿 必傳慢驚矣。

10) 入門¹⁷⁾

○先與和氣通關竅 次截風搖清心田截風丸定搐散 搐定痰熱尙不退 下之只用抱龍丸 牛黃抱龍丸 利後溫胆與定魄 定魄丸醒脾散。

11) 景岳全書¹⁸⁾

○此肝邪風熱 陽盛陰虛證也 治此之法 當察緩急凡邪盛者 不得不先治其標。

○急則治標之法但得痰火稍退即當調補血氣如後附薛氏之法或參用慢驚諸治以防虛敗此幼科最要之法。

○大抵此證多屬肝膽脾胃陰虛血燥風火相搏而然若不顧真陰過用祛風化痰之藥則脾益虛血益燥邪氣綿延必成慢驚矣。此中陰虛之義皆人所不知。

12) 六科準繩¹⁴⁾

○風邪心家受熱積驚 肝家生風發搐 肝風心火二藏交爭血亂氣并 痰涎壅盛 百脈凝滯 關竅不通 風氣蕃盛 無所發泄 故暴烈也 又有搐搦 反張斜視而牙關不緊 口無痰涎而 氣熱未可直指以為 驚風恐是 傷風傷寒夾食 夾驚疹痘等證 此即錢氏假搐之說 又各依本證施治矣 又急驚搐搦不可把握 但扶持之否則 風竈逆入經絡遂使手足拘攣成癱疾。

13) 東醫寶鑑⁴⁾

○治法通關截風定搐去痰 其熱尙作則 當下之一泄已後 急須和胃鎮心。

14) 醫門寶鑑²²⁾

○急驚即陽症 治宜 清涼苦寒 通用牛黃抱龍丸 至聖保命丹 或外用 開關散 嚏驚散。

15) 嬰童百問⁶⁾

○治法大要 用藥有序 通關以後 具與截風定搐 痰熱尙作乃下之 痰熱一洩 又須急與和胃定心之劑 如搐定而痰熱少者 則但用輕藥消痰 除熱可也 益急驚須當下 切不可過用寒涼及 銀粉巴消 輩蕩滌太驟 此等重劑醫家不得已而用之 僅去疾

即止 或不當用而用 或當用而過焉。 往往由此而成慢驚矣。

16) 醫宗金鑑¹²⁾

○驚用鎮驚風至寶 牛黃攻痰涼膈清 平治羌活瀉青等 化痰導赤共涼驚。

17) 吳氏兒科學¹³⁾

○要不外解表祛邪 清熱平肝而已。 昔賢有云小兒急驚 屬肝木風痰有餘之症。 宜平肝鎮心 驅風消痰降火勢清內熱 寥寥數字 亦足以盡急驚 風之治法也。 惟病有淺深治有先後 初起宜發表以祛邪。 寒重則辛以兼溫 熱重則辛以兼涼。 繼則熱勢內盛。 宜內清外激 表裡兼治重證神昏厥厥 宜平肝鎮心 危證邪深津耗 宜解毒生津 此其綱也。

18) 萬病醫藥顧問²¹⁾

○痰壅氣促之療法～急驚風病 多由暴發 身體壯熱 心中煩急等 宜分別治之。 觸異致驚者 清熱鎮驚湯 安神鎮驚丸主之 火鬱生風者 至寶丹主之 痰盛生驚者牛黃丸攻下之 熱極生風者 涼膈散清解之 病不甚者則用平治之法 風熱者 羌活散主之 肝熱者 瀉青丸主之 痰兼熱者 清熱化痰湯主之 心經熱者 導赤散, 涼驚丸主之。

○手足抽搐之療法～速以通關散吸入鼻內 無嚏者不治 有嚏者可治 當服加減清熱鎮驚湯。

19) 兒科證治²⁰⁾

○急驚一症 有輕重之別 緩急之差, 發作時應根據急則治其標的原則處理。 其症表現為邪盛而急 昏迷不醒 抽搐劇烈時 宜先開竅 鎮驚俟神志稍清 抽搐稍止 再求其本 追其源 繼以辨證施治。 如外為風寒鬱閉 不能宣通 而有表症者 宜解表疏散。 食滯內停者宜消導通滯 熱極生風者 宜清熱鎮驚鎮痙 痰盛生驚者 宜豁痰鎮驚 如其它傳染病致驚者 宜審治本症 此症發作 往往互為因果 應採取清熱祛痰 鎮驚熄風的 其本原則。

III. 考 察

本論에서 살펴본 急驚風의 臨床的 症狀를 要略 分類하면 다음과 같다.

發 熱	身熱 19)24)23)7) 壯熱 25)7)18)22)6)21)20) 壯熱無汗 13) 壯熱煩急 12) 潮熱 7) 口中氣熱 19)7)8)18)14)6)
顏 面	面赤 19)24) 面紅脣黑 23) 面脣紅 12) 面紅脣赤目赤 13) 頰赤脣紅 8)18)6) 脣紅 14) 臉赤 14)
口 渴	引飲 19) 飲冷 18) 渴 17)
牙 關	牙關硬 24) 牙關緊 17) 牙關噤 12) 牙關緊閉 13)20) 牙關緊急 25)8)18)14)22) 6)1) 牙關氣如絕 23) 牙關噤急不開 21)
目	目翻 23) 上視 24) 目上蓮筍 7) 窺視 8)18)14)6) 搖頭窺視 1) 眉眼眨引 14)22)6) 目睛番轉 13) 兩眼直視或斜視 20)
痰 涎	痰壅 18)17) 痰涎壅滯 25) 涎湧 8) 涎潮 22)6) 痰壅氣促 12)21) 痰升氣促 13) 痰鳴氣促 20) 喉有痰 13)
脈	浮洪數 8)18) 浮數洪緊 14) 洪數 12)21) 浮數或弦數 20)
舌 苔	苔薄白或黃厚 20)
四 肢	搐 19)17)14) 搐搦 24)6) 顫動搐搦 8)18) 17)22) 反張 8)18)14)6) 筋脈抽掣 項背 強直 25) 四肢抽掣 項背強硬 13) 角弓反張 身體掣顫 1) 頸項強直 20) 手足搐搦 13) 四肢攣攣 1) 十指開合 1) 四肢抽搐或持續不已 20)
大小便	大小便黃赤 14)19) 便結 18) 秘 17) 二便秘澀 12)21) 大小便黃 6)

古代에는 驚風과 癘의 區別이 없이 陰癘과 陽癘의 區別만이 있었으므로 陳 24) 은 陽證에 涼藥을 使用한다는 原則을 主張하며 朱砂 輕粉 等を 利用하였다. 太平聖惠方 25) 에 처음으로 急驚風이라 命名되며 역시 寒涼藥으로 治療하였다.

錢 19) 에 의서야 急驚風과 慢驚風이 區別되며 病名으로 確立되었고 急驚風의 病因 證治가 始作되었다. 急驚風은 熱痰이 心膈에 끼인 것이므로 利驚丸 瀉青丸 抱龍丸등을 利用하여 痰熱을 내리는 것이 治法이 되었다. 錢의 利下痰熱은 急驚風 治療의 基本原則이 되었다.

中央脾土를 重要視한 東垣 16) 은 急驚風의 治法을 先瀉火補金大補其土하는 것이 神治之法이라 主張하였다. 卽 急驚風은 肝風이 旺盛한 것인데 肝邪가 盛하면 반드시 木克土 하므로 먼저 脾土를 補한 後에 風木을 瀉해야 된다 하였다. 이는 東垣에 와서 急驚風 治療에 있어 寒涼한 藥을 너무 使用한 境遇의 副作用을 認識하게 된 것이라 볼 수 있다.

曾 23) 은 邪熱이 心에 쌓여 肝에 傳하여 지므로 急驚風이 發하는 것이라 하였다. 그 治法은 먼저 發表解熱한 後에 心氣를 通하고 肝經을 疏通시키는 것이며 驚風이 가라앉은 後에는 平和한 藥으로 痰을 除去하며 調理하여야 한다 하였다. 또한 抽搐을 治療하는 根本은 寬氣이며 氣가 順하면 抽搐은 自然히 멈추게 된다 하였다.

樓 7) 는 急驚風을 木火土實한 것으로 보아 寒涼한 藥으로 瀉下해야 한다 하였다. 그러나 急驚風의 根本은 肝膽血虛로 火動風生하고 風이 生하면 陰血은 더욱 홀어져서 陰火가 熾盛하게 되니 去風化痰瀉火 하는 辛散之劑를 거듭 使用하게 되면 脾가 虛해지고 血이 損傷을 받

아 慢驚風이 되므로 반드시 六君子湯으로 補脾胃해야 한다 하였다. 薛⁸⁾ 또한 肝經血虛하여 火動風生하는 것이므로 반드시 肝血을 滋養하고 脾氣를 培養해야 한다 하였다. 景岳¹⁸⁾ 또한 肝氣가 有餘하여 痰火가 熾盛한 것이라 하였고 그 治法은 痰火를 먼저 식힌 後에는 반드시 氣血을 補해야 한다 하였다. 즉 肝膽脾胃의 陰虛로 血이 燥해져서 風火가 相搏되어 急驚風이 發하는 것이므로 眞陰을 돌보지 않고 去風化痰之劑만을 使用하면 慢驚風이 된다 하였다.

李¹⁷⁾는 먼저 通關竅한 後에 截風搐 清心한다. 卽 痰은 氣가 鬱하여 생기는 것이므로 氣가 順해지면 痰이 化해져서 抽搐이 멈추게 된다. 抽搐이 멈추게 된 後에 痰熱을 완전히 除去하며 痰熱을 除去한 後에는 溫膽定魂시킨다. 王¹⁴⁾은 肝風心火 二臟交爭으로 急驚風이 發하는 것으로 證의 先後를 分別하여 治療에도 先後가 있다 하였다. 熱이 甚해지면 痰이 생기고 痰이 甚해지면 驚이 생기고 驚이 甚해지면 風이 생기고 風이 甚해지면 抽搐이 發하는 것이니 抽搐을 治療하려면 먼저 風을 治療해야하고 風을 治療하려면 驚을 治療해야하고 驚을 治療하려면 豁痰을 해야하며 治痰을 하려면 解熱을 먼저 해야 한다 하였다. 이는 驚風四證의 治療順序를 밝힌 것이다.

周²¹⁾는 急驚風의 治療는 清涼苦寒之劑로 治療한다 하였다. 魯⁶⁾는 李¹⁷⁾의 治法을 따라 먼저 通關竅한 後에 截風搐시키면 痰熱을 完全히 利下시킨후에는 和胃定心之劑로 調理하러하였다. 吳¹²⁾는 化痰導赤涼驚을 吳¹³⁾는 發表 清熱平肝을 周²²⁾는 清熱鎮驚을 曹²⁰⁾는 清熱去痰 開竅鎮驚을 그 治法으로 利用하였다.

本論에 記述된 文獻에서 出現 頻度數 높은 急驚風의 處方을 열가지 들면 다음과 같다.

1. 利驚丸¹⁹⁾⁷⁾¹⁸⁾¹⁴⁾⁶⁾⁴⁾⁸⁾ : 治小兒 急驚風
青黛 輕粉 牽牛 天竺黃(薄荷湯化下)¹⁾
2. 瀉青丸⁸⁾¹⁸⁾¹⁴⁾⁴⁾¹²⁾²¹⁾ : 治肝熱搐搦脈洪實
草龍膽 川芎 山梔子仁 川大黃 羌活 防風²⁾
3. 涼驚丸¹⁹⁾¹⁸⁾⁴⁾²¹⁾¹⁴⁾ : 治驚疳
草龍膽 防風 青黛 鈞鈎藤 黃蓮 牛黃 麝香 龍腦³⁾
4. 抱龍丸¹⁹⁾¹⁸⁾¹⁷⁾¹⁰⁾⁴⁾ : 治驚風 潮搐 身熱 昏睡 能下痰熱 乃心肺肝痰也
牛膽南星 天竺黃 雄黃 朱砂 麝香(甘草膏薄荷湯調下)⁴⁾
5. 安神丸¹⁹⁾⁴⁾¹⁹⁾¹⁸⁾ : 治急驚風 及心熱驚啼
馬牙硝 白茯苓 麥門冬 乾山藥 龍腦 寒水石 朱砂 甘草
6. 通關散⁴⁾¹⁴⁾¹³⁾¹⁸⁾²¹⁾ : 治驚風 口噤不開
南星 白僵蠶 麝香 豬牙皂角 赤角蜈蚣⁵⁾
7. 安神鎮驚丸¹⁶⁾⁸⁾¹⁸⁾ : 驚退後調理 安心神 養氣血 和平豫防之劑也
天竺黃 茯神 牛膽南星 酸棗仁 麥門冬 赤芍藥 當歸 薄荷葉 黃蓮 朱砂 牛黃 梔子 木通 龍骨 青黛 生地黄 人參(金箔)⁶⁾
8. 牛黃抱龍丸²²⁾⁴⁾¹⁾ : 治急慢驚風 痰嗽潮搐 能鎮驚安神
牛膽南星 天竺黃 牛黃 朱砂 麝香 眞珠 琥珀 牛黃(甘草膏 金箔 薄荷湯 調下)⁷⁾
9. 至聖保命丹¹⁹⁾⁴⁾¹⁸⁾ : 治急慢驚風 及胎驚
天芎
南星 白附子 防風 天麻 蟬退 白僵蠶 麝香 全蝎 朱砂 爲衣(金箔 薄荷湯 調下)⁸⁾
10. 至寶丹¹⁹⁾¹³⁾⁶⁾ : 治諸痛急驚 心熱卒中客忤 不得眠睡 煩躁風涎 搐搦 及傷寒 狂語 伏熱 嘔吐 竝養服之
生烏犀屑 生玳瑁屑 琥珀 朱砂 雄黃 金箔 銀箔 龍腦 麝香 牛黃 安息香⁹⁾

上記 處方 構成藥物의 出現 回數는 다음과 같다.

回數	藥 物
6 回	麝香 朱砂
5 回	南星 薄荷
4 回	金箔 牛黃 天竺黃
3 回	甘草 防風 龍腦 雄黃 青黛
2 回	殭蠶 麥門冬 草龍膽 梔子 琥珀 黃蓮
1 回	羌活 牽牛 輕粉 當歸 大黃 馬牙硝 木通 白附子 茯苓 茯神 山藥 酸棗仁 生地黃 犀角 蟬退 安息香 蜈蚣 龍骨 銀箔 人蔘 芍藥 全蝎 皂角刺 鈞鈎藤 眞珠 川芎 天麻 寒水石

洋方的으로 痙攣은 腦神經 細胞의 機能障碍을 말하는데 各己 다른 많은 原因에 依해 發生되기 때문에 診斷的 用語라기보다는 原因 疾患에 對한 症狀을 意味하게 된다. 小兒期에는 痙攣의 原因이 될만한 한 因子들이 매우 많고 腦가 發達 過程에 있어 解剖學的으로나 神經學的으로 未熟한 狀態에 있으므로 痙攣이 發生되기 가 쉽다. 5歲以下의 小兒痙攣의 出現頻度는 6.7내지 8%로 成人의 0.2 내지 0.5%에 비해 매우 높다.²⁾ 小兒期痙攣性疾患(CONVULSIVE DISORDERS)은 新生兒 痙攣(NEONATAL CONVULSIONS), 熱性痙攣(FEBRILE CONVULSIONS), 嬰兒 테타니(INFANTILE TETANY), 癇疾(EPILEPSY), 癇疾類似發作(SPELLS SIMULATING EPILEPSY)로 大別된다.⁵⁾ 이 중 急驚風과 가장 類似한 것은 熱性痙攣으로 嬰幼兒에서 熱性感染症이 있을때 最初의 熱上升기에 全身痙攣을 일으키는 것이다. 그 原因은 高熱, 扁桃炎 咽頭炎 中耳炎 등의 上氣道 感染, 遺傳, 後天性, 腦疾患등으로 神經學的으로 전혀 異常이 없던 小兒에게서 體溫이 갑자기

기 上升할때 發生하며 痙攣이 지난後에는 異常所見이 없고 痙攣의 모양은 對稱의이며 대개 15分 以內에 그치고 熱이 내린後 1週日이 지나면 EEG가 正常으로 된다.

IV. 結 論

한방문헌 25 중을 고찰해 본 결과는 다음과 같다.

1. 急驚風의 主要症狀은 身體壯熱 面紅脣赤 牙關緊急 竄視 痰涎壅滯 脈浮洪數 角弓反張 四肢抽搐 大小便黃赤 等이다.
2. 急驚風의 治法은 開竅 鎮驚 清熱 祛痰 熄風이며 痰熱이 除去된 後에는 氣血을 補해야 한다.
3. 急驚風에 가장 많이 應用되어은 處方은 利驚丸 瀉青丸 涼驚丸 抱龍丸 通關散 等이다.
4. 構成 藥物은 朱砂 麝香 殭蠶 等の 鎮驚熄風之劑 및 南星 牛黃 黃蓮 等の 清熱之劑가 主를 이룬다.

V. 參 考 文 獻

1. 康明吉: 濟衆新編, 서울, 醫星堂, 1975, pp.279-281.
2. 金東輝 外 五人: 最新診斷과 治療, 서울, 藥業新聞 出版局, 1986, pp.742-743.
3. 丁奎萬 編: 東醫小兒科學, 慶熙大學校 韓醫科大學 小兒科教室, 1983, pp.493-516.
4. 許 凌: 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1986, pp.639-643.
5. 洪彰義: 小兒科學, 서울, 大韓教科書株式會社, 1988, pp.538-549.

6. 魯伯嗣著：嬰童百問(上)，上海書店，1985，卷2 pp.2-19.
7. 樓全善：醫學綱目，台南，台南北一出版社，中華民國62年。
8. 薛鎰集 薛己輯：保嬰撮要，北京，人民衛生出版社，1983，pp.607-608.
9. 成都中醫學院編：中醫兒科學(中醫醫學叢書之三)，成都四川人民出版社，1976，pp.185-186.
10. 巢元方：巢氏諸病源候論，治中市，昭人出版社，pp.8-9(卷45).
11. 沈金鰲：幼科釋謎，香港，萬葉出版社，pp.1701-1445.
12. 吳謙外：醫宗金鑑，北京，人民衛生出版社，1982，pp.1309-1312.
13. 吳克潛：吳氏兒科學，臺北市，新文風出版公司，pp.269-246.
14. 王肯堂選：六科準繩(幼科)，臺北市，新文風出版公司，中華民國，1968，pp.73-89.
15. 王白岳外8人共著：中醫兒科學，四川人民衛生出版社，1984，p.117.
16. 李東垣外5人：東垣十種醫書，서울，大星文化社，1983，pp.241-242.
17. 李梴：醫學入門，서울，大星文化社，1989，pp.481-483.
18. 張介賓：景岳全書，서울，一中社，1984，pp.704-705.
19. 錢乙：小兒藥證直訣，宇宙醫學出版社，中華民國1951，pp.27-28.
20. 曹旭：兒科證治，陝西科學技術出版社，1979，pp.205-212.
21. 周邦道：萬病醫學顧問，서울，書苑堂，1978，pp.44-47.
22. 周命新編著：新增醫門寶鑑，서울，杏林書院，1975，pp.374-377.
23. 曾世榮：活幼心書，北京市，中國書店，1985年，pp.7-9.
24. 陳無擇：三因克一病證方論，治聯國風出版社，中華民國67年，卷18 pp.19-20.
25. 陳昭遇外：太平聖惠方，서울，翰成社，1979，p.2694, 2708.