

小兒乳蛾에 관한 文獻的 考察

— 東西醫學的 比較 —

沈文敬 * · 朴恩貞 ** · 丁奎萬 ***

I. 緒論

乳蛾症이란 咽喉側에 蛋狀・棗狀과 같은 것이 紅腫되어 있으면서 疼痛하는 것으로 扁桃腺炎에 해당되며 보통 口蓋扁桃腺炎과 아데노이드선염(인두편도선염)을 말한다. 이 두 편도는 감염과 비후가 같이 일어나기도 하고, 감염이 먼저 일어나고 비후가 뒤에 오는 경우가 있다.^①

乳蛾라는 명칭은 張仲景^②의 〈儒門事親〉에서 「熱氣上行，結薄於喉之兩傍。近外腫作，以其形似。是謂乳蛾。一謂單。二謂雙也。」라고 하여 처음으로 사용하였으며, 〈喉科秘旨〉에서 는 石蛾라는 異名을 사용하였고 그 외에 肉蛾^③나 珠蛾^④라고 표현하기도 하였다.

小兒는 稚陰稚陽하고 臟腑가 嫌嫩하며 形氣가 未充하여 쉽게 外邪에 感觸되므로 扁桃에 急性炎症을 자주 발생시키며, 계속되는 上氣道感染은 아데노이드와 더불어 심한 증식증을 보여서 기계적 폐색으로 인하여 귀나 코등 주위 臟器에 악영향을 미치게 된다. 또한 이차적으로 腎臟炎이나 心臟疾患, 關節疾患를 발생시킬 수 있으며 이러한 합병증은 成長 후에도 지장

을 초래하므로 早期治療를 해야한다.

근래에 와서는 특히 幼兒에서 扁桃의 免疫學的 機能의 重要性이 強調되고 있으며, 편도 아데노이드 切除術에 대해 보다 保存의 態度를 갖는 것이 바람직하다라는 경향을 보이고 있다.

이에 著者는 乳蛾에 關하여 東西醫學的으로 比較・考察하는 것이 臨床에서 乳蛾症을 治療하는데 도움이 될 수 있을 것으로 思慮되어, 乳蛾에 關한 東西醫學의 見解를 比較・考察한 若干의 結果를 報告하는 바이다.

II. 調查資料 및 研究方法

1. 調査資料

韓醫學書籍으로 33 餘種의 文獻을, 西醫學書籍으로는 新耳鼻咽喉科學을 비롯한 10 餘種의 醫書를 選定하여 研究資料로 삼았다.

2. 研究方法

1) 韓醫學的으로는 乳蛾에 關한 各種文獻에 收錄된 內容을 時代順으로 拔萃하여 整理하였다.

* 圓光大學校 附屬韓方病院

** 圓光大學校 韓醫科大學

*** 慶熙大學校 韓醫科大學

으며 痘因, 痘狀, 治法, 治方別로 区分하여 整理하였다.

2) 西醫學의 으로는 急·慢性 扁桃腺炎에 關한 內容을 拔萃하여 原因, 痘狀, 治療別로 整理하였다.

3) 東西醫學의 으로 乳蛾에 關하여 分類한 內容 中 痘因, 痘狀, 治療에 있어서 相互關聯性이 있는 점을 比較하여 總括과 考察해서 살펴보았다.

III. 本 論

(1) 乳蛾에 關한 東醫學의 文獻調査

1. 儒門事親¹⁾ 金

內經之言 喉痺卽咽與舌在間耳 以其病同是火故不分也。後之醫者 各詳其狀 強立八名 曰 單乳蛾 雙乳蛾 單閉喉 子舌脹 木舌脹 纏喉風 走馬喉閉 熱氣上行 結薄於喉之兩傍 近外腫作 以其形似 是謂乳蛾 一爲單 二爲雙也。

2. 古今醫鑑²⁾ 明

其會厭兩傍腫者 俗謂之雙乳蛾 易治。

會厭一邊腫者 謂之單乳蛾 難治。

古方通謂之喉痺 皆相火之所沖逆耳。

蓋因濕氣上行 轉于喉之兩傍 近外腫作 以其形似乳蛾 一爲單 二爲雙。

3. 幼科金針³⁾ 明

小兒咽症看猶難 乳蛾發出有雙單。

利膈清咽真妙法 須防氣促及生痰。

咽喉爲一身之要道 作心肺肝腎呼吸之門 害人迅速 小兒患此 非蛾卽痺 二症咸因 風熱實邪不散 热卽生痰 痰火并舉而得也 小兒喉痛 何以知之 但撲乳必哭其病 必在喉也 取筋壓其口 察其喉蛾發於關外 或左 或右 或左右皆有 突如蛾腹 故得其名。

4. 古今醫統秘方大全(八)⁴⁾ 明

咽喉一十八證 皆是火熱成之 一曰 單乳蛾 其形元如小筋頭生於咽喉關上或左或右 生於關下者難治 二曰 雙乳蛾 其形亦如 筋頭大生箇在喉關兩邊生關下者 亦難治。

5. 六科證治準繩 幼科⁵⁾ 明

病詳審治之 咽喉之疾 本傷熱毒上攻也 四時受熱 藏心腑之間 一旦所觸上攻 咽喉所謂腎傷寒也然其證 有單肉蛾 雙肉蛾 如始單雙肉蛾可針卽針有 不可針者卽 用薰擦藥 退後方依次用服藥。

6. 普濟方⁶⁾ 明

粉香散 出瑞竹堂方 吹乳蛾卽開。

一捻金散 治乳蛾 及風熱上攻咽喉腫痛。

治喉風單雙乳蛾〈出瑞竹堂方〉。

用牆上土蜂窠一個 碾極細 先病人舌用葉搭破微令血出 將蜂窠土用醋調 用鵝毛蘸藥 於喉中擦之 冷痰涎出為效 後用扁竹根搗爛 調冷水與病者只服三口 利三行卽愈 就用冷水漱口 立愈。

奪命丹 治纏喉風 急喉閉牙關不能開 重舌木舌雙乳蛾 幷誤吞竹木 鷄魚骨刺 幷皆治之。

治肉蛾喉痺。

用白礬半兩飛過 入半碗沸湯調 通口服之 血胞隨手自消 若經少時 變作血膿難醫。

治咽喉纏腫。雙乳蛾喉痺熱毒方。

龍腦一字 薄荷葉五錢 大黃生二錢半 甘草一錢炒 盆硝半錢 蒲黃生用淨者一錢 右爲細末 每用少許吹咽喉內 摘化 忌生葱 蒜 薑 胡椒。

7. 丁茶山先生小兒科秘方⁷⁾

會厭 한쪽에 發腫한 것을 單蛾라 하고 兩쪽에 發腫한 것을 雙蛾라 하고 此를 通稱 喉痺라 하는데 모두 다 相火의 衝逆所致로서 關上의 것은 治療하기 容易하나 關下의 것은 難治니 左記方 藥을 用할지니라。

燈心一錢 黃柏并燒存性 枯白礬 各五分 龍腦一分 右爲末하야 每一 二分式 患處에 吹入。

清涼散

8. 東醫寶鑑⁸⁾ 宣祖

會厭之兩傍腫者 俗謂之雙乳蛾易治 會厭之一邊腫者 俗謂之單乳蛾難治 古方通謂之 喉痺皆相火之所衝逆耳〈正傳〉。

皆因熱氣上行搏於喉之兩傍近外腫作以其形似乳蛾一爲單二爲雙〈醫鑑〉

單蛾風者 其形圓如 小根頭大生於咽喉關上或左或右關下難治 雙蛾風者 有兩枝在喉關兩邊 亦圓如 小筋頭大關下難治〈得效〉。

其乳蛾之差小者 名曰喉閼。

9. 類證治裁⁹⁾ 清

(乳蛾)有單雙 有連珠 單輕 雙重 連珠尤重 多因酒色鬱熱而生 單蛾生會厭一邊 一日痛 二日紅腫 三日有形 如細白星 發寒熱者凶 吹藥先用碧丹五金丹一 後用金丹二碧丹三 內服喉症主方 俟大便行 自痊 如至三日 喉中但紅腫無細白星 即是喉癰宜辨 雙乳蛾生會厭 左右兩邊俱有細白星 藥照前用 左屬心 右屬肝 前藥於主方內 左加黃連 犀角 右加赤芍 柴胡 雙蛾則兼用之 大便秘加枳殼 元明粉 連珠蛾 二白星上下相連 用藥照前 或外用成吹藥加冰片吹之 內服三黃桔梗湯。

10. 證治彙補¹⁰⁾ 清

大意

一陰 - 陽結 謂之喉痺〈內經〉

一陰肝與心包也 一陽膽與三焦也 四經皆有相火 幷絡于咽喉〈王冰〉。

氣熱即內結 結甚即腫瘡 瘡甚即痺 痞甚不通而痰塞以死矣〈子和〉。

內因

因胸膈素有痰涎 或飲酒過度 或忿怒失常 或房事不節 火動其痰 潟塞于咽喉之間 以致內外腫痛 水漿不入〈醫鑑〉。

外候

熱氣上行 結于喉之兩傍 近外作腫 形如筋頭

是爲乳蛾 有雙單之分。

11. 繢名醫類案¹¹⁾ 清

一男子乳蛾腫痛 脈浮數 尚未成膿 針去惡血 飲荆防敗毒散 二齊而消

一男子乳蛾腫痛 飲食不入 瘡色白其膿已成 針之膿出而安

12. 醫學心悟¹²⁾ 清

五曰 雙單乳蛾 狀如乳頭 生喉間一邊生者 名單乳蛾 兩邊生者 名雙乳蛾 宜用齏菜汁調元明粉灌去痰涎 吹以冰片散 須服甘桔湯 自應消散 若不消 以小刀點乳頭上出血立瘥 凡針乳蛾宜針頭尾 不可針中間 鮮血者易治 血黑而少者難痊 凡用刀針血不止者用廣三七末 嚼敷刀口上即止 凡使刀針 不可誤蒂下 損即不救 慎之慎之。

13. 辨症玉函¹³⁾ 清

雙蛾症之虛實從何辨之大約外感者爲實內傷者爲虛而外感內傷又從何而辨之大約 外感者鼻必寒舌必燥身必先熱而從寒痰必黃而自目必赤而浮此邪氣之實也……

內傷者雖同是爲蛾喉腫而日間少輕…此正氣虛也。

14. 辨證奇聞全書¹⁴⁾ 清

辨證論治一

人有感冒風寒 一時咽喉腫痛 其勢甚急 變成雙蛾者 其症痰涎稠濁 口渴呼飲 痛痛難當。

(臨床處方) 方用…破陰湯

辨症論治二

人有一時喉忽腫大而作痛 吐痰如蠻 口渴求水 下喉少快 已而又熱呼水 咽喉長成雙蛾…

初作腫而後成蛾也 蛾有二 一雙蛾 一單蛾也 雙蛾生兩毒 兩傷壅擠 中間反留一線之際 可通茶水 藥劑尚可下咽 若單蛾即獨自成形 反塞住水穀之路 往往有勺水而不能嚥。

辨症論治三

人有咽喉腫痛 目輕夜重 喉間亦長成蛾 宛如陽症 但不甚痛 而咽喉之際 自覺一乾燥之至 飲水

嚥之少快 至水入腹 而腹又不安 吐涎如水甚多 將涎投入清水中 卽時散化爲水 人以爲此喉痛而生蛾也。

蓋此症爲陰蛾也 陰蛾卽日輕夜重 若陽蛾卽日重夜輕矣 斯少陰腎火 不無可藏之地 直奔而上炎於咽喉也 治之法 宜大補腎水 而加入補火之味以引火歸藏 下熱而上熱自塞矣。

(臨床處方) 方用 … 引火湯

15. 嘽醫大全¹⁵⁾ 清

單雙蛾主論

陳實功 曰 單雙蛾者 皆標病也 其患生於咽喉或單或雙 其咽門雖腫 半塞半開 其病雖凶而喉道又寬又腫 雖重無妨 宜金鎖匙 吐出痰涎椎蕩積熱。

馮魯瞻 曰 單雙肉蛾可針卽針 有不可針者 亦用吹藥劫藥吐去風痰以 圖捷效次 服煎劑蓋急證難於久待也。又曰 腫於咽兩傍者爲雙蛾易治 腫於一邊者爲單蛾難治。

岐天師 曰 有病雙蛾者 人以爲熱也 喉門腫痛痰如鋸洩不絕茶水 一滴不能下嚥豈非熱證。然而痛雖甚至早少輕喉難腫舌必不燥痰 雖多必不黃而成塊 此乃假熱之證也。

張仲景 曰 陰虛雙蛾之證 用附子一錢 鹽水炒成片用一片含在口中立時有路可以用湯藥矣。後以八味地黃丸一兩 白湯送下立時而愈。

雷真君 曰 凡人有咽喉忽腫作痛生雙蛾者 飲食不能下 五日不食卽死矣。單此證實火易治而虛火難。又曰 陰蛾之證乃腎水虧乏火不能減於下乃飛越於上而喉中關狹火不得直泄乃結成 蛾似蛾而非蛾也。

華真君 曰 雙蛾陰證最難易治而最治也 不知其竅則最難。

陳遠公 曰 人有感冒風寒咽喉腫痛其勢甚急 變成雙蛾者 其證痰涎稠濁 不時口渴 索飲疼痛 水不能入喉 此陽火壅阻咽喉勢若重而病實輕也。

醫論選要 曰 單蛾者其形圓小節頭生於咽喉關上

或左或右 雙蛾則兩邊俱生也。若生於關下難治。

奎光 曰 乳蛾有單有雙有連珠多因酒色鬱結而發單輕雙重 初起一日痛 二日紅腫 三日有形如細白星 發寒熱者凶。

心法 曰 乳蛾由肺經積熱受風凝結而成生咽喉傍狀如蠶蛾有單有雙 雙者經 單者重 生於關前者形多易見吹藥易 劍手法易施故易治。

16. 幼幼集成¹⁶⁾ 清

治喉閉乳蛾 用鷄內金 勿洗 陰乾燒過 存性研末 以小竹筒吹入 卽破而愈 鷄內金卽鷄臍腔內之黃皮也。

17. 校正 石室秘錄¹⁷⁾ 清

喉痛

雷公真君曰 凡人有咽喉忽腫作痛生雙蛾者 飲食不能下 五日不食卽死 但此症實火易治而虛火難醫實火世人已有妙方 如用山豆根 黃連 半夏 柴胡 甘草 桔梗 天花粉治之立消惟虛火乃腎水不藏於命門 浮遊於咽喉之間其症亦如實火惟夜重於日清晨反覺少輕若實火清晨反重 夜間反輕實火 口燥舌乾而開裂虛火口不甚渴舌滑而不裂也 以此辨症。

18. 中醫歷代醫論選¹⁸⁾

〈咽喉病的病機與治法〉

腫于兩傍者爲雙蛾 肿于一邊者爲單蛾 圓突如珠乃癰瘤之類 宜刺出其血而愈。

〈咽喉脈證通論〉

單蛾 雙蛾至八九日後 方可用針刺出毒血 未滿十日 萬不可刺。

19. 濟世全書¹⁹⁾

單乳蛾 雙乳蛾 單喉閉 雙喉閉 子舌脹 木舌脹 纏喉閉 走馬喉閉 蓋因熱氣上行 轉於喉之 兩傍近外腫 作以其形似 是爲乳蛾 一爲單 二爲雙。

開關丸

治喉閉雙單乳蛾風腫痛涎嚥不下死在須臾。

山豆根爲末用熊膽和爲丸 用一鷄臍皮 陰乾爲末爲衣丸如葵豆大每服下丸放 舌下徐徐嚥下立已。

20. 醫宗損益²⁰⁾

單乳蛾 雙乳蛾 喉痺

實火涼膈散 加黃連 荆芥 石膏 防風通聖散.

虛火四物湯 加桔梗 荆芥 知母 黃柏 痰盛者

千瘡湯 通用 甘桔湯.

21. 金元四大醫家學術思想研究²¹⁾

乳蛾又叫“喉蛾” “熱氣上行 結薄于喉之兩傍 近外腫作 以其形似 是爲乳蛾一爲單 二爲雙也”.

乳蛾系扁桃體炎 為常見的咽喉痛 證見惡寒發熱 咽喉一側或兩側紅腫疼痛 有黃白色膿性分泌物 由于風熱搏結 毒火上攻 法當疏風 清熱 常用清咽利膈湯.

22. 洪家定診秘傳²²⁾

〈左扁桃腺炎〉

舊病名에 左單蛾니 血虛症의 滯와 蜷를 兼하여 勞神勞力으로 發病되나니 血虛하여 火가 盛하여 上沖血症이라. 以補陰降火豆 為主할지어다.

加味梔子清肝湯 加味四物湯 加味必用方甘桔湯
加味地黃湯

〈右扁桃腺炎〉

舊病名에 右單蛾니 氣虛症에 滯와 蜷를 兼하여 勞神勞力함으로써 水升火降이 잘 되지 못하여 上沖됨이니 以順氣強火之材豆 為主하라.

藿香正氣散 治感胃滯.

加味十六味流氣飲 治氣虛血鬱不通.

加味理飲煎 治腎肝經虛症.

23. 實用中醫學²³⁾

〈扁桃腺炎〉

肺胃蘊熱 兼感外邪

突然高熱 咽部腫疼 或化膿起腐 煩躁口渴便乾
舌苔黃厚 舌紅 脈滑數

治法：清瀉肺胃 散風解毒

方藥：芥穗二錢 牛蒡子三錢 鮮蘆根一兩 生石膏六錢 知母二錢 山豆根三錢 花粉五錢 板藍根

五錢 赤芍三錢

24. 萬病醫藥顧問²⁴⁾

何謂乳蛾 生於咽喉之傍 狀如蠶蛾亦有形若棗栗者 紅腫疼痛 是謂乳蛾.

乳蛾證共分八類

25. 常見病中醫臨床新編²⁵⁾

〈急性扁桃體炎〉

病因：外感風熱邪毒

內因肺胃積熱

辨證：熱重風輕型

風重熱輕型

風熱輕型

26. 五官科學²⁶⁾

〈急性扁桃體炎〉

病因：① 風熱之邪

② 平素喜飲多食辛辣厚味 胃熱乃生 久而化火 胃火循經上炎喉核 復受外邪 風火相煽

症狀：起病較急 咽部疼痛明顯 吞嚥時加劇 伴
有咽乾 口渴 畏寒 發熱 頭痛 周身不適 扁桃
體紅腫 表面有點狀或片狀黃白色分泌物附着

辨證：① 風熱乳蛾—散風清熱—銀翹散加減

② 燥乳蛾—清熱瀉火 消腫利咽—普濟消毒
飲加減

〈慢性扁桃體炎〉

病因：① 肝腎陰虧 虛火上炎（陰虛乳蛾）

② 小兒發風熱乳蛾 遷延日久 邪阻經絡 氣
血瘀滯（石蛾）

辨證：① 咽喉暗紅微腫 疼痛不顯著 早輕暮重
午後潮熱 咽乾少飲 脈細數 舌質紅

- 滋陰降火

- 知柏地黃湯 八珍湯加蒲黃 遠志

② 咽暗紅 喉核不腫但堅硬

- 活血理氣 養陰清熱

- 清咽雙和飲加減

27. 兒科證治²⁷⁾

名	病 源	症 狀	方
單乳蛾	肺經積熱 復受風凝結	咽喉之一邊狀如蠶蛾 脈浮數 紅腫疼痛 身熱惡心	六味湯加葛根，紅花，紫蘇葉 冰硼散
雙乳蛾	風熱壅盛	生於兩邊 紅腫疼痛 身發寒熱 六脈弦數	六味湯加陳皮，海浮石，蘇葉 羌活 清咽利膈湯 養陰清肺湯 涼膈散 神仙活命湯
石蛾	肝火老痰 結成惡血	紅腫疼痛 生於乳蛾地位 稍進半寸 遇有勞役側發	六味湯加生地，貝母，牛蒡子 麥門冬，木通 生地貝母湯 消散藥驗方 雄黃解毒丸
連珠蛾	熱毒壅盛	乳蛾之上下相連者 紅腫疼痛	清咽利膈湯 涼膈散 銀翹散 子藥 丑藥 巳藥 雄黃解毒丸 寸藥 劍藥
爛乳蛾	肺胃鬱熱	喉間紅腫爛斑大痛 難食 六脈弦數	六味湯加葛根，黃芩，蘇葉， 玄參 八仙散 子藥 金不換 加味珠黃散
風寒乳蛾	肺胃感受風寒	喉間腫大如李 頭項不能俯 氣塞不適 寸關之脈浮緊	六味湯加蘇葉，羌活
色乳蛾	肺受風寒	腫塞滿口 身發寒熱 六脈浮	六味湯加蘇葉，細辛，羌活
陰虛乳蛾	動於房慾 (或 素稟陰虛) 致令陰液虛耗 陽火上升	口乾舌燥 咽喉腫大 早晨痛輕 下午痛重 至夜尤甚 面部紅熱 足部覺冷	八味地黃丸 引火湯 熟地山萸湯 生附子含口中方 六味地黃丸

病因：① 外感風熱邪毒 肺胃素有積熱→痰火

② 肝腎陰虛 復因勞累過度

③ 急性失治→氣血鬱結

辨證：① 風熱型

② 虛火型

③ 氣血凝滯型

28. 中醫耳鼻喉科學²⁸⁾

1) 風熱乳蛾

病因病理：① 風熱外侵 肺經有熱

② 邪熱傳裏 肺胃熱盛

症狀：① 咽部疼痛 逐漸加劇 吞咽不便 咽喉
乾燥灼熱感 喉核紅腫 發熱惡寒 頭痛 鼻塞 體倦

怠 咳嗽有痰 舌邊尖紅 苔薄白 脈浮數

② 咽部疼痛劇烈 痛連耳根及頸下 吞咽困難
有堵塞感 聲嘶 高熱 口渴引飲 咳嗽痰稠黃 口
臭 腹脹 大便秘結 舌質紅赤 苔黃厚 脈洪大而數
治法 吊 治方：① 疏風清熱 消腫利咽—疏風
清熱湯

② 泄熱解毒 利咽消腫—清咽利膈湯 普濟消
毒飲

2) 虛火乳蛾

病因病理：① 肺陰虧虛

② 腎陰虧虛

症狀：① 咽部乾燥不適 微痛 微痒 乾咳無痰
或痰少而粘 哽哽不利 喉核肥大 潮紅 午後觀紅
精神疲乏 手足心熱 舌質紅 脈細數

② 咽喉乾燥不適 微痛 哽哽不利 口乾不喜多飲
喉核紅潮 喉核上有黃白色膿點 頭暉 眼花 耳鳴
腰膝痠軟 虛煩失眠 舌紅少苔 脈細數

治法 吊 治方：① 養陰清肺 生津潤燥—養陰
清肺湯加減

② 滋陰降火 清利咽喉—知柏地黃湯

29. 東醫小兒科學²⁹⁾

1) 急性 扁桃腺炎

：肺胃에 熱이 쌓이고 風熱外邪에 感觸되
면 邪熱이 咽喉에 侵入하게되어 氣血이 凝滯
하므로 咽喉가 紅腫疼痛하며, 甚하면 化膿한다.

治法：清瀉肺胃 散風解毒

治方：甘桔湯 必用方甘桔湯 凉膈散 防風通聖
散 清咽利膈湯 加味破濫湯 仙方敗毒湯

2) 慢性 扁桃腺炎

：急性 扁桃腺炎을 자주 일으키던 중 慢
性으로 移行하는 境遇로 陰虛內熱症狀을 보이
는데 扁桃腺은 若干 부어있고 甚했다, 輕微
하며, 潮熱, 盗汗등의 症狀이 있다.

治法：滋陰清熱 凉血消腫

治方：清火補陰湯 加味四物湯 千瘡湯 加減知

柏地黃湯

30. 漢方 眼耳鼻咽喉科學³⁰⁾

○乳蛾 九分類

① 單乳蛾 ② 雙乳蛾 ③ 石蛾 ④ 爛乳
蛾 ⑤ 風寒乳蛾 ⑥ 白色乳蛾 ⑦ 連珠蛾 ⑧
陰虛乳蛾 <萬病醫藥顧問 解釋> ⑨ 伏寒乳蛾

原因一體內에 寒邪가 蓄積되어 있다가 外感
에 搾患되었을 때

症狀—咽喉紫色 脈沈遲或細數

治療—六味湯加羌活, 葛根, 草河車, 穿山甲,
赤芍藥, 當歸尾, 細辛

31. 漢方 眼耳鼻咽喉科學³¹⁾

1) 急性 扁桃炎

原因：風邪, 熱邪, 過勞와 酒色傷으로 火가 動
症候：突然惡寒 發熱 患部疼痛 嘸下痛 嘸下
困難 咽喉乾燥 頭痛 四肢痛 全身倦怠感

治療：① 實熱로 因한 咽喉腫痛—清涼散 必
用方甘桔湯

② 咽喉急閉 單·雙乳蛾—如聖勝金鏡

③ 乳蛾豆 因한 喉閉—解毒雄黃元 清咽利
膈湯 凉膈散 銀翹散

④ 虛證으로 喉痺, 喉痛, 喉瘡—加味四物湯

2) 慢性 扁桃炎

原因：急性의 原因으로부터 慢性으로 移行

症狀：대개 無症狀, 輕微한 咽頭痛 異物感
咳嗽 口臭 營養障礙 食慾不振 疲勞

治療：六味湯加味

慢性虛證—加味四物湯

(2) 西醫學的 文獻調查³²⁾⁻³⁹⁾

1. 急性 扁桃炎

1) 原因：virus에 의한 上氣道 感染의 경
과 중 세균의 2차 감염 또는 세균의 적합감염

原因菌：β-용혈성 연쇄상구균

포도상구균

〈Table 1〉 乳蛾の 病因説

文 獻	原 因
儒門事親 ¹⁾	熱氣上行
古今醫監 ²⁾	濕氣上行 痰熱(人胸膈素有痰涎 或因飲酒過度 或因忿 怒失常 或因房勞不節) =(胃火，肝火，腎火)
幼科金針 ³⁾	風熱實邪 燥火
古今醫統秘方大全 ⁴⁾	火熱
六科證治準繩 ⁵⁾	熱毒上攻
丁茶山 小兒科秘方 ⁷⁾	相火衝逆
東醫寶鑑 ⁸⁾	風熱
類證治裁 ⁹⁾	酒色鬱熱
證治彙補 ¹⁰⁾	痰火
醫學心悟 ¹²⁾	熱 寒 風寒包火
辨症玉函 ¹³⁾	外感一邪氣實 內傷一正氣虛
辨證奇聞全書 ¹⁴⁾	風寒 陰虛

文 獻	原 因
傷醫大全 ¹⁵⁾	風痰 熱
校正石室秘錄 ¹⁷⁾	實火 虛火
濟世全書 ¹⁹⁾	熱氣上衝
醫宗損益 上 ²⁰⁾	實火 虛火
金元四大家學術思想 研究 ²¹⁾	風熱博結 毒火上衝
洪家定診秘傳 ²²⁾	左一血虛 火盛 右一氣虛 水不升 火不降
實用 中醫學 ²³⁾	肺胃蘊熱 兼 外邪
萬病醫藥顧問 ²⁴⁾	肺經積熱 復受風凝結 風熱壅盛 肝火老痰 結成惡血 熱毒壅盛 肺胃鬱熱 肺胃感受風寒 肺受風寒 動於房勞
兒科證治 ²⁷⁾	風熱+痰火 肝腎陰虛 急性失治→氣血鬱結

〈Table 2〉 乳蛾の 症狀，治法説

文 獻	症 狀	治 法
儒門事親 ¹⁾	喉之兩傍 近外腫作	其微者 可以鹹軟之 其大者 以辛散之 今之醫者 皆有其藥也 如薄荷，烏頭，鹽蟲，白礬， 朴硝，銅石
古今醫監 ²⁾ 丁茶山小兒科秘方 ⁷⁾ 東醫寶鑑 ⁸⁾	會厭 兩傍腫 會厭 一邊腫	急則治其標；吐痰散熱 緩則治其本；降火補虛

文獻	症狀	治法
幼科金針 ³⁾	發於關外 或左 或右 或左右皆有突如蛾腹	兒大者 以針微刺出血 兒幼不必刺血 大人患此 甚者 水穀難入 將土牛膝根打汁飲之
古今醫統秘方大全 ⁴⁾	單乳蛾一其形元如 小筋頭 生於咽喉關上 或左 或右 雙乳蛾一其形亦如 筋頭大 生兩箇	〈子和〉急者宜吐痰後復下之 上下分消而愈 甚者以針刺去血 然後用藥吐下
六科證治準繩 ⁵⁾	單肉蛾 雙肉蛾	先洗去口中舌上 白胎 其次掃去風涎 單肉蛾可針則針有 不可針則用熏摻藥退 後方依次用服藥
類證治裁 ⁶⁾	單蛾生會厭一邊 一日痛 二日紅腫 三日有形如細白星 雙蛾生會厭 左右兩邊俱有細白星 連珠蛾 二白星上下相連	單乳蛾候 大便行 自瘻 左屬心(黃連，犀角用) 右屬肝(赤芍，柴胡用) 雙乳蛾則兼用之
證治彙補 ¹⁰⁾	喉之兩傍 近外作腫 形如筋頭	實之法 宜發散 次用清涼 或湧導痰涎 或針刺出血 虛之法 順導內經 從治之旨 徐徐頻與
醫學心悟 ¹²⁾ 辨症玉函 ¹³⁾	狀如乳頭 生喉間一邊生 或兩邊生 外感一鼻塞 舌燥 身必先熱而後塞 痰色黃白 目赤 脈浮 內傷一蛾喉腫而日間少輕 痰多 舌必不燥 吐痰如湧泉而下 畏寒 足冷	去痰涎 消散 乳頭上出血 外感一吐痰涎 內傷一水中補火
傷醫大全 ¹⁵⁾	① 咽喉腫痛 其勢甚急 痰涎稠濁 口渴 疼痛難當 ② 日輕夜重 咽喉乾燥 飲水嚥之少快 至水入腹而腹又不安 吐痰涎如水甚多	① 泄膀胱之火 ② 大補腎水
校正石室秘錄 ¹⁷⁾	實火一口燥舌乾而開裂 清晨反重 夜間反經 虛火一口不甚渴 舌滑而不裂 夜重於口 清晨反覺少輕	實火一發散 虛火一補腎水

文 獻	症 狀	治 法
金元四大家學術 思想研究 ²¹⁾	咽喉痛 惡寒 發熱 咽喉一側 或兩側紅腫疼痛 黃色膿性分泌物	疏風 清熱 解毒
洪家定診秘傳 ²²⁾	左單蛾 右單蛾	左一補陰降火 右一順氣降火
實用中醫學 ²³⁾	突然高熱 咽部腫痛 或化膿肌膚 煩躁 口渴 便乾 舌苔黃厚 舌紅 脈滑數	清瀉肺胃 散風解毒

< Table 3 > 處方의 出現頻度數

No.	處 方 名	頻度數
1	清咽利膈湯 ^{2,3,19,21,24,25,27,28,30,31)}	10
2	涼膈散 ^{20,24,27,30,31)} 雄黃解毒丸 ^{8,10,24,30,31)}	5
3	加味四物湯 ^{8,20,22,31)} 冰硼散 ^{3,12,24,25)}	4
4	甘桔湯 ^{2,12,16)} 六味湯 ^{24,27,30)} 養陰清肺湯 ^{24,28,30)} 引火湯 ^{14,17,24)} 如聖勝金錠 ^{4,8,31)} 清涼散 ^{7,8,31)}	3
5	加味普濟消毒飲 ^{25,26)} 甘露飲 ^{27,28)} 開關散 ^{2,19)} 八味地黃湯 ^{17,18)} 荆防敗毒散 ^{11,13)} 普濟消毒飲 ^{10,27)} 神仙活命湯 ^{24,30)} 銀翹散 ^{24,25)} 六味地黃湯 ^{18,24)} 銀翹散 ^{25,26)} 清上丸 ^{2,19)}	2

No.	處 方 名	頻度數
6	劫藥 ²⁴⁾ 金不換 ²⁴⁾ 加味珠黃散 ²⁴⁾ 救命散 ⁶⁾ 鷄內金散 ⁸⁾ 桔梗湯 ¹⁰⁾ 加味梔子清肝湯 ²²⁾ 薑香正氣散 ²²⁾ 加味十六味流氣飲 ¹³⁾ 加味理陰煎 ²²⁾ 線球散 ²⁾ 八味地黃丸 ²⁴⁾ 奪命散 ⁶⁾ 八仙散 ²⁴⁾ 八珍湯加菖蒲, 遠志 ²⁶⁾ 破陰湯 ¹⁴⁾ 黃藥 ¹⁾ 粉香散 ⁶⁾ 碧丹 ⁹⁾ 西瓜霜 ²⁰⁾ 生地貝母湯 ²⁴⁾ 巴藥 ²⁴⁾ 熟地茱萸湯 ¹³⁾ 雙金飲加味 ²⁵⁾ 柴胡清肝湯 ⁵⁾ 鴉黃散 ⁵⁾ 三黃桔梗湯 ¹³⁾ 殺蛾丹 ¹³⁾ 監藕節方 ²⁴⁾ 寶藥 ²⁴⁾ 元參桔梗飲 ²⁷⁾ 一捻金散 ⁶⁾ 立聖膏 ⁶⁾ 牛黃涼膈散 ⁸⁾ 五金丹 ⁹⁾ 子藥 ²⁴⁾ 青藥 ²⁴⁾ 吹藥 ²⁴⁾ 春風散 ²⁾ 清火補陰湯 ²²⁾ 清胃散 ⁵⁾ 七寶散 ⁸⁾ 青龍膏 ⁸⁾	1

< Table 4 > 藥性에 의한 藥物 分類

藥物分類		藥物名	百分率
清熱藥類 261	清熱解毒(83)	連翹(24) 金銀花(19) 青黛(15) 牛蒡子(14) 馬勃(4) 射干(3) 山豆根(2) 白蘞(1) 蒲公英(1)	30.8
	清熱燥濕(62)	黃芩(29) 黃連(20) 黃柏(10) 龍膽草(2) 陳皮(1)	
	清熱瀉火(55)	梔子(25) 竹葉(11) 知母(8) 石膏(7) 天花粉(3) 茶葉(1)	
	清熱涼血(55)	玄蔴(19) 生地黃(17) 牛黃(8) 板藍根(7) 赤芍藥(2) 犀角(2)	
	清熱解暑(5)	西瓜(2) 滑石(2) 荷葉(1)	
	清熱明目(1)	熊膽(1)	
補益藥類 159	補氣(71)	甘草(52) 人蔴(7) 山藥(6) 白朮(3) 大棗(2) 黃耆(1)	18.8
	補血(47)	熟地黃(22) 當歸(16) 白芍藥(9)	
	補陰(38)	山茱萸(12) 麥門冬(11) 五味子(5) 天門冬(5) 沙參(3) 石斛(2)	
	補陽(3)	巴戟天(3)	
解表藥類 112	辛涼解表(60)	薄荷(42) 柴胡(7) 升麻(4) 甘菊(3) 葛根(2) 蝦衣(1) 桑葉(1)	13.2
	辛溫解表(52)	荆芥(26) 防風(22) 蘇葉(1) 蘆薈(1) 羌活(1) 獨活(1)	
理氣藥類(80)		桔梗(47) 香附子(7) 枳殼(6) 檳榔(5) 木香(4) 厚朴(3) 橘皮(2) 大腹皮(2) 川棟子(1) 烏藥(1) 青皮(1) 檀香(1)	9.4
補益副助藥類(54)		牡丹皮(16) 白茯苓(15) 川芎(13) 潭鴟(9) 赤茯苓(1)	6.4
破積聚藥類(27)		硼砂(13) 芒硝(6) 巴豆(5) 輕粉(3)	3.2
芳香性開竅藥類(23)		冰片(11) 豆蔻(5) 麝香(2) 薑香(2) 龍腦(1)	2.7
化痰止咳藥類(17)		貝母(6) 皂莢(3) 南星(2) 枇杷葉(2) 馬兜鈴(2) 白芥子(1) 前胡(1)	2.0
其他(115)			13.5

< Table 5 > 藥物의 歸經別 頻度

No	歸經	頻度數	百分率%
1	手太陰肺經	64	19.8
2	足陽明胃經	53	16.4
3	足厥陰肝經	53	16.4
4	足太陰脾經	50	15.4
5	手少陰心經	36	11.1
6	足少陰腎經	23	7.1
7	手陽明大腸經	18	5.6
8	足太陽膀胱經	10	3.1
9	足少陽膽經	10	3.1
10	手太陽小腸經	5	1.5
11	手少陽三焦經	1	0.3
12	命門	1	0.3

폐렴균

hemophilus influenzae
adenovirus

誘因 : 寒氣, 疲勞, 過飲, 過食, 鼻腔 또는 副鼻洞 手術 후에 발생

2) 種類 : 急性 카타르성 扁桃炎一구개 편도가 단순히 발적, 종창

急性 濾胞性 扁桃炎一濾胞이 일치하여 원형 황백색의 반점 있음

急性 腺窩性 扁桃炎一腺窩入口部에 일치해서 황백색의 반점 있음

3) 症狀 : 潜伏期는 보통 3 ~ 5 일

갑자기 발열, 오한, 두통, 인두통으로 시작하며 구역질이나 구토는 小兒에서 많이 볼 수 있다.

환자의 75% 이상에서 두통, 권태, 식욕부진을 호소한다. 咽頭痛은 발병 후 24시간 이내에 거의 모든例에서 생긴다. 60%에서 코막힘, 콧물을 호소하며 50%에서 마른 기침이나 목이 쉬는 下氣道炎 증상이 나타난다.

연하곤란, 연하통, 口臭를 일산하는 수도 있다.

4) 治療: 안정과 保溫

일상생활에서 扁桃炎의 誘因이 되는 過食, 睡眠不足, 過勞 및 사람이 많이 모이는 곳은 피한다.

脫水症 주의

抗生素療法 - penbritin, terramycin

局所塗布 - 2~4% lidocaine 액

500배 adrenaline

含嗽 - 5000배 생리적 식염수 또는 2% 重曹水

(2) 慢性 편도염

1) 原因: 急性 편도염의 反復罹患

2) 病理: 편도의 비대 또는 위축

腺窩入口에는 상피세포의 落屑과 백혈구, 세균이 혼합해서 頸廢物質形성

上皮는 비후, 세포 침윤 또는 결손

淋巴 여포는 증대 또는 위축

혈관벽 비후

3) 症狀: 대개 無症狀, 輕度의 인두통, 이물감, 기침, 구취

口蓋扁桃가 비대하면 심하게는 연하곤란 및 口呼吸障礙를 일으킨다.

병소 감염 발생(세균 및 독소가 순환기를 통해 흡수되어 영양불량, 식욕부진, 피로 발생, 관절, 근육, 신장, 심장에 과급)

口蓋弓은 일반적으로 輕度로 발적하고 腺窩

에는 桡子가 있고 下頸角의 淋巴腺이 비대하다.

4) 治療: ① 보존적 요법

- a. 腺窩 개방하거나 吸引 또는 洗滌
- b. X-선 치료—편도 비대를 축소시킴
- c. 항생물질 사용; penicillin
- d. 레다法에 의한 편도 吸引
- e. 適宜 藥液을 隱窩 內에 吸引

② 수술적 요법—편도 적출술, 편도 절제술

○ 편도 적출술 적응증

- a. 급성 염증의 반복 발생
- b. 편도염이 안정기관(비, 부비동, 중이, 유양돌기, 후두기관)에 염증을 파급시킬 때

c. 기계적 장애 초래

- d. 편도염이 병소 감염으로서 遠隔臟器인 신장, 심장, 관절 등에 염증을 미칠 때

○ 편도 적출술 금기증

- a. 모든 종류의 급성 염증
- b. 혈우병, 백혈병, 紫斑症
- c. 당뇨병
- d. 신장병, 신장염
- e. 活動性 肺結核이 있을 때
- f. 高年者, 만 3세 이하의 소아
- g. 소아마비의 유행시기

V. 總括 및 考察

乳蛾에 病因을 考察하여 보면 儒門事親¹⁾에서 热氣上行이라고 表現한 以來로 그 說을 그대로 引用하거나 追從한 경우가 있었으며^{5,12,19,21)}, 龔²⁾은 胸膈에 平소에 痰癰이 있는 사람이 飲酒過度하거나 怒怒失常하거나 房勞不節로 胃火·肝火·腎火가 痰을 生하여 痰熱로 因

한다고 하였다. 程¹²⁾ 錢¹⁴⁾ 은 外感風寒으로 因한다고 하였고, 泰³⁾ 許⁸⁾ 李²¹⁾ 節²⁴⁾ 은 外感風熱로 因한다고 하였으며, 泰³⁾ 李¹⁰⁾ 는 痰火로 因한다고 하였다. 曹²⁷⁾ 는 風熱과 痰火로 因한다고 하였다. 龔²⁾ 丁⁷⁾ 陳¹⁷⁾ 黃²⁰⁾ 은 火에 대해서 實火와 虛火로 區分하여 虛火에 대해서 言及하였다. 以上에서 살펴본 바와 같이 乳蛾는 주로 火熱^{1,5,16,19)}, 虛火^{7,14,17,20)}, 焦熱^{2,3,9)}, 風熱^{8,21,24)}, 風痰¹⁵⁾, 血虛²²⁾, 氣虛²²⁾ 등에 起因한다.

乳蛾의 症狀에 대하여 張¹¹⁾ 李¹⁰⁾ 는 喉之兩傍 近外腫作한다고 하였으며, 龔²⁾ 丁⁷⁾ 許⁸⁾ 는 會厭이라는 구체적 위치를 언급하면서 一邊 또는 兩傍으로 腫脹한다고 하였다. 陳¹³⁾ 은 外感과 內傷으로 區分하여서 說明하였는데 外感은 鼻塞, 舌燥, 惡寒, 發熱, 目赤, 脈浮하며 內傷은 畏寒, 足冷, 喉腫而日間少輕痰多 吐痰如湧泉而下한다고 하였다. 陳¹⁷⁾ 은 實火와 虛火로 區分하여서, 實火인 경우는 口燥舌乾而開裂, 清晨反重, 夜間反輕하고 虛火인 경우는 口不甚渴, 舌滑而不裂, 夜重晨輕한다고 하였다. 林⁹⁾ 은 시일의 경과에 따른 증상의 변화를 說明하였는데 一日痛 二日紅腫 三日有形如細白星한다고 하였다. 以上의 調査에 의하면 1) 2) 4) 5) 7) 8) 9) 22)는 형태를 보아서 單과 雙으로 區分하여서 說明하였으며 13) 21)은 痘因에 따른 증상을 說明하였다.

乳蛾의 治法에 대하여 張¹¹⁾ 은 微한 것은 鹹軟하고 大한 것은 辛散한다고 하였다. 龔²⁾ 丁⁷⁾ 許⁸⁾ 은 急하면 吐痰散熱하고 緩하면 降火補虛한다고 하였으며, 徐⁴⁾ 는 急하면 吐痰한다고 하였다. 李¹⁰⁾ 는 實하면 發散시킨다고 하였으며, 程¹²⁾ 은 去痰涎하고 消散시킨다고 하였다. 陳¹³⁾ 은 外感은 吐痰涎하고 內傷은 水中補火의 治法을 쓴다고 하였다. 洪²²⁾ 은 左와 右의

위치에 따라 左는 補陰降火하며 右는 順氣降火한다고 하였다. 以上에서 살펴본 바와 같이 發散^{1,10,12,17)}, 吐痰涎^{1,2,4,5,12,13)}, 針微刺出血^{3,4,12)}, 降火補虛^{2,15,17)} 등의 治法을 사용하였다.

乳蛾의 治療處方의 數를 調査한 바 Table 3에서 보는 바와 같이 28個 文獻에 나타난 內服藥의 總 處方數는 61種이었고, 處方各各의 頻度數는 清咽利膈湯^{19,21,24,25,27,28,30,31,32)} 10回로 가장 많았고, 다음으로 原膈散^{20,24,27,30,31)} 5回, 雄黃解毒丸^{8,10,24,30,31)} 5回等의 順序로 나타났다. 處方의 構成藥物은 總 133種이었으며, 藥性別로 分類한 結果 Table 4에서 보는 바와 같이 清熱藥類가 261回로 30.8%를 차지하였고, 補益藥類가 159回로 18.8%, 解表藥類가 112回로 13.2%, 理氣藥類가 80回로 9.4% 等의 順으로 나타났다. 따라서 火熱이나 風熱에 의한 급성 편도선염에는 清熱藥類와 解表藥類를 使用하여, 血虛나 氣虛로 인한 만성 편도선염에는 補氣·補血藥類를 사용하여 小兒의 免疫力を 증가시켜줌으로써 치료할 수 있다고 생각된다.

處方의 構成藥物로 본 歸經別 頻度數는 Table 5에서 보는 바와 같이 肺經이 64回(19.8%)로 가장 많았고, 그 다음이 胃經 53回(16.4%), 肝經 50回(15.4%), 脾經 36回(11.1%) 等의 順으로 나타났다. 이와 같이 肺經, 胃經, 肝經, 脾經으로 가는 藥物이 總 68%에 해당한다. 許³⁾에 「咽者胃之系 喉者肺氣之所通」이라고 하여서 咽喉는 肺와 胃가 關聯되었다고 보았다. 이는 歸經別 頻度數의 統計順位와一致된다고 생각된다.

西醫學의으로 急性 扁桃腺炎의 原因은 virus에 의한 上氣道 感染의 經過中에 細菌의 二次感染이나 直接感染 때문인데, 이는 韓醫學의으로 外感六淫中에서 특히 風熱이 肺胃經에 直接

侵入한 경우와 상호 연관이 있으며, 急性扁桃腺炎의 反復罹患으로 慢性化되는 경우는 小兒가 氣虛, 血虛 및 阴虛內熱한 경우와 관련지어서 생각해 볼 수 있다.

急性扁桃腺炎은 갑자기 發熱, 惡寒, 頭痛, 咽喉痛이 있으며 倦怠, 食慾不振, 咳嗽 등의 증상이 나타나는데, 이는 外感風熱이 肺胃經에侵入하여 나타나는 증상과 유사하다고 생각된다. 慢性扁桃腺炎은 대개가 無症狀이며 輕度의 咽喉痛, 기침, 扁桃肥大가 심하고 燥下困難이나 口呼吸을 일으키기도 하며 營養不良, 食慾不振, 疲勞가 발생하는데 이는 肺胃陰虛나 腎陰虛로 虛火가 上炎하여 나타나는 증상과 유사하다고 생각된다.

扁桃腺과 아데노이드의 주요 기능은 呼吸器官에 대해 방어하는 역할과 면역 글로불린 형성에 역할을 하는 것이다. 5세까지 주로 성장을 하는데, 이때가 呼吸器感染에 대한 감수성이 가장 큰 시기이기 때문이다. 小兒의 免疫狀態가 증가함에 따라 扁桃腺과 아데노이드의 방어기능의 중요성은 점차 감소된다. 따라서 扁桃腺의 切除는 가능하면 4~5세까지는 하지 않는 것이 좋다.³³⁾ 소아는 外邪의 방어능력이 미약해서 쉽게 감기에 걸리는데 이 때 扁桃腺炎을 동반하는 경우에는 清瀉肺胃하고 散風解毒하여 初期에 治療해야하며, 慢性的으로 扁桃腺의 肥大와 炎症을 가지고 있는 小兒는 補血, 補陰, 補氣등의 補益藥類를 사용하여 免疫力を 증강시키는데 治療의 주안점을 두어야 한다고 料된다.

V. 結論

乳蛾의 病因·症狀·治法 및 治方에 관하여

東西醫學의으로 比較·考察하여 아래와 같이 결론을 얻었다.

1. 乳蛾의 病因에 관하여 東醫에서는 火熱·虛火·痰熱·風熱·風痰·氣血虛等으로 포괄할 수 있으며, 西醫에서는 Virus·연쇄상구균·포도상구균·폐렴균·influenza bacilli 등의 감염으로 인하여, 寒氣·疲勞·過飲·過食이 誘因이 된다.

2. 乳蛾의 分類는 東醫에서는 單乳蛾와 雙乳蛾로 區分하였고, 西醫에서는 急性扁桃腺炎과 慢性扁桃腺炎으로 區別하였다.

3. 乳蛾의 症狀은 風熱이 肺胃經에 侵入하여 突然惡寒·發熱·患部疼痛·燥下困難·頭痛·身疼·全身倦怠感 등이 나타나며 이는 急性扁桃腺炎에 該當하며, 阴虛內熱로 因하여 咽喉微痛·咽喉暗紅微腫·朝輕暮重·午後潮熱·口乾·不喜多飲·異物感·食慾不振·疲勞 등이 나타나는 것은 慢性扁桃腺炎에 該當한다.

4. 乳蛾의 治法은 東醫에서는 發散風熱·降火補虛로 크게 大別되며, 西醫에서는 急性扁桃腺炎에는 藥학요법과 항생물질을 적용시키며 慢性扁桃腺炎에는 보존적 요법과 수술요법을 사용한다.

5. 乳蛾의 處方에 대하여 東醫에서는

① 處方의 出現頻度數는 清咽利膈湯이 가장 많았고, 凉膈散·加味四物湯·甘桔湯·養陰清肺湯의 順으로 나타났다.

② 處方 構成藥物의 藥性別 分類時에는 清熱藥類가 가장 많았고, 補益藥類·解表藥類·理氣藥類의 順으로 나타났다.

③ 處方 構成藥物의 歸經別 頻度는 肺經이 가장 높게 나타났고, 胃經·肝經·脾經의 順으로 나타났다.

參 考 文 獻

1. 張子和：儒門事親 卷三 喉舌緩急砭藥不同解
二十一，臺北，中國醫藥叢書，pp.2-3，
1978.
2. 龔 信：古今醫鑑，江西，江西科學技術出版社，
pp.254-255，1990.
3. 泰景明：幼科金鍼 卷下，臺北，新文豐出版
公司，pp.112-113，1977.
4. 徐春甫：古今醫統秘方大全(八) 卷之六十五，
臺北，新文豐出版公司，pp.4296-4297，
1982.
5. 王肯堂：六科證治準繩 幼科， 서울，大星文
化社， p.170，1992.
6. 周定王·朱橚：普濟方，翰成社， pp.349-
383，1981.
7. 丁茶山：丁茶山 小兒科 秘方， 서울，杏林
出版社， p.133，1974.
8. 許 浚：東醫寶鑑， 서울，南山堂， p.252，
1966.
9. 林珮琴：類證治裁，臺北，施風出版社， p.
395，1978.
10. 李用粹：證治彙補，臺北，施風出版社， p.
259，1976.
11. 魏之琇：續名醫類案，北京，人民衛生出版社，
p.442，1957.
12. 程國彭：醫學心悟，臺北，大方出版社， p.
213，1978.
13. 陳士鐸：辨症玉函，上海，上海科學技術出版
社， pp.123-125.
14. 錢鏡湖：辨證奇聞全書，臺北，甘地出版社，
pp.164-165，1980.
15. 顧世澄：瘡醫大全， 서울，太醫社， pp.218-
231，1975.
16. 陳復正：幼幼集成，上海，上海科學技術出版
社， p.197，1978.
17. 陳士鐸：校正石室秘錄， 서울，杏林書院，
p.206，1973.
18. 王新華：中醫歷代醫論選，江蘇省，江蘇科學
技術出版社， pp.842-845，1983.
19. 龔廷賢：濟世全書 八卷下，臺北，新文豐出
版公司， pp.533-535，1982.
20. 黃道淵：醫宗損益 上， 서울，醫藥社， p.232
1976.
21. 李聰甫·劉炳凡：金元四大醫家學術思想研究，
서울，成補社， p.131，1985.
22. 洪淳昇：洪家定診秘傳， 서울，大星文化社，
pp.19-20，p.32，1990.
23. 北京中醫醫院編：實用中醫學，北京，北京出
版社， p.908，1975.
24. 節青陵：萬病醫藥顧問，臺北，大中國圖書公
司， pp.117-126，1969.
25. 常見病中醫臨床新編：常見病中醫臨床新篇，
香港，醫藥衛生出版社， pp.163-164，1973
26. 上海中醫學院編：五官科學，香港，商務印書
館香港分館出版， pp.109-112，1983.
27. 曹 旭：兒科證治，陝西科學技術出版社，干
西安市中醫醫院， pp.166-168，1979.
28. 王德鑑：中醫耳鼻咽喉科學，上海，上海科學
技術出版社， pp.68-72，1985.
29. 丁奎萬：東醫小兒科學， 서울，杏林出版社，
pp.369-372，1985.
30. 蔡炳允：漢方眼耳鼻咽喉科學， 서울，集文堂，
p.293，1982.
31. 李相漸：漢方眼耳鼻喉科學， 서울，壽文社，
pp.270-275，1967.
32. 白萬基：新耳鼻咽喉科學， 서울，一潮閣，
pp.354-356， pp.362-363.
33. 洪彰義：小兒科學， 서울，大韓教科書株式會
社， p.297，1987.

34. 李文鎬·全鐘量·許仁穆: 內科學 上卷, 서울, 금강출판사, p.501, 1979.
35. 尹德鎮: 小兒科學大全, 서울, 연세대학교 출판부, pp.822-824, 1984.
36. 金東輝外 5人: 最新診斷과 治療, 서울, 약업신문, pp.461-462, 1976.
37. Waldo and Margery Nelson : Nelson Textbook of Pediatrics, West Washington square philadelphia, W.B Saunders company, p.1020.
38. Robert Hutchison : Current medical Diagnosis & Treatment, Lange medical publications Science publications Center LMP, pp.115-116, 1984.
39. Edward Wasserman, M.D., Donald S. Gromisch, M.D. : Survey of Clinical pediatrics seventh edition McGraw-Hill Book Company, p.236, 1981.
40. 서울대학교 의과대학 耳鼻咽喉科學教室: 耳鼻咽喉科學 서울심포지움 2, p.140, 1987.
41. 康秉秀: 漢方臨床 알레르기, 서울, 성보사 pp.111-117, 1988.