

抗癌劑 副作用에 대한 韓方療法

金東熙·金聖勳*

I. 緒論

癌이 人類가 克服해야 할 難治病의 하나로 出現한 이래 東西醫學에서는 積極 없는 努力を 通하여 癌治療에 대한 治療法과 治療劑의 開發에 있어相當한 發展이 있었다.

西洋醫學에서는 治療法으로 外科處置, 免疫療法, 放射線療法 및 化學療法등이 活用되고¹⁾ 있으나 그 中에서도 抗癌劑에 依한 化學療法이 가장 많이 應用되고 있다.

東洋 醫學에서 癌의 治法은 清熱解毒, 化痰軟堅, 利水消腫, 活血化瘀등의 攻邪法과 扶正培本 健脾益氣 滋養肝腎 養胃生津등의 補正法으로 大別되며 疾患의 程度에 따라 攻法爲主 攻補兼治 扶正爲主로 나눌 수 있다.^{2,3)}

最近에 와서는 抗癌劑가 癌細胞뿐만 아니라 正常細胞까지도 毒性을 나타내어 肿瘍細胞를 殺滅하는 同時に 骨髓造血機能을 抑制하고 消化器官 및 全身에 反應하여 副作用을 誘發하여 人體의 免疫機能을 降低시키는 問題點이 露出된다는 점⁴⁾에서 抗癌治療劑의 副作用을 減少시키면서 癌細胞에 대해 特異的 毒性을 나타내는 治療法의 開發이 要求되고 있다.

이러한 점에 立脚하여 近來에 中國에서는 抗癌劑의 副作用에 關하여 臨床 및 實驗分析한 論文을 雜誌를 通하여 發表하고 있는데 이들은 化療期間中 或 化療後에 扶正培本의 治法이 免疫機能을 增加시키며 骨髓造血機能을 改善하고 內分泌機能을 調節하는 作用이 있음을 報告하고 있다. 이는 化學療法을 癌細胞을 直接的으로 除去하는 去邪法으로 認識하여 扶正法을 中

* 大田大學 韓醫科大學 痘病學教室

心으로 하는 韓藥을 投與하여 抵抗力を 增加시켜 抗癌作用의 強化와 副作用을 減少시키고자 하였다.

그러나 現在 우리의 實情은 癌의 豫防 治療에 對해서는 어느 程度 報告된 바가 있으나 抗癌劑의 副作用에 대한 韓方療法의 報告는 많지 않다.

이에 著者는 抗癌劑로 因한 副作用에 대한 韓方 臨床 및 實驗 報告 結果等을 綜合하고 考察하여 韓方療法으로 抗癌劑의 副作用을 豫防 治療 할 수 있는 理論的 根據를 提示 하고자 한다.

I. 本 論

1. 抗癌劑의 適應症과 副作用

	(1) 適應증	(2) 副作用
암 킬 화 제	1) Cyclophosphamide 急慢性骨髓性白血病, 호치킨病, 癌腫, 肉腫, 赤血球增多症, 實驗的移植性腫瘍, Croker 肉腫, Enrlich癌, NF癌, 特히 吉田肉腫	白血球減少, 顆粒球減少, 淋巴球減少, 脫毛, 倦怠感, 食慾不振, 嘔氣, 嘔吐, 一過性低血壓, 低血壓 로인 血栓, 腎障害, 肝機能低下, 黃疸, 味覺異常, 泄瀉, 心悸亢進, 頭痛, 眩暈, 不眠, 無菌性出血性膀胱炎, 出血傾向, 貧血, 口內炎, 口渴, 發熱, 局所痛, 發疹
	2) Busulfan 慢性 吳 惡急性骨髓白血病, 急性白血病, hodgkin病, 慢性淋巴性白血病, 惡性淋巴腫과 癌 및 肉腫	血小板減少, 胃腸障碍, 黑皮, 無月經, 尿酸血症 等에 依한 腎障害
항 대 사 길 화 제	1) Mercaptopurine 惡性淋巴線腫, 淋巴芽細胞性骨髓芽細胞性 및 骨髓細胞性의 急慢性白血病	副作用은 比較的 적으나 粘膜의 潰瘍, 皮膚發疹, 嘔吐, 發熱, 肝障害, 血小板減少, 貧血, 黃疸, 出血傾向, 白血球減少, 肝 및 腎의 障害, 消化管症狀
	2) Methorexate 女性의 絨毛上皮癌, 非轉位性의 營養細胞腫瘍 및 小兒의 急性淋巴芽性白血病, 乳腺, 肝, 舌, 咽頭, 精子等의 癌腫, Burkitt淋巴腫, 肺癌, 骨肉腫, 惡性絨毛上皮腫	口腔炎, 腸炎, 骨髓抑制, 脫毛, 皮膚發疹

	3)Fluorouracil	胃癌, 直腸癌, 結腸癌, 等의 消化管癌, 乳癌, 子宮癌, 肺癌, 肝癌, 脾臟癌, 皮膚癌, 其他 各種癌腫, 細網肉腫, 乳癌, 淋巴肉腫, 纖維肉腫	造血機能을 抑制하여 白血球減少症 및 血小板減少症, 口內炎, 腹痛, 惡心, 嘔吐, 味覺異常, 泄瀉等의 消化器障害 및 全身倦怠感, 發熱, 脫毛, 色素沈着, 眩氣症, 運動失調, 言語障害, 胸痛, 心電圖異常
抗生素	1)Mytomycin C	癌腫(肺癌, 胃癌, 食道癌, 肝癌), 肉腫(細網肉腫, 淋巴肉腫), 白血病, 乳癌, 恶性絨毛上皮腫	出血傾向, 食慾不振, 惡心, 嘔吐, 全身倦怠, 發熱, 肝障害, 白血球減少, 血小板減少, 體重減少, 泄瀉
	2)Bleomycin	頭部癌, 皮膚癌(陰莖癌, 陰囊癌, 女子外陰癌), 肺癌, 食道癌, 恶性淋巴腫, 神經膠腫, 子宮頸癌, 頸部癌(上顎癌, 舌癌, 口脣癌, 咽喉頭癌)	發熱, 食慾不振, 脱毛, 皮膚의硬化, 手唇의 變色 및 變形, 指趾 手背 足背의腫脹, 肥厚, 知覺過敏
	3)Adriamycin	膀胱癌, 睾丸癌, 卵巢癌	骨髓抑制, 心臟毒性, 頻脈, 低血壓, 心不全
植物性 抗癌 剤	1)Vinblastin	Hodgkin病, 絨毛癌	嘔逆, 嘔吐, 白血球減少症, 脱毛
	2)Vincristine	小兒의 急性白血病, Wilms腫瘍	嘔逆, 嘔吐, 白血球減少症, 神經毒作用, 脱毛, 感覺異常, 末梢筋肉衰弱, 便秘
其他 抗癌 剤	1)Cisplatin	睾丸癌, 卵巢癌, 膀胱癌, 淋巴腫等에 適用	腎臟障害, 聽覺障礙, 血少板減少, 赤血球減少, 白血球減少, 惡心, 嘔吐, 泄瀉


2. 抗癌劑 副作用에 關한 略圖

消化器系 症狀	食慾不振, 惡心, 嘔吐, 泄瀉, 口腔粘膜潰瘍, 腹痛, 下腹部不快感, 胃腸管出血
自律神經系症狀	熱感, 頻尿, 頻便, 頤面麻痺感, 冷感, 發汗, 渴症
精神神經系症狀	頭痛, 眩氣症
皮膚症狀	發疹, 脱毛, 色素沈着, 瘙痒症, 皮膚角化症
心血管系症狀	心系亢進症
造血臟器	白血球 및 血少板減少
其他	肝機能障礙, 腎機能障碍, 心臟機能障碍, 經度消失, 繼發性癌의 發生

3. 抗癌劑 副作用 減少에 多用되는 藥物의 效能에 따른 略圖

作 用	藥 物
清補氣血	太子參 丹蔘 北沙蔘 西洋蔘
溫補氣血	黃耆 黛蔘 紅蔘 當歸 龍眼肉 紅棗 紫河車
健脾和胃	白朮 茯苓 甘草 砂仁 陳皮
滋補肝腎	女貞子 何首烏 補骨脂 枸杞子 熟地黃 空絲子 仙靈脾
生津潤燥	生地 麦門冬 元蔴 石斛
清熱解毒	蒲公英 半枝蓮 白英 龍葵 白花蛇舌草 山豆根 魚腥草

2-1. 抗癌劑 醫作用 2 韓方病理



3-1. 抗癌劑 副作用에 多用하는 益氣健脾處方

處方 構成		適應證
防毒湯	黃耆 黛蔘 各 30g, 五味子 補骨脂 炒白朮 各 15g, 麥門冬 20g, 當歸 茯苓 清半夏 各 12g	各種 腫瘍에 共通
健脾益氣湯	黃耆 黛蔘 白朮 各 15g, 酸棗仁 陳皮 各 10g, 茯苓 25g, 遠志 炙甘草 各 5g	
經驗方	黛蔘 20g, 黃耆 30g, 焦白朮 10g, 赤茯苓 15g, 生炒米仁 30g, 當歸 15g, 枸杞子 15g, 空絲子 12g, 猫瓜蔓草 30g, 化半夏 15g, 生甘草 10g, 水牛角 30g	原發性 肝癌
當州五號方	北沙蔘 當蔘 山茱萸 浮小麥 生地 30g, 淮山 15g, 人蔘 12g, 五味子 3g, 麥門冬 酸棗仁 炙甘草 虎骨 各 30g, 大棗 10 枚	白血病
加味補血湯	黛蔘 9g, 當歸 15g, 黃耆 30g, 丹蔘 9g, 肉桂 4.5g, 制首烏 15g, 白芍藥 9g, 大棗 90g, 雞血藤 9-25g	骨髓抑制
益氣煎	黛蔘 白朮 白芍藥 茯苓 當歸 生地 熟地黃 補骨脂 木香 鹿角翔 龍眼肉 枸杞子 陳皮 各 9g, 黃耆 12g	白血病 氣虛型
升血湯	生黃耆 太子蔘 雞血藤 白朮 茯苓 枸杞子 女貞子 空絲子	
三蔘生脈飲	太子蔘 南北沙蔘 丹蔘 麥門冬 五味子 黃耆 花粉 白蔘	肺癌
通幽湯	生地 熟地 當歸 制半夏 白花蛇舌草 七葉-枝花 各 30g, 桃仁 厚朴 枳實 各 15g, 紅花 炙甘草 升麻 大黃 各 10g, 生薑汁 非菜汁 各 6g	食道癌
降逆湯	茯苓 生甘草 旋覆花 代赭石 香木綠皮 焦遠志 焦三仙 刀豆子 丁香 姜半夏 姜竹茹 陳皮 柿蒂	
理胃和結湯	黛蔘 15g, 白朮 12g, 茯苓 12g, 甘草 3g, 生黃耆 15g, 熟地黃 15g, 黃精 12g, 白毛藤 30g, 白花蛇舌草 30g, 茯實 15g, 連肉 15g, 四三七 1.5g, 大棗 6枚, 沙蔘 10g, 羊臘棗 10g, 枸杞子 9g,	
理胃通關湯	黛蔘 15g, 白朮 9g, 茯苓 15g, 甘草 3g, 烏茱萸 3g, 旋覆花 6g, 대자식 9g, 生半夏 9g, 麥芽 30g, 羊臘脂 10g, 砂仁 6g, 沙蔘 9g, 四三七 1.5-2g, 熟地黃 15g	
健脾益氣方	黃耆 黛蔘 各 20g, 白朮 15g, 酸棗仁 陳皮 各 10g, 茯苓 25g, 遠志 炙甘草 各 5g	各種 腫瘍에 共通
和胃降逆方	蒼朮 法半夏 茯苓 各 15g, 川朴 陳皮 各 10g, 砂仁 木香 各 5g, 麥芽 神曲 各 25g	各種 腫瘍에 共通
補益氣血方	黃耆 黃精 黛蔘 各 20g, 熟地 當敗 白芍藥 枸杞子 各 15g, 炙甘草 5g	各種 腫瘍에 共通
調養肝腎方	制首烏 30g, 山茱萸 麥門冬 丹皮 各 10g, 牛膝 15g, 淮山藥 茯實 各 20g, 五味子 5g	各種 腫瘍에 共通
	生沙蔘 7g, 炙黃耆 20g, 炒白朮 杜沖 仙靈脾 各 9g, 柏子仁 桔實子 各 15g, 枸杞子 肉從蓉 太子蔘 淮山藥 女貞子 各 12g, 枳殼 5g	各種 腫瘍에 共通

3-2. 抗癌劑 副作用減少에 쓰이는 52例 處方中 多用 藥物 順序

使用回數	藥物名
33	黃耆(약63%)
32	人蔘(약60%)
25	白朮(약48%)
18	白茯苓(35%)
16	陳皮(약31%)
12	麥門冬 當歸(약23%)
11	半夏 生地黃(약21%)
10	白花蛇 舌草 鷄血藤 熟地黃 五味子(약19%)
9	黃精 山藥(약17%)
8	石斛 白芍藥 女貞子 太子參(약15%)
7	大棗 兔絲子(약13%)
6	灸甘草 甘草 木香 丹蔘 白英 半枝蓮 石斛 石鶴草 砂仁(약11%)
5	芡實 補骨脂 何首烏 三七粉 焦三仙(약10%)
4	玄蔘 蒲公英 貝母 山棗仁 山茱萸 生薑 天門冬 蒼朮 蓮子肉 遠志 枳殼 赤芍藥 竹茹 元蔘(약8%)
3 以下	昆布 雞內飲 菊花 龜膠 葛根 魚腥草 鐘金 龜板 米仁 茅根 侮蠍 麥芽 桃仁 代赭石 野百合 刀豆子 大青葉 白毛藤 鱗甲 白部根 半邊蓮 白扁豆 附子 白豆蔻 浮小麥 丁香 智母 海藻 花粉 延胡索 黃花 夏枯草 黃芩 香綠皮 黃柏 喜樹根 紫花地丁 敗醬草 桑白皮 三葉青 仙靈脾 桑椹子 小蘿 旱蓮草 猪苓 神曲 旋覆花 柿蒂梗穿 酸模根 生地黃 土茯苓 仙鶴草 蜈蚣 全蝎 穿山甲 石膏 桑寄生 炒扁豆 柴胡 升麻 三陵 蓬朮 地骨皮 全瓜蒌 紫何車 桂枝 山楂 山豆根 山慈姑 天南星 天花粉 車前子 羊乳 玉竹肉桂 肉從蓉 吳茱萸 龍骨 龍眼肉 意苡仁 夜交藤 牛膝(약6%以下)

4. 抗癌劑 副作用에 대한 韓方療法

1. 焦中華등 : 抗癌劑治療後의 惡心, 嘔吐, 腹脹滿, 不思飲食하는 경우 降逆止嘔, 建脾和胃하는 治法을 用⁵⁾
2. 韓仁存등 : 胃癌에 抗生劑를 用한 경우 나타나는 全身症狀, 消化器 反應等의 副作用에 脾腎方은 骨髓造血機能에 保護作用이 있다.⁶⁾
3. 徐龍生 : 抗癌劑治療後 나타나는 頭暈乏力, 納差口乾, 二便失調등의 全身症狀은 补氣養血, 滋補肝腎하고, 食慾減退, 惡心嘔吐, 腹痛腹瀉등의 消化器 症狀은 健脾和胃(黨蔘, 白朮, 茯苓, 白芍, 山藥등) 降逆止嘔(旋覆花, , 三仙, 砂仁, 雞內金)하며, 骨髓抑制, 白血球減少, 赤血球減少, 血少板減少등의 症狀은 扶正培本法(主로 脾腎을 雙補 : 熟地黃, 肉從蓉, 巴戟天, 补骨脂, 繢斷, 黃耆, 黨蔘等)을 用한다.⁷⁾
4. 何任 : 扶正補益藥 (脾腎을 為主)을 用하여 抗癌劑의 副作用을 減少⁸⁾
5. 浙江中醫學院學報編輯委員會 : 小鼠의 미토마이신副作用으로 나타난 白血球減少 및 體重減

少陰 十全大補湯이 有效하였다.⁹⁾

6. 錢變卿 : 黃耆, 太子參, 鷄血藤, 白朮, 茯 , 枸杞子, 女貞子, 穗絲子로 構成된 升血湯이 胃癌患者의 抗癌劑 治療後 나타나는 副作用을 輕減¹⁰⁾
7. 陳紹東 : 抗癌劑治療中에 四君子湯, 旋覆花湯등의 益氣健脾, 和胃降逆하는 方을 消化道의 副作用을 減少하였다.¹¹⁾
8. 季宇彬 外 : 補中益氣湯으로 Cyclophosphamide의 副作用으로 나타나는 赤血球減少와 白血球減少 및 脾腸萎縮에 대하여 顯著한 抵抗作用이 있다.¹²⁾
9. 張慶楨 外 : 抗癌劑 治療後 貧血, 口腔感染, 鼻咽感染, 蘭尾感染, 發熱, 出血등의 副作用이 나타나는데 補氣生血滋陰을 為主로 하고 兼하여 清熱解毒을 佐하여 治療한다.¹³⁾
10. 徐梅文 : 抗癌劑治療後에 나타나는 惡心, 嘔吐食差, 腹脹, 腹痛, 便糖등의 消化器系 副作用을 和中調胃, 降逆止嘔하는 效能이 있는 降逆湯으로 治療하였다. 降逆湯의 構成은 다음과 같다.(茯苓, 甘草, 旋覆花, 代赭石, 香皮, 遠志, 三仙, 刀豆子, 丁香, 半夏, 竹茹, 陳皮, 枸杞)¹⁴⁾
11. 王寇庭 : 胃癌治療中 抗癌劑를 使用하였을 때 正氣虛弱, 白血球減少等의 副作用이 나타난 경우는 抗癌劑의 投與를 中斷하고 扶正(氣陰雙補)을 主로 한다.¹⁵⁾
12. 濬明繼 등 : 化療時 나타나는 副作用 및 亢癌效果 增強에 調胃化結湯을 利用.¹⁶⁾
 方劑-黨蔘 15g, 白朮 12g, 茯苓 12g, 甘草 3g, 黃耆 15g, 熟地黃 15g, 黃精 15g, 白英 30g, 蛇舌草 30g, 芡實 15g, 蓼肉 12g, 田三七 1.5g, 沙蔘 12g, 枸杞子 9g, 大棗 6 枚로 構成
13. 金光 등 : 防毒湯이 化療後에 나타나는 消化器系, 造血系, 神經系, 心血管系의 副作用을 抑制함을 臨床的으로 觀察 報告¹⁷⁾
 方劑-黃耆 黨蔘 各 30g, 五味子, 補骨脂, 白朮(炒) 15g, 麥門冬 20g, 當歸, 茯 , 陳皮, 清半夏 12g
14. 李國友 등 : 化療後 나타나는 消化器作用, 惡心嘔吐, 食慾不振, 口腔炎, 腹痛, 腹脹, 腹瀉, 便秘에 六君子湯合旋復花代赭石湯¹⁸⁾
 方劑-黨蔘, 白朮, 茯 , 甘草, 陳皮, 清半夏, 旋復花, 生薑, 大棗
15. 劉鏞振 : 化療와 中藥을 配合하여 多發性骨隨癌을 治. 化療後에 나타나는 正氣虛에 仙鶴草 60-90g, 白花蛇舌草, 半邊蓮, 半枝蓮 各15-30g, 喜樹根, 敗醬草根, 蛇梅, 白毛藤, 大青汁, 京三陵, 蓬朮, 赤芍藥, 紅花 各 10g, 意苡仁 10-12g, 蛇六

谷 6g에 黃耆, 黍夢 10-15g,當歸, 生地黃, 熟地黃, 黃精 各 10g¹⁹⁾

16. 王芳成 : 中西醫結合으로 胃癌을 治하면서 中醫補法을 加함. 또한 晚期 癌患者의 手術과 化療後 나타나는 痘症을 3型으로 區分하여 中藥을 投與. 心脾兩虛에 黍夢, 黃耆, 當歸, 山棗仁, 白朮, 茯, 龍眼肉, 木香, 遠志, 甘草로 治하고 脾腎兩虛에 黍夢, 黃耆, 當歸, 補骨脂, 茅絲子, 枸杞子, 女貞子, 何首烏, 白朮, 茯等으로 健脾益腎하여 治하며 脾胃不和에는 黍夢, 山藥, 意苡仁, 白朮, 茯苓, 法半夏, 陳皮, 竹茹등으로 健脾和胃 시켜 治²⁰⁾

19. 易璜善 등 : 原發性 肝癌에 化療 放療後에 나타나는 骨髓造血機能低下, 免疫機能低下 및 衰弱患者抗癌 能力低下등의 副作用을 健脾理氣藥을 用하여 低下시키며 化療 放療治療를 합²¹⁾

20. 王濟民 : 胃癌 및 食道癌의 抗癌藥物療法時에 扶正抗癌藥物을 用할時 治療가 早期患者에 比해 中晚期患者에게 더욱 效果가 있음을 報告²²⁾

21. 徐榮禧 : 竹葉石膏湯이 惡性骨腫瘍의 化療 毒性 反應을 防止 治하며 嘴惡甚者에 旋覆花와 大諸石 竹茹를 加하고 口舌生瘡에는 石膏, 知母, 玄蔴, 天花粉을 加하며 紅疹 瘡痒에는 基本方에 生地黃, 赤芍藥, 丹皮를 加하며 氣虛多汗, 心系에 黃耆, 當歸, 五味子 흑은 生脈飲을 加하여 治합²³⁾

22. 權陽汝忠 : 中醫藥이 抗癌藥 副作用을 減少시킴을 臨床觀察하여 報告하면서 治療 方法에 對해 4가지 方法을 提示합²⁴⁾

1. 健脾益氣法-黃耆, 黍夢 各20g 白朮15g 山棗仁, 陳皮10g, 茯 25g, 遠志, 炙甘草各5g

2. 和胃降逆法-蒼朮, 法半夏, 茯 各15g, 川朴, 陳皮10g, 砂仁5g, 麥芽, 神曲25g

3. 补益氣血法-黃氣, 黃精, 黍夢 各 20g, 熟地黃, 當歸, 白芍藥, 枸杞子15g 炙甘草 5g

4. 調養肝腎法-何首烏30g, 山茱萸, 麥門冬, 牡丹皮, 牛膝各15g 茢實20g, 五味子5g 여기에 白花蛇舌草, 半枝蓮 各60g을 매일 煎湯하여 茶用함을 提示.

23. 凌鴻英 등 : 原發性 肝癌細胞癌의 治療시 化療治療 및 人蔘, 黃耆등의 中藥과 結合治療의 結果를 比較 提示하여 中藥結合治療가 免疫 狀態와 腫瘤크기의 變化가 더 있음을 報告²⁵⁾

24. 中醫研究院廣安門醫院腫科 : 中西醫結合하여 乳腺癌患者 134例를 治療分析하여 報告하면서 放療化療時 人工牛黃散에 升血一號方을 加하여 用하였다. 이는 太子蔘, 何首烏, 黃耆15g, 當歸, 知母, 枸杞子, 三仙 各 10g, 白朮12g, 石葦30g, 三七粉 3g, 大棗 7枚로 構成되어짐²⁶⁾

25. 우정신 : 원발성 肝癌 患者의 臨床實驗에서 健脾理氣藥 配合과 配合치 않은 組의 治療 效果를 比較하여 報告²⁷⁾
26. 蔡德政 : 化療放療 所致로 貧血, 血小板減少症, 造血機能 障碍에 黍夢 花粉이 一定한 效果가 있음을 臨床 實驗 報告²⁸⁾
27. 陳馥馨 : 子宮管頸癌轉移에 化療後 清熱 消毒 및 健脾止血의 中藥을 投與時 이에 대한 治療 效果 報告²⁹⁾
28. 劉邊林 : 化療와 中藥治療를 結合하여 治하는데 痘機를 本虛表實에 두어 晚期胃癌患者의 健脾益氣差胃之法을 用
基本方-黨蔘30g(或 以上 10g), 茯, 半夏, 陳皮15g, 白朮, 露蜂房, 全蝎 各10g, 黃耆, 料姜石 各 60g, 瓦楞子 30克, 蜈蚣 2條用³⁰⁾
29. 周國雄等 : 患者的 西藥化療 長期治療時에 나타나는 氣血兩虛型에 扶正培本法을 為主로 治하여 “蘭州五號方”을 用하였다.³¹⁾
方劑-北沙蔘, 黨蔘, 山茱萸, 浮小麥, 生地黃30g, 淮山藥15g, 人蔘須12g, 五味子3g, 麥門冬, 山棗仁, 炙甘草, 龍骨 10g, 大棗 10枚
30. 王義明等 : 扶正攻癌之法으로 晚期氣管支肺癌을 治하는데 扶正培本法에 세 가지 方을 提示함³²⁾
1. 養陰潤肺方-生地黃, 玄蔘, 天門冬, 麥門冬, 沙蔘, 百合 各12g, 天花粉 30g, 貝母, 玉竹, 石斛 9g, 五味子 6g,
 2. 益氣健脾方-生黃耆12g, 黨蔘, 茯苓, 扁豆(炒), 白米(炒), 制黃精 各9g, 意苡仁12g, 山藥 12g,
 3. 补精益腎方-熟地黃, 炙鼈甲, 龜板, 制首烏, 當歸, 百芍藥 各12g, 枸杞子, 鹿角, 补骨脂 各9g

4-1. 抗癌劑의 副作用에 대한 韓方療法 略圖

	副 作 用	治法 喫 藥物
焦中華等	消化器症狀(恶心嘔吐, 腹脹滿, 不思飲食)	降逆止嘔, 健脾和胃
鬱仁存	全身症狀, 消化器症狀, 骨髓抑制	脾腎方

徐龍生	全身症狀(頭暈,乏力,納差口乾,二便失調) 消化器症狀(食慾減退,恶心,嘔吐,腹痛,泄瀉) 骨髓抑制(白血球,赤血球,血小板減少)	補氣養血,滋補肝腎 健脾和胃,降逆止嘔 (四君子,旋覆代子湯加減) 扶正培本(脾胃雙補主)
何任		扶正補益藥(脾胃爲主)
浙江中醫學院學報編輯	미토마이신으로 因赴 白血球減少, 體重減少	十全大補湯
金光等	消化器症狀,造血系,神經系,血管系症狀	防毒湯(黃耆,黨蔘--)
嚴陽汝忠	消化器(惡心嘔吐),骨髓,神經,肝腎障礙	健脾益氣(四君子湯加減) 和胃降逆(蒼朮,半夏,--) 補益氣血(黃耆,黃精,--) 調養肝腎(何首烏,山茱萸等)
陳紹東	消化器症狀	益氣健脾,和胃降逆 (四君子,旋覆代子湯加減)
季宇琳等	Cyclophosphamide豆 因赴 赤血球減少,白血球減少,脾臟萎縮	補中益氣湯
張慶楨等	炎症性疾患(口腔,鼻咽,肛門,肺部,闌尾),發熱,出血	補氣生津滋陰 兼清熱解毒
徐悔文	消化器症狀(惡心,嘔吐食差,腹脹,腹痛,便糖)	和中調胃,降逆止嘔(降逆湯)
周維順等	消化障礙,骨髓抑制,體力衰弱,發熱,肝腎的損傷	溫補氣血,健脾和胃,滋補肝腎, 有熱則清熱 解毒
王寇庭	正氣虛弱,白血球減少	扶正法(氣陰雙補)
趙田雍	皮膚症狀(靜脈炎,軟組織急性症) 五官症狀(口乾舌燥,咽喉作通,齒根,舌,額急 咽喉潰瘍) 消化器症狀(胸脅諸悶,不思飲食,嘔惡頻作) 血液症狀(眩暈,目眩,耳鳴,心悸,氣短)	清熱解毒,養陰生津 養陰清熱補氣 健脾益氣 補氣養血
周國雄	消化器症狀,造血系,血管系,體力虛弱	和胃降逆,補血益氣,養血補腎
徐英禧	消化器副作用(惡心,嘔吐,口舌生瘡) 皮膚疾患(紅疹癢痒) 循環器疾患(心系,健忘,多汗)	降逆止嘔(竹葉石膏湯加旋覆花代 赭石) 清熱養血(竹葉石膏湯加生地黃, 赤芍藥,丹皮) 養氣補血(竹葉石膏湯加黃耆,當 歸,五味子)
審英鷄等	消化器症狀	利胃和結湯
沈力	全身疾患(神疲乏力,氣短,盜汗,自汗) 呼吸器症狀(少氣賴言,語聲咳聲低弱,氣短納 差,痰稀白而粘)	氣陽雙補 清解除毒和脾胃
王緒繁	消化器副作用(食慾減退,大便糖泊) 骨髓抑制	健脾開胃補陰 補陰清涼生津

李國友等	消化器副作用(恶心嘔吐, 食慾不振, 口腔炎, 腹痛, 腹脹, 腹瀉, 便秘)	扶正培本(六君子湯合旋覆花大諸石湯) 降逆止嘔
貝潤浦	血液症狀 (發熱, 眩暈, 出血, 紫斑) 胃腸系統症狀(恶心嘔吐, 食慾不振, 胸滿腹痛, 腹瀉, 便秘) 神經精神系統症狀(頭痛, 嗜眠, 疲勞, 幻覺) 皮膚反應(疱疹癢痒, 色素沈着, 禿髮)	清熱涼血補血 降逆健脾和胃 寧心安神, 柔肝滋腎 清熱養血
唐由君	白細胞減少	補氣補血 健脾滋陰

5. 抗癌의 東西兼治에 따른 臨床 및 實驗報告

(Table 1) 防毒湯이 抗癌劑 副作用 減少에 미치는 影響에 대한 臨床實驗 分析

病名	例數	特效	顯效	有效	無效
肺癌	126	78	38	10	
胃癌	104	62	20	19	3
肝癌	84	46	17	19	2
食道癌	54	32	14	6	2
結腸癌	41	27	10	3	1
乳線癌	38	29	7	2	
宮頸癌	19	15	3	1	
鼻咽癌	14	10	2	2	
惡性淋巴癌	10	8	1	1	
其他	19	2	5	4	8

(Table 2) II期肝癌患者不同治法的療效比較

組 別	例數	生存例數		中位生存期 (月)
		1年以上	5年以上	
健脾理氣群	48	21(43.7)	8(16.7)	12.0
非健脾理氣群	15	2(13.3)	0	5.0
對照群	202	4(2.0)	0	3.0

(Table 3) 黨參花粉의 治療前後의 血液學的 變化

項 目	例數	治療前 平均值	治療後 平均值	治療後--治療前 mean±S.D
白血球總數	26	2888	4821	1932.96±242.3
中性粒細胞 (%)	25	64	69	4.96±1.5
血紅蛋白 (g %)	23	11.1	11.8	0.69±0.35
血小板 (10000/mm)	23	10.4	12.4	1.97±0.86

(Table 4) 补中益氣湯과 抗癌劑를 병행하여 小鼠S180에 投여 한 實驗分析 結果

	劑量	合藥途徑	動物數 開始 結果		平均瘤腫	抑制率(%)
			10	10		
補中益氣湯 (煎劑)	20ml/kg	po	10	10	0.16+_0.05	86
抗癌劑	100ml/kg	ip				
補中益氣湯(注射劑)	10ml/kg	ip	10	10	0.08+_0.01	93
抗癌劑	100ml/kg	ip				
補中益氣湯	20ml/kg	po	10	9	0.58+_0.09	50
補中益氣湯	10ml/kg	ip	10	9	0.44+_0.07	62
抗癌劑	100ml/kg	ip	10		0.24+_0.10	79
生理鹽水	同本積	ip	30	28	1.15+_0.45	

(Table 5) 补中益氣湯과 抗癌劑를 병행하여 小鼠L615에 投여한 實驗 結果 分析

	劑量	結藥途徑	動物數 藥前 停藥時		平均生存時間(d)	生命延長率
			藥前	停藥時		
補中益氣湯 (煎劑)	20ml/kg	po	6	6	16.80+_3.45	90
抗癌劑	100ml/kg	ig				
補中益氣湯 (注射劑)	10ml/kg	ig	6	6	17.62+_2.97	100
抗癌劑	100ml/kg	ig				
補中益氣湯 (煎劑)	20ml/kg	po	6	6	10.25+_3.70	16
補中益氣湯 (注射劑)	10ml/kg	ig	6	6	11.90+_3.20	35
抗癌劑	100ml/kg	ig	8	6	15.50+_4.20	76
生理鹽水	同本積	ig	10	9	8.80+_0.95	

(Table 6) 化療와 健脾益腎藥의 兼用시 나타난 全身 反應 比較

全身 反應	體 重			乏 力	
	增加	固定	下降	加重	固定
治療群(180例)	42	127	11	8	172
對照群(146例)	12	114	20	33	113

*治療群-化療+健脾益腎冲劑

*對照群-化療

(Table 7) 化療와 健脾益腎藥의 兼用시 消化器管의 反應 比較

消化道 反應	食 欲		惡 心		嘔 吐	
	減退	固定	加重	固定	有	無
治療群(180例)	18	162	17	163	7	173
對照群(146例)	47	99	41	105	17	129

*治療群-化療+健脾益腎冲劑

*對照群-化療

(Table 8) 化療과 健脾益腎藥의 兼用時 貪食細胞 能力

	療前		療後		T值	P值
	mean+_S.D	mean+_S.D	mean+_S.D	mean+_S.D		
治療群(6例)	32.2+_6.23		62.3+_9.45		3.0878	<0.05
對照群(5例)	54.4+_34.24		52.6+_10.81		0.1020	>0.05

*治療群-化療+健脾益腎冲劑

*對照群-化療

(Table 9) 扶正培本藥의 化療小鼠血白細胞에 미치는 影響

組別	血白細胞/立方mm										
	動物數		化療前均數		化療後均數		化療前後均差+_標準差				
心脾方	21		6942.86		6223.81		719.05+_1901.74				
脾腎方	21		8504.76		6000.00		2504.76+_2617.53				
對 照	22		8722.73		5536.36		3186.36+_1877.51				

*對照-化療

(Table 10) 腫瘍治療時 化療單用과 化療中藥兼用時 副作用 比較
(惡性滋養細胞腫瘍--葡萄胎 絨毛膜癌)

組別	脫髮			納減嘔吐		腹瀉		口腔潰瘍, 咽喉腫痛		其他		
	全部	大部	少量	重	輕	重	輕	重	輕	發 細	鼻 細	燒 細
服韓藥群	2	25	3	14	16	6	15	3	18	5	2	
未服韓藥群	30	0	0	18	12	12	10	3	16	6	4	

*腹韓藥群-加味厚朴消症湯(氣虛血瘀型), 补腎固沖湯(氣血兩虛型), 益肺飲(邪毒蘊肺型)

(Table 11) 134例 乳腺癌患者의 5年生存率과 年齡, 病理分類

總 例 數	年齡						病 理 分 類						治療方法								
	30 以 下	31 -	41 -	51 -	60 以 上	單 純 癌	腺 癌	pa ge' s癌	粘 液 癌	乳 實 癌	管 內 癌	囊 性 增 生 癌	小 腸 癌	頸 癌	不 明	手 術	手 術	手 術	大 綜 合		
生存	119	1	10	61	38	9	40	34	1	3	1	25	3	1	7	4	16	2	34	21	45
死亡	15	0	4	6	3	2	7	3	0	0	0	1	1	1	0	2	0	1	3	1	10
合計	134	1	14	67	41	11	47	37	1	3	1	26	4	2	7	6	16	3	37	22	65

III. 考 察

免疫이란 痘邪로 부터 人體를 保護하는 正氣를 意味하는 것³³⁾으로 抗癌劑에 依한 消化器系統, 骨髓造血系統, 神經精神系統, 皮膚系統, 泌尿器系統등의 副作用은 韓醫學의 依한 傷正에 該當하는 것³⁴⁾으로 곧 免疫機能低下를 뜻하는 것인 바.腫瘍으로 因한 正氣虛에 抗癌劑를 利用하여 祛邪의 治法을 用하면 虛則補 實則瀉의 治療原則³⁵⁾에 矛盾되는 점이 생기게 된다. 따라서 韓醫學에서는 扶正培本法을 古來로 腫瘍를 治療하는 重要한 治療原則으로 活用하였는데 이는 調理臟腑, 補氣益血, 助陽滋陰등으로 人體의 免疫機能을 增加시켜 腫瘍의 進行을 抑制하여 良好한 效果를 나타내게 한다. 現代 醫學의 依한 機體의 免疫 狀態와 腫瘍 發生 및 發展은 密接한 關係가 있는데 이는 特히 細胞 免疫 水準의 降下와 飽食細胞 能力의 抑制가 腫瘍의 發生과 發展의 重要한 要因이 됨을 말하는 것이다. 王³⁶⁾은 扶正培本의 藥이 腫瘍抑制 및 化療療法의 副作用을 減少시키는데 크게 4가지 作用에 依한다고 報告하였다. 이는 첫째, 免疫機能調節 둘째, 骨髓造血機能의 改善 셋째, cAMP 및 cGMP의 調節作用 넷째, 內分泌調節 機能에 依해 이루어진다고 하였다. 許³⁷⁾는 氣虛 陰虛型 惡性 腫瘍 患者를 正常人과의 免疫狀態를 比較하여 統計를 내었다. 免疫指標測定結果 特히 氣虛組의 平均置가 最低임을 臨床實驗 報告하였다.

따라서 扶正培本의 作用이 있는 藥物이 이런 免疫學的 侧面에서 人體의 免疫機能을 增加시켜 抗腫瘍作用과 化療後에 나타나는 副作用을 減少시키는 것으로 볼 수 있다. 이는 肺, 肝, 腎 및 各種 癌治療 및 化療副作用 減少에 补中益氣湯, 香砂六君子湯, 防毒湯, 薑黃湯 및 升血湯 등 益氣健脾藥이 主劑인 處方이 补肺飲, 五苓散, 六味地黃湯, 四物湯등의 补陰과 利水 治方보다 多用되며 臨床과 實驗에서 有意味의 있음은 이를 證明하는 것이라 할 수 있다.

抗癌劑는 크게 알킬화제, 대사길항제, 抗生劑, 植物性 알칼로이드 및 其他抗癌劑等으로 나눌 수 있는데^{38,39)} 알킬화제에는 mechlorethamine, cyclophosphamide, melphalan, busulfan, chlorambucil, hexamethylmelamine등이 屬하는데 副作用은 모두 骨髓造血障礙가 甚하여 白血球, 赤血球 및 血少板등의 減少가 나타나고 嘔逆과 嘔吐等의 胃腸障害는 어느 정도 나타나고 있으며 cyclophosphamide는 脫毛症과 膀胱炎이, busulfan은 色素沈着과 肺纖維症이 자주 隨伴된다.^{38,39)} 대사길항제 methotrexate는 肝otoxicity과 毛鬚乳頭의 細胞들의 交替가 빨라 나타나는 脱毛症이 6-mercaptopurine은 肝otoxicity이 자주 隨伴 된다. 抗生劑에는 Mitomycin C, Actinomycin D, Daunorubicin, Bleomycin, Mithramycin등이 屬하는데 副作用은 주로 骨髓造

血障碍와 食慾不振, 惡心嘔吐등의 胃腸障碍가 甚하게 나타나며 Mitomycin C는 肝障碍가, Bleomycin은 脫毛症, 肺纖維症이, Adriamycin은 脱毛症, 心筋病症이 자주 隨伴된다.^{38,39)} 植物性알칼로이드에는 Vinblastine, Vincristine⁴⁰⁾ 屬하는데 副作用은 모두 骨髓造血障碍와 嘔逆, 嘔吐등의 胃腸障害가 甚하게 나타나며 Vinblastine은 異常感覺이, Vincristine은 異常感覺, 運動神經減退 및 脱毛症이 자주 隨伴된다.^{38,39)} 其他 抗生剤로는 Hydroxyurea, Procarbazine, Nitrosourea, L-Asparagine, Cisplatin등이 屬하는데 主로 骨髓造血障碍와 惡心, 嘔吐, 泄瀉, 腹痛등의 胃腸障害의 共通症狀外에 Cisplatin은 腎臟障害와 聽覺障害가, Nitrosourea는 肝 및 肝毒性이 자주 隨伴된다.^{38,39)} 또한 抗癌剤의 副作用에 關하여 報告된 186例 調査하였던 바 抗生剤의 副作用은 가장 頻度가 높은 共通的인 症狀이 消化器 障碍(86%), 骨髓造血障害(72%)等으로 나타났으며 그 밖에도 각 藥物의 特性에 따라 脱毛症, 神經症狀, 皮膚症狀, 肝中毒, 腎障碍, 心筋症, 肺纖維症등이 隨伴될 수 있는 것으로 나타나 있다.

抗癌剤의 副作用에 對하여 韓醫學의으로 病因 病理를 살펴보면 胃腸障碍는 惡心 嘔吐 腹脹 腹不舒 隱隱作痛 便糖 或 泄瀉등의 一定한 共通 症狀이 나타나는데⁴⁰⁾ 이는 脾胃의 運化作用 氣化作用 및 升降作用의 失調에 의해 發生되는 것으로 理解할 수 있으며 胃腸障碍와 함께 疲勞, 無力, 面色少華, 自汗, 倦怠 舌淡등은 氣虛에 屬하는 것으로 볼 수 있다.⁴¹⁾ 脾虛와 氣虛의 關係는 “先治氣虛者多從健運脾胃着手” “邪氣所湊其氣必虛” “積氣成也 正氣不足以後邪氣居之”³⁶⁾ 脾胃 後天之本 “脾胃爲氣血生化之本” “脾旺而不受邪”等의 원리에서⁴²⁾ 볼 수 있듯이 서로 密接한 關係를 가지고 있다. 따라서 治療및 副作用 減少에 多用되는 黃耆 人蔘 白朮 陳皮등의 补氣健脾藥과 补中益氣湯, 四君子湯, 黃耆健中湯, 香砂六君子湯, 健脾補氣方등의 使用은 어느 程度 이러한 理論에 附合된다고 할 수 있다. 最近 李⁴³⁾는 健脾益氣藥이 T淋巴細胞比值 및 淋巴細胞 轉化率을 높이며 黃耆, 人蔘은 骨髓造血細胞 DNA合成 및 有核細胞分裂作用을 促進한다고 臨床과 實驗에서 報告하고 있으며 王³⁶⁾은 人蔘, 黃耆, 白朮, 靈芝등이 網狀內皮系貪食作用을 增強시킨다고 하였고 金⁴⁴⁾은 化療時 补中益氣湯을 兼用하면 补中益氣湯이 cyclophosphamide의 抗癌活性을 增加시키며 化療의 副作用을 減少시킨다고 實驗報告하였다. 이를 現代醫學의으로 說明하면 이러한 藥物과 處方은 免疫調節機能을 가지고 機體의 免疫機能을 增強시켜 抗腫留作用을 補助하며 化療 療法으로 因한 免疫機能의 低下로 생긴 全身 症狀을 治療하게 되는 것이다.

骨髓造血障害로는 白血球減少, 血小板減少, 出血等과 같은 症狀이 나타나는데⁴⁵⁾ 이들의 病理는 化療時에 腎의 藏精機能과 肝의 藏血機能이 減少되거나 壓失되었을때 血中 白血球 赤血球 血小板의 減少가 일어나고 여러 感染 및 出血 脱毛등이 同伴된다. 肝과 腎의 關係는 肝藏血,

腎藏精하여 腎精이 充足하면 血도 旺盛해져 肝藏血의 機能이 充實해지는 것이므로 血과 精을 同原이라 할 수 있다. 또한 이러한 精血은 氣가 旺盛하였을 때 비로소 제 生理 機能을 發揮 할 수 있게 되어 氣, 血, 精은 相互 互根이 되어 人體 生理를 維持하는 것이다.⁴⁶⁾ 따라서 이에 扶正培本의 治法인 滋養肝腎 溫補腎養法과 枸杞子, 女貞子, 當歸 生地, 茄葉, 山茱萸, 山藥 등의 補肝腎藥이 免疫機能을 強化시키는 補氣藥과 더불어 使用됨을 臨床에서 볼 수 있는데 이는 氣能生血의 原理에 따라 黃耆가 爲君이 되어 補血하는 當歸補血湯과 같은 理致라고 思慮된다. 貝³⁴⁾는 扶正培本의 藥과 抗癌劑를 配合하였을 때 白血球와 血小板數가 顯著히 增加하였으며 血漿皮質 hormone作用의 改善이 이루어졌음을 報告하였고 白⁴⁷⁾과 張⁴⁸⁾은 抗癌劑의 副作用에 消積白朮散과 蒼朮湯을 投與했을 때 cisplatin과 cyclophosphamide에 依한 副作用이 好轉된 것은 抗癌劑 毒性에 依해 耷起된 肝臟과 腎臟 機能 障碍도 우선 益氣健脾藥으로 免疫機能을 回復시킨 後 生肝健脾湯이나, 六味地黃湯 및 八正散등이 2次의 으로 痘症에 따라 應用될 수 있음을 示唆하고 있다. 그밖에 抗生劑의 副作用에 대한 韓方療法의 臨床報告 및 實驗研究를 綜合考察하여 보면 治法으로 焦⁵⁾等은 降逆止嘔, 健脾和胃를, 鬱⁶⁾은 脾腎을 治하는 脾腎方을, 徐⁷⁾는 補氣養血, 滋補肝腎, 健脾和胃, 降逆止嘔, 扶正培本을, 何⁸⁾는 脾腎을 主하는 扶正補益을, 金等¹⁷⁾은 防毒湯을, 欧²⁴⁾는 健脾益氣, 和胃降逆, 補益氣血, 調陽肝腎을, 陳¹¹⁾은 益氣健脾, 和胃降逆을 季¹²⁾等은 補中益氣湯을, 張¹³⁾等은 補氣生津滋陰兼清熱解毒을, 徐¹⁴⁾는 和中調胃, 降逆止嘔하는 降逆湯을, 周⁴⁹⁾等은 溫補氣血, 健脾化胃, 滋補肝腎과 有熱者에 清熱解毒을, 王¹⁵⁾은 氣陰을 雙補하는 扶正法을 言及하였다.

以上의 内容을 綜合的으로 要約하면 抗癌劑의 副作用에 關한 治法은 主로 益氣健脾하는 扶正培本의 治療原則下에 痘症에 따라 滋補肝腎, 健脾養胃, 生津潤燥, 清熱解毒治法等을 應用할 수 있음을 알 수 있다.

IV. 結 論

著者は 抗癌劑의 副作用을 韓方療法으로 豫防 또는 治療할 수 있는 理論의인 根據를 提示하여 癌治療에 대한 漢方臨床에 도움이 되고자 抗癌劑의 副作用을 辨證하고 이와 關聯된 臨床 및 實驗報告등을 綜合考察하여 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 抗癌劑의 不作用은 대체로 消化器障礙, 骨髓造血抑制作用등의 共通 症狀外에 藥物

- 의 特性에 따라 皮膚反應, 泌尿系統反應, 神經系統反應, 肝中毒, 心筋症, 肺纖維症 및 脫毛症等이 發生될 수 있다.
2. 抗癌劑 副作用에 대한 病理는 人體가 腫瘍으로 因하여 免疫機能이 低下된 狀態에서 抗癌劑의 毒性에 依하여 脾의 升清降濁, 脾胃運化와 統血作用 肝의 藏血 및 腎의 藏精등의 機能失調로 要約할 수 있다.
 3. 抗癌劑의 副作用에 대한 韓方 治法은 益氣健脾의 治療原則下에 滋養肝腎, 健脾養胃, 生津潤燥, 清熱解毒등의 治法을 痘症에 따라 並行할 수 있다.
 4. 抗癌劑의 副作用에 應用된 52例 處方의 構成 藥物은 黃耆(33例), 人蔘(32例), 白朮(25例), 白茯苓(18例), 陳皮(16例)등의 願으로 益氣健脾藥들이 많이 使用되었고 그 밖에 滋養肝腎劑인 女貞子, 枸杞子, 山茱萸, 山藥, 熟地黃, 生地黃등이 많이 쓰였다.
 5. 抗癌劑의 副作用에는 防毒湯, 補中益氣湯, 升血湯, 理胃化結湯, 四君子湯, 脾腎方, 降逆湯, 扶正升血湯등의 處方을 中心으로 加減活用하는 方法을 提案할 수 있다.

參 考 文 獻

- 1 孫泰重編 : 病理學概論, 서울, 高文社, pp227-229, 1979
- 2 姜延良 :六味地黃湯防治腫留的實驗研究, 中醫雜誌, pp471-474, 1983
- 3 金韓燮 外 : 癌의 治法, 治方 및 治療藥物에 關한 文獻의 考察, 大韓韓醫學會誌, Vol.6, No.1, p.80, 1986.
- 4 李 文 : 如何正確選用抗癌中成藥, 中醫雜誌, 9:46-48, 1989
- 5 焦中華 : 中西結合治療高白細胞型急性白血病19例臨床分析, 中西醫結合雜誌, 8:502, 1989
- 6 鬱仁存 : 中西結合研究胃癌的現象和展望, 中西醫結合雜誌, 2:74, 1985.
- 7 徐龍生外 : 扶正培本法在腫留臨床上的應用, 浙江中醫學院學報, 3:23, 1988.
- 8 何任 : 腫留扶正祛邪治法初測, 浙江中醫學院學報, 1:1-4, 1989
- 9 浙江中醫學院學報編輯委員會 : 腫留-中醫藥防治癌症病人放化療副反應, 浙江中醫學院學報, 6:49, 1986.
- 10 錢燮卿 外 : 升血湯配合化療治療中, 晚期胃癌的臨床觀察及實驗研究, 中西醫結合雜誌, 12:7 15, 1987.

- 11 陳紹東：治癌獨議，上海中醫雜誌，4:12-13. 1989.
- 12 季宇彬 外：補中益氣湯對cyclophosphamide抗癌活性和毒性的影響，中國中藥雜誌，3:50, 1989
- 13 張慶楨，唐由君：42例急性白血病化療後的病機轉歸分析，山東中醫雜誌，6:28-29, 1990.
- 14 徐悔文：降逆湯防治腫瘤化療消化道反應三十七例，浙江中醫雜誌，1:5, 1989.
- 15 王寇庭：談中醫防治癌症的思路方法，中醫雜誌，7:45, 1989.
- 16 潘明繼 外：扶正生津湯配合放射治療鼻咽癌150例遠期療效觀察，中西醫結合雜誌，2:83, 1985.
- 17 金光 外：中藥防治腫瘤化療毒副反應509例臨床觀察，陝西中醫，11: 485, 1990.
- 18 李國友：中醫藥防治腫瘤化療後消化道毒副反應療效觀察，中西醫結合雜誌 第9卷 12期, pp751-752. 1989
- 19 劉鑄振 外：化療配合中藥治療多發性骨髓瘤10例療效觀察，中西醫結合雜誌 第7卷, 12期, pp742-743. 1987
- 20 王芳成：中西醫結合治胃癌用補法 寧邊中醫雜誌 第11卷, p24, 1980
- 21 易曠善：原發性肝癌的中醫藥臨床治療，浙江中醫雜誌 12號, pp562-564, 1989.
- 22 王濟民 外：中醫藥防治癌症的體會，浙江中醫雜誌，1:32-33, 1991.
- 23 徐英禧：竹葉石膏湯防治18例惡性骨腫化療毒副反應，中西醫結合雜誌 第8卷 12期, p725, 1989
- 24 廣陽汝忠：中醫藥減少抗癌藥毒副反應的臨床觀察，上海中醫藥雜誌，4:14.1989.
- 25 凌鴻英 外：中西醫結合治療原發性肝細胞癌的初步研究，中西醫結合雜誌 第 9卷 6期, pp348-349, 1989.
- 26 中醫研究院廣安門醫院腫瘤科：中西醫結合治療分析乳腺癌患者134例，中醫雜誌 3期, pp41-42, 1985.
- 27 于稱辛：健脾理氣法治療原發性肝癌臨床和機理的初步研究，中醫雜誌 7期, pp28, 1987.
- 28 蔡德政：黨蔘花粉治療放療化療所致造血功能障礙26例療效初步觀察，中醫雜誌 11期, pp25-26, 1987.
- 29 陳馥馨：中藥治療子宮頸癌規律探討，雲南中醫雜誌 1期, pp39-41, 1983.
- 30 劉邊淋：中藥治療晚期胃癌33例，陝西中醫 第 11卷 11期, pp1990.
- 31 周國雄：中西醫結合治療及研究急性白血病之進展，新中醫 6期, 1984.
- 32 王義明 外：中西結合用扶正攻癌療法治療晚期支氣管肺癌，福建中醫學雜誌, pp16-17,

1983.6.

- 33 金聖勳 : 四君子湯, 四物湯 및 八物湯이 Prednisolone으로 誘發된 생쥐의 免疫反應低下에 미치는 影響, 1987,2.
- 34 貝潤浦 : 中醫配合化學藥物治療腫瘤的體會, 癌症腫瘤醫論醫話精選 pp586-587, 1989.
- 35 金聖勳 外 : 東醫病理學, pp82-84, 1993.2.
- 36 王錦雲 : 扶正培本法治療惡性腫瘤積研究, 癌症腫瘤醫論醫話精選, pp101-104, 1989.
- 37 許延平 外 : 體液免疫指標對惡性腫瘤氣虛, 陰虛型患者測定的臨床意義, 浙江中醫雜誌 12期, p45, 1987.
- 38 李文鎬 外 : 內科學 卷下, 서울, 박애출판사, pp2446-2450, 2466-2475, 1976.
- 39 韓永棕編 : 고오스 藥理學, 서울, 汎文社, pp701-710, 1986.
- 40 金聖勳 外 : 東醫病理學, pp136-137, 1993.2.
- 41 金完熙 外 : 臟腑辨證論治, 서울, 成輔社, p228, 1988.
- 42 姜孝信 : 東洋醫學概論, 高文社, pp57-58.
- 43 李爲祿 : “扶正培本”與“活血化瘀”治療腫瘤的原理, 癌症腫瘤醫論醫話精選, pp83-85, 1989.
- 44 金秀真 : 補中益氣湯 및 少陰人補中益氣湯이 S-180에 대한 抗腫瘍效果와 cyclophosphamide에 의한 副作用에 미치는 影響, 大田大學校碩士學位論文, 1993
- 45 唐由君 外 : 42例急性白血病化療後的病機轉歸分析, 山東中醫雜誌 第9卷 6期, pp28-29, 1990.
- 46 金聖勳 外 : 東醫病理學, p118, 1993.2.
- 47 白承學 : 消積白朮散이 白鼠의 抗癌障礙에 미치는 影響, 大田大學校碩士學位論文, 1991.
- 48 張中植 : 蕃草湯이 S-180에 대한 抗腫瘤 效果와 cyclophosphamide에 依한 副作用減少에 미치는 影響, 大田大學校碩士學位論文, 1992
- 49 周雄順 外: 藥論惡性腫瘤 放化療後的中醫治療原則, 浙江中醫學院學報, 3:11-12, 1990.