

四象醫學의 醫學的 淵源과 李濟馬 醫學思想에 대한 研究 (東醫壽世保元 引用文을 중심으로)

朴性植 · 宋一炳

I. 緒論

東武 李濟馬 선생이 東醫壽世保元을 지어 四象醫學을 제창한 이후 오늘에 이르기까지 四象醫學에 대한 관심이 점차 높아지고 四象醫學의 기본 이론과 임상적 응용에 대한 研究가 활발하게 진행되고 있다.

특히 宋等^{23,24,25,26)}은 李濟馬의 학문적 淵源과 哲學的背景에 대한 研究에 중점을 두어 四象醫學이 既存의 醫學과는 달리 儒學的 배경을 근간으로 탄생한 학문임을 밝혀 四象醫學의 獨創性을 명확히 하였다.

東武는 東醫壽世保元 醫源論에서 자신이 醫學經驗이 있는지 5,6천년후에 태어나 前人의 저술을 바탕으로 우연히 四象人 臟腑性理를 얻었다고 밝히고, 歷代醫學의 흐름을 神農黃帝 이후 秦漢이전의 病證藥理는 張仲景이 전하여 醫道가 始興하고, 魏晉이후 隋唐 이전의 病證藥理는 朱肱이 전하여 醫道가 中興하고, 宋元이후 明이전의 病證藥理는 李梴 龔信 許浚이 전하여 醫道가 復興하였다고 하여 既存의 醫學史를 요약하였다. 더불어 歷代醫家の 勤勞功業을 論하면서 張仲景 朱肱 許浚을 첫째로 꼽고 李梴 龔信을 그 다음으로 두었다.

이처럼 東武는 자신의 醫學이 既存醫學의 經驗을 바탕으로 하여 성립되었음을 말하면서 나아가 四象醫學이 既存醫學의 연장선상에서 나타난 발전적 醫學임을 제시하고 있다. 한편 東武는 역대의가들 중 許浚을 首位로 언급하면서도 東醫壽世保元에서 許浚의 著書는 한번도 引用하지 않고 있다.(東醫壽世保元 病證論에는 20餘種의 醫書에서 137條文이 引用되어 있다.)

東武는 東醫壽世保元 性命論 四端論 擴充論 臟腑論에서 四象哲學을 밝히고, 醫源論과 病證論에서 既存의 醫學과 比較說明하면서 새로운 측면에서 醫學精神을 論하고 있다.

四象醫學의 學問的 淵源과 誕生背景은 哲學的 측면과 醫學的 측면으로 구분할 수 있다.

哲學的 측면에서 李濟馬 四象醫學의 배경은 儒學思想을 근간으로 한 四象哲學(事心身物論)이 바탕이 된다. 즉 既存醫學은 자연과 인간사이의 관계를 大宇宙와 小宇宙라는 시각에서 출발한 自然中心思想인 陰陽五行論으로 天人關係의 人間觀을 나타내고 있다면, 四象醫學은 사람(自己)과 사람(他人)사이의 관계(작게는 個人現象, 크게는 社會現象을 포함한다)를 이해하고자 하는 人間中心思想에 바탕을 둔 心身關係의 人間觀을 설명하고 있

* 경희대학교 한의과대학 사상의학교실

다고 하였다.^{24,25)}

그러나 醫學의 측면에서 既存의 醫學과 四象醫學의 聯關係에 대한 설명은 아직 분명하지 않다.

著者は 東武의 醫學史觀에 나타난 許浚에 대한 평가를 動機로 하여 본 研究를 시도하여 四象醫學의 醫學的 측면에서의 淵源과 背景을 밝히고, 四象醫學이란 독창적 醫學이 중국이 아닌 바로 우리나라에서 탄생할 수 밖에 없었던 이유에 대해 약간의 知見을 얻었기에 보고하는 바이다.

II. 研究方法

東武의 醫學의 측면에서 새로운 精神이 나타나 있는 東醫壽世保元 醫源論과 病證論을 중심으로 본 研究를 진행하였다.

특히 東醫壽世保元의 病證論 중 既存醫書에서 引用한 病證들(이하 引用文)을 중심으로 원본과 東醫壽世保元의 引用文을 대조하였다.

나아가 東醫壽世保元의 모든 引用文을 許浚 東醫寶鑑에서 찾아 비교하였다.

東武는 東醫壽世保元의 引用文 중 東醫寶鑑 이후의 문헌은 한번도 引用한 적이 없으며, 醫源論 중 本草에 대한 언급에서 引用된 문헌이 모두 東醫寶鑑 集例에 引用된 문헌으로만 되어 있고, 本草의 집대성을 이룬 明代 李時珍의 本草綱目은 제외되어 있다.

따라서 著者は 東醫壽世保元 病證論의 모든 引用文이 東醫寶鑑 어디인가에 나타나 있을 것이라는 信念으로 東醫寶鑑 전반에 걸쳐 같은 문장을 찾아 확인하고자 하였다.

東醫壽世保元의 引用文들과 東醫寶鑑 그리고 引用文의 原書를 대조 비교하는데 있어서 편의성을 도모하고자 아래와 같이 하였다.

- 1) 東醫壽世保元은 引用病證들을 조항별로 나누어 편찬한 四象醫學原論(이을호 흥순용편, 행림출판)을 위주로 하여 각 引用文을 하나의 조항으로 정하였다.
- 2) 연속되어 引用된 문장은 東醫壽世保元의 형식을 따라 별도로 引用文獻을 표시하지 않고 순서대로 번호를 붙였다.
- 3) 東醫寶鑑(許浚著, 남산당발행)을 위주로 하여 각 조항마다 (동:p000)의 형식으로 해당 페이지를 명시하였다.
- 4) 引用文 중 가장 많이 引用된 張仲景 傷寒論은 傷寒論譯詮(채인식편, 고문사)을 위주로 하고 傷寒論譯詮의 조문번호를 (채:000조)의 형식으로 명시하였다.
- 5) 나머지 모든 引用文은 原著者의 책을 중심으로 하고자 하였다.
- 6) 다만 東醫壽世保元에서 “朱震亨 丹溪心法曰”로 引用된 문장은 著者가 丹溪心法을 구하지 못해 확인하지 못하고 丹溪心法附餘를 사용하였다.

III. 文獻材料 및 本論

A. 少陰人 腎受熱表熱病論

A-1. 張仲景 傷寒論曰 發熱惡寒脈浮者 屬表 卽太陽證也.

동:P379 태양형중용약) 發熱惡寒脈浮者 屬表 卽太陽證也.

채:1조 태양之爲病 其脈浮 頭項強痛而惡寒

2조 태양病 發熱 汗出 惡風 脈緩者 名爲中風

3조 태양病 或已發熱 或未發熱 必惡寒 體痛

嘔逆 脈陰陽俱緊者 名曰傷寒

傷寒論에는 같은 문장이 없다.

A-2. 太陽傷風脈 陽浮而陰弱 陽浮者 熱自發 陰

弱者汗自出 齏齏惡寒 浙浙惡風 翁翁發熱 鼻鳴乾嘔 桂枝湯主之.

동:p380 태양상풍) 太陽傷風脈 陽浮而陰弱 陽浮者 熱自發 陰弱者 汗自出 齏齏惡寒 浙浙惡風 翁翁發熱 鼻鳴乾嘔者 桂枝湯主之.(중경)
채:13조 태양중풍 陽浮而陰弱 陽浮者 熱自發 陰弱者 汗自出 齏齏惡寒 浙浙惡風 翁翁發熱 鼻鳴乾嘔者 桂枝湯主之

A-3. 危亦林 得效方曰 四時瘟疫 當用香蘇散.

동:p526 은역문, 향소산) 香蘇散 治四時瘟疫 香附子三錢 紫蘇葉二錢半 陳皮一錢半 蒼朮 甘草各一錢 右剉作一貼 入薑三蔥白二 水煎服(得效)
世醫得效方:p21 卷第一, 傷寒和解) 香蘇散 一方加沈香 名沈香飲子 治四時傷寒傷風傷濕傷食 大小兒皆服 香附子五兩炒去毛 紫蘇去根二兩半 陳皮二兩 甘草二兩 蒼朮二兩切片米泔浸炒黃 右剉散 每服四錢 水盞半 生薑三片 蔥白二根煎 不拘時候 得平爲妙.

A-4. 龔信醫鑑書曰 傷寒頭痛身疼 不分表裏證 當用藿香正氣散.

동:p386 한문, 상한음증 곽향정기산) 藿香正氣散 治傷寒陰證 頭痛身疼如不分表裏證 以此導引經絡 不致變動 藿香一錢半 紫蘇葉一錢 白芷 大腹皮 白茯苓 厚朴 白朮 陳皮 半夏製 桔梗 甘草炙 各五分 右剉作一貼 薑三片 棗二枚 水煎服(醫鑑)
古今醫鑑:p127 곽란) 藿香正氣散 治四時不正之氣 寒溫時疫 山嵐瘴氣 兩濕蒸蒸或中寒腹痛吐利 中暑冒風 中濕身重泄瀉 或不服水土 脾胃不和 或飲食停滯 復感外邪 頭痛發熱 戰慄惡寒 或嘔吐惡心 膈膈滿悶 一切氣逆不安之症 并能調治. 藿香二錢 紫蘇一錢五分 陳皮一錢 厚朴薑制一錢 半夏薑制一錢 白朮一錢 茯苓一錢 大腹皮一錢

桔梗一錢 甘草炙一錢 上剉一劑 生薑三片 棗二枚 水煎熱服.

古今醫鑑:p123 설사) 藿香正氣散 治感濕泄瀉 或兼暑者.

東醫寶鑑 集例에 古今醫鑑 萬病回春 2권을 本朝人 龔信所著라 하였다.

A-5. 張仲景曰 太陽病脈浮緊 發熱無汗而衄者 自愈也.

동:p397 상한혈증) 太陽病 脈浮緊 發熱無汗而衄者 自愈也.(중경)

채:48조 태양병 脈浮緊 發熱 身無汗 自衄者愈

A-6. 太陽病六七日 表證因在 脈微而沈反不結胸 其人如狂者 以熱在下焦 小腹當滿 小便自利者 下血乃愈 抵當湯主之.

동:p397 상한혈증) 太陽病六七日 表證因在 脈微而沈反不結胸 其人如狂者 以熱在下焦 小腹當滿 小便自利者 下血乃愈 抵當湯主之.(중경)

채:131조 태양병 六七日 表證仍在 脈微而沈 反不結胸 其人發狂者 以熱在下焦 小腹當硬滿 小便自利者 下血乃愈 所以然者 以太陽 隨經瘀熱在裏故也 抵當湯主之.

A-7. 太陽證 身黃發狂 小腹硬滿 小便自利者 血證 宜抵當湯, 傷寒 小腹滿 應小便不利 今反利者 以有血也.

동:p397 상한혈증) 太陽證 身黃發狂 小腹硬滿 小便自利者 血證諦也 宜抵當湯.(중경)

傷寒 小腹滿 應小便不利 今反利者 爲有血也. 當下之 宜抵當丸.(중경)

채:132조 태양병 身黃 脈沈結 少腹硬 小便不利者 爲無血也 小便自利 其人如狂者 血證諦也 抵當湯主之.

133조 傷寒有熱 小腹滿 應小便不利 今反利者

爲有血也。當下之 不可餘藥 宜抵當丸。

A-8. 太陽病不解 熱結膀胱 其人如狂 血自下者自愈 但小腹急結者 宜攻之 宜桃仁承氣湯。

동:p397 상한혈증) 太陽病不解 熱結膀胱 其人似狂 若血自下者自愈 但小腹急結者 宜攻之 宜桃仁承氣湯.(중경)

채:111조 太陽病 不解 熱結膀胱 其人如狂 血自下 下者愈 其外不解者 尙未可攻 當先解外 外解已 但小腹急結者 乃可攻之 宜桃核承氣湯

A-9. 太陽病 外證 未除而數下之 遂下利不止 心下痞硬 表裏不解 人參桂枝湯主之。

동:p396 상한비기) 太陽病 外證 未除而數下之 遂下利不止 心下痞硬 表裏不解 桂枝人參湯主之.(중경)

채:171조 太陽病 外證未除 而數下之 遂協熱而利 下利不止 心下痞硬 表裏不解 桂枝人參湯主之。

A-10. 張仲景曰 婦人 傷寒 發熱 經水適來適斷 晝日明了 夜則譫語 如見鬼狀 此爲熱入血室 無犯胃氣及 上二焦必自愈。

동:p400 열입혈실증) 婦人以血爲主 血室卽衝脈血海也 婦人 傷寒 發熱 經水適來適斷 晝日明了 夜則譫語 如見鬼狀 此爲熱入血室 無犯胃氣及上二焦 必自愈. 活人書云 小柴胡湯加生地黄主之 犯胃氣謂下之 犯上二焦謂發汗也.(중경)

채:153조 婦人中風 七八日 續得寒熱 發作有時 經水適斷者 此爲熱入血室 其血必結 故使如瘧狀 發作有時 小柴胡湯主之

A-11. 陽明病 口燥 但欲漱水 不欲嚥者 此必衄不可下

동:p381 양명병금기) 陽明病 口燥 但欲漱水 不欲嚥者 此必衄 不可下 宜用犀角地黄湯.(중경)

채:211조 陽明病 口燥 但欲漱水 不欲嚥者 此必衄

A-12. 陽明病 不能食 攻其熱必噦, 傷寒嘔多 雖有陽明不可攻, 胃家實 不大便 若表不解 及有半表先以桂枝 柴胡 和解 乃可下也。

동:p381 양명병금기) 陽明病 不能食 攻其熱必噦, 所以然者 胃氣虛冷故也. 傷寒嘔多 雖有陽明不可攻也.

胃家實 不大便 若表不解及有半表者 先用桂枝柴胡和解之 乃可下也.

채:203조 陽明病 不能食 攻其熱 必噦, 所以然者 胃中虛冷故也 以其人 本虛故攻其熱 必噦

A-13. 張仲景曰 陽明之爲病 胃家實也 問曰 緣何得陽明病 答曰 太陽病 發汗 若下 利小便者 此亡津液 胃中乾燥 因轉屬陽明 不更衣內實大便難者 此名陽明病也。

동:p381 양명병유삼) 陽明之爲病 胃家實也 問曰 緣何得陽明病 答曰 太陽病 發汗 若下 利小便者 此亡津液 胃中乾燥 因轉屬陽明 不更衣內實大便難者 此名陽明病也.(중경)

채:188조 陽明之爲病 胃家實也 189조 問曰 何緣得陽明病 答曰 太陽病 發汗 若下 若利小便 此亡津液 胃中乾燥 因轉屬陽明 不更衣內實大便難者 此名陽明病也.(중경)

A-14. 傷寒轉屬陽明 其人戢然微汗出也。

동:p381 양명의증) 傷寒轉屬陽明 其人戢然微汗出也.

채:197조 傷寒轉屬陽明者 其人戢然微汗出也.

A-15. 傷寒 若吐若下後 不解 不大便 五六日 至十餘日 日晡所發潮熱 不惡寒狂言如見鬼狀 若劇者 發則不識人 循衣摸床 惕而不安 微喘直視 脈弦者 生 脈澀者死。

동:p381 양명병약후) 傷寒 若吐若下後 不解 不大便 五六日 至十餘日 口喎所發潮熱 不惡寒 狂言如見鬼狀 若劇者發則不識人 循衣摸床 惕而 不安 微喘直視 脈弦者生 脈澹者死.(중경)
 채:222조 傷寒 若吐若下後 不解 不大便 五六日 上至十餘日 口喎所發潮熱 不惡寒獨狂語如見鬼 狀 若劇者 發則不識人 循衣摸床 惕而不安 微喘 直視 脈弦者生 澹者死. 微者但發熱 譫語者 大承 氣湯主之 若一服利 止後服

A-16. 許叔微 本事方曰 一人 病傷寒 大便秘利 口喎發潮熱 手循衣縫 兩手撮空 直視喘急 諸醫皆 走走 此誠惡候 仲景雖有證而無法 但云脈弦者生 脈澹者死 設且救之 與小承氣湯一服而 大便秘利 諸疾 漸退 脈且微弦半月愈.

동:p381 양명병약후) 一人 病傷寒 大便秘利 日 喎發潮熱 手循衣縫 兩手撮空 直視喘急 諸醫皆 走 此誠惡候 仲景雖有證而無法 但云脈弦者生 脈澹者死 設且救之 與小承氣湯一服而 大便秘利 諸疾漸退 脈且微弦半月愈. 或問曰 脈弦者生何也 ……(본사)

普濟本事方:p128) 又有人病傷寒 大便秘利 日喎 發潮熱 手循衣縫 兩手撮空 直視喘急 諸醫皆走 予曰 此誠惡候 初得之者十中九死 仲景雖有證而 無法 但云脈弦者生 脈澹者死 已經吐下 難於用 藥 設且救之 若大便得通而脈弦者 庶可治也 與 小承氣湯一服 而大便秘利 諸疾漸退 脈且微弦 半 月愈 或人問曰 下之而脈弦者生 此何意也

A-17. 王好古 海藏書曰 一人 傷寒發狂欲走 脈 虛數 用柴胡湯反劇 以參芪歸朮陳皮甘草煎湯一服 狂定再服 安睡而愈.

동:p381 양명허중의보) 一人 傷寒發狂欲走 脈虛 數 用柴胡湯反劇 以參芪歸朮陳皮甘草煎湯一服 狂定再服 安睡而愈.(海藏)

해장서:확인불가

王好古의 號가 海藏이나 海藏齋라는 著號는 없다.

다만 東醫寶鑑 集例에서 醫壘元戎 醫家大法 湯 液本草 3권을 元代 王好古의 著書라하고 그의 號는 海藏이라 하였다. 그리고 東醫寶鑑에서 실제 引用文을 밝힐 때 세권의 著者를 분명히 구분하 여 언급하지 않고 모두 (海藏)이라고만 표시하고 있다. 따라서 東武가 東醫寶鑑에 引用文이 표시된 그대로 引用했다고 보여진다.

A-18. 醫學綱目曰 傷治循衣摸床者數人 皆用大 補氣血之劑 惟一人兼調振脈代遂於補劑中略加桂 亦振止脈和而愈.

동:p381 양명허중의보) 嘗治循衣摸床者數人 皆 用大補氣血之劑 惟一人兼調振脈代遂於補劑中略 加桂 亦振止脈和而愈.(綱目)

醫學綱目:卷三十一 p21 傷寒部) 嘗治循衣摸床者 數人 皆用大補氣血之劑 惟唯一人兼調振 脈代 遂於補劑中略加桂二分 亦振止脈和而愈.

東武는 모든 引用文을 처음 引用할 때는 항상 著者와 號名을 함께 밝히고 있으나 醫學綱目만은 著者를 언급하지 않고 있다.

이는 許浚이 東醫寶鑑 集例에서 引用 때마다 著 者를 밝히고 있으나 醫學綱目에서만은 本朝人所 撰으로만 되어있고 著者가 표시되어 있지 않다. 따라서 東武가 著者名을 확인하지 못한 것으로 보인다.

실제 醫學綱目은 明代 樓英(字, 全善)(1332- 1401)의 著書이다.

A-19. 成無己 明理論曰 潮熱屬陽明 必於日晡時 發者乃爲潮熱也. 陽明之爲病 胃家實也 胃實則譫語 手足戢然汗出者 此大便已硬也. 譫語有潮熱 承氣湯 下之 熱不潮者勿服.

동:p395 상한조열) 潮熱者若潮水之潮 其來不實

是也 一日一發指時而發者謂之潮熱若日主五發者是即發熱 非潮熱也 潮熱屬陽明 必於日晡時發者乃爲潮熱也 陽明之爲病胃家實也 胃實則譫語(明理) p381 양명실증의하) 手足戢然汗出者 此大便已硬也. 譫語有潮熱 承氣湯下之 熱不潮者勿服.(明理) 명리론:p567 潮熱第五) 潮熱屬陽明 必於日晡時發者 乃爲潮熱 p571 手足汗弟九) 手足戢然汗出者 此大便必硬也 手足戢然汗出大便難而譫語者 下之則愈

A-20. 朱震亨 丹溪心法曰 傷寒懷證 昏沈垂死一切危急之證 好人參一兩 水煎一服而盡汗者鼻梁上出 涓涓如水.

동:p406 외감내상허증의보) 一婦年七十患 傷寒發熱惡寒 諸醫以藥發散 旬日不效飲食漸小 昏沈不省 口不能言 眼不能開 咽喉有微氣 有欲絕之候 六脈虛微若無 以人參煎湯 徐徐灌之 連用頓甦 又歷四十年而卒 夫人參迴元氣於無何有之鄉果有起死迴生之功 醫說載一人傷寒成懷證 只服人參湯鼻梁出汗而愈與此同(回春)

단계심법부여:p137 懷證奪命散) 治傷寒 汗下後不解 或投藥錯誤 治病人困重 垂死昏沈 或陰陽二證不明 七日以後皆可服 好人參一兩去蘆 右爲片 水二鐘於銀石器內 熬至一鍾 溫服 病人喜冷以新水沈冷服之 渣再煎服 連進數服 服之鼻尖上潤汗出 是其應也

단계심법원본은 구할 수 없어 확인하지 못했다. 다만 단계심법부여에서 찾아보았으나 비슷하지만 꼭 같지는 않고 東醫寶鑑에서도 꼭 같지는 않으나 좀더 유사하다.

A-21. 張仲景曰 陽明病 外證 身熱汗自出 不惡寒反惡熱

동:p381 양명외증) 陽明外證云何 答曰 身熱 汗

自出 不惡寒 反惡熱也

채:190조 問曰 陽明病外證云何 答曰 身熱 汗自出 不惡寒 反惡熱也

A-22. 傷寒陽明病 自汗出 小便數則 津液內竭 大便必難 其脾爲約 麻仁丸主之.

동:p196 대변문, 비약중) 傷寒陽明病 自汗出 小便數則 津液內竭 大便必難 其脾爲約 脾約丸主之.(중경)(脾約丸은 一名 麻仁丸이다 동:p196)

채:256조 跌陽脈 浮而澹 浮則胃氣強 澹則小便數 浮澹相博 大便則硬 其脾爲約麻仁丸主之

A-23. 陽明病 自汗出 小便自利者 此津液內竭 大便雖硬 不可攻之 宜用蜜導法通之.

동:p381 양명병금기) 陽明病 自汗出 小便自利者 此津液內竭 大便雖硬 不可攻之 宜用蜜導法通之.

채:242조 陽明病 自汗出 若發汗 小便自利者 此津液內竭 雖硬 不可攻之 當須自欲大便 宜用蜜導法通之 若土瓜根及大豬膽汁 皆可爲導

A-24. 陽明病 發熱汗多者 急下之 宜大承氣湯.

동:p381 양명외증) 陽明病 發熱汗多者 急下之 宜大承氣湯.(중경)

채:262조 陽明病 發熱汗多者 急下之 宜大承氣湯.

A-25. 李梴 醫學入門曰 汗多不止 謂之亡陽 如心痞胸煩 面青膚靨者 難治 色黃手足溫者可治 凡汗漏不止 眞陽脫亡故 謂之亡陽 其身必冷 多成痺寒 四肢拘急 桂枝附子湯主之.

동:p125 진액문, 망양증) 凡汗多不止 謂之亡陽 又汗不得出 亦謂之亡陽 如必胸煩 面青膚靨者 難治 色黃手足溫者可治(入門) 汎汗滿不止 眞陽脫亡故 謂之亡陽 其身必冷 多成痺寒矣(入門) 凡發汗過多則 陽虛不固 汗出多則 津液亡而小便難

四肢者諸陽之本 液脫者骨屬屈伸不利 是以四肢拘急 桂枝附子湯主之。(入門)

의학입문:p294 상한문, 漏汗) 體虛者 漏汗不止 眞陽脫亡 凡汗不得者 謂之亡陽 汗多不止者 亦謂之亡陽 如心痞胸煩 面青膚潤者 難治 色黃手足溫者可治 因太陽證者 桂枝湯加附子

p314 상한문, 계지부자탕) 方意以過汗則 陽虛不固 汗出多則 津液亡而小便難 四肢諸陽之本 液脫者骨屬屈伸不利 是以用桂枝甘草辛甘以溫經 附子辛熱 薑棗辛甘 通津液以和表也 如裏寒去芍藥 小便利去桂枝加白朮

A-26. 張仲景曰 陽明病有三病 太陽陽明者 脾約是也 正陽陽明者 胃家實是也 少陽陽明者 發汗利小便 胃中燥煩實 大便難是也

동:p381 양명병유삼) 病有太陽陽明 有正陽陽明 有少陽陽明 何謂也 答曰 太陽陽明者 脾約是也 正陽陽明者 胃家實是也 少陽陽明者 發汗利小便 胃中燥煩實 大便難是也.(중경)

채:187조 問曰 病有太陽陽明 有正陽陽明 有少陽陽明 何謂也 答曰 太陽陽明者 脾約是也 正陽陽明者 胃家實是也 少陽陽明者 發汗利小便已 胃中燥煩實 大便難是也

A-27. 張仲景曰 厥陰證 手足厥冷 小腹痛 煩滿 囊縮 脈微欲絕 宜當當歸四逆湯

동:p385 율음병변만낭축) 厥陰證 手足厥冷 小腹痛 煩滿囊縮 脈微欲絕 宜當當歸四逆湯.(중경)

채:358조 手足厥寒 脈細欲絕者 當歸四逆湯主之

A-28. 凡厥者 陰陽氣 不相順接 便爲厥 厥者 手足逆冷是也.

동:p385 율음병수족율냉) 凡厥者 陰陽氣 不相順接 便爲厥 厥者 手足逆冷是也.

채:344조 凡厥者 陰陽氣 不相順接 便爲厥 厥者

手足逆冷是也.

A-29. 傷寒六七曰 尺寸脈 微緩者 厥陰受病也 其證 小腹痛滿而 囊縮 宜用 承氣湯下之

동:p385 율음병변만낭축) 傷寒六七曰 尺寸脈 微緩者 厥陰受病也 其證 小腹痛滿而 囊縮 宜用 承氣湯下之.(중경)

채:참고350조 傷寒 六七曰 脈微 手足厥冷 煩躁 灸厥陰 厥不還者 死

A-30. 六七曰 脈至皆大 煩而口燥 不能言 躁擾者 必欲解也

동:p402 상한옥해) 六七曰 脈至皆大 煩而口燥 不能言 躁擾者 必欲解也.(중경)

채:참고276조 傷寒六七曰 無大熱 其人躁煩者 此爲陽去入陰故也

A-31. 朱肱 活人書曰 厥者 手足逆冷 是也 手足指頭 微寒者 謂之清 此疾爲輕 陰厥者初得病 便四肢厥冷 脈沈微而不數 足多舉

동:p388 상한음율) 厥者 手足逆冷 是也 其手足指頭 微寒者 謂之清 此疾爲輕(중경) 陰厥者 初得病 便四肢厥冷 脈沈微而不數 足多舉 臥時惡寒.....(중경)

황인서:p134 二十八問) 問手足厥冷 此名厥也 厥者逆也 陰陽不相順接 手足厥冷也

p121 十八問).....乾薑甘草湯 手足指頭 微寒冷 謂之清

p135 二十八問) 冷厥者 初得病 日便四肢逆冷 脈沈微而不數 足多舉 臥而惡寒.....

A-32. 傷寒六七曰 煩滿囊縮 尺寸俱微緩者 足厥陰經受病也 其脈微浮 爲欲愈 不浮爲難愈 脈浮緩者 必囊不縮 外證 必發熱惡寒 爲欲愈 宜桂麻各反湯 若尺寸 俱沈短者 必囊縮 毒氣入腹 宜承氣湯下

之 速用 承氣湯可保 五生一死 六七曰 脈微浮者 否極泰來 水升火降 寒熱作而大汗解矣

동p384 권음형중용약) 傷寒六七曰 煩滿囊縮 尺寸俱微緩者 足厥陰經受病也 其脈微浮 爲欲愈 不浮爲難愈 脈浮緩者 必囊不縮 外證 必發熱惡寒似瘧 爲欲愈 宜桂麻各半湯 若尺寸 俱沈短者 必囊縮 毒氣入腹 宜承氣湯下之(活人) 大抵傷寒病臟腑傳變陽經先受病故……速用 承氣湯下之可保 五生一死(活人) 若六七曰傳厥陰 脈得微緩 微浮爲脾胃脈也 故知脾氣全不受剋邪無所容 否極泰來 榮衛將復 水升火降則 寒熱作而大汗解矣(活人)

활인서:p77 六問) 問傷寒六七曰 煩滿囊縮 其脈尺寸俱微緩 此足厥陰經受病也 厥陰病 其脈微浮爲欲愈 不浮爲難愈 宜小建中湯 脈浮緩者 必囊不縮 外證 必發熱惡寒似瘧 爲欲愈 宜桂枝麻黃各半湯 若尺寸脈 俱沈短者 必是囊縮 毒氣入腹 宜承氣湯下之

A-33. 諸手足厥冷 皆屬厥陰 不可汗下 然有須汗 須下者 謂手足 雖逆冷 時有溫時 手足掌心必煖 非正厥逆 當消息之

동:p385 권음형중용약) 諸手足厥冷 皆屬厥陰 不可汗下 然有須汗 須下者 謂手足 雖逆冷 時有溫時 手足掌心必煖 非正厥逆 當消息之(活人)

활인서:p137 二十八問) 諸手足厥冷 皆屬厥陰 不可下 不可汗 然有須下 須汗證者 謂手足雖逆冷 時有溫時 手足掌心必煖 非正厥逆也 當消息之

A-34. 李梴曰 舌卷厥逆 冷過肘膝 小腹絞痛 三味蓼黃湯 四順湯主之 囊縮手足乍冷乍溫煩滿者 大承氣湯主之

동:p384 권음형중용약) 厥陰心包絡爲標 故舌卷厥逆 冷過肘膝 小腹絞痛 三味蓼黃湯 四順湯主之 肝爲本 故男則囊縮 女則乳縮 手足乍冷乍溫

煩滿者 大承氣湯主之(入門).

醫學입문:p276 상한문 표본) 厥陰心包絡爲標 故舌卷厥逆 冷過肘膝 吐沫嘔逆不渴 小腹絞痛者爲寒 三味蓼黃湯 四順湯 肝爲本 主男子囊縮 女人陰挺 乳縮 或手足乍冷乍溫 大便實 消渴煩滿者 屬熱 大承氣湯

A-35. 朱肱曰 厥陰病 消渴 氣上衝心 心中疼熱 飢不欲食 食則吐蛔

동:p384 권음형중용약) 厥陰之爲病 消渴 氣上衝心 心中疼熱 飢不欲食 食則吐蛔(活人)

활인서:p139 이십구문) 問吐長蟲 此名蛔厥也 蛔厥者 臟寒 蛔上入膈 其人吐蛔也 此是厥陰證

A-36. 龔信曰 傷寒有吐蛔者 雖有大熱 忌下涼藥 犯之必死 蓋胃中有寒則 蛔不安所而 上膈 大凶之兆也 急用理中湯

동:p398 상한토회) 傷寒有吐蛔者 雖有大熱 忌下涼藥 犯之必死 蓋胃中有寒則 蛔不安所而 上膈 大凶之兆也 急用理中湯加烏梅二箇 紅椒十粒 煎服 待蛔定却以小柴胡湯退熱(醫鑑)

고금의감:p61 六經證) 一治傷寒 若有吐蛔者 雖有大熱 忌下涼藥 犯之必死 蓋胃中有寒 則 蛔上膈 大凶之兆 急用炮乾薑理中湯一服 加烏梅二箇 川椒十粒 煎服 待蛔定却以小柴胡湯退熱 蓋蛔聞酸則定 得苦則安矣

B. 少陰人 胃受寒裏寒病論

B-1. 張仲景曰 太陰之證 腹滿而吐 食不下 自利益甚 時腹自痛

동:p382 태음형중용약) 太陰之爲病 腹滿而吐 食不下 自利益甚 時腹自痛

채:280조 太陰之爲病 腹滿而吐 食不下 自利益甚 時腹自痛 若下之 必胸下結硬

B-2. 腹滿時痛 吐利不渴者 爲太陰 宜四逆湯 理中湯 腹滿不減 減不足言 宜大承氣湯

동:p382 태음형중용약) 腹滿時痛 吐利不渴者 爲太陰 宜四逆湯 理中湯 腹滿不減 減不足言 宜大承氣湯

채:284조 自利不渴者 屬太陰 以其藏有寒故也 當溫之 宜服四逆輩

286조 本太陽病 醫反下之 因爾腹滿時痛者 屬太陰也

264조 腹滿不減 減不足言 當下之 宜大承氣湯

B-3. 傷寒 自利不渴者 屬太陰 以其藏有寒故也 當溫之 宜用四逆湯

동:p382 태음형중용약) 傷寒 自利不渴者 屬太陰 以其藏有寒故也 當溫之 宜用四逆湯(중경)

채:284조 自利不渴者 屬太陰 以其藏有寒故也 當溫之 宜服四逆輩

B-4. 太陰證 腹痛自利不渴 宜理中湯 理中丸 四順理中湯丸 亦主之

동:p382 태음형중용약) 太陰證 腹痛自利不渴 宜理中湯 理中丸 四順理中湯丸 亦主之.(중경)

채:참고 284조 自利不渴者 屬太陰 以其藏有寒故也 當溫之 宜服四逆輩

B-5. 張仲景曰 病發於陰而反下之 因作痞 傷寒嘔而發熱者 若心下滿而不痛 此爲痞 半夏瀉心湯主之 胃虛氣逆者 亦主之

동:p396 상한비기) 病發於陰而反下之 因作痞(중경) 傷寒嘔而發熱者 若心下滿而不痛 此爲痞 半夏瀉心湯主之 胃虛氣逆者 亦主之(중경)

채:137조 病發於陽 而反下之 熱入因作 結胸 病發於陰 而反下之 因作痞 所以成結胸者 以下之 太早故也

157조 傷寒五六日 嘔而發熱者……但滿而不痛者 此爲痞 柴胡不中與之 宜半夏瀉心湯

B-6. 下後 下利日數十行 穀不化 腹雷鳴 心下痞硬 乾嘔心煩 此乃結熱 乃胃中虛 客氣上逆故也 甘草瀉心湯主之

동:p396 상한비기) 下後 下利日數十行 穀不化 腹雷鳴 心下痞硬 乾嘔心煩 此乃結熱 乃胃中虛 客氣上逆故也 甘草瀉心湯主之.(중경)

채:166조 傷寒中風 醫反下之 其人下利 日數十行 穀不化 腹中雷鳴 心下痞硬而滿 乾嘔 心煩 不得安 醫見心下痞 謂病不盡 復下之 其痞益甚 此非結熱 但以胃中虛 此乃結熱 乃胃中虛 客氣上逆故也 甘草瀉心湯主之

이 조문은 傷寒論에서는 此非結熱로 되어 있으나 東醫寶鑑에서 此乃結熱로 잘못 옮긴 것을 이제마가 그대로 인용한 것임.

B-7. 太陰證 下利清穀 若發汗則 必脹滿 發汗後 腹脹滿 宜用厚朴半夏湯

동:p382 태음병복창안) 太陰證 下利清穀 若發汗則 必脹滿(중경) 發汗後 腹脹滿 宜用厚朴半夏湯(중경)

채:372조 下利清穀 不可攻表 汗出 必脹滿

67조 發汗後 腹脹滿者 厚朴半夏甘草人蔘湯主之

B-8. 汗解後 胃不和 心下痞硬 脇下有水氣 腹中雷鳴 下利者 生薑瀉心湯主之

동:p396 상한비기) 汗解後 胃不和 心下痞硬 脇下有水氣 腹中雷鳴 下利者 生薑瀉心湯主之(중경)

채:165조 傷寒 汗出解之後 胃中不和 心下痞硬 乾噉食臭 脇下有水氣 腹中雷鳴 下利者 生薑瀉心湯主之

B-9. 傷寒下利 心下痞硬 服瀉心湯後 以他藥下之 利不止 與理中湯 利益心 赤石脂禹餘糧湯主之

동:p383 소음병자리) 傷寒下利 心下痞硬 服瀉心湯後 以他藥下之 利不止 與理中湯 利益心理中者理中焦 此利在下焦 赤石脂禹餘糧湯主之(중경) 채:167조 傷寒 服湯藥 下利不止 心下痞硬 服瀉心湯已 復以他藥下之 利不止 醫以理中與之 利益甚 理中者理中焦 此利在下焦 赤石脂禹餘糧湯主之 復利不止者 當利其小便

B-10. 張仲景曰 傷寒陰毒病 面青身痛如被杖 五日可治 七日不治

동:p389 상한음독) 傷寒陰毒病 面青身痛如被杖 咽喉痛 五日可治 七日不可治 甘草湯主之(중경) 金匱要略:p361 百合狐惑陰陽毒病證治弟三) 傷寒陰毒之病 面青身痛如被杖 咽喉痛 五日可治 七日不可治 承麻鼈甲湯去雄黃蜀椒主之

東武는 東醫壽世保元에서 引用文을 引用할 때 著者와 書名을 밝히고 있으며 少陰人病 첫머리에 張仲景 傷寒論曰이라고하고 이후부터는 모두 張仲景曰이라고만 칭하고 있다. 그러나 이 조문은 傷寒論에는 없고 金匱要略에서 확인된다.

이 또한 許浚이 東醫寶鑑 集例에서 傷寒論과 金匱玉函經을 引用하고 漢張機所著라고 밝히고 있으나 실제 病證을 引用할 때는 이를 구분하지 않고 (仲景)이라고만 표시하고 있다. 따라서 東武도 東醫寶鑑을 따라 모두 仲景으로만 표시한 것으로 보인다.

B-11. 李挺曰 三陰病深 必變爲陰毒 其證 四肢厥冷 吐利不渴 靜躁而臥 深則咽痛 鄭聲加以頭痛 頭汗 眼睛內痛 不欲見光 面唇指甲青黑 身如被杖 又此證 面青白黑 四肢厥冷多睡.

동:p388 (傷寒음독) 傷寒三陰病深 必變爲陰毒 其證 四肢厥冷 吐利不渴 靜躁而臥 深則咽痛 鄭聲加以頭痛 頭汗 眼睛內痛 不欲見光 面唇指甲青黑 手背冷汗 心下結硬 臍腹築痛 身如被杖 外腎水

冷 其脈附骨取之則有接之則無 宜甘草湯 正陽散 陽氣乍復 或生煩燥者 返陰丹 復陽丹用之 不可涼藥(入門) 又此證 面青舌黑 四肢厥冷多睡(입문)

입문:p302 상한문 음독) 三陰病深 必變爲陰毒·····外證比常 陰證厥冷 吐利不渴 靜躁 深則咽痛 鄭聲 加以頭痛 頭汗 眼睛內痛 不欲見光 面唇指甲青黑 手背冷汗 心下結硬 臍腹築痛 身如被杖 外腎水冷 或便膿血 診其脈附骨 取之則有 按之則無 宜甘草湯 正陽散·····陽氣乍復 或生煩燥者 返陰丹 復陽丹 金液丹 不可涼藥

B-12. 張仲景曰 傷寒直中陰經 初來無頭痛 無身熱 無渴 泊寒踈臥 沈重欲眠 脣青厥冷 脈微而欲絕 或脈伏 宜四逆湯 四逆者四肢厥冷也.

동:p383 소음사역중유이) 傷寒直中陰經 初來無頭痛 無身熱 無渴 泊寒踈臥 沈重欲眠 脣青厥冷 脈微而欲絕 或脈伏 宜四逆湯 四逆者四肢厥冷也.(중경)

채:333조 少陰病 脈沈者 急溫之 宜四逆湯 344조 凡厥者 陰陽氣不相順接 便爲厥 厥者 手足逆冷是也 傷寒論 중에 사역탕 사용례가 12條 있으나 같은 조문은 없다.

B-13. 張仲景曰 少陰病 脈微細但欲寐.

동:383조 소음형중용약) 少陰之爲病 脈微細但欲寐·····(중경)

채:288조 少陰之爲病 脈微細 但欲寐也.

B-14. 傷寒 欲吐不吐 心煩但欲寐 五六日 自利而渴者 屬少陰 少便色白 宜四逆湯.

동:p383 소음형중용약) 傷寒 欲吐不吐 心煩但欲寐 五六日 自利而渴者 屬少陰也 虛故引水自救 若少便色白者 以下焦虛有寒 不能制水 故小便色白

宜四逆湯.(중경)

채:289조 傷寒 欲吐不吐 心煩但欲寐 五六日 自利而渴者 屬少陰也 虛故引水自救 若少便色白者 少陰病形悉具 小便白者 以下焦虛有寒 不能制水 故小便色白也

B-15. 少陰病 身體痛 手足寒 骨節痛 脈沈者 附子湯主之.

동:p383 소음형중용약) 少陰病 身體痛 手足寒 骨節痛 脈沈者 附子湯主之.(중경)

채:312조 少陰病 身體痛 手足寒 骨節痛 脈沈者 附子湯主之

B-16. 下利 腹脹滿 身體疼痛 先溫其裏 乃攻其表 溫裏宜四逆湯 攻表宜桂枝湯.

동:p383 소음형중용약) 下利 腹脹滿 身體疼痛 先溫其裏 乃攻其表 溫裏宜四逆湯 攻表宜桂枝湯.(중경)

채:380조 下利 腹脹滿 身體疼痛 先溫其裏 乃攻其表 溫裏宜四逆湯 攻表宜桂枝湯.

B-17. 張仲景曰 少陰病始得之 反發熱 脈沈者 麻黃附子細辛湯主之.

동:p383 소음형중용약) 少陰病始得之 反發熱 脈沈者 麻黃附子細辛湯主之.(중경)

채:308조 少陰病始得之 反發熱 脈沈者 麻黃附子細辛湯主之.

B-18. 少陰病一二日 口中和 背惡寒 宜附子湯.

동:p383 소음형중용약) 少陰病一二日 口中和 背惡寒 當灸之 宜附子湯.(중경)

채:311조 少陰病一二日 口中和 其背惡寒者 當灸之 附子湯主之

B-19. 少陰病二三日 用麻黃附子甘草湯 微發之

以二三日無證故 微發汗也 無證謂無吐利厥證也.

동:p383 소음형중용약) 少陰病二三日 用麻黃附子甘草湯 微發之 以二三日無證故 微發汗也 無證謂無吐利厥證也.(중경)

채:309조 少陰病得之 二三日 麻黃附子甘草湯 微發汗 以二三日 無裏證故 微發汗也

B-20. 下利 脈沈而遲 其人 面小赤 身有微汗 下利清穀 必鬱冒汗出而解 病人必微厥 所以然者 其面戴陽下虛故也.

동:p383 소음형중용약) 下利 脈沈而遲 其人 面小赤 身有微汗 下利清穀 必鬱冒汗出而解 病人必微厥 所以然者 其面戴陽下虛故也.(중경)

채:374조 下利 脈沈而遲 其人 面少赤 身有微熱 下利清穀者 必鬱冒汗出而解 病人必微厥 所以然者 其面戴陽下虛故也.

B-21. 少陰病 脈細沈數 病爲在裏 不可發汗 少陰病 但厥無汗而強發之 必動其血 或從口鼻 或從目出 是爲下厥上竭 難治.

동:p383 소음병금기) 少陰病 脈細沈數 病爲在裏 不可發汗(중경)

少陰病 但厥無汗而強發之 必動其血 未知從何道來 或從口鼻 或從目出 是名下厥上竭 難治也.

채:292조 少陰病 脈細沈數 病爲在裏 不可發汗

301조 少陰病 但厥無汗而強發之 必動其血 未知從何道出 或從口鼻 或從目出 是名下厥上竭 爲難治也.

B-22. 張仲景曰 自利純青水 心下痛 口燥乾者 宜大承氣湯

동:p383 소음병자리) 少陰病 自利純青水 心下痛 口燥乾者 宜大承氣湯.(중경)

채:328조 少陰病 自利青水 色純青 心下必痛 口乾燥者 宜大承氣湯

B-23. 朱肱曰 少陰病 口燥咽乾而渴 宜急下之 非若陽明 宜下而可緩也

동:p403 급하양중) 少陰主腎 繫舌本 發熱入藏 留於少陰之經 腎汁乾咽路焦 故口燥咽乾而渴 宜急下之 非若陽明 宜下而可緩也 雖然陽明一證 發熱汗多亦急下之 以胃汁乾故也.(活人)

활인서:p77 五問) 少陰主腎 繫舌本 傷寒熱氣入於臟 流留於少陰之經 腎汁乾咽路焦 故口燥咽乾而渴 須宜急下之 非若陽明證 宜下而可緩也 雖然陽明亦有一證 發熱汗出多急下之 陽明屬胃 汗多則胃汁乾 亦須急下也

B-24. 李杲 東垣書曰 少陰證口中辨 口中和者當溫 口中乾燥者 當下 少陰證下利辨 色不青者當溫 色青者當下.

동:p383 소음형중용약) 少陰證口中辨 口中和者當溫 口中乾燥者當下(동원)

p383 소음병자리) 少陰證下利辨 色青者當下 色不青者當溫(동원)

동원십중의서:p295 難知 少陰證) 少陰證下利辨 色青者當下 色不青者當溫

少陰證口中辨 口中和者當溫 口中乾燥者當下

B-25. 李梴曰 舌乾口燥 或下利清水 謔語便閉 宜小承氣湯 面青四肢厥冷 指甲青黑 宜薑附湯.

동:p383 소음형중용약) 少陰心爲本 故舌乾口燥 或下利清水 謔語便閉 宜小承氣湯 腎爲標 故面寒脣青 四肢厥冷 指甲青黑 宜薑附湯(입문)

입문:p276 상한문 표본) 少陰心爲本 故舌乾口燥 或透臍硬痛 或心下硬痛 或下利純清水 或謔語便閉 宜小承氣湯 腎爲標 故面寒如刀刮 脣青不渴 吐利 胸腹絞痛 四肢厥逆指甲黑 蹠臥 身如被杖 古薑附湯

B-26. 朱肱曰 躁無暫定而厥者 爲藏厥

동:p388 권유장길회길) 躁無暫定而厥者 爲藏厥 (활인)

활인서:p138 二十八問) 若傷寒發厥 至七八日 膚冷而躁無時暫安者 爲藏厥 此爲難治

B-27. 李梴曰 藏厥者 發躁無休息時 發熱七八日 脈微膚冷而躁 或吐或瀉 無時暫安者 乃厥陰 眞藏氣絕故 曰藏厥 仲景無治法 而四逆湯 冷飲救之 又少陰病 厥而吐利發躁者 亦不治而 三味蓼莢湯救之.

동:p388 권유장길회길) 藏厥者 發躁無休息時 宜發熱七八日 脈微膚冷而躁 或吐或瀉 無時暫安者 乃厥陰 眞藏氣盡 故曰藏厥 仲景無治法 四逆湯 冷飲救之 又少陰病 厥而吐利發躁者 亦不治 三味蓼莢湯救之.(입문)

입문:p390 상한문 장길) 發躁無休息 發熱七八日 脈微 膚冷而躁 或吐或瀉 無時暫安者 乃厥陰 眞藏氣盡 故曰藏厥 仲景無治法 四逆湯冷飲 救之 又少陰厥而吐利發躁者 亦不治 三味蓼莢湯救之.

B-28. 朱肱曰 病人 身冷 脈沈細而疾 煩燥而不飲水者 陰盛隔陽也. 若飲水者 非此證也 厥陰病 渴欲飲水者 小小與之愈.

동:p390 음성격양) 病人 身冷 脈沈細而疾 煩燥而不飲水者 陰盛隔陽也.(활인)

若飲水者 非此證也(활인)

p395 상한번갈) 厥陰病 渴欲飲水者 小小與之愈 (활인)

활인서:p134 이십칠문) 問身冷 脈細沈疾 煩燥而不飲水 此名陰盛隔陽也.....若欲引飲者非也

B-29. 成無己曰 煩謂心中鬱煩也 躁謂氣外熱躁也 但煩不躁 及先煩後躁者 皆可治 但躁不煩 及先躁後煩者 皆不可治 先躁後煩 謂怫佛然更作躁悶 此陰盛隔陽也 雖大躁 欲於泥水中臥 但水不得入口 是也 此氣欲絕而爭 譬如燈將滅而暴明.

동:p392 번조길홍) 內熱曰煩 心中鬱煩也 外熱曰躁 謂氣外熱躁也 內熱爲有根之火 故但煩不躁 及先煩後躁者 皆可治 外熱爲 無根之火 故但躁不煩 及先躁後煩者 皆不可治也(明理) 所謂煩躁者 謂先煩漸至躁也……先躁後煩 謂怫怫然更作躁悶 此陰盛隔陽也 雖大躁 欲於泥水中臥 但水不得入口是也 此氣欲絕而爭 譬如燈將滅而暴明(明理)

명리론:p583 번조제이십) 有不煩而躁者 謂怫怫然更作躁悶 此爲陰盛隔陽也 雖大躁 欲於泥水中臥 但飲水不得入口者 是矣

B-30. 李梴曰 傷寒陰盛隔陽 其證身冷反躁 欲投井中 面青脣黑 渴欲飲水 復吐 大便 自利黑水 六脈沈細而疾 或無脈 陰盛隔陽大虛證也 宜霹靂散 又曰 厥逆煩燥者不治

동:p390 음성격양) 傷寒陰盛隔陽 其證身冷反躁 欲投井中 面青脣黑 渴欲飲水 復吐 大便 自利黑水 六脈沈細而疾或無(入門) 陰盛隔陽大虛證也 身熱而脈不鼓擊 或身冷而欲坐井中欲漱水而 不入口 非眞熱也 宜霹靂散 迴陽返本湯(入門)

입문:p323 상한문 벽력산) 治陰盛格陽 身冷反躁 欲投井中 身體沈重 脣靑面黑 渴飲水復吐 大便 自利黑水 六脈沈細而疾或無

p302 상한문 陰盛 拒陽) 陰盛拒陽大虛證也 身熱而脈不鼓擊 此言陰陽隔絕……或身冷而欲坐井中 欲漱水而不入口者 非眞熱也 此名陰盛隔陽 宜霹靂散

p301 상한문 음결)……厥逆煩燥者不治……

B-31. 張仲景曰 傷寒 七八日 身黃如梔子色 小便不利腹微滿 屬太陰 茵陳蒿湯 傷寒 但頭汗出 餘無汗 劑頸而還 小便不利 身必發黃

동:p382 태음병발황) 傷寒 七八日 身黃如梔子色 小便不利腹微滿 屬太陰 宜茵陳蒿湯(중경) 傷寒 但頭汗出 餘無汗 劑頸而還 小便不利 身必發黃

(중경)

채:268조 傷寒 七八日 身黃如梔子色 小便不利 腹微滿者 茵陳蒿湯主之

141조 太陽病 脈浮而動數 浮則爲風……若不結胸 但頭汗出 餘無汗 劑頸而還 小便不利 身必發黃也.

B-32. 李梴曰 天行疫癘 亦能發黃 謂之瘟黃 殺人最急 宜瘴疽丸

동:p514 황달문, 역려발황) 天行疫癘 亦能發黃 謂之瘟黃 殺人最急 宜瘴疽丸 茵陳蒿湯 濟生茵陳湯 苦蔘散(諸方)

입문:p497 상한문 장달환) 時行及瘴癘疫癘 忽發黃 殺人最急 如覺體氣有異者 急制服之 宜瘴疽丸

B-33. 醫學綱目曰 但結胸 無大熱者 此爲水結 但頭汗出 名曰 水結胸 小半夏湯主之

東醫寶鑑:p396 상한결홍) 但結胸 無大熱者 此爲水結 在胸脇 但頭汗出 名曰 水結胸 小半夏湯加茯苓主之(方見入門)

p268 수결홍) 傷寒結胸無大熱者 此爲水結在胸脇 但頭微汗出(중경)

醫學綱目:卷三十二 p16 傷寒部) 但結胸無大熱者 此爲水結在胸脇也 但頭微汗出者 大陷胸湯主之(活人)云 水結胸 小半夏加茯苓湯 小柴胡去牡蠣湯亦主之

이조문은 醫學綱目を 引用文獻으로 하고 있으나 醫學綱目에서는 꼭같은 것이 확인되지 않고 東醫寶鑑과 더 유사하나 처방명이 다르고 引用文獻이 入門으로 되어 있다.

B-34. 龔信曰 寒實結胸 無熱證者 宜三物白散

동:p396 상한결홍) 寒實結胸 無熱證者 宜三物白散 小陷胸湯(의감)

의감:확인되지 않음

東醫寶鑑에서 引用文獻을 잘못 옮긴 것으로 보인다.

B-35. 張仲景曰 病有結胸 有藏結 其狀如何 曰 按之痛 寸脈浮 關脈沈 名曰結胸也. 何謂藏結 曰如結胸狀 飲食如故 時時下利 寸脈浮 關脈細小沈緊 名曰藏結 舌上白苔滑者 難治 病人胸中 素有痞 連在臍傍 引入小腹 入陰筋者 此名藏結 死.

동:p396 상한장결) 病有結胸 有藏結 其狀如何 曰 按之痛 寸脈浮 關脈沈 名曰結胸也. 何謂藏結 答曰如結胸狀 飲食如故 時時下利 寸脈浮 關脈細小沈緊 名曰藏結 舌上白苔滑者 難治(중경) 病人胸中 素有痞 連在臍傍 引入小腹 入陰筋者 此名藏結 死.(중경)

채:135조 問曰 病有結胸 有藏結 其狀如何 答曰 按之痛 寸脈浮 關脈沈 名曰結胸也. 何謂藏結 答曰如結胸狀 飲食如故 時時下利 寸脈浮 關脈細小沈緊 名曰藏結 舌上白苔滑者 難治 175조 病脇下 素有痞 連在臍傍 痛引少腹 入陰筋者 此名藏結 死.

B-36. 朱肱曰 臑結 狀如結胸 飲食如故 時時下利而舌上白苔 歌曰飲食如常 時下利 更加舌上白苔時 連臍腹痛引陰筋 此疾 元來死不醫

동:p396 상한장결) 歌曰飲食如常 時下利 更加舌上白苔時 連臍腹痛引陰筋者 藏結 元來死不醫 狀如結胸 飲食如故 時時下利而舌上白苔(환인) 환인서:p222 七十五問) 又云 臑結無陽證 不往來 寒熱 其人反靜 舌上胎滑者 不可攻也 二者病人脇下舊有痞 連在臍傍 痛引小腹 入陰筋者 亦名臑結 死不治 又問 臑結者何也 臑結者死 仲景無治法 大抵臑結 其證如結胸狀 飲食如故 時時下利 陽脈浮 關脈小細沈緊 名曰臑結 舌上白苔滑者 難治也

B-37. 張仲景曰 黃疸之病 當以十八日 爲其 十日以上宜差 反劇 爲難治. 發於陰部 其人必嘔 發於陽部 其人 振寒而發熱.

동:p515 황달문, 가치불치중) 黃疸之病 當以十八日 爲期 十日以上宜差 反劇 爲難治(중경) 疸而不渴者可治 疸而渴者難治 發於陰部 其人必嘔 發於陽部 其人 振寒而發熱(중경)

금궤요략방론:p409 黃疸病脈證并治弟十五) 黃疸之病 當以十八日 爲期 治之十日以上差 反極爲難治

疸而渴者其疸難治 疸而不渴者其疸可治 發於陰部 其人必嘔 陽部 其人振寒而發熱也

B-38. 諸疸 小便黃赤色者 爲濕熱 當作濕熱治 小便色白 不可除熱者 無熱也 若有虛寒證 當作虛勞治

동:p512 황달문, 황달치법) 諸疸 小便黃赤色者 爲濕熱 當作濕熱治(중경)

諸疸 小便色白 不可除熱者 無熱也 若有虛寒證 當作虛勞治之.(중경)

금궤요략방론:p411 黃疸病脈證并治弟十五) 黃疸腹滿 小便不利而赤 自汗出 此爲表和裏實 當下之宜 大黃硝石湯主之 黃疸病 小便色不變 欲自利 腹滿而喘 不可除熱 熱除必嘔 嘔者小半夏湯主之 男子黃 小便自利 當與虛勞 小建中湯 등을 참고

B-39. 腹脹滿 面萎黃 躁不得睡

동:p512 황달문, 황달지인) 腹脹滿 面萎黃 躁不得睡 躁不得睡 屬黃家(중경)

금궤요략방론:p409 黃疸病脈證并治弟十五) 腹滿 舌萎黃 燥不得睡 屬黃家

B-40. 黃家日暮時 當發熱 反惡寒 此爲女勞得之 膀胱急 小腹滿 一身盡黃 額上黑 足下熱 因作黑疸 腹脹如水狀 大便黑或時澀 此女勞之病 非水也 腹

滿者難治

동:p512 황달문, 흑달난치) 黃家日晡時 當發熱 而反惡寒 此爲女勞得之 膀胱急 小腹滿 一身盡黃 額上黑 足下熱 因作黑疸 腹脹如水狀 大便黑 或時澇 此女勞之病 非水也 腹滿者難治(중경)
금궤요략방론:p409 黃疸病脈證并治弟十五) 黃家日晡時 當發熱 而反惡寒 此爲女勞得之 膀胱急 小腹滿 身盡黃 額上黑 足下熱 因作黑疸 其腹脹如水狀 大便必黑時澇 此女勞之病 非水也 腹滿者難治 用硝礬石散主之

B-41. 朱肱曰 陰黃 煩燥喘嘔不渴 宜用茵蔯橘皮湯 一人 傷寒發黃 脈微弱 身冷 次弟用藥 至茵蔯四逆湯大效 一人 傷寒發黃 脈沈細遲無力 次弟用藥 至茵蔯附子湯大效.

동:p514 황달문, 인진골피탕) 陰黃 煩燥喘嘔不渴 宜用茵蔯橘皮湯 (인진오수유탕) 一人 傷寒因下之太遲 發黃 脈沈細遲無力 次第用藥 至茵蔯附子湯大效 一人 傷寒發黃 脈微藥 身冷 次第用藥 至茵蔯四逆湯大效.(活人)

활인서:四十七問, 八十八問에서 身黃과 發黃을 언급하였으나 상기조문은 없으며 茵蔯蒿湯만 나와있음

B-42. 醫學綱目曰 濕家之黃 色暗不明 一身不痛, 熱家之黃 如梔子 一身盡痛.

동:p512황달문,황달치법) 色如烟熏黃乃濕病也 一身盡痛, 色如梔子黃乃黃病也 一身不痛, 濕家之黃 色暗不明, 熱家之黃色如梔子色 甚者勃勃出染着衣如黃栢汁(綱目)

의학강목: 卷三十一 P46 傷寒部) 濕家之黃也 身黃似薰黃 雖黃而色暗不明也 熱家之黃也 身黃似梔子色 甚者勃勃出染着衣 正黃如黃栢 是其正黃色 郿 色如薰黃 一身盡痛 發熱者爲濕痺.

이 조문은 동의보감의 濕黃과 熱黃의 身痛有無가 다르게 기록되어 있다.

B-43. 王好古曰 凡病 當汗而不汗 當利小便而不利 亦生黃.

동:p512황달문,황달치법)凡病 當汗而不出則生黃 當利小便而不利亦生黃 皆脾主肌肉四肢寒濕 與內熱相合故也.(해장)

해장서:확인불가

B-44. 朱震亨曰 黃疸 因食積者 下其食積 其餘但利小便 小便利白 其黃自退.

동:p512황달문,황달치법)黃疸 因食積者 下其食積 其餘 但利小便爲先 小便利白 其黃自退(단심)

단계심법부여:P299 疸) 戴云 五疸者 周身皮膚并眼 如梔子水染 因食積黃者 量人虛實 下其食積其餘 但利小便爲先 小便利白 其黃則自退矣 단계심법 원본은 구할수 없어 확인 못함

B-45. 李梴曰 黃疸十日以上 入腹 喘滿煩渴 面黑者 死.

동:p515황달문,가치불치증) 黃疸以十八日爲期 黃疸十日以外 入腹 喘滿煩渴 面黑者 死.(入門) 입문:p378잡병문 황달) 黃疸以十八日爲期 黃疸十日以外 入腹 喘滿煩渴 面黑者 死

B-46. 王叔和脈經曰 黃家寸口脈 近掌無脈 口鼻冷 黑色 並不可治.

동:p515황달문,가치불치증) 凡黃家寸口脈 近掌無脈 口鼻冷 黑色 並不可治.(脈經)

맥경:확인불가

東醫寶鑑에서 引用文獻을 잘못 기록한 것을 李濟馬가 그대로 옮겨적은 것으로 생각된다

C. 少陽人 脾受寒表寒病論

C-1. 張仲景曰 太陽病脈浮緊 發熱惡寒 身痛 不汗出而煩燥者 大青龍湯主之.

동:p380 태양兩傷풍한) 脈浮緊 發熱惡寒 身痛 不汗出而煩燥者 大青龍湯主之.

채:39조 태양中風 脈浮緊 發熱惡寒 身疼痛 不汗出而煩燥者 大青龍湯主之.....

C-2. 張仲景曰 少陽之爲病 口苦咽乾目眩.

동:p382 소양형중용약)少陽之爲病 口苦咽乾目眩 (중경)

채:271조 少陽之爲病 口苦咽乾目眩也

C-3. 眩而口苦舌乾者 屬少陽.

동:p382 소양형중용약) 眩而口苦舌乾者 屬少陽. (중경)

채:참고 271조 少陽之爲病 口苦咽乾目眩也
273조 傷寒 脈弦細 頭痛發熱者 屬少陽 少陽不可發汗.....

C-4. 口苦耳雙胸滿者 少陽傷風證也

동:p382 소양형중용약)口苦耳雙胸滿者 少陽傷風也.(중경)

채:참고 272조 少陽中風 兩耳無所聞 目赤 胸中滿而煩者 不可吐下 吐下則悸而驚

C-5. 口苦咽乾目眩耳雙胸脇滿 或往來寒熱而嘔 屬少陽 忌吐下 宜小柴胡湯和之.

동:p403 가화불가화증) 口苦 咽乾 目眩 耳雙 胸脇滿 或往來寒熱而嘔 屬少陽 忌吐下 宜小柴胡湯和之.(중경)

채:참고 99조 傷寒 五六日 中風 往來寒熱 胸脇苦滿 默默不欲飲食 心煩喜嘔 或胸中煩而不嘔 或渴 或腹中痛 或脇下痞硬 或心下悸 小便不利 或不渴 身有微熱 或咳者 小柴胡湯主之

C-6. 朱肱曰 凡發汗 腰以上 雖淋漓而腰以下 至足微潤則病終不解.

동:p402 발한법)凡發汗 腰以上則如常覆之 腰以下則厚衣覆之 腰以上 雖淋漓而腰以下 至足微潤則病終不解.(활인)

활인서:p105 十三問).....然發汗 須如常覆腰以上 厚衣覆腰以下 蓋腰以上流瀉而腰以下至足微潤 病終不解

C-7. 張仲景曰 少陽證 濺濺汗出 心下痞硬滿 引脇下痛 乾嘔短氣不惡寒 表解裏未和也 宜十棗湯 若合下不下 令人脹滿 遍身浮腫.

동:p382 소양병협동)少陽證 濺濺汗出 頭痛 心下痞硬滿 引脇下痛 乾嘔短氣不惡寒 表解裏未和也 宜十棗湯 若合下不下 令人脹滿 遍身浮腫.(중경)

채:160조 태양中風 下利 嘔逆 表解者 乃可攻地 其人 濺濺汗出 發作有時 頭痛 心下痞硬滿 引脇下痛 乾嘔 短氣 汗出 不惡寒者 此表解裏未和也 十棗湯主之

C-8. 傷寒表未解 醫反下之 膈內拒痛 手不可近 心下滿而硬痛 此爲結胸 宜大陷胸湯

동:p396 상한결흉) 傷寒表未解 醫反下之 膈內拒痛 手不可近 一云 心下滿而硬痛 此爲結胸 宜大陷胸湯(중경)

채:141조 태양病 脈浮而動數 浮則爲風 數則爲熱 動則爲痛 數則爲虛 頭痛發熱 微盜汗出 而反惡寒者 表未解也 醫反下之 動數變遲 膈內拒痛 胃中空虛 客氣動膈 短氣躁煩 心中懊憹 陽氣內陷 心下因硬 則爲結胸 大陷胸湯主之 若不結胸 但頭汗出 餘無汗 劑頸而還 小便不利 身必發黃也

C-9. 渴欲飲水 水入即吐 名曰水逆 五苓散主之

동:p395 상한변갈) 渴欲飲水 水入即吐 名曰水逆

五苓散主之(중경)

채:75조 中風 發熱六七日 不解而煩 有表裏證 渴欲飲水 水入即吐者 名曰水逆 五苓散主之

C-10. 杜壬曰 裏未和者 蓋痰與燥氣壅於中焦 故頭痛乾嘔 汗出痰隔也 非十棗湯不治

동:p382 소양병협동) 杜壬曰 裏未和者 蓋痰與燥氣壅於中焦 故頭痛乾嘔短氣汗出是痰隔也 非十棗湯不治(강목)

두입:확인불가

杜壬은 宋代사람이며 저서로는 '醫准' 一卷이 있으나 이미 분실되어 전해지지 않는다.(중의인명사전)

위 조문을 東醫寶鑑에서는 醫學綱目에서 引用한 것으로 되어 있는데 醫學綱目 卷三十一 傷寒部 p35)에서 상기조문은 확인된다(杜曰 裏未和者 蓋痰與燥氣壅於中焦 故頭痛乾嘔汗出 是痰隔也 非十棗不治)

C-11. 龔信曰 心下硬痛 手不可近 燥渴譫語 大便實 脈沈實有力 爲大結胸 大陷胸湯下之. 反加煩燥者 死 小結胸 正在心下 按之則痛 宜小陷胸湯.

동:p396 상한결흉) 若按心下硬痛 手不可近 燥渴譫語 大便實 脈沈實有力 爲大結胸 急以大陷胸湯加枳殼桔梗下之. 反加煩燥者 死(의감) 小結胸者 正在心下 按之則痛 脈浮滑 宜小陷胸湯.(의감) 의감:p60 六經證) 若心下硬痛 手不可近 燥渴譫語 大便實 脈沈實有力 爲結胸證 急宜大陷胸湯加枳殼下之. 量元氣虛實 緩而治之 反加煩燥者死 p70 六經證) 小陷胸湯 治小結胸 心下痞滿而軟 按之則痛

C-12. 李子建 傷寒十勸論曰 傷寒腹痛亦有熱證 不可輕服溫暖藥 又曰傷寒自利 當觀陰陽證 不可例服溫暖及止瀉藥

동:p404 寒門, 傷寒十勸 李子建所撰 不可不察) 傷寒腹痛亦有熱證 不可輕服溫暖藥 傷寒自利 當看陰陽證 不可例服溫暖及止瀉藥

이자건:확인불가

중의인명사전에 따르면 李子建은 宋代 사람으로 傷寒十勸을 저술하였으며 <中醫醫籍考>에 나타난다고 하나 中醫醫籍考는 확인하지 못함

중국의학사(홍원식편 p157)에는 活人書에 포함되어 전해지는 것으로 되어있다. 活人書에서는 상기조문이 확인된다.(增注類證活人書:卷二十二 傷寒十勸) 傷寒腹痛亦有熱證 不可服溫暖藥 傷寒自利 當看陰陽證 不可例服補暖及止瀉藥)

C-13. 朱震亨曰 傷寒陽證 身熱脈數 煩渴引飲 大便自利 宜柴芩湯

동:p397 상한자리) 傷寒陽證 身熱脈數 煩渴引飲 大便自利 宜柴芩湯.(단심)

단계심법부여:참고p123) 柴芩湯 治發熱泄瀉裏虛者

C-14. 古醫 有言 頭無冷痛 腹無熱痛 此言非也

古醫 又言 汗多亡陽 下多亡陰 此言是也.

동:p348 용약문, 한하지계) 汗多亡陽 下多亡陰(중경)

이 조문은 李濟馬가 東醫壽世保元의 모든 引用文에서 引用文獻의 冊名을 표시하고 있으나, 이條文에서 만든 古醫曰이라 하여 자신이 전해 들은 말을 그대로 기록한 것으로 보인다.

저자가 東醫寶鑑에서 비슷한 조문이라도 확인하지 못한 것이 바로 頭無冷痛 腹無熱痛 이 조문이다.

C-15. 張仲景曰 太陽病不解 轉入少陽者 脇下硬滿 乾嘔不能食 往來寒熱者 尚未吐下 脈沈緊者 與小柴胡湯 若已吐下 發汗譫語 柴胡證罷 此爲壞病 依壞病法治之.

동:p382 소양병괴증) 太陽病不解 轉入少陽者 脇下硬滿 乾嘔不能食 往來寒熱 尙未吐下 脈沈緊者 與小柴胡湯 若已吐下 發汗譫語 柴胡證罷 此爲壞病 依壞病法治之。(중경)

채:274조 本太陽病不解 轉入少陽者 脇下硬滿 乾嘔不能食 往來寒熱 尙未吐下 脈沈緊者 與小柴胡湯 若已吐下 發汗溫鍼譫語 柴胡證罷 此爲壞病 知犯何逆以法治之.

C-16. 傷寒 脈弦細 頭痛發熱者 屬少陽 不可發汗 發汗則譫語

동:p382 소양병불가발한) 傷寒 脈弦細 頭痛發熱者 屬少陽 不可發汗 發汗則譫語(중경)

채:273조 傷寒 脈弦細 頭痛發熱者 屬少陽 不可發汗 發汗則譫語 此屬胃 胃和則愈 胃不和則煩而悸

D. 少陽人 胃受熱裡熱病論

D-1. 張仲景曰 太陽病八九日 如瘧狀 發熱惡寒 熱多寒少 脈微而惡寒者 此陰陽俱虛 不可更發汗 更下 更吐 面色反有熱色者 未欲解也, 不能得小汗出 身必痒 宜桂麻各半湯

동:p380 태양병사학) 太陽病八九日 如瘧狀 發熱惡寒 熱多寒少 脈微而惡寒者 此陰陽俱虛 不可更發汗 更下 更吐 面色反有熱色者 未欲解也 以其不能得小汗出 身必痒 宜桂麻各半湯。(중경)

채:24조 太陽病 得之八九日 如瘧狀 發熱惡寒 熱多寒少 其人不可嘔 澹便欲自可 一日二三度發 脈微緩者 爲欲愈也 脈微而惡寒者 此陰陽俱虛 不可更發汗 更下 更吐 面色反有熱色者 未欲解也. 以其不能得小汗出 身必痒 宜桂麻各半湯

D-2. 太陽病 似瘧 發熱惡寒 寒多熱少 脈微弱者 此亡陽也 身不痒 不可發汗 宜桂麻各半湯

동:p380 태양병사학) 太陽病 似瘧 發熱惡寒 熱

多寒少 脈微弱者 此亡陽也 身不痒 不可發汗 宜桂麻各半湯(중경)

채:28조 太陽病 發熱惡寒 熱多寒少 脈微弱者 此亡陽也 身不痒 不可發汗 宜桂枝二越婢一湯

D-3. 張仲景曰 陽明證 小便不利 脈浮而渴 豬苓湯主之

동:p 381 양명병 저령탕) 豬苓湯 治陽明證 小便不利 汗少 脈浮而渴 赤茯苓 豬苓 阿膠 澤瀉 滑石 各一錢 右四味剉 水煎臨熟 入阿膠煎烊溫服(중경)

채:233조 若脈浮發熱 渴欲飲水 小便不利者 豬苓湯主之

D-4. 三陽合病 頭痛面垢 譫語遺尿 中外俱熱 自汗煩渴 腹痛身重 白虎湯主之.

동:p391 상한합병) 三陽合病 頭痛面垢 譫語遺尿 中外俱熱 自汗煩渴 或腹滿身重 白虎湯主之(중경)

채:229조 三陽合病 腹滿 身重 難以轉側 口不仁而面垢 譫語 遺尿 下之 則額上生汗 手足逆冷 若自汗出者 白虎湯主之.

D-5. 朱肱曰 陽厥者 初得病 必身熱頭痛 外有陽證 至四五日方能發厥 厥至半日却身熱蓋熱氣深 方能發厥 若微厥却發熱者 熱深故也 其脈雖伏 按之滑者 爲裡熱 或飲水 或揚手擲足 或煩燥不得眠 大便秘 小便赤 外證多昏憤 用白虎湯.

동:p388 상한양길) 陽厥者 初得病 必身熱頭痛 外有陽證 至四五日方能發厥 厥至半日却身熱 蓋熱氣深 方能發厥 若微厥却發熱者 熱深故也 其脈雖伏 按之滑者 爲裡熱 或飲水 或揚手擲足 或煩燥不得眠 大便秘 小便赤 外證多昏憤 承氣湯 白虎湯隨證用之.

활인서:p135 二十八問) 熱厥者 初中病 必身熱頭痛 外別有陽證 至二三日 乃至四五日 方發厥兼

熱厥 厥至半日却身熱，蓋熱氣深則 方能發厥 須在二三日後也 若微厥則發熱者 熱微故也 其脈雖沈伏 按之而滑為裡有熱 其人 或畏熱 或飲水 或揚手擲足 或煩燥不得眠 大便秘 小便赤 外證多昏憤者 知其熱厥也 白虎湯 承氣湯隨證用之

D-6. 王好古曰 渴病 有三 曰消渴 曰消中 曰消腎 熱氣上騰 胸中煩燥 舌赤唇紅 此渴引飲 常多小便數而少 病屬上焦 謂之消渴，熱畜於中 消穀善飢 飲食倍常 不生肌肉 此渴亦不甚煩 小便數而恬 病屬中焦 謂之消中，熱伏於下 腿膝枯細 骨節痠疼 飲水不多 隨即尿下 小便多而濁 病屬下焦 謂之消腎，又有五石過度之人 真氣既盡 石勢獨留 陽道興強 不交精泄 謂之強中，消渴輕也 消中甚焉 消腎尤甚焉，若強中則其斃 可立而待也。

동:p506 소갈문, 소갈형증) 渴病 有三 曰消渴 曰消中 曰消腎，熱氣上騰 心虛受之 心火散漫 不能收斂 胸中煩燥 舌赤唇紅 此渴引飲 常多 小便數而少 病屬上焦 謂之消渴，熱畜於中 脾虛受之 伏陽蒸胃 消穀善飢 飲食倍常 不生肌肉 此渴 亦不甚煩 小便數而恬 病屬中焦 謂之消中，熱伏於下 腎虛受之 腿膝枯細 骨節痠疼 精走髓虛 引水自救 飲水不多 隨即尿下 小便多而濁 病屬下焦 謂之消腎，自消腎而析之 又有五石過度之人 真氣既盡 石勢獨留 陽道興強 不交精泄 謂之強中，消渴輕也 消中甚焉 消腎尤甚焉，若強中則其斃 可立而待也。(直指)

해장서:확인불가

D-7. 朱震亨曰 上消者 舌上赤裂 大渴引飲 白虎湯主之 中消者 善食而瘦 自汗大便硬 小便數 黃連豬肚丸主之 下消者 煩躁引飲 小便如膏 腿膝枯細 六味地黃湯主之

동:p506 소갈문, 소갈유상) 上消者 舌上赤裂 大渴引飲 膈消是也 白虎加人蔘湯主之……中消

者 善食而瘦 自汗 大便硬 小便數 所謂瘵成為消中者是也 調胃承氣湯……黃連豬肚丸 藕汁膏皆可用一 下消者 煩躁引飲 耳輪焦乾 小便如膏 腿膝枯細 所謂焦煩 水易虧者是也 六味地黃丸主之。(諸方)

단계심법부여:확인불가

D-8. 醫學綱目曰 渴而多飲 為上消 消穀善飢 為中消 渴而尿數 有膏油 為下消。

동:p506 소갈문, 소갈형증) 渴而多飲 為上消 消穀善飢 為中消 渴而尿數 有膏油 為下消。(강목) 의학강목:卷二十一 p49, 56 59脾胃門) 渴而多飲 為上消 消穀善飢 為中消 渴而便數有膏油 為下消

D-9. 危亦林曰 因耽嗜色慾 或服丹石 真氣即脫 熱邪獨盛 飲食如湯消雪 肌膚日削 小便 如膏油 陽強興盛 不交精泄 三消之中 最為難治。

동:p509 소갈문, 강중증) 因耽嗜色慾 或服丹石 真氣即脫 熱邪獨盛 飲食如湯消雪 肌膚日削 小便 如膏油 陽強興盛 不交精泄 三消之中 最為難治……(득효)

득효방:p218 소갈卷弟七) 石子薺萇湯 治強中 多因耽嗜色慾 及快意飲食 或服丹石真氣即脫 藥氣陰發 治煩渴引水 飲食倍常 陰氣常興 不交精泄 故中焦虛熱 注於下焦 三消之中 最為難治

D-10. 危亦林曰 消渴 須防癰疽 忍冬藤 不拘多小 根莖花葉 皆可服

동:p510 소갈문, 소갈수예방용저, 인동원) 忍冬元 渴疾 須預防癰疽 忍冬草 不以多小 根莖花葉 皆可用……(득효)

득효방:p224 소갈卷弟七) 忍冬圓 治渴疾愈 須預防癰疽 忍冬草 不以多小 根莖花葉皆可用 一名老翁鬚 一名蜜吸花 一名金銀花 以洗淨用之

D-11. 李杲曰 消渴之疾 能食者 未傳 必發腦疽 背瘡 不能食者 必傳中滿鼓脹

동:p510 소갈문, 소갈전변증) 消渴之疾 未傳能食者 必發腦疽背瘡 不能食者 必傳中滿鼓脹 皆爲不治之證…….(동원)

동원십종의서:p165 蘭室秘藏 소갈론) 總錄所謂 未傳能食者 必發腦疽背瘡 不能食者 必傳中滿鼓脹 皆爲不治之證

D-12. 東醫醫方類聚曰 消渴久病 變成發癰疽 或成水病 或雙目失明

동:p510 소갈문, 소갈전변증) 消渴久病 變成發癰疽 或成水病 或雙目失明(류취)

의방류취:제육책 p316 宣明論 燥門消渴論) 又夫周身熱燥鬱 故變爲雀目 或內障癰疽 瘡瘍 上爲咳嗽喘 下爲痔瘻 或亨 積而濕熱內甚 不能傳化者 變爲水腫 腹脹也

p318 聖濟總錄 三消統論) 此久不愈 能爲水腫癰疽之病 慎此者服藥之外 當以絕嗜欲 薄滋味爲本 p321 玉機微義 消渴) 故久而多變于聾盲 瘡瘍 瘵癆之類而危殆 其爲燥熱傷陰也明矣

p344 聖惠方 治消渴後成水病諸方) 夫渴飲水 其人必眩……其病變成癰疽 或爲水病也

D-13. 王好古曰 一童子 自嬰至童 盜汗七年 諸藥不效 服涼膈散 三日病已

동:p124 진액문, 동자도한) 一童子 自嬰至童 盜汗七年 諸藥不效 服涼膈散 三黃元 三日病已…….(해장)

해장서:확인불가

D-14. 東醫醫方類聚曰 夫渴者 數飲水 其人必頭目眩 背寒而嘔 因虛故也

동:p506 소갈문, 소갈형증) 五臟六腑 皆有津液 熱氣在內則 津液竭少 故爲渴 夫渴者 數飲水 其

人必頭目眩 背寒而嘔 皆因裏虛故也(류취)

의방류취:제육책 p340 治熱渴諸方) 夫五臟六腑 皆有津液也 若五臟因虛而生熱者 熱氣在內 則津液竭少 故爲渴也 夫渴者 數飲水 其人必頭目眩 背寒而嘔 皆因裏虛故也

D-15. 龔信曰 凡陰虛證 每日午後 惡寒發熱 至晚 亦得微寒而解 誤作瘧治 多致不救

동:p445 허로문, 음허용약) 凡陰虛證 每日午後 惡寒發熱 至晚 亦得微寒而解 脈必虛濡而數絕類瘧 但瘧脈弦而虛 脈大弦爲辨耳 誤作瘧治 多致不救(의감)

의감:p178 허로) 凡陰虛證 每日午後 惡寒發熱 至晚亦得微寒而解 脈必虛濡而數絕類瘧疾 但瘧脈弦而虛 脈大爲辨耳 若誤作瘧疾治之 多致不救

D-16. 孫思邈 千金方書曰 消渴 宜慎者有三 一飲酒 二房勞 三鹹食及麵 能慎此三者 雖不服藥 亦可自愈

동:p510 소갈문, 금기법) 消渴病 宜慎者有三 一飲酒 二房勞 三鹹食及麵 能慎此 三者 雖不服藥 亦可自愈.(친금)

친금방:p373 消渴第一)……其所慎者有三 一飲酒 二房室 三鹹食及麵 能慎此者 雖不服藥而自可無他 不知此者 縱有丹石 亦不可救 深思慎之…….

E. 太陰人 胃脘受寒 表寒病論

E-1. 張仲景曰 太陽傷寒 頭痛發熱 身疼腰痛 骨節皆痛 惡寒無汗而喘 麻黃湯主之

註-傷寒 頭痛 身疼腰痛 以至牽連 百骨節俱痛者 此太陽傷寒 營血不利故也.

동:p380 태양상한) 太陽傷寒 頭痛發熱 身疼腰痛 骨節皆痛 惡寒無汗而喘 麻黃湯主之

註曰頭痛 身疼腰痛 以至牽連 百骨節俱痛者 此

太陽傷寒 營血不利故也(중경)

채:36조 태양病 頭痛發熱 身疼腰痛 骨節疼痛 惡寒無汗而喘者 麻黃湯主之.

E-2. 張仲景曰 傷寒四五日而厥者 必發熱 厥深者 熱亦深 厥微者 熱亦微 傷寒厥四日 熱反三日 復厥五日 厥多熱少 其病爲進 傷寒發熱四日 厥反三日 厥少熱多 其病 當自愈

동:p388 음양결경증) 傷寒至四五日而厥者 必發熱 前熱者 後必厥 厥深者 熱亦甚 厥微者 熱亦微 (중경) 傷寒厥四日 熱反三日 復厥五日 其病爲進 厥多熱少 陽氣退故爲進也(중경) 傷寒發熱四日 厥反三日 厥少熱多 其病 當自愈(중경)

채:342조 傷寒一二日 至四五日而厥者 必發熱 前熱者 後必厥 厥深者 熱亦甚 厥微者 熱亦微 厥應下之 而反發汗者 必口傷爛赤

349조 傷寒 厥四日 熱反三日 復厥五日 其病爲進 寒多熱少 陽氣退故爲進也

348조 傷寒 發熱四日 厥反三日 復熱四日 厥少熱多 其病當愈 四日至七日 熱不除者 其後必便膿血

F. 太陰人 肝受熱 裡熱病論

F-1. 朱肱曰 陽毒面赤斑 斑如錦紋 咽喉痛 唾膿血 宜葛根解肌湯 黑奴丸 陽毒及壞傷寒 醫所不治 精魄已竭 心下尚煖 幹開其口 灌黑奴丸 若下咽 卽活

동:p389 상한양독) 陽毒爲病 面赤斑斑如錦紋 咽喉痛 唾膿血 五日可治 七日不可治 宜陽毒升麻湯 陽毒梔子湯 葛根湯 外用水漬法(활인)

p389 흑노환) 陽毒及壞傷寒 醫所不治 精魄已竭 心下尚煖 幹開其口 灌藥下咽卽活 若不大渴 不可與此藥(활인)

p381 양명병, 갈근해기탕) 治陽明經病 目疼 鼻乾 不得臥 宜解肌 葛根 柴胡 黃芩 芍藥 羌活 石膏 升麻 白芷 桔梗 各一錢 甘草五分 右剉作

一貼 入薑三棗二 水煎服(의감) 一名 柴葛解肌湯(회춘)

활인서:p127 二十一問) 問發躁狂走 妄言面赤 咽痛 身斑斑若錦文 或下利赤黃而脈洪實 此名陽毒也 p400 黑奴丸).....爲壞傷寒 醫所不治爲死 或人精魂已竭 心下纔暖 發開其口 灌藥下咽卽活 兼治陽毒及發斑

F-2. 李梴曰 微惡寒發熱 宜葛根解肌湯 目疼鼻乾 潮汗閉澁 滿渴狂譫 宜調胃承氣湯. 熱在表則目疼不眠 宜解肌湯 熱入裏則狂譫 宜調胃承氣湯

동:p380 양명형중옹약) 陽明者 大腸爲表 與肺爲表裏 故微惡寒發熱爲經病 宜葛根解肌湯 渴而有汗者 宜白虎湯 胃爲本 目疼鼻乾 潮汗閉澁 滿渴狂譫 宜調胃承氣湯(입문) 陽明以肌肉之間爲表 胃府爲裏 熱在表則目疼不眠 宜解肌湯 熱入裏則狂譫 宜調胃承氣湯(입문)

입문:p276 상한문 標本) 陽明 大腸爲表 與肺爲表裏 故微惡寒發熱爲經病 宜葛根解肌湯 渴而有汗不解者 宜白虎湯 胃爲本 目疼鼻乾 潮汗閉澁 滿渴狂譫 爲腑病 宜調胃承氣湯(입문)

p289 상한문 翕翕發熱) 陽明以肌肉之間爲表 肌肉之下爲近裏 以胃府之內爲全入 裏熱在表則目痛不眠 葛根解肌湯 熱近於裏則 口渴背寒 白虎加人蔘湯 熱入裏則 自汗狂譫 調胃承氣湯

F-3. 龔信曰 陽明病 目疼鼻乾不得臥 宜葛根解肌湯

동:p381 양명병, 갈근해기탕) 治陽明經病 目疼 鼻乾 不得臥 宜解肌 葛根 柴胡 黃芩 芍藥 羌活 石膏 升麻 白芷 桔梗 各一錢 甘草五分 右剉作一貼 入薑三棗二 水煎服(의감) 一名 柴葛解肌湯(회춘)

의감:p65 六經證) 葛根解肌湯 治足陽明胃經受證 目痛鼻乾不得眠 微頭痛 脈來微洪 宜解肌 屬陽

明經病 其正陽明腑病 別有治法 乾葛 柴胡 黃芩 芍藥 羌活 白芷 桔梗 甘草 上剉 每服一兩 生薑 三片 棗一枚 石膏末一撮 水煎熱服 無汗惡寒 去黃芩 加麻黃

F-4. 三陽病深 變爲陽毒 面赤眼紅 身發斑黃 或下利黃赤 六脈洪大 宜黑奴丸

동:p389 상한양독) 傷寒三陽病深 變爲陽毒 或有失於汗下 或本陽證 誤投熱藥 使熱毒入深 發爲狂亂 面赤眼紅 身發斑黃 或下利黃赤 六脈洪大名曰陽毒發斑 宜黑奴丸 白虎湯 三黃石膏湯 消斑青黛飲(의감)

의감:확인불가

東醫寶鑑에서 引用文獻을 잘못 기록한 것으로 보인다.

F-5. 靈樞曰 尺膚熱深 脈盛燥者 病瘟也

동:p525 은역문, 맥법) 尺膚熱深 脈盛燥者 病瘟也.(영추)

靈樞:第七十四篇, 論疾診尺) 尺膚熱甚 其脈盛燥者 病瘟也

F-6. 王叔和曰 瘟病脈 陰陽俱盛 病熱之極 浮之而滑 沈之散澁

동:p525 은역문, 맥법) 陰陽俱盛 病熱之極 浮之而滑 沈之散澁 惟有溫病脈散諸經 各隨所在不可指名(맥결)

맥결:확인불가

李濟馬는 왕숙화로 引用했으나 東醫寶鑑에서 이 조문은 맥결에서 引用한 조문으로 되어있다.

許浚은 東醫寶鑑 集例에서 脈經과 脈訣을 西晉 王叔和所著로 기록하고 있으나 脈經에는 상기조문이 없으며 왕숙화 脈訣은 현재 확인되지 않는다.

중국의학사(홍원식편, p118)에는 王叔和 脈訣은 없고 실제로는 六朝人 高陽生이 撰한 것인데 그

내용이 대개 脈經에서 取한 것이므로 王叔和 脈訣이라 題한 것이라 하고 있다.

F-7. 脈法曰 瘟病二三日 體熱腹滿頭痛 食飲如故 脈直而疾 八日 死 瘟病四五日 頭痛腹滿而吐 脈來細而強 十二日 死 八九日 頭身不痛 目不赤 色不變而反利 脈來澁 按之不足舉時大 心下堅 十七日 死.

동:p525 은역문, 맥법) 瘟病二三日 體熱腹滿頭痛 食飲如故 脈直而疾 八日 死.

瘟病四五日 頭痛腹滿而吐 脈來細而強 十二日 死, 瘟病 八九日 頭身不痛 目不赤 色不變而反利 脈來澁 按之不足 舉時大 心下堅 十七日 死.

脈法이란 책은 없다.

李濟馬는 脈法曰로 하였는데 이는 東醫寶鑑 瘟疫門 脈法項에서 설명되고 있으므로 그대로 따온 것으로 보인다. 이 조문은 脈經에서 확인된다.(맥경:p61 診百病死生訣第七) 瘟病二三日 身體熱腹滿頭痛 食飲如故 脈直而疾者 八日死 四五日 頭痛腹滿而吐 脈來細而強 十二日死 八九日 頭不疼 身不痛 目不赤 色不變 而反利 脈來牒牒 按之不彈手時大 心下堅 十七日死)

F-8. 龔信曰 瘟病 穢穢大熱 脈細小者 死 瘟病下利 痛甚者 死

동:p525 은역문, 맥법) 瘟病 穢穢大熱 脈細小者 死

瘟病下利 腹中痛甚者 死(의감)

의감:p14 驗諸死證脈) 瘟病 穢穢大熱 脈細小者 死 그러나 瘟病下利 腹中痛甚者 死 이 조문은 의감에서 확인하지 못함

F-9. 萬曆丙戌 余寓大深 瘟疫大作 士民多斃 其證 增寒壯熱 頭面項頰赤腫咽喉腫痛 昏憤 發一秘方 名二聖救苦丸 大黃四兩 豬牙皂角二兩 麵糊和

丸 菉豆大五七十九一服即汗一汗即愈 粟壯者 百發百中 皂角 開關竅發其表 大黃 瀉諸火通其裏

동:p528 은역문, 이성구고환) 大黃四兩酒蒸 豬牙皂角二兩 右爲末 麵糊和丸 綠豆大每五七十九以綠豆湯送下 汗出爲效, 萬曆丙戌 余寓大深 瘟疫大作 士民多斃 至滅門 其證 增寒壯熱 頭面頰項赤腫 咽喉腫痛 昏憤 名曰大頭瘟 余發一秘方名二聖救苦丸 用牙皂以開關竅而發其表 用大黃以瀉諸火而通其裏 一服即汗 一汗即愈 眞仙方也 粟壯者 百發百中 虛弱者 先服荊防敗毒散 若未愈用牛蒡芩連湯亦效(회춘)

만병회춘:p88) 萬曆丙戌春 余寓大深 屬瘟疫大作 士民多斃 其症閭巷相染 甚至滅門 其症 增寒壯熱 頭面頰項赤腫 咽喉腫痛 昏憤等症 此乃冬應寒而反熱 引受不正之氣 至春發爲瘟疫 至夏發爲熱病 名曰大頭瘟 大熱之症也 余發一秘方 名二聖救苦丸 用牙皂以開關竅而發其表 用大黃以瀉諸火而通其裏 一服即汗 一汗即愈 眞仙方也 日塞戶噴門 應酬不暇全活者 不能勝數矣 但人稟之消壯者 百發百中 其虛弱者 余先以人蔘敗毒散輕者即愈 如未愈用牛蒡芩連湯 可收全效亦效 李濟馬는 공신을 引用하면서 醫鑑만을 말하고 있으나 이 조문은 古今醫鑑에는 없고 萬病回春에서 확인된다.

F-10. 感四時不正之氣 使人痰涎壅盛 煩熱 頭疼身痛 增寒壯熱 項強睛痛 或飲食如常 起居依舊 甚至聲啞 或赤眼口瘡 大小腮腫 喉痺咳嗽 稠粘噴嚏.

동:p525 은역문, 은역형증) 感四時不正之氣 使人痰涎壅盛 煩熱 頭疼身痛 增寒壯熱 項強睛痛 或飲食如常 起居依舊 甚至聲啞 或赤眼口瘡 大小腮腫 喉痺咳嗽 稠粘噴嚏(의감)

의감:p76 은역) 人蔘敗毒散 治感四時不正之氣·····大抵使人痰涎壅盛 壯熱如火 頭疼身痛 項強睛疼 聲啞腮腫 俗呼浪子瘟 或稱蝦蟆瘟

F-11. 內經曰 諸澁枯涸 皴揭 皆屬於燥

동:p416 燥門, 조인철소) 內經曰 諸澁枯涸 乾勁皴揭 屬於燥

案問:第七十四篇 至眞要大論) 願聞病機何如 岐伯曰 諸風掉眩 皆屬於肝·····諸嘔吐酸 暴注下迫 皆屬於熱까지 燥에 대한 것은 없다.

內經 十九病機 중에는 燥에 관한 것이 없으며 후에 劉河間이 燥에 관한 것을 추가한 것이다.

東醫寶鑑에서 內經曰로 시작하여 引用한 것을 李濟馬가 그대로 옮긴 것이며 乾勁이란 말은 빠져 있다.

F-12. 靈樞曰 二陽結 謂之消 飲一溲二 死不治 註曰 二陽結謂胃及大腸熱結也.

동:p506 소갈문 소갈지원) 內經曰 二陽結 謂之消 註曰 二陽結謂胃及大腸熱結也 腸胃藏熱則喜消水穀也

p510 소갈문, 불치증) 內經曰 飲一溲二 死不治·····(綱目)

소문:第七篇 陰陽別論) 二陽結 謂之消

第三十七篇 氣厥論) 心移寒於肺 肺消 肺消者 飲一溲二 死不治

李濟馬는 靈樞에서 引用한 것으로 되어 있으나 靈樞에는 없고 案問에서 확인된다.

F-13. 扁鵲難經曰 消渴脈 當得緊實而數 反得沈澹而微者 死.

동:p506 소갈문, 맥법) 消渴脈 當得緊實而數 反得沈澹而微者 死(난경)

난경:十七難) 經言 病或有死 或有不治自愈 或連年月不已 其死生存亡 可切脈而知之耶 然加盡知也·····病若開目而渴 心下牢者 脈當得緊實而數 反得沈澹而微者 死也

편작난경에는 消渴脈으로 나오지 않으나 東醫寶鑑에는 消渴脈으로 나온다.

F-14. 張仲景曰 消渴病 小便反多 如飲水一斗 小便亦一斗 腎氣丸主之.

동:p506 소갈문, 소갈유삼) 消渴病 小便反多 如飲水一斗 小便亦一斗 腎氣丸主之.(중경)

금궤요략방론:p399 消渴小便利淋病脈證并治第十三) 男子 消渴 小便反多 如飲一斗 小便佚斗 腎氣丸主之

F-15. 危亦林曰 陰血耗竭 耳聾目暗 脚弱腰痛 宜用黑元丹

동:p448 虛勞門, 黑元) 治虛勞 陰血耗竭 面色黧黑 耳聾目暗 脚弱腰痛 小便白濁當歸酒浸二兩 鹿茸酥炙一兩 右爲 煮烏梅肉爲膏和丸 梧子大 溫酒吞下 五七十丸(득효)

득효방:p269 卷第八 虛損) 黑元 精血耗竭 面色黧黑 耳聾目暗 口乾多渴 脚弱腰疼 小便白濁 上燥下寒 不受峻補 鹿茸一兩 燎去毛 當歸二兩酒浸 右各爲末 煮烏梅膏子爲圓 梧子大 每服五十圓 空心溫酒下

F-16. 凡男子 方當壯年而眞氣 猶怯 此乃稟賦素弱 非虛而然 滋益之方 羣品稍衆藥力細微 難見功效 但固天元一氣 使水升火降則 五臟自和 百病不生 宜用拱辰丹

동:p448 허로문, 공진단) 凡男子 方當壯年而眞氣 猶怯 此乃稟賦素弱 非虛而然 僭燥之藥尤宜速戒 滋益之方 羣品稍衆藥力細微 難見功效 但固天元一氣 使水升火降則 五臟自和 百病不生 此方主之.....(득효)

득효방:p271 卷第八 虛損 공진단) 男子 方當壯年而眞氣猶怯 此乃稟賦素弱 非虛而然 僭燥之藥尤宜速戒 勿謂手足厥逆 便云陰多 如斯治之 不惟不能愈疾 大病自此生矣 滋益之方 羣品稍衆藥力細微 難見功效 但固天元一氣 使水升火降則 五臟自和 百病不生此方主之

G. 太陽人 外感腰脊病論

G-1. 內經曰 尺脈緩澁 謂之解休 釋曰尺爲陰部 肝腎主之 緩爲熱中 澁爲亡血 故謂之解休 解休者 寒不寒 熱不熱 弱不弱 壯不壯 瘳不可名 謂之解休也.

동:p454 허로문, 해역중) 內經曰 尺脈緩澁 謂之解休 釋曰尺爲陰部 肝腎主之 緩爲熱中 澁爲亡血 故謂之解休 解休者 寒不寒 熱不熱 弱不弱 壯不壯 瘳不可名 謂之解休也

소문 十八篇 平人氣象論에 尺脈緩澁 謂之解休으로 확인되며 釋曰.....이하는 王氷註이다.

G-2. 靈樞曰 髓傷則消燂 筋痿體解休 然不去矣 不去謂不能行去也

동:p454 허로문, 해역중) 髓傷則消燂 筋痿體解休 然不去矣 不去謂不能行去也(영추)

素問:第五十篇 刺要論) 刺骨無傷髓 髓傷則鎖鑠 筋酸 體解休 然不去矣

李濟馬는 영추에서 引用한 것으로 되어 있으나, 영추 第七十四 論疾診尺篇에 尺肉弱者解休安臥脫肉者寒熱不治만 나오며 素問:第五十篇 刺要論)에서 확인된다.(刺骨無傷髓 髓傷則鎖鑠筋酸 體解休 然不去矣)

이 또한 東醫寶鑑에서 引用文獻을 영추로하고 있어 李濟馬가 그대로 引用한 것으로 보인다.

H. 太陽人 內觸小腸病論

H-1. 朱震亨曰 噎膈反胃之病 血液俱耗 胃院乾枯 其枯在上近咽則 水飲可行食物難入 入亦不多 名之曰噎 其枯在下近胃則 食難可入 難盡入胃 良久復出 名之曰膈 亦曰反胃 大便秘少 若羊屎然 名雖不同 病出一體 又曰上焦噎膈 食下則胃院 當心而痛 須臾吐出 食出痛乃止 中焦噎膈 食物可下 難盡入胃 良久復出 下焦噎膈 朝食暮吐 氣血俱虛者 口中多出沫但見 沫多出者必死 大便如羊屎者 難治

不淡飲食者難治.

동:p462 구토문, 열격반위병인) 血液俱耗 胃院乾枯 其槁在上 近咽之下 水飲可行食物難入 間或可入 入亦不多 名之曰噎 其槁在下 與胃相近 食難可入 難盡入胃 良久復出 名之曰膈 亦曰反胃 大便秘少 若羊屎然 名雖不同 病出一體, 其槁在賁門 食下則胃院 當心而痛 須臾吐出 食出痛乃止 中焦噎膈 食物可下 難盡入胃 良久復出 下焦噎膈 此上焦之噎膈也 或食物可下 難盡八骨 良久復出 其槁在幽門 此中焦之噎膈也 其或 朝食暮吐 其槁在關門 此下焦之噎膈也(단심)

동:p465 구토문, 난치불치증) 糞如羊屎者不治 不淡飲食不斷房室者不治 氣血俱虛者 口中多出沫 但見沫多出者必死
단계심법부여:확인불가

H-2. 張鷟曰 噎當是神思間病 惟內觀自養 可以治之

동:p463 구토문, 열격반위병인) 張鷟曰 噎當是神思間病 惟內觀自養 可以治之 其言深中病情(단심)

張鷟:확인하지 못한 醫家이며 중의인명사전에 도 없음

그러나 東醫寶鑑에는 단계심법에서 引用한 것으로 되어 있으나 단계심법은 책이 없어 확인하지 못하고 단계심법부여에서는 확인되지 않는다.

H-3. 龔信醫鑑曰 反胃也 膈也 噎也 受病皆同 噎膈之證 不屬虛 不屬實 不屬冷 不屬熱 乃神氣中一點病耳

동:p462 구토문, 열격반위병인) 噎膈有五 五膈者 憂患寒熱氣也……反胃也 膈也噎也 受病皆同(의감)

p463 구토문, 열격반위병인) 膈噎之證 不屬虛 不屬實 不屬冷 不屬熱 乃神氣中 一點病耳(醫林)

의감:p132 번위) 夫翻胃者 朝食而暮吐 暮食而朝吐 或食已即吐 下者是也 膈噎者爲五膈五噎也 五膈憂患熱氣也……翻胃也 膈也 噎也 三者名雖不同 而其所受之病 則一而已

IV. 總括 및 考察

東醫壽世保元 病證論에 引用된 引用文을 중심으로 그 引用文의 인용원서와 東醫寶鑑을 대조학인하였다.

東醫壽世保元 病證論에 나타난 모든 引用文獻의 종류는 총 22종이다.(도표1)

그러나 東武의 引用文獻과 실제 引用文獻과는 차이가 있다.(도표2)

東武가 東醫壽世保元 病證論을 저술하면서 引用文에는 반드시 引用文獻을 밝히고 있으며 특히 그 문헌이 처음 引用될 때는 저자와 서명을 동시에 명시하고 있다. 저자가 본론에서 확인한 바를 근거로 東醫壽世保元 引用文獻의 오류를 지적하면 다음과 같다.

1) 한 저자가 一種 이상의 醫書를 저술한 경우에는 引用時 구분하여 引用하지 않고 東醫寶鑑을 따르고 있다.

張仲景 傷寒論 이의 金匱要略에서 확인되는 引用文:B-10, B-37, B-38, B-39, B-40, F-14.

王好古:海藏書란 책은 없고 醫墨元戌 醫家大法 湯液本草를 東醫寶鑑에서 구분하지 않고(海藏)이라고만 표시하고 있다.(A-17, B-43, D-6, D-13)

2) 東醫壽世保元에서 예외적으로 著者を 명시하지 않고 書名만 밝힌 경우

醫學綱目:東武는 引用文을 처음 引用할 때는 著者와 書名을 함께 밝히고 있으나 醫學綱目에서만은 著者를 명시하지않고 本朝人所撰으로 되어 있는것과 같은 유형이다.(A-18, B-33, B-42, D-8)

3) 書名은 표시하지 않고 人名만 표시한 경우
杜王:宋代 사람이며 著書로는 “醫准” 一卷이 있으나 전해지지 않으며 東醫寶鑑에서는 醫學綱目에서 引用한 것으로 되어 있고 醫學綱目中서 확인된다.(C-10)

張鷟:저자가 확인하지 못한 醫家이며 東醫寶鑑에는 출전이 丹溪心法으로 되어있다. 단계심법은 없어서 확인하지 못하였다.(H-2)

4) 東醫寶鑑에서 범한 引用文獻의 오류를 그대로 따른 경우

G-11:이 조문은 원래 素問 至眞要大論에는 없다.

5) 東醫寶鑑의 해당조항을 그대로 引用한 경우
F-7:이 조문은 東醫寶鑑 癩逆門 脈法항에서 설명되고 있으며 실제 이 조문은 王叔和 脈經에서 확인된다. 이러한 근거들로 東武가 東醫壽世保元을 저술할 때 許浚의 東醫寶鑑을 근거로 하였으나 許浚의 醫學思想에 많은 영향을 받았음을 알 수 있다.

東醫壽世保元の 引用文獻은 이와같은 오류를 범하고 있을 뿐만 아니라, 東醫壽世保元에서 引用된 문장이 引用文獻 원서에서 확인되는 경우에도 그 내용이 東醫寶鑑과 더 일치하고 있다.

따라서 東醫壽世保元 病證論에 引用된 문장은 대부분 東醫寶鑑에 있는 문장이며(著자가 C-14의 頭無冷痛 腹無熱痛의 引用文단은 東醫寶鑑에서 확인하지 못했으나 이 문장은 東武 자신도 전해들은 얘기를 기록하면서 단순히 古醫曰로 표시한 것으로 보인다). 內經이나 傷寒論 活人書 古今醫鑑 醫學入門 등의 原書 자체보다는 東醫寶鑑을 중심으로 引用한 것임을 알 수 있다. <도표3>

東醫寶鑑은 內景篇 外形篇 雜病篇을 통틀어 總87門(단 寒門 上,下와 癰疽門上,下는 각 하나의 門으로 취급함)중에서 東醫壽世保元 病證論에 引用된 문은 10門에 해당하며 그 중 대부분이 寒門에서 引用되었다.<도표4>

결국 東武는 東醫壽世保元을 저술하면서 哲學的原理論을 제외한 醫學의 病證論은 許浚의 東醫寶鑑에 근거를 두고 있음을 알 수 있다.

그러나 우리가 유의해야 할 바는 東武가 東醫寶鑑 이외에 다른 서적을 보지 않았다고 생각해서는 안된다는 것이다. 이 점에 대한 근거는 醫源論에서 東武가 靈樞, 素問에 대해 “醫家格致之宗主而苗脈之所自出也”라 하면서도 그 학설을 그대로 다 믿을 것은 못된다고 평하고 있으며, 四象人 辨證論 末尾에 “靈樞書中 有太少陰陽五行人論而 略得外形 未得臟理 蓋太少陰陽人 早有古昔之見而未盡精究也”라 하여 靈樞 第64篇 陰陽二十五人篇과 第72篇 通天篇의 내용을 언급하고 있지만 東醫寶鑑에는 이 내용이 없다.

여기서 著자가 중요하게 생각하는 것은 東武가 醫源論에서 밝혔듯이 자신이 醫學經驗이 있는 지 5,6천년 후에 태어나 前人の 著述을 통해 우연히 四象人 臟腑性理를 얻어 東醫壽世保元을 저술하게 되었다는 점이다. 즉 東武는 素問, 靈樞, 傷寒論 등(물론 다른 서적도 포함될 수 있지만)을 熟知한 상태에서, 醫學의 經驗과 思想은 東醫寶鑑에서 많은 영향을 받았으며 이를 근거로 새로운 시각의 醫學인 東醫壽世保元을 저술하였다는 것이다.

즉 東武는 許浚의 醫學經驗을 상당히 높이 평가하고 東醫寶鑑에 나타난 醫學思想을 계승하여 四象醫學으로 발전시켰다고 하겠다.

宋²⁵⁾은 東醫寶鑑과 東醫壽世保元の 두 醫學에서 함께 韓國醫學의 獨自의 發展精神을 찾을 수 있다고 하였다. 특히 治療醫學의 擴大精神, 實用的 要約精神, 庶民醫學의 具顯精神이 두 醫學에 나타나고 있으며, 나아가 두 의학이 다 같이 形象醫學을 추구하고 있으나 許浚은 劃一的 形象醫學(形氣論의 形象醫學)을 추구한데 비하여 四象醫學은 四體質的 形象醫學(形心論의 形象醫學)을 추구하고

있다고 하였다.

東武 李濟馬는 既存醫學을 부정하고 기존의학과 완전히 단절된 상황에서 四象醫學을 제창한 것이 아니라, 本論에서 확인한 바와 같이 기존의 특히 東醫寶鑑의 의학정신을 누구보다도 잘 이해하고 있었기 때문에 發展的 次元에서 새로운 시각으로의 認識轉換이 가능했던 것이며, 既存醫學과 연속선상에서 獨創의인 四象醫學을 제창한 것이다.

東武는 단순히 內經醫學의 理論的 思考나 張仲景 傷寒論의 對病的 辨證思想을 중심으로 한 것이 아니라, 許浚 東醫寶鑑의 독특한 思想인 形象醫學 精神을 이어받아 四象醫學을 제창한 것이다.

許浚의 東醫寶鑑이 自然을 大宇宙 人間을 小宇宙라는 天人關係의 人間觀에서 출발한 形象醫學으로 人間의 一般的 生理現象(共通生理現象)을 설명하고 있다면, 四象醫學은 사람(自己)과 사람(他

人)사이의 關係를 강조한 人間中心思想에서 출발한 心身論的 人間觀을 제시하고 있으며 이 관계의 가장 중요한 연결 核心이 心이라는 것이다.

나아가 이 心을 이해하기 위한 방법으로 知人과 正己를 제시하고 있으며 知人 正己의 과정에서 四象人의 臟腑性理를 체득하였다고 하겠다.

이러한 차원에서 李濟馬는 許浚의 形象醫學과는 軌를 달리하여 個體의 特性을 강조한 差等的 形象醫學을 제시하게 된 것이며 이 점이 바로 四象醫學의 醫學的 淵源이며 誕生 背景이라 하겠다.

結論의으로 東醫寶鑑이 醫學的 측면에서 李濟馬의 醫學思想에 가장 많은 영향을 끼쳤음을 알 수 있으며, 다른나라가 아닌 바로 우리나라에서 四象醫學이 탄생하게 된데에는 李濟馬가 時代的 地域的으로 儒學思想과 東醫寶鑑의 醫學情神을 흡수할 수 있었기 때문에 가능했다고 하겠다.

<도표 1>

東醫壽世保元 病證論에서의 引用文獻別 빈도수

(단 東醫壽世保元에 제시된 引用文獻을 근거로하여)

	少陰人		少陽人		太陰人		太陽人		합 계
	表	裏	表	裏	表	裏	表	裏	
1. 張仲景 傷寒論	22	27	10	4	2	1			66
2. 危亦林 得效方	1			2		2			5
3. 龔信 醫鑑	2	1	1	1		5		1	11
4. 許叔微 本事方	1								1
5. 王好古 海藏書	1	1		2					4
6. 樓英 醫學綱目	1	2		1					4
7. 成無己 明理論	1	1							2
8. 朱震亨 丹溪心法	1	1	1	1				1	5
9. 李梈 醫學入門	2	6				1			9
10. 朱肱 活人書	4	5	1	1		1			12
11. 李杲 東垣十書		1		1					2
12. 王叔和 脈經		1				1			2
13. 杜壬			1						1
14. 李子健 傷寒十勸論			1						1
15. 醫方類聚				2					2
16. 孫思邈 千金方				1					1
17. 內經						1	1		2
18. 靈樞						2	1		3
19. 難經						1			1
20. 張鷟峯								1	1
21. 脈法						1			1
22. 古醫			1						1
합 계	36	46	16	16	2	16	2	3	137

<p>東醫壽世保元 제시된 인용문헌</p>	<p>실제 引用文獻</p>
<ol style="list-style-type: none"> 1. 張仲景 傷寒論 2. 危亦林 得效方 3. 龔信 醫鑑 4. 許叔微 本事方 5. 王好古 海藏書 6. 樓英 醫學綱目 7. 成無己 明理論 8. 朱震亨 丹溪心法 9. 李梴 醫學入門 10. 朱肱 活人書 11. 李杲 東垣十書 12. 王叔和 脈經 13. 杜壬 14. 李子建 傷寒十勸論 15. 醫方類聚 16. 孫思邈 千金方 17. 內經 18. 靈樞 19. 難經 20. 張鷟 21. 脈法 22. 古醫 	<p>張仲景의 傷寒論과 金匱要略이 함께 인용되고 있다.</p> <p>龔信의 古今醫鑑과 龔廷賢의 萬病回春이 함께 인용됨</p> <p>海藏書란 책은 없다.</p> <p>東醫壽世保元에는 저자가 명시되어 있지 않다.</p> <p>저자가 책을 구하지 못하고 丹溪心法附餘로 대신함</p> <p>宋代人이며 저서로 “醫准”一卷이 있으나 전해지지 않음 李子建은 宋代 사람으로 傷寒十勸을 저술하였으나 活人書에 포함되어 전해짐</p> <p>본론 F-11은 실제 內經 素問에 존재하지 않음 본론 G-2는 실제 素問의 내용임</p> <p>張鷟은 확인할 수 없으며 東醫寶鑑에서는 丹溪心法에서 인용한 것으로 되어 있다.</p> <p>脈法이란 책은 없고 東醫寶鑑 瘟疫門 脈法항에 언급된 것을 그대로 옮긴 것이며 脈經에서 확인된다.</p> <p>李濟馬 자신이 전해들은 얘기를 그대로 적은 것으로 보인다.</p>

<도표3>

東醫壽世保元の 引用文과 東醫寶鑑, 引用原書와의 比較

해당서적		해당조항		회수
東醫壽世保元の 引用文이 東醫寶鑑 그리고 引用原書에서 함께 확인되는 경우		A-13, 14, 18, 21, 24, 26, 28, 36 B-1, 10, 13, 18, 21, 23, 24, 27, 35, 37, 40, 45 C-1, 2, 6, 9, 11, 12, 15, 16 D-1, 8, 10, 11, 14, 15 E-2 F-2, 3, 5, 15, 16 G-1		41
東醫壽世保元の 引用文이 東醫寶鑑 과 일치하는 경우(引用原書와도 유사하나 東醫寶鑑과 더 일치하는 경우도 포함)		A-1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 19, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35 B-2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 38, 39, 41, 43, 46 C-3, 4, 5, 7, 8, 10 D-2, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13, 16 E-1 F-1, 4, 6, 8, 10, 11, 13, 14 H-2, 3		83
東醫壽世保元 引用文이 引用原書에서만 확인되는 경우		없음		0
東醫壽世保元 引用文이 東醫寶鑑에서 확인되고 引用原書와는 다른 서적에서 확인되는 경우		F-7, 9, 12 G-2		4
기 타	引用文이 丹溪心法으로 되어 있어 引用原書를 확인하지 못한 경우	A-20, B-44, C-13 D-7, H-1	5	9
	東醫壽世保元 引用文이 東醫寶鑑과 내용이 비슷하나 꼭 일치하지는 않는 경우	A-25 B-33, 42	3	
	東醫寶鑑에서 확인하지 못한 경우	C-14	1	
총 회수				137

<도표 4>

東醫壽世保元 引用文과 東醫寶鑑과의 比較

東醫寶鑑 東醫壽世保元		寒	瘟疫	大便	津液	黄疸	消渴	虚勞	燥	嘔吐	用藥	회수
소음인	表病	33	1	1	1							36
	裏病	35				11						46
소양인	表病	15									1	16
	裏病	5			1		9	1				16
태음인	表病	2										2
	裏病	4	6				3	2	1			16
태양인	表病							2				2
	裏病									3		3
회수		94	7	1	2	11	12	5	1	3	1	137

V. 結論

東醫壽世保元 病證論에 引用된 引用文을 중심으로 고찰한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

- 1) 東醫壽世保元 病證論에 引用된 引用文은 引用文獻 원서보다는 東醫寶鑑을 근거로 하고 있다.
- 2) 醫學의 측면에서 四象醫學의 배경은 東醫寶鑑의 形象醫學 精神에서 구할 수 있다.
- 3) 既存의 證治醫學이 天人關係의 人間觀이 중심이된 一般의이고 共通의인 生理를 바탕으로 하여 성립된 形象醫學이라면, 四象醫學은 心身關係의 人間觀을 중심으로 個體의 特性을 강조한 差等的 形象醫學이다.
- 4) 四象醫學은 既存의 證治醫學을 부정하고 단절된 상황에서 탄생된 醫學이 아니라, 既存 醫學(특히 東醫寶鑑)과 연속선상에서 출발한 새로운 시각의 發展的 醫學이다.
- 5) 四象醫學은 儒學思想을 가진 李濟馬가 東醫寶鑑의 精神을 습득할 수 있었기 때문에 탄생할 수 있었으며, 韓國醫學의 새로운 발견이며 獨自의 主體醫學이라 하겠다.

參考文獻

- 1) 蔡仁植:傷寒論譯註, 서울, 高文社, 1985
- 2) 許浚:東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1983
- 3) 洪淳用,李乙浩:四象醫學原論, 서울, 杏林出版, 1985
- 4) 洪元植 編:精校 黃帝內經素問, 서울, 東洋醫學研究院出版部, 1985
- 5) 洪元植 編:精校 黃帝內經靈樞, 서울, 東洋醫學研究院出版部, 1984
- 6) 洪元植 編:中國醫學史, 서울, 東洋醫學研究院,

1984

- 7) 龔信:古今醫鑑, 江西省, 江西科學技術出版社, 1990
- 8) 龔廷賢:萬病回春, 臺南市, 莊家出版社, 中華民國68年
- 9) 樓全善:醫學綱目, 臺南市, 臺南北一出版社, 中華民國62年
- 10) 孫思邈:備急千金要方, 서울, 大星文化社, 1984
- 11) 王叔和:脈經, 香港, 太平書局, 1982
- 12) 危亦林:世醫得效方, 北京, 人民衛生出版社, (서울醫聖社影印本) 1990
- 13) 李杲:東垣十鍾醫書, 서울, 大星文化社, 1983
- 14) 李雲 主編:中醫人名辭典, 北京, 國際文化出版公司, 1988, P.43, 270
- 15) 李梴:醫學入門, 서울, 翰成社, 1984
- 16) 張仲景:仲景全書, 서울, 大星文化社, 1984
- 17) 浙江省中醫研究所, 湖州中醫院 校:醫方類聚 校點本 第六分冊, 北京, 人民衛生出版社, 1980
- 18) 朱肱:增注類證活人書, 서울, 南山堂, 1987
- 19) 朱震亨原著, 方廣 編註:丹溪心法附餘, 서울, 大星文化社, 1982
- 20) 中國中醫研究員 中國醫史文獻研究所:中醫人物辭典, 上海, 上海辭書出版社, 1988, p.47, 50, 192, 219
- 21) 許叔微:普濟本事方 上海 上海科學技術出版社, 1987, p.128
- 22) 滑壽原著, 吳埴村編:難經本義 臺南市 莊家出版社 中華民國73年 pp.48~49
- 23) 金達來:李濟馬의 學問的 背景과 四象醫學의 形成時期에 對한 研究, 四象醫學會誌 Vol.2, No.1, 1990
- 24) 宋一炳:李濟馬 哲學의 學問的 背景과 四象醫學의 成立에 對한 考察, 四象醫學會誌 Vol.3, No.1, 1991
- 25) 東醫寶鑑을 四象醫學 領域에서 살펴본 特徵

과 끼친 影響, 四象醫學會誌 Vol.4, No.1,
1992

26) 宋正模:四象醫學의 原理와 哲學的 背景에 對
한 考察, 四象醫學會誌 Vol.4, No.1, 1992