

雲霧移睛에 對한 文獻的 考察

孫炯宰 · 金中鎬* · 蔡炳允*

I. 緒 論

雲霧移睛은, 外的으로는 正常이나 患者가 自覺적으로 눈앞에 마치 蚊蠅이나 雲霧가 날아다니는 듯한 느낌을 갖는 것으로⁹⁾, 흰 벽이나 푸른 하늘을 쳐다보면 어떤 物質(물방울 머리카락等)이 움직이고 있는 듯한 느낌이 있는 것으로, 이를 西洋醫學에서는 飛蚊症이라 하며, 飛蚊症이 甚해지면 視力이 障礙를 받게되고, 甚할 境遇 急激히 視力을 잃는 境遇도 있다.

硝子體는 透明하고 血管이 없는 Gel로서, 眼球 容積 및 무게의 2/3를 차지하고 있으며, 正常 狀態에서 透明한 媒體의 役割을 하며, 그 內壓으로 眼球의 外形을 維持하고, 網膜을 眼球壁에 密着시키는 作用을 한다. 隣接한 組織으로는 水晶體, Zinn's Zonule, 毛樣體, 網膜, 視神經 乳頭 등이 있다.^{4,5)}

硝子體에는 生理的이나 病的으로 여러가지 狀態의 混濁이 發生하는데, 混濁이 작고 질을 때에는 飛蚊症을 呼訴하기 쉽고, 硝子體속에 크고 強하게 생겼을 때에는 視力이 떨어진다.

生理的으로는 나이에 隋伴하는 硝子體 融解에 의해서 실보무라지 모양 또는 덩어리 形態의 混濁을 보이며, 또 後部の 硝子體 剝離에 의해 硝子體 境界膜의 乳頭緣이 收縮 混濁하여 고리모양의 混濁으로 나타나는 境遇도 많다. 強度의 近視眼에서도 硝子體 融解에 의한 混濁을 보일 수 있다.

病的으로는 베체트병, Sarcoidosis의 葡萄膜炎일때, 또 網膜炎이나 硝子體 出血 등으로 硝子體 混濁이 생기는 境遇도 있고, 網膜 剝離에 앞서 飛蚊症으로 自覺되는 境遇도 종종 있다.

東洋醫學에서는 雲霧移睛^{18,29,44)}을 眼見飛禽形²⁶⁾, 蠅翅黑花²⁴⁾, 혹은 目妄見⁵⁵⁾ 등으로 記述하여 本症을 言及했다.

이에 著者는 文獻을 通하여 本症의 治療에 도움을 주고자 本症의 原因, 治療藥에 對하여 調査整理한 結果를 報告하는 바입니다.

II. 資料 및 方法

1. 資料

文獻 56種을 資料로 選定하여 雲霧移睛에 관한 內容을 拔萃하여 그 原因, 症狀 및 治療藥에 對하여 研究 檢討하였다.

2. 方法

1) 雲霧移睛에 對하여 原因 및 治療藥을 分類하고 그 頻度を 調査하였다.

2) 症狀에 있어서는 歷大文獻 中에서 그 內容을 拔萃하여 摘錄하였다.

3) 原因에 있어 같은 것으로 看做될 때 하나의 項目에 包含시켰다.

4) 治療藥에서는 處方名이 같으나, 構成 藥物에 있어 한 두가지 加減하였을 境遇, 같은 項目에 記入하고 加減된 治療藥을 따로 出典을 記

慶熙大學校 韓醫科大學 大學院

*慶熙大學校 韓醫科大學 外官科學教室

錄하였다.

5) 頻度に 있어 原因, 治療藥 모두 2回 以上 만을 記錄하였다.

Ⅲ. 本 論

1. 原因 分類 및 頻度

№	原	因	頻度
1.	肝腎虧損 ⁴⁵⁾ 精血不足 目厥失 養 ^{12,16,19,28,35,48,51)} 肝腎不足 7,10,18,49,54)	目厥失	12
2.	熱氣甚 ^{10,17,27,39,40)} 熱證 ^{9,29)} 熱傷氣血 火鬱經絡 血熱妄行 溢于絡外 ^{16,28,45)}	熱證 ^{9,29)}	10
3.	濕熱鬱蒸 ^{16,19,28,45)} 或 痰濕內 壅 濁氣上泛 ^{12,34,35,49)}	痰濕內壅	9
4.	元府有傷 ^{27,29,40)} 玄府有傷 ⁹⁾ 玄府閉密 ^{10,17,41)} 玄府有所閉 合者 ³⁹⁾	玄府有傷 ⁹⁾	8
5.	久病虛羸 或 經產失血過多 以致氣血不足 ^{16,34,35)} 氣血虧虛 ⁴⁵⁾ 氣血不足 ^{16,33,47,49)}	氣血虧虛 ⁴⁵⁾	8
6.	肝氣鬱結 氣滯血瘀 ^{12,16,19,28,34, 35,51)}	氣滯血瘀	7
7.	脾虛濕困 ^{12,16,34,35,51)}	脾虛濕困	5
8.	腎水衰 ^{24,50)} 腎水既虛 ^{46,47)} 腎精虧 ¹¹⁾	腎水既虛 ^{46,47)}	5
9.	腎虛 ^{10,13,14,27)}	腎虛	4
10.	腎氣弱 ^{10,17,25,40)}	腎氣弱	4
11.	陰虛火旺 灼傷目絡 血溢絡外 ^{12, 34,35,51)}	灼傷目絡	4
12.	痰火傷肺 金之清純不足 ^{9,29,42,44)}	痰火傷肺	4
13.	悲哭太過 ^{9,29,54)}	悲哭太過	3
14.	深思積忿者 ^{9,29,54)}	深思積忿者	3
15.	脾胃清純之氣有傷其絡 ^{9,29,44)}	脾胃清純之氣有傷其絡	3

№	原	因	頻度
16.	肝膽血虛 ^{3,53)}	肝膽血虛	3
17.	膽腎自病 ^{29,44)}	膽腎自病	2
18.	虛弱不足人 ^{9,29)}	虛弱不足人	2
19.	陽氣不失 陰氣競生故也 ^{33,47)}	陽氣不失 陰氣競生故也	2
20.	肝膽勞傷 ^{33,47)}	肝膽勞傷	2
21.	小兒疳證 ^{9,29)}	小兒疳證	2
22.	傷寒日久 ^{9,29)}	傷寒日久	2
23.	眼外傷 ^{9,35)}	眼外傷	2

2. 症狀

1) 『諸病源候論』

目茫茫候

夫目是五臟六腑之精華……或惡見火光 視見蜚
蠅黃黑也……

2) 『太平聖惠方』

治眼見黑花諸方

夫眼見黑花 皆起於臟腑 爲陽氣不實 陰氣競生
故也 凡人陰陽安和 精氣上注於目 故能令明目也
若肝膽勞傷 氣血不足 而更注目強視 看讀細書
勞動所傷 承虛致患 或有因患起早 榮衛氣虛 恣
食五辛 而傷正氣 攝養既已失度 眼目於此患生 靨
物或如飛蠅 或如亂髮 因茲藏久 漸變多般 黑白
象龍蛇之形 遠近如烟霧看物 針藥宜補於五臟 保
養須在於十全 不值良醫 疾狀彌篤 立成內障也

3) 『聖濟總錄』

目見黑花飛蠅

論曰腎木也 肝木也 木得水而盛也 其理明矣
腎水既虛 肝無以滋養 故見于目者 始則○○不
能矚遠 久則昏暗 時見黑花飛蠅 其證如此 腎虛可
知也 治宜以益腎水 去肝風之劑 則標本兩得矣

4) 『普濟方』

目見黑花飛蠅

治眼見黑花諸方

夫眼見黑花 皆起於臟腑 爲陽氣不實 陰氣競生 故也 凡人陰陽安和 精氣上注於目 故能令明目也 若肝膽勞傷 氣血不足 而更注目強視 看讀細書 勞動所傷 承虛致患 或有因患起早 榮衛氣虛 恣食五辛 而傷正氣 攝養既已失度 眼目於此患生 覩物或如飛蠅 或如亂髮 因茲藏久 漸變多般 黑白象龍蛇之形 遠近如烟霧看物 針藥宜補於五臟 保養須在於十全 不值良醫 疾狀彌篤 立成內障也

聖濟總錄曰 腎水也 肝木也 木得水而盛也 其理明矣 腎水既虛 肝無以滋養 故見于目者 始則○○不能屬遠 久則昏昏 時見黑花飛蠅 其證如此 腎虛可知也 治宜以益腎水 去肝風之劑 則標本兩得矣

5) 『銀海精微』

蠅翅黑花

問曰 人之患 眼目有黑花 茫茫如蠅翅者 何也

答曰 此腎水衰 腎乃肝之母 腎水不能濟於肝木 則虛熱 膽乃生於 肝之侵 肝木焦枯 膽氣不足 故行動舉止 則眼中 神水之中 蕩漾有黑影 如蠅翅者

6) 『證治準繩』

雲霧移睛證

謂人自見目外有如蠅蛇 旗○ 蚊蝶 條環等狀之物 色或青黑粉白微黃者 在眼外空中飛揚撩亂 仰視則上 俯視則下也 乃玄府有傷 絡間精液耗○ 鬱滯清純之氣而爲內障之證 其原皆屬膽腎 黑者 膽腎自病 白者 因痰火傷肺 金之清純不足 黃者 脾胃清純之氣有傷其絡 蓋瞳神乃先天元陰之所主 稟聚五

臟之精華 因其內損而見其狀 虛弱不足人 及經產去血太多 而悲哭太過 深思積忿者 每有此病 小兒疳證熱證 瘡疾 傷寒日久 及目痛久閉 蒸傷精液 清純之氣 亦有此患 幼而無知 至長如曉 氣絡已定 治亦不愈

7) 『審視搖函』

雲霧移睛症

雲霧移睛 元虛者殃 自視目外 有物舒張 或如蠅茲飛狀 或如旗○飄揚 有如粉蝶 有滯青黃 昏屬腎膽 內障難當 真氣耗損 氣汁有傷 自宜謹慎 思患須防。

8) 『張氏醫通』

雲霧移睛證

自見如蠅飛花墮 旗○條環 空中撩亂 或青黃黑白 仰視則上 俯視則下也 乃絡間津液耗滯 鬱滯清純之氣而然 其原皆屬膽腎 黑者 膽腎自病 補腎磁石丸 或白或黃者 因痰火 傷肺脾清純之氣也 皂莢丸

9) 『日經大成』

目妄見

一抹微霞照眼明 飛蠅舞蝶趁新睛 何來旗○開還卷 不盡絲環減復生 把酒弓蛇先在蓋 瞻天 火亂搖星 妖氛如此因何致 木落風騰火上升 此目亦無外症 然無中生有 如游絲 結髮 飛蠅 舞蝶 蛇旗 條環等 物之狀 色或青黑 粉白 微黃 看眼外空中飛揚撩亂 條減條生 仰視則上 俯視則下 本科謂雲霧移睛者是

3. 治療藥 種類斗 頻度

NO	處方名	構成藥物	頻度
1	明目地黄丸	生地黃, 熟地黃, 知母, 黃柏, 菟絲子, 獨活, 枸杞子, 牛膝, 茯苓 9, 12, 14, 15, 18, 28, 34, 35, 45, 48, 51)	14
2	駐景丸	熟地黃, 車前子, 菟絲子, 五味子, 枸杞子, 楮實子, 當歸, 川椒 18, 25, 28, 40, 48, 51, 52)	7

處方名	構成藥物	頻度
3. 猪苓散	猪苓, 車前子, 木通, 大黃, 梔子, 滑石, 狗脊, 篇蓄, 蒼朮 ^{9,18,19,24,28,51,54}	7
4. 丹梔逍遙散	柴胡, 當歸, 白芍藥, 茯苓, 白朮, 甘草, 薄荷, 生薑, 丹皮, 梔子 ^{12,15,28,35,48}	5
5. 血府逐瘀湯	當歸, 生地黄, 桃仁, 紅花, 枳殼, 赤芍, 柴胡, 甘草, 桔梗, 川芎, 牛膝 ^{12,28,34,35,51}	5
6. 三仁湯	杏仁, 滑石, 白豆蔻, 厚朴, 通草, 竹葉, 薏苡仁, 半夏, 黃芩, 梔子, 車前子 ^{12,34,35,51}	4
7. 八珍湯	當歸, 川芎, 白芍, 熟地黄, 人參, 白朮, 白茯苓, 甘草 ^{15,34,35,45}	4
8. 生蒲黃湯	蒲黃, 旱蓮草, 生地黄, 荆芥, 丹皮, 鬱金, 丹參, 川芎 ^{12,34,35,48}	4
9. 芎歸補血湯	生地黄, 天門冬, 川芎, 牛膝, 白芍藥, 炙甘草, 白朮, 防風, 熟地黄, 當歸身 ^{9,34,35,48}	4
10. 六君子湯加減	人參, 白朮, 白茯苓, 甘草, 陳皮, 半夏, 生薑, 大棗 ^{12,34,35}	3
11. 知柏八味丸	知母, 黃柏, 熟地黄, 山茱萸, 山藥, 白茯苓, 澤瀉, 丹皮 ^{9,28,48}	3
12. 鞋人丸	鞋人, 地膚子, 白茯苓, 細辛, 人參, 石決明, 地骨皮, 白朮, 石膽, 熟地黄, 楮實子, 空青, 防風, 青羊膽, 鯉魚膽 ^{9,18,47}	3
13. 菊睛丸	甘菊, 巴戟, 肉蓯蓉, 枸杞子 ^{17,25,52}	3
14. 乾地黄丸	熟乾地黄, 石斛, 菟絲子, 防風, 黃芪, 車前子, 茺蔚子, 覆盆子, 肉蓯蓉, 磁石, 地膚子, 兔肝 ^{33,46,47}	3
15. 決明丸	決明子, 甘菊, 車前子, 防風, 蔓荊子, 川芎, 乾地黄, 梔子仁, 細辛, 白茯苓, 玄參, 山藥 ^{33,46,47}	3
16. 磁石丸	磁石, 朱砂, 神曲 ^{33,46,47}	3
17. 還睛散	獨活, 麻黃, 白茯苓, 厚朴, 五味子, 蒺藜, 槐子, 枸杞子, 薺實子, 麥門冬, 人參, 細辛, 白芷, 決明子, 車前子, 茺蔚子, 覆盆子, 地膚子, 丹參, 川芎, 防風, 黃芩, 升麻, 黃連, 遠志, 木通, 柏子仁 ^{33,46,47}	3
18. 皂莢丸	蛇蛻, 蟬蛻, 元精石, 穿山甲, 當歸, 白朮, 白茯苓, 穀精草, 木賊, 白菊花, 刺楸皮, 龍膽草, 赤芍藥, 連翹, 獺猪爪, 人參, 川芎 ^{42,44}	2
19. 補腎磁石丸	磁石, 甘菊, 石決明, 菟絲子, 肉蓯蓉 ^{42,44}	2
20. 羚羊羌活湯	黃芪, 炙甘草, 羚羊角, 羌活, 黃芩, 山茱萸, 車前子, 附子, 人參, 青箱子, 決明子, 澤瀉, 秦艽, 柴胡 ^{9,18}	2
21. 黑參湯	玄參, 黃芩, 生地黄, 赤芍藥, 菊花, 青箱子, 白蒺藜 ^{9,24}	2
22. 補肝散	柴胡, 赤芍藥, 熟地黄, 白茯苓, 甘菊, 細辛, 甘草, 柏子仁, 防風 ^{8,41}	2
23. 撥雲散	蔓荊子, 楮實, 羌活, 蒺藜, 青箱子, 惡實, 防風, 菊花, 旋復花, 甘草, 穀精草, 石決明, 地骨皮, 蟬蛻, 木通, 牡蠣, 竹葉, 烏賊骨,	2

№	處方名	構 成 藥 物	類 度
		白花蛇, 木賊, 龍膽, 細辛, 密蒙花, 蒼朮 ^{33,47)}	
24.	羌活散	羌活, 甘草, 石決明, 石膏, 密蒙花, 蒼朮, 防風, 蒺藜, 木賊, 蔓菁子, 威靈仙, 桑葉, 荆芥穗, 原蠶沙 ^{33,47)}	2
25.	鞋人散	鞋人, 羌活, 天麻, 槐子, 山梔子, 黃芩, 黃連, 菊花 ^{33,47)}	
26.	熟鳩丸	熟鳩, 羊肝, 蔓菁子, 蜀椒, 楮實, 仙靈脾, 木賊, 羌活, 蟬蛻, 甘菊, 荆芥穗, 蒼朮, 蒺藜 ^{33,47)}	2
27.	從蓉散	肉從蓉, 巴戟, 檳榔, 萆薢, 麥門冬, 犀角, 羚羊角, 陟厘, 黃芩, 茺蔚子, 枸杞子, 人蔘, 玄參, 木香, 菟絲子, 槐子, 決明子, 丹參 ^{33,47)}	2
28.	羚羊角散	羚羊角, 羌活, 黃芩, 人蔘, 決明子, 車前子, 防風, 玄參, 細辛, 甘菊, 甘草 ^{33,47)}	2
29.	肉從蓉圓	肉從蓉, 磁石, 神麴, 青鹽, 雀兒, 菟絲子 ^{33,47)}	2
30.	磁石圓	磁石, 柏子仁, 黃芪, 防風, 乾薑, 白茯苓, 遠志, 桂心, 附子, 地骨皮, 巴戟, 牛膝, 熟乾地黃, 覆盆子, 鹿茸, 肉從蓉 ^{33,47)}	2
31.	羚羊角湯	羚羊角, 決明子, 人蔘, 升麻, 玄參, 車前子, 羌活, 防風, 細辛 ^{33,47)}	2
32.	芎藭丸	川芎, 細辛, 蟬蛻, 甘菊, 荆芥穗, 蒼朮, 鞋人, 犀角, 羚羊角 ^{33,47)}	2
33.	防風湯	防風, 羚羊角, 車前子, 細辛, 羌活, 黃芩, 人蔘, 決明子, 玄參, 甘草, 甘菊 ^{33,47)}	
34.	蜀椒丸	蜀椒, 玄參 ^{33,47)}	2
35.	賁肝散	羌活, 獨活, 青箱子, 款冬花, 羊肝 ^{33,47)}	2
36.	枸杞丸	枸杞子, 巴戟, 旋復花, 蜀椒 ^{33,47)}	2
37.	神効散	石決明, 黃連, 密蒙花 ^{33,47)}	2
38.	磁石湯	磁石, 黃芪, 人蔘, 沈香, 川芎, 桂心, 蒼蒲, 當歸, 補骨脂, 熟乾地黃, 肉從蓉, 附子, 羌活, 五味子, 乾薑, 覆盆子 ^{33,47)}	2
39.	五倍丸	巴戟, 枸杞子, 甘菊, 旋復花, 蜀椒 ^{33,47)}	2
40.	兔肝丸	兔肝, 羌活, 黃連, 菊花, 地骨皮, 龍齒, 車前子, 青箱子, 防風, 柴胡, 萎鞋, 白附子 ^{33,47)}	2
41.	羌菊丸	羌活, 菊花, 白茯苓, 蒺藜, 枳角, 附子, 肉從蓉, 黃芪, 沈香, 兔肝, 萆薢 ^{33,47)}	2
42.	通明丸	石決明, 芍藥, 桔梗, 車前子, 茺蔚子, 熟乾地黃, 細辛 ^{33,47)}	2
43.	黃連丸	黃連, 甘菊, 車前子, 羚羊角, 芒硝 ^{33,47)}	2

IV. 考 察

眼病을 發病 部位에 根據하여 分類하면 外障과 內障으로 兩大할 수 있다. 外障은 胞臉, 兩眦, 白睛, 黑睛 等の 部位病變이며, 內障은 瞳神의 病變이다^{12, 15, 19, 34, 35, 45, 48};

雲霧移睛은 危³⁸의 內·外障 七十五證에는 記述되어 있지 않고, 傳¹⁸ 王²⁹에 따르면 內障에 屬하는 證으로 記述되어 있으며, 許¹⁰에 依하면 眼昏 및 眼花에 附屬되어 記述되어 있고, 蔡⁹에는 眼昏眼花疾患 中에 屬하며, 廖^{34, 35}等^{12, 15, 19, 28, 45, 48, 51}에 依하면 瞳神疾患으로 되어 있다.

西洋 醫學的 面에서 볼 때 硝子體 混濁(Vitreous Opacity)에 該當한다고 할 수 있으며, 이를 分類^{4, 5}하면,

1) 飛蚊症은 輕한 硝子體 混濁인데, 까만 점, 실, 먼지같은 것이 나타나며, 後硝子體 剝離, 輕한 硝子體의 出血, 葡萄膜炎 때도 나타난다.

2) 硝子體 出血로, 出血은 網膜, 脈絡膜, 毛樣體의 血管組織에서 發生하는데 眼球의 外傷, 網膜의 여러가지 出血性 疾患, 糖尿病性 網膜症, 出血疾患 등이 原因이 된다. 輕한 出血때는 飛蚊症만 나타나고, 甚한 出血때는 完全 失明(暴盲)이 된다.

3) 炎症性 混濁은, 葡萄膜, 網膜, 視神經 等の 眼內 組織에 炎症이 있으면 滲出液, 炎症細胞, 色素 및 纖維 등이 硝子體로 나와서 混濁을 일으키는데, 混濁의 程度는 炎症의 性質과 程度에 따라 달라진다.

4) 星狀 硝子體症은, 硝子體腔內 특히 前半部나 後半部에 여러가지 크기의 黃色物質(칼슘과 脂肪酸의 化合物, Calcium soap)이 多數 散在하는 것으로, 대개 60歲 以後의 老人에서 偏眼에 생긴다.

5) 閃光性 硝子體 融解는, 대개 40歲 前에

兩眼에 發生하는데 黃色의 콜레스테롤 結晶體가 떠다니는 것이 보이는데, 대개 慢性 葡萄膜炎이나, 오래된 網膜剝離, 眼內出血 等 眼球의 慢性狀態에서 볼 수 있다.

硝子體 動脈 殘留 및 增殖性 一次 硝子體 殘留와 같은 先天 異狀으로 나타나는 境遇도 있다. 網膜剝離의 前驅症狀, 惡性近視, 全身疾患 中의 Sarcoidosis 및 Beheet's dis. 에서도 나타날 수 있다.

以上과 같이 살펴볼 때, 硝子體가 混濁해졌을 때 飛蚊症이 나타난다. 이러한 飛蚊症은 韓醫學에서 볼 때 雲霧移睛證에 相當한다고 볼 수 있고 그 原因은 肝腎虧損^{12, 16, 19, 28, 35, 46, 48, 51} 또는 肝腎不足^{7, 10, 18, 49, 54}이 12回로 가장 높았고, 熱氣甚^{10, 17, 27, 39, 40}에 依한 것이 10回였고, 濁氣上泛^{12, 34, 35, 49}에 依한 것이 9回였고, 久病虛羸^{16, 34, 35} 및 氣血不足^{16, 33, 47, 49}이 8回였고, 玄府有傷^{27, 29, 40}에 依한 것이 8回였다.

原因에서 肝腎虧損, 熱證, 濕熱 및 氣血不足이 頻도가 높게 나타난것은, 最近의 中國에서 發行된 醫學書籍^{34, 35}이 病因病機的 面에서 統一된 傾向을 보이고 있음을 알 수 있다.

元府(玄府)有傷은 歷代文獻 中 가장 많이 나온 原因인 바, 許¹⁰에 따르면 玄府者 無物不有 人之臟腑 皮毛肌肉筋膜骨髓爪牙 盡皆有之乃者 悉由熱氣怫鬱 玄府閉塞 而致氣液血脈 榮衛精神 不能升降出入故也 各隨鬱結微甚 而爲病之輕重 故知熱鬱於目 則無所見也 或目昏而見黑花者 由熱氣甚而發之於目也 이라 하여 玄府의 機能 및 熱氣가 甚할 境遇 傷함을 받는 바임을 알 수 있다.

治療藥은 明目地黃丸^{9, 12, 14, 15, 19, 28, 34, 35, 45, 48, 51}이 11回로 頻도가 가장 높았고, 駐景丸^{18, 52} 및 猪苓散^{9, 18, 19, 24, 28, 51, 54}이 7回였고, 丹梔逍遙散^{12, 15, 28, 35, 48} 및 血府逐瘀湯^{12,}

28,34,35,51) 이 5回 었다.

V. 結 論

以上과 같이 雲霧移睛의 原因, 症狀 및 治療藥에 對하여 調查 整理하였던 바, 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 雲霧移睛은 飛蚊症과 類似하며 硝子體 混濁時에 주로 나타나는데 生理的 境遇와 病的 境遇로 兩大 分類할 수 있다.

2. 生理的 境遇는 老人性 變化, 高度近視 및 後部 硝子體 剝離이고, 病的 境遇는 高血壓, 糖尿病, 血液疾患, 베체트병, Sarcoidosis 등으로 因한 出血이나 炎症이거나, 眼球組織 自體의 出血이나 炎症이다.

3. 原因은 肝腎虧損이 가장 많았고, 그 다음으로 熱氣甚 및 濕熱鬱蒸이 높았다.

4. 治療藥은 明目地黄丸이 가장 많았고, 그 다음으로는 駐景丸 및 豬苓散이 높았다.

5. 原因은 肝腎虧損이, 治療藥은 明目地黄丸이 가장 높게 나타났으며 이로 미루어 西洋醫學의 兩大分類에서 病的 境遇 보다는 生理的 境遇에 使用함이 有效하지 않을까 思料된다.

參 考 文 獻

1. 康命吉：濟衆新編，서울，杏林出版社，1982，pp.114-115.
2. 朴盛洙：現代韓方講座，서울，杏林出版社，1985，p.516.
3. 朴炳昆：韓方臨床 50年，서울，大光出版社，1979，p.405.
4. 尹東浩：眼科學，서울，一潮閣，1990，pp.149-153,169,203.
5. 尹源植：眼科學，서울，一潮閣，1980，pp.190,234-237,270.
6. 李相漸：眼耳鼻咽喉科學，서울，壽文社，1967，pp.70-71.
7. 李麟宰：袖診經驗神方，서울，癸丑文化社，1985，p.139.
8. 周命新：醫門寶鑑，서울，杏林書院，1975，pp.188,197.
9. 蔡炳允：眼耳鼻咽喉科學，서울，集文堂，1982，p.137.
10. 許 浚：東醫寶鑑，서울，南山堂，1981，pp.224-225.
11. 顧世澄：瘍醫大全，서울，太醫社，1975，pp.429,438.
12. 高慧筠外 2人：中醫眼科學耳鼻喉科學題解，北京，中醫古籍出版社，1987，p.49.
13. 龔延賢：壽世保元，臺北，旋風出版社，1973，p.424.
14. 龔延賢：萬病回春，臺北，臺中國圖書公司，1984，p.286.
15. 廣州中醫學院 編：中醫五官科學，北京，人民衛生出版社，1991，pp.76-78.
16. 樓 英：醫學綱目，서울，一中社，1991，pp.407,430.
17. 潘 楫：醫燈續焰，北京，人民衛生出版社，1988，p.451.
18. 傅仁宇：審視瑤函，臺北，東方圖書公司，1962，pp.184-185.
19. 上海中醫學院 編：五官科學，香港，商務印刷館，1982，pp.66-67.
20. 徐大春：徐靈台先生醫書全集，臺北，五洲出版社，1980，p.193.
21. 徐學山：醫學門徑，臺北，新文豐出版社，1976，p.423.
22. 葉天士：臨證指南醫案，香港，商務出版社，1976，卷1 p.25.
23. 巢元方：諸病源候論，臺中，昭人出版社，1982，p.66.

24. 孫思邈：銀海精微，서울，驪江出版社，1987，pp.735-958.
25. 孫一奎：赤水玄珠全集，北京，人民衛生出版社，1986，p.131.
26. 孫震元：瘍科會粹，北京，人民衛生出版社，1987，p.602.
27. 沈金鰲：沈氏尊生書，臺北，自由出版社，1979，p.545.
28. 楊醫亞：中國學問答(下)，臺北，人民衛生出版社，1985，pp.573-574.
29. 王肯堂：證治準繩，上海，科學技術出版社，1984，卷1 p.478.
30. 王鳳岐 外 1人：炎症的中醫辨治，北京，中國醫藥科技出版社，1990，pp.63,65,68,71.
31. 王 燾：外臺秘要，臺北，國立中醫藥研究所，1964，p.574.
32. 汪訊庵：醫方集解，서울，成輔社，1983，p.363.
33. 王懷隱：太平聖惠方，서울，翰成社，1980，pp.979-981.
34. 廖品正：中醫眼科學，長沙，湖南科學技術出版社，1990，pp.130-132.
35. 廖品正 外 1人：中醫眼科學，北京，人民衛生出版社，1990，pp.265-269.
36. 虞 搏：醫學正傳，서울，成輔社，1986，p.224.
37. 袁學洲編：秘傳眼科七十二症全書，北京，中醫古籍出版社，1972，p.79.
38. 危亦林：世醫得効方，서울，驪江出版社，1987，pp.528-529.
39. 劉 純：劉純醫學全集，北京，人民衛生出版社，1986，p.640.
40. 劉河間：劉河間三六書，서울，成輔社，1975，p.373.
41. 李 梴：醫學入門，南昌，江西科學技術出版社，1988，pp.749-753.
42. 林 0 琴：類證治裁，서울，成輔社，1980，pp.375,377.
43. 張介賓：景岳全書，서울，大成出版社，1988，p.549.
44. 張璐玉：張氏醫通，臺北，自由出版社，1963，p.405.
45. 張梅芳：中醫眼科，北京，人民衛生出版社，1989，pp.103-105.
46. 趙佶外：聖濟總錄，北京，人民衛生出版社，1992，pp.1880-1886.
47. 朱 橚：普濟方，上海，人民衛生出版社，1982，pp.816-823.
48. 中國眼喉科學 編：中國眼喉科學，成都，四川人民出版社，1982，p.39.
49. 中國中醫研究院 編：中醫症狀鑑別診斷學，北京，人民衛生出版社，1987，pp.602-603.
50. 中國中醫研究院 編：中醫證候鑑別診斷學，北京，人民衛生出版社，1990，pp.546,548.
51. 曾慶華外 1人：眼瓜針灸治療學，成都，四川科學技術出版社，1989，pp.351,355.
52. 陳師文：太平惠民和劑國方，臺北，人民衛生出版社，1973，pp.199-206.
53. 陳士鐸：辨證錄，北京，人民衛生出版社，1989，p.162.
54. 胡蔭臣：眼科三字經淺釋，西安，陝西科學技術出版社，1981，pp.39-40.
55. 黃庭鏡：目經大成，北京，中醫古籍出版社，1987，pp.180-181.
56. Daniel Vaughan 外 1人：Genetal Ophthalmology, S.F. Lange Med. Pub. 1968, pp.157.