

噎膈, 反胃, 胃癌의 治療에 관한 文獻的 考察

東國大學校 韓醫科大學 內科學教室

林 成 祐

I. 緒 論

최근 우리나라 疾病 死因 중 癌으로 인한 경우가 수위를 차지하는데, 특히 胃癌은 각종 惡性腫瘍疾患 중 가장 많은 것으로 보고⁵⁾²¹⁾ 되었다.¹⁾

腫瘍에 관한 韓醫學의 기록으로는 瘤, 噎膈, 反胃, 積聚, 癥瘕, 痰癖, 癰, 巖²³⁾²⁵⁾³⁴⁾⁴²⁾로 표기되어 있다. 이 가운데 어떤 병명이 胃癌을 지칭하는가는 확실하지 않으나 噎膈은 飲食不下 隔塞不通 服善滿 ----- 診形瘦而腹大 胃脘當心以痛 上肢兩脇 膈咽不痛 飲食不通⁷⁾³²⁾³⁹⁾으로 反胃는 吐食而不納 或 飲食突然貯塞以不下⁷⁾¹⁸⁾¹⁹⁾³²⁾⁴²⁾하는 症狀의 특성으로 胃癌과 가장 유사한 病으로 분류되었다.

胃癌의 治療이론으로는 補益藥物만을 爲主로 하는 扶正固本法과 活血化瘀, 清熱利濕, 軟堅散結하는 攻邪法 및 扶正固本에 表治를 하는 藥물을 配合하거나, 攻邪法을 加味하는 扶正攻邪法¹⁰⁾¹³⁾¹⁷⁾¹⁸⁾ 등의 3가지로 분류할 수 있다.

이러한 治療法이 臨床的으로 消化器管 惡性腫瘍患者의 治療에 양호한 效果가 인정되고 있는⁶⁾¹³⁾¹⁷⁾³⁰⁾ 가운데, 文獻에 나타난 噎膈, 反胃의 治療와 最近報告된 臨床결과를 考察하여 癌治療에 대한 內科的 治療법을 살펴보고 이를 通하여 消化器管의 惡性腫瘍治療에 도움을 얻고 앞으로 胃癌患者의 內科的 治療에 그 時期와 方法, 處方運用에 약간의 知見을 얻었기에 다음과 같이 보고하는 바이다.

II. 本 論

(東垣 十種醫書 脾胃論)¹⁹⁾

當先用 辛甘氣味 俱陽之藥 引胃氣以治其本 加都寒之藥 以瀉其標也, 寒月陰氣 大助陰邪於外 於正藥內 加 吳茱萸 大熱大辛苦之味 以瀉陰寒之氣, 暑月陽盛則於正藥中 加青皮 陳皮 益智 黃栢 散寒氣 泄陰火之上逆 或 以消痞丸合 滋腎丸, 滋腎丸者 黃栢 知母 微加肉桂 三味是也 或更以黃連別作丸.

神補丸: 治心膈痛 腹痛 血痛 腎氣痛 脇下痛 大便不通 氣噎 宿食不消.

加味平胃散: 治脾胃不和 不思飲食 心腹脇肋 脹滿刺痛 口苦無味 胸滿氣短 口噦惡心 噯氣吞酸 面色萎黃 肌體瘦弱 怠惰嗜臥 體重切痛 常多自利 或發霍亂 及 五噎 八痞 膈氣反胃

通幽湯: 治幽門不通上衝 吸門不開 噎塞 氣不得上下 治右幽門閉 大便難 此脾胃初受熱中 多有此證 名之曰下脘不通

草豆久丸: 治脾胃虛而心火乘之 不能滋榮上焦元氣 遇冬 腎與膀胱 之寒水旺時 子能令母實 致肺金大腸相輔而來 剋心乘脾胃 此大復其誰也.

(丹溪心法 翻胃)³⁴⁾

翻胃大約有四 血虛 氣虛 有熱 有痰兼病 必用童便薑汁 竹瀝 牛羊乳 生薑, 氣虛入四君子湯 右手脈無力 血虛入四物湯 加童便, 左手脈無力 切不可用香燥之藥 若服之必死, 宜薄滋味 治反胃用 黃連二錢 生薑汁浸炒山查肉二錢 保和丸二錢, 同爲末糊丸 如麻子大, 胞脂爲衣 人蔘

* 동국인천한방병원 소화기내과

湯入竹瀝 再煎一沸下六十丸，有痰 二陳湯為主，寸關脈沈或伏而大 有氣結宜 開滯

導氣之藥，寸關沈而澀 有內虛陰火上炎而反胃者 作陰火治之，年少者 四物湯 清胃院 血燥不潤便故澀，年老雖不治 亦用參朮關防氣虛胃虛，氣虛者 四君子湯加 蘆根 童便 或 參苓白朮散，或 菲汁 羊牛乳，又有積血停於內而微當消息推-----，氣虛者四君子湯為主熱以解毒為主 痰以二陳湯為主。

(萬病回春 翻胃)¹⁾

丹溪云 年高者不治，蓋年少之人氣血未虛 用藥除去痰 雖得漸愈 其病立復 所以然者 氣虛即不能運化而生痰 血虛即不能滋潤而生化也 又云此症 切不可用香燥之藥 而厚滋味 蓋症屬熱燥故不可用香燥之藥 香能散氣 燥能耗血 厚滋味能助火胃生痰也。大凡膈噎翻胃不可服辛熱香燥最能耗血糞如羊屎者不治。

(醫學入門)²³⁾

實火 黃連解毒湯加 童便 薑汁 或益元散 入薑汁證白脚為小丸 時時服之 溫六丸尤妙 甚者陶氏六一承氣湯 人參利膈丸，虛火冲上食不入者 枳桔二陳湯，渴者 陶氏白朮散 大便閉者 陶氏通幽湯 或 參仁丸 麻子仁丸。問有身受寒氣 口傷冷物 以致脾胃火衰 膈上苦冷 腸鳴 脈必滑微 宜暫用丁香煮散 五膈湯 五噎湯 單附子散去之 若不求其本 偏認為寒 概用辛香燥藥，-----痰飲 脈滑而伏 二陳湯----，食積 脈滑而短 枳朮丸 ----，七情鬱結 脈沈而澀 飲食喜靜 胸背痛者 四七湯 溫膽湯----，氣虛不能 運化生痰者 脈必緩而無力 四君子湯

----，血虛不能滋潤生火者 脈必數而無力 四物湯----，氣血俱虛者 八物湯為主。胃冷面青

手足厥 食久乃吐 二陳湯 加薑桂 甚加丁香附或丁香半夏丸，胃熱面紅手足熱食已則吐 二陳湯 加姜炒芩連山梔。暴甚 略 加檳榔 木香，胃口痛 加薑汁 或葛根竹茹湯 或小柴胡湯 加竹茹，

如時常嘔吐清水 冷涎自下涌上者 此脾熱所致也 二陳湯 加 白朮 白芍 升麻 炒芩蓮 山梔

神曲 麥芽 乾生薑等分，上焦吐者 氣衝胸痛 食已暴吐而渴 如當降氣和中 六君子湯加 木香 藿香 桔梗 枇杷葉 或 七氣湯，熱氣衝者 古荊黃湯 加人參 甘草 煨姜。

(東醫寶鑑)³⁸⁾

噎膈反胃治法：噎病生於血乾 夫血者陰氣也 陰主靜 內外兩靜 卽臟腑之火不起----何噎之有

(入門)¹⁹⁾

噎膈反胃大屬 血虛 氣虛----宜薄滋味(丹溪)

(醫宗必讀)²²⁾

-----經曰 能合生脈 可以萬全，此證之所以難者 方欲健脾理痰 恐燥劑有妨於津液 方欲養血生津 恐潤劑有碍於中州，審其陰傷火旺者 當以養血為含 脾傷陰盛者 當以溫補優先，更有憂叫盤磚火鬱閉結 神不大衰 脈猶有力 當以倉公 河間之法下之，小小湯丸 累累加用 關局自透 膈間痰盛 微微涌出 因而治下 藥勢易行 設或不行 蜜鹽下導 如終桃仁 自然宜通。

(景岳全書)²⁵⁾

反胃論治：治反胃之法 當辨其新久及所致之因 或以酷飲無度 傷於酒濕 或以縱食生冷 敗其

真陽----致損胃氣而然，故凡治此者 必宜以扶助正氣 健脾養胃為主，但新病者 胃氣猶未盡壞 若果飲食未消即 當兼祛其滯 若有逆氣未調 卽當兼解其鬱，若病稍久 或氣體稟弱之輩卽當專用溫補，不可標本雜進 妄行峻利 開導消食化痰等劑 以致重傷胃氣 以致不起也。

噎膈論治：凡治噎膈大法 當以脾腎為主 蓋脾主運化 而脾之大絡 布於胸膈，腎主津液 而腎之氣化主平二陰 故上焦之噎膈 其責在脾 下焦之閉結 其責在腎，治脾者 宜從溫養，治腎者宜

從滋潤，治噎之法 凡氣血俱虛者 宜五福飲及十全大補湯，脾虛於上者 宜四君子湯，脾虛兼寒者 宜五君子煎，脾肺營虛而燥者 宜生姜汁煎，陰虛於下者 宜左歸飲 大營煎，陰中之 陽虛者 宜右歸飲 加當歸 或 右歸丸 八味地黃丸之類 皆治本之法也。

用溫補以治噎膈 人必疑基壅滯而且嫌迂緩 不知中氣敗證 此其爲甚 使非速效根本 則脾氣何由再健，設用溫補而噎塞 愈甚則不得不曲爲加減 然必須千方百計 務從元氣中標其消宜 庶可保全也，若用補之後 雖成未見功效 但得全無副作用，便是藥病相投且此病最不易治 既能受補 必須多服 方得漸效 以收全功 不可性急致疑 一暴十寒以自誤也。

諸家活噎 故法用人參黃芪以補元氣，御米粟以解毒殺胃，竹瀝以清痰散結，乾薑以溫中，生薑以去穢 牛羊乳以養血潤液，蜜汁當歸以潤燥，用此數者爲主治，其餘因證而增減之 俱是良法。

(臨證指南醫案)¹²⁾

以致陽氣內結 陰血內枯而盛 宜調養心脾 以舒結氣 填精益血 以滋枯燥，以治飲食入胃 不能運化 以浮朝食暮吐 暮食朝吐 治宜益火之源，以消陰翳 補土通陽 以溫脾胃。

其陽結於上 陰虧於下而爲噎膈者 用通陽開痞 通補胃腑 以及進退 黃連附子瀉心諸法 上熱 下寒爲治，其肝陰胃汁枯槁及煩勞陽亢 肺胃津液枯而成噎膈者 用酸甘濟陰 及潤燥清燥爲主，其液虧氣滯及陽衰血瘀而成噎膈者 用理氣逐瘀 兼通血絡爲主，其液虧氣滯及陽衰血瘀而成 噎膈者 用理氣逐瘀 兼通血絡爲主，其胃陽虛而爲噎膈反胃 及憂鬱痰阻而成者 用通補胃腑 辛熱開濁以及苦降辛通 佐以利痰清膈爲主，其肝鬱氣逆而爲噎膈者 兩通厥陰 陽明爲治，其酒熱鬱傷脾胃氣不降而爲噎膈者 用輕劑清降及苦辛寒開肺爲主。

(醫學心悟)²⁹⁾

用啓膈散 通其閉 及用四君子湯調理脾胃，兼鬱者 兼用逍遙散，夫胃既槁矣 而復以燥藥投之

不愈益其燥手，-----深中病情然其間 有狹蟲 狹血 狹痰 與食而爲患者 皆當按法兼治。

(類證治裁)²¹⁾

噎膈初期 多因憂患悲悵 以致陽結於上 陰滯於下 治宜調心脾 以舒結氣 填精血以滋枯燥，反胃初期 多因土弱火衰以致朝食暮吐暮食朝吐 治宜扶胃土以通陽 益命間火以蒸化，-----血瘀或膈者 兼通血絡，因胃腸虛而濁瘀及胃者 用通補胃腑 辛熱淺濁法，因氣鬱痰阻 用苦降辛通法，因肝鬱氣逆用兩通厥陰陽明法，因酒熱鬱傷脾胃 用輕劑清降 及苦辛開肺法。

(醫門寶鑑)³²⁾

蓋噎膈者 病於胸臆上焦而氣結不行 宜開宜助，反胃者 病於中下二焦而陽虛不化 宜補宜溫 此

其症候 既有不同 故治亦分類也。

(新中醫 1990.3 p38)²⁷⁾

疏肝理氣止痛 活血破積

柴胡清肝湯合 喜樹煎

柴胡 白芍 枝殼 10克 陳皮 香附 鬱金 延胡 生薑 丁香 各 6克

(中醫雜誌 1990.2 pp44-45)⁹⁾

清熱解毒 軟堅散結 活血止痛

加味犀黃丸

麝香 人工牛黃 乳香 沒藥 三七粉 山慈姑

(山西中醫 1992.1 p25)¹⁵⁾

清營透熱 解毒 養陰

清營湯加味

生地 玄參 天門 銀花 連翹 18克 赤芍 丹皮 板蘭根 生石膏 30克 오공 4條 犀角 3分

(山西中醫 1991.2 pp12-13)²⁸⁾

扶正培本 活血化瘀 清熱解毒 消腫止痛 軟緊散結

復方白龍湯

人蔘 仙鶴草 15克 白花蛇舌草 30克 急性子 15克 丕刺 12克 淫羊藿 15克 女貞子 20克
生白朮 桃仁 丹蔘 15克 龍葵 半支蓮 30克
--氣血雙損:加 黃芪 30克 當歸 10克
--氣滯血瘀:加 三稜 10克 莪朮 12克
--濕熱內阻:加 生薏米 土茯苓 30克 草河車 20克 旱黃蓮 30克

(北京中醫雜誌 1990.1 pp46-49)⁸⁾

益氣健脾 滋補肝腎 升血湯

生黃芪 太子蔘 鷄血藤 30克 白朮 雲苓 10克 枸杞子 女貞實 兔絲子 15克

(中西醫結合雜誌 1991.4 pp233-234)⁶⁾

扶正健脾湯

益氣補血 調理脾胃 滋養肝腎

生黃芪 20g 黨蔘 15g 白朮 茯苓 12g 甘草 3g 熟地 15g 枸杞 首烏 15g 黃精 10g 女貞子 10g 沙蔘 麥冬 10g 鷄血藤 24g 枳實 15g 山藥 12g

(中國中西醫結合雜誌 1993.3 pp173-174)⁴⁰⁾

插管前

1) 健脾助運 補益氣血 扶正抗癌

生黃芪 15g 西黨蔘 15g 蒼白朮 12g 生薏仁 30g 豬茯苓 15g 全當歸 10g 淡附片 6g 補骨脂 10g 仙鶴草 桑木 30g 木香 制半夏 鷄內金 10g 焦三仙 15g 三七粉 3g

2) 養陰生津 清熱解毒

生地 石斛 水牛角 北沙蔘 麥門冬 30g 玄蔘 山豆根 炒黃連 10g 半支蓮 30g 三葉青 12g 白花蛇舌草 30g 生大黃 10g 川蓮子 30g 生甘草 10 西洋蔘 3

插管後

1) 疏肝和胃 降逆止嘔

姜竹茹 清半夏 陳皮 10g 枇杷葉 12g 柿蒂

30g 炒川蓮 6g 吳茱萸 3g 旋覆花 12g 代赫石 15g 烏梅 12g 焦三仙 15g 炒白芍 12g 生甘草 6 西洋蔘 3

2) 益氣養血 滋補肝腎

生黃芪 30g 全當歸 10g 較股藍 15g 清阿膠 生熟地 12g 炒薏仁 虎杖根 仙鶴草 30g 豬茯苓 鹿含草 石葦 15g 唐木香 12g 紫丹蔘 15g 鷄內金 10g 紅棗 30g 袍薑 3g

(山東中醫雜誌 1992.5 pp20-21)³⁰⁾

溫經止痛 通調氣血之法
消癌痛

威靈仙 制川烏 蜈蚣 10g 牛黃 5g 全蝎 石龍子 10g 敗醬 0.2g 制馬錢子 3g 冰片 2g 麝香 1g

復原湯

黃芪 30g 桂枝 當歸 10g 白芍 黨蔘 20g 白朮 10g 甘草 4g 生龍骨 牡蠣粉 20g (胃癌 加 黃連 6g 薏苡仁 20g)

(中西醫結合雜誌 1990.6 pp343-344)¹⁶⁾

活血化瘀 散積消腫的功効

小金散加味

馬錢子 0.5g 當歸 制乳香 制沒藥 6g 白膠香 地龍 五靈脂 丹蔘 制草烏 陳皮 厚朴 木香 9g 砂仁 4.5g

(中西醫結合雜誌 1990.12 pp712-715)¹⁴⁾

扶正抗癌

黨蔘 生黃芪 15g 生白朮 10g 生薏仁 仙鶴草 白英 白花蛇舌草 30g

(河南中醫 1990.2 pp24-25)²⁶⁾

補益氣血 托毒消腫

托里消毒散加味

人蔘 15克 當歸 白朮 茯苓 生黃芪 20克 丹蔘 急性子 山甲 15克 桂元肉 半支蓮 30克 酒 川蓮 10克

(湖南中醫雜誌 1992.3 p39)³⁶⁾

開鬱散結 補氣益血

三寶功德丹

半支蓮 白花蛇舌草 100g 金石斛 50g 當歸
100g 木香 60g 威靈仙 100g 大黃 60g 羚羊骨
100g 砂仁 袍山甲 山豆根 露蜂房 馬錢草 地骨
皮 核桃樹枝 50g

(湖北中醫雜誌 1992.5 P44)²⁰⁾

清熱化痰 祛瘀散結

保元湯

蘇葉 15克 黃連 山豆根 10克 半支蓮 20克
昆布 海藻 浙貝 15克 當歸 白朮 20克 甘草 5
克 黑故紙 10克 熟地 30克 當歸 15克 白芍 木
香 10克 肉桂 6克

健脾溫腎 活血散結 清熱化痰

黃芪 30克 白朮 10克 黨參 20克 甘草 5克
當歸 15克 熟地 30克 黑故紙 女貞子 15克 赤
芍 陳皮 蚤休 15克 石菖蒲 8克 浙貝 15克

(陝西中醫 1992.8 p366)¹¹⁾

溫陽益氣 收澁固脫

桃花湯加味

赤石脂 乾薑 人參 15克 白芍 牡蠣 30克 粳
米 甘草 6克

(陝西中醫 1990.1 p25)⁴¹⁾

溫陽解毒攻下

陳皮 半夏 莪朮 良薑 桃仁 佛手 蛤粉 川軍
元明粉 10克 海藻 牡蠣 烏賊骨 15克 女貞實
何首烏 檳榔 30克 早角 5克 山慈姑 12克 蜈蚣
2條

(陝西中醫 1990.11 p487)¹⁷⁾

益氣健脾軟緊散結

黨參 30克 茯苓 清半夏 陳皮 15克 白朮 露
蜂房 全蝎 10克 當歸 料姜石 60克 瓦楞子 30

克 蜈蚣 2條

(陝西中醫 1990.11 pp448)³⁹⁾

滋陰潤燥 破血通降

通幽湯加味

生地 熟地 當歸 制半夏 白花蛇舌草 桃仁 厚
朴 枳實 15克 紅花 灸甘草 升麻 大黃 10克 生
薑汁 子菜葉 6克

(遼寧中醫雜誌 1992.6 pp34-35)¹³⁾

氣虛形-補中益氣爲主

-補中益氣湯基本方

血瘀形-化瘀退熱爲主

-血府逐瘀湯基本方

(中西醫結合雜誌 1990.12 pp717-719)³⁵⁾

健脾益腎方

香砂六君子湯, 補中益氣湯, 地黃湯

黃芪 黨參 15-30g 山藥 15g 白朮 地黃 山茱
萸 女貞實 枸杞子 兔絲子 補骨脂 10-12g 半夏
10g 丹參 10-15g 木香 3-6g 草寇 6-9g

破血攻消

瓜蒌子白半夏湯, 柴胡疏肝散

瓜蒌 15g 半夏 12-15g 柴胡 枳實 川芎 香附
子 10g 白芍 三棱 莪朮 全蝎 1-6g

(中西醫結合雜誌 1990.12 pp745-746)³¹⁾

扶正培本 益氣養陰 清熱解毒

人參 黃芪 白朮 茯苓 龍葵 半支蓮 白英 仙
鶴草 白花蛇舌草

(上海中醫雜誌 1990.10 pp7-9)³⁾

1.調理氣機-1)積聚之成乃氣滯之故

2)理氣乃治本之法

3)理氣不避香燥

2.消緊散結-1)堅者必消之

2)消堅散結之活用

3.扶助正氣-1)扶正對治療胃癌的作用

2)扶正着中脾胃

(浙江中醫學院學報 1993.2 PP9-10)³³⁾

1. 疏肝和胃,降逆止痛

逍遙散加減

柴胡 鬱金 10克 白芍藥 代代花 10克 白屈菜 10克 半夏 枳殼 旋覆花 10克 代赭石 15克 焦三仙 30克 當歸 茯苓 10克 藤梨根 30克 灸甘 6克

2. 溫中散寒,健脾溫胃

理中湯加減

黨參 30克 白朮 乾薑 半夏 蘿蔔子 10克 生地 30克 畢撥 茯苓 10克 生米仁 30克 陳皮 10克 甘草 6克

3. 解毒祛瘀,清熱養陰,活血化癆

失笑散加減

龍葵 30克 生蒲黃 五靈脂 10克 白屈菜 20克 元胡 10克 鐵樹葉 藤梨根 仙鶴焦 30克 當歸 15克 赤芍 10克 三七根 紅花 3克 蒲公英 30克 肥玉竹 15克 露蜂房 6克

4. 清熱解毒 或 養陰清熱

玉女煎合增液湯加減

生地 玄參 玉竹 15克 花粉 沙參 藤梨根 蛇舌草 30克

5. 化痰散結,溫化中焦

二陳湯加減

茯苓 陳皮 半夏 夏枯草 10克 生米仁 30克 蒼白朮 10克 生牡蠣 30克 海藻 蘇子 10克

6. 補氣益血,健脾補腎

十全大補湯加減

當歸 30克 黨參 15克 白朮 茯苓 當歸 10克 赤芍 15克 夏枯草 3克 黃精 10克 鷄血藤 15克 陳皮 10克 首烏 30克 阿膠 10克

(福建中醫院 1990.2 PP56-58)³⁷⁾

胃癌中醫治療的研究

1) 扶正培本法則

2) 活血化癆法則

3) 清熱解毒法則

(陝西中醫 1990.10 PP433-434)¹⁶⁾

理氣散結 化痰和胃 或 培補脾腎

枳朴六君子湯

黨參 30克 白朮 茯苓 鬱金 半夏 索羅子 15克 蜂房 全蝎 生薑 10克 甘草 3克

III. 考察

腫瘍에 관한 한의학적 病名은 '瘤'⁴²⁾라는 病名이 最初로 언급된 이후에 積聚, 癥瘕, 按癥, 石癰, 癌¹⁸⁾¹⁹⁾³²⁾ 등이 있고 噎膈, 反胃의 경우는 飲食不下 膈塞不通 腹善滿 ---- 診形瘦而腹大 胃脘當心以痛 上肢兩脇 膈咽不通 飲食不下, 吐食而不下 或은 飲食突然 阻塞以不下⁷⁾⁴²⁾ 라고 각각 칭하여 그 徵候가 胃癌의 症狀과 가장 유사하여 일찍부터 胃癌에 대한 언급이 있으면서 內科의 治療도 治療의 계통을 이루어왔음을 알 수 있다.⁷⁾⁸⁾¹⁰⁾¹⁴⁾³⁵⁾ 李¹⁹⁾는 胃氣를 先保하면서 表症을 治療하는 藥物을 加하는데 寒月에는 大熱辛苦之味를, 暑月에는 泄陰火하는 治療를 강조하였고, 朱³⁴⁾는 補氣, 補血을 위주로 降陰火 解毒을 겸용하는 治療를 하였는데 薄하고 滋한 藥物을 주로 用하여 精氣를 保護하는 것을 重視하였다. 또한 朱³⁴⁾, 龔¹⁾, 李¹⁹⁾, 許³⁸⁾ 등은 香燥한 藥物의 使用을 禁하여 胃氣의 保存을 重視 하였다. 이는 健脾理痰, 養陰生津 하면서 氣血鬱滯된 경우 下法을 爲主로 하였는데 특히 陰, 陽, 虛, 實을 잘 구별하여 內治의 選擇에 慎重을 기하였다. 張²⁵⁾反胃는 扶助正氣 健脾養胃로 去滯를 兼 하면서 久病者는 오직 溫保法을 강조하였고 噎膈은 溫陽 滋潤의 治療를 爲主로 하면서 解毒實胃 清痰散結 溫中 養血潤燥 등의 治법을 강조하였다.

葉¹²⁾은 助陽心脾를 강조하면서 益火之源 以

消陰翳하고 補土通陽 以溫脾胃하여 通陽開鬱 理氣退瘀 通血絡 理痰消膈의 治法을 강조하였다. 林²¹⁾은 噎膈初期에는 憂悲悲悵 하여 陽結 於上 하고 陰結於下 하는 경우가 많으므로 調 心脾胃舒結氣하고 填精血以滋枯燥하며, 反胃初 期에는 扶胃土以通陽 益命門火以蒸化하고, 血 瘀成膈者는 通血絡하고 胃陽虛而濁瘀反胃者는 溫補胃府 辛熱瀉濁法을, 氣鬱痰阻에는 苦降辛 通法을 주장하였다. 周³²⁾는 噎膈에는 宜開宜助 하고 反胃에는 宜補宜溫해야 한다고 하였다.

이상으로 噎膈과 反胃의 治法은 健脾養胃를 治療의 根本으로 하여 補氣, 補血, 養陰을 胃 주로 하는 扶正固本法과 理氣, 理痰, 散結, 解 鬱, 祛瘀, 祛滯를 胃주로 하는 攻瀉法, 그리고 두가지 治法을 合用한 扶正攻瀉法등의 3가지 로 분류할수있다. 이와같은 噎膈과 反胃의 치 법을 근간으로 최근 보고된³⁶⁾⁸⁾¹⁴⁾¹⁸⁾²⁶⁾³¹⁾³⁷⁾³⁹⁾ 胃 癌의 한방治療를 살펴보면 扶正培本, 補氣養 血, 健脾溫胃, 健脾益腎, 益氣健脾, 滋補肝腎 하는 補法과 活血化瘀, 軟堅散結, 化痰散結, 化 痰和胃 하는 化瘀法(散結法) 및 疏肝理氣, 疏 肝和胃, 理氣散結, 調理脾胃 하는 理氣法과 清 熱解毒, 清熱化瘀, 清熱養陰 하는 清熱法 그리

고 溫經止痛, 活血化瘀 하는 止痛法등이 운용 되었고 그의 解毒, 收澀固脫하는 治療法도 보 고 되었다. 治療法의 선택 빈도수는 補法, 化 瘀法, 清熱解毒法, 理氣法의 순으로 나타나 扶 正補虛法의 治療가 重視됨을 볼수 있는데 이 는 正氣를 內存하여 邪氣가 들어오지 못하도 록 하는 인체의 恒常性 유지를 통한 免疫의 活性化²⁾¹⁰⁾¹⁸⁾를 높이려는 노력으로 볼 수 있다.

개개 약물의 특성별 선택은 補養藥, 理血藥, 清熱藥, 化痰藥, 理氣藥, 解表藥, 消導藥, 攻下 藥의 순서로 나타났다. 胃癌治療에 사용된 약 물의 분포는 다음과 같다.

최근의 보고에 의하면 東西醫 결합에 의한 腫瘍治療가 많이 보고되고 효과 인정되고 있 다고 한다. 현재 胃癌의 治療에 韓藥이 미치는 영향은 방사선治療와 화학요법중 체질의 허약 이나 병의 진행에 따른 부작용의 감소와 체내 恒常性을 症가市켜 抗癌治療의 선택적 유의성 증가가 있다고 본다. 앞으로는 胃癌 治療에 있 어서 특정한약의 투여 시기 및 투여량의 통일 그리고 개개 약물의 癌세포에 대한 선택적작 용 연구를 통하여 胃癌에 대한 한약의 근본적 인 治療효과와 산출을 위해 노력해야한다.

Table. 胃癌 治療藥物 分類表

補養藥	補氣藥	當歸 白朮 人蔘 甘草 黨蔘 黃芪 黃連
	補陰藥	兔絲子 補骨脂 紫河車 淫羊藿
	補血藥	熟地黃 當歸 白芍藥 枸杞子 何首烏 阿膠 麥門冬
	補陰藥	女貞子 沙蔘 石斛 天門冬 玉竹
理血藥	活血藥	丹蔘 桃仁 瓦楞子 鬱金 乳香 沒藥 赤芍藥 五靈脂 鷄血藤 莪朮
	止血藥	三七根 地榆 白芨 白茅草
清熱藥	清熱解毒藥	白花蛇舌草 金銀花 山豆根 連翹
	清熱涼血藥	生地 玄蔘 牡丹皮 犀角 地骨皮
	清熱燥濕藥	黃連 苦蔘
	清熱瀉火藥	石膏 夏枯草
化痰藥	溫化痰藥	半夏 旋覆花 皂角 南星
	清熱化痰藥	竹茹 昆布 海藻 蛤粉 天花粉
理氣藥		陳皮 木香 枳實 香附子 枳殼 川棟子
解表藥	辛溫解表藥	生薑 白芷 桂枝
	辛涼解表藥	升麻 柴胡
消導藥		鷄內金
攻下藥		大黃 芒硝

IV. 結 論

胃癌과 관련된 문헌고찰을 古文中에서는 噎膈과 反胃를 참고로 하고 최근 보도된 胃癌治療는 臨床논문을 참고로 하여 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 噎膈, 反胃의 治法은 健脾養胃를 위주로 補氣, 補血, 理氣, 散結, 解鬱, 益腎滋潤, 祛痰, 祛滯, 下法등을 隨證加減하고 항상 正氣(胃氣)의 보존을 重視하였다.

2. 胃癌治療에 있어서 補法의 治療가 많고 祛痰, 理氣, 清熱, 解毒, 止痛의 治法이 사용됨을 알 수 있다.

3. 胃癌治療에 있어서 사용빈도가 높은 약물은 當歸 白朮 甘草 人蔘의 補氣藥과 熟地黃 當歸 白芍藥 枸杞子 何首烏의 補血藥, 女貞實 三七根 丹蔘 桃仁의 補陰藥, 瓦楞子の 理血藥, 清熱解毒藥인 白花蛇舌草, 清熱涼血藥인 生地黃, 理氣藥인 陳皮 木香등으로 나타났다.

參考文獻

1. 龔廷賢: 增補萬病回春, 臺北, 大中國圖書公司, pp.151-153, 1981.
2. 金 晄: 癌患者의 細胞性 免疫, 서울, 대한 내과학회지, 33: 290-291, 1987.
3. 金 嵐: 錢伯文治療胃癌學術思想探析, 上海市, 上海中醫雜誌, No.12, pp.7-9, 1990.
4. 樓全善: 醫學綱目, 臺北, 北一出版社, 卷二十二, pp.57-58, 1973.
5. 朴良元: 現代公衆保健醫學, 서울, 癸丑文化社, pp.392-400, 1982.
6. 潘明繼: 扶正健脾湯辨證加減134例癌症化療副反應의 觀察, 北京, 中西醫結合雜誌, Vol.11, No.4, pp.233-234.
7. 柳基遠의 10인: 脾系內科學, 서울, 그린문화

- 사, p 89,p 96, 1991.
8. 北京中醫學院: 升血湯配合化療中晚期胃癌의 臨床研究, 北京市, 北京中醫雜誌, No.1, pp 46-49, 1990.
9. 孫桂芝: 加味犀角黃丸治療晚期惡性腫瘤157例臨床觀察, 北京市, 中醫雜誌, Vol.31, 1990.
10. 安德均음김: 免疫과 한방, 서울, 도서출판 열린책들, pp.15-18, 1992.
11. 楊樹明: 桃花湯加味治療晚期癌疼痛, 西安市, 快中醫, Vol.13, No.8, p.487, 1990.
12. 葉 桂: 臨證指南醫案, 臺北, 旋風出版社, 卷三, p.3-4, 1981.
13. 王敬재: 辨證治療癌熱70例臨床小結, 沈陽市, 遼寧中醫學院, Vol.19, No.6, pp.34-35, 1992.
14. 王冠庭: 扶正抗癌爲主結合化療對158例述後晚期胃癌의 治療及實驗研究, 中西醫結合雜誌, Vol.10, No.12, pp.712-715, 1990.
15. 王國平: 清營湯加味治療癌性疼痛 68例 觀察, 太原市, 山西中醫, Vol.8, No.1, p.25, 1992.
16. 王慧川: 買方主任醫師治療病症經驗簡介, 西安市, 快西中醫, Vol.14, No.5, p.44, 1992
17. 劉邊林: 中藥治療晚期33例, 西安市, 陝西中醫, Vol.11, No.11, p.487, 1990.
18. 尹相協의 4인: 六君子湯, 小柴胡湯, 魚腥草의 擔癌生存期間延長效果와 免疫反應에 관한 實驗的 研究, 서울, 경희醫學, Vol.7, No.3, pp.342-357, 1991.
19. 李 杲: 東垣十種醫書, 서울, 대성문화사, pp.94-98,p.122,pp.125-127, 1983.
20. 李大海: 中西醫結合治療胃癌症2側, 武漢市, 湖北中醫雜誌, Vol.14, No.5, p.44, 1992.
21. 이문호: 최근한국의 질병변천, 서울, 대한醫學협회지, 32(3), pp.283-290, 1989.
22. 李中梓: 醫宗必讀, 서울, 西苑堂, pp.261-261, 1977.
23. 李 梴: 醫學入門, 南昌市, 江西科學技術出版社. pp.846-848, 1988.
24. 林佩琴: 類證治裁, 서울, 成輔社, pp.171-172, 1980.

- 25.張介賓: 景岳全書, 서울,大成文化社, pp.447-449,450-546, 1988.
- 26.張書林: 托里消毒散治療晚期癌症應用, 鄭州市, 河南中醫學院, Vol.10, No.2, pp.24-25, 1990.
- 27.張曉明: 柴胡疏肝湯合喜樹煎劑治療胃癌1例, 廣州市, 新中醫, Vol.22, No.3, pp.38, 1990.
- 28.張華: 含戒中草藥治療消化道惡性腫瘤3例臨床療效評價, 太原市, 山西中醫, Vol.7, No.2, pp.12-13, 1991.
- 29.程國彭: 醫學心悟, 서울, 成輔社, pp.177-178, 1961.
- 30.趙錫民: 治癌痛合復原湯治療癌痛50例, 北京市, 山東中醫雜誌, Vol.11, No.5, pp.20-21, 1992.
- 31.趙冠英: 參草扶正抗癌囊劑治療惡性腫瘤64例臨床觀察, 中西醫結合雜誌, Vol.10, No.12, pp.745-746, 1990.
- 32.周命新: 醫門寶鑑, 서울, 醫聖堂, P.131, 1990.
- 33.周維順: 略論胃癌的診治原則, 亢州市, 浙江中醫學院學報, Vol.17, No.2, pp.9-10, 1993.
- 34.朱辰亨: 丹溪心法附餘, 臺北, 五洲出版社, 卷九, p.16, 1981.
- 35.陳健中: 中西醫配合化療胃癌治療中白細胞的影響, 中西醫結合雜誌, Vol.10, No.12 pp.717-719, 1990.
- 36.陳長義: 三寶功德丹治療晚期胃癌182例, 長沙市, 湖南中醫雜誌, Vol.8, No.3, p.39, 1992.
- 37.崔同建: 胃癌的中醫結合研究, 福州市, 福建中醫藥, Vol.12, No.3, pp.151-153, 1992.
- 38.許浚: 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, pp.462-463, 1981.
- 39.黃志華: 通幽湯加味治療晚期食管癌胃癌76例, 西安市, 陝西中醫, Vol.11, No.11, p.448, 1990.
- 40.吳卽村: 中醫藥結合腹腔動脈插管化療治療晚期食道癌胃癌130例臨床觀察, 中國中西醫結合雜誌, Vol.13, No.3, pp.173-174, 1993.
- 41.胡楨: 晚期胃癌治療, 西安市, 陝西中醫, Vol.11, No.1, p.25, 1990.
- 42.洪元植: 黃帝內經靈樞, 서울, 東洋醫學研究院, pp.38-39,p.124,p.294, 1985.