

사상의학 보고서 (중요 용어 색인)

이경숙*

『東醫壽世保元』의 원문을 살펴보면 일반적인 증상, 병명, 『傷寒論』적인 병리 용어인 태양병 등의 용어를 제외하고도 한의학의 이론 전개에 기본이라고 할 수 있는 '표', '리', '한', '열', '음', '양'의 단어가 상당히 많이 쓰여지고 있다.

현재, 기존 한의학에서도 이 용어들은 한의학의 이론을 전개하기 위하여 필수적으로 쓰이고 있는 용어들이다. 그러나, 사상의학의 이론적인 근간이 되고 있는 『東醫壽世保元』에서는 이전의 한의학과는 다른 의미로서 이 단어들이 쓰이고 있음을 알 수 있다. 더구나, 나아가 기존 한의학에서는 쓰이고 있지 않은 용법인 표음, 표양, 표한 등의 결합이 많이 보인다.

그래서 『東醫壽世保元』에서는 이 단어들이 어떤 한 의미로 쓰였으며, 새로운 용어들의 결합은 어떤 의미를 가지는지 밝히는 것은 사상의학의 기초 이론을 정립하는데 필수적이라고 할 수 있다. 즉, 사상의학의 생리·병리·진단에 가장 필수적인 작업인 것이다.

따라서 이러한 연구의 선행 작업의 일환으로 간략한 색인을 만들어 보았다. 그러나, 시간과 능력상 아직 구체적인 분석은 해보지 못하고 중간 단계

에서 보고서를 제출하게 되었다. 또한 虛와 實은 『東醫壽世保元』에서 다른 용어보다 중요성이 떨어져 색인 작업에서 제외하였으나 앞으로 구체적인 분석과 더불어 포함되어야 할 것이다.

〈일러두기〉

- 원문은 행림출판사 1979년 출판본을 김형태 씨와 박윤희 씨가 전산화시킨 파일을 이용하였다.
- 원문 앞의 기호 설명
 - 번호 맨 앞의 '·'은 동무 선생의 말을 나타낸다. 이것이 없는 것은 ○로 시작하는 고전 인용문이다.
 - A-B-C-D

A는 아래와 같다.

- 少陰人 腎受熱表熱病論
- 少陰人 脾受寒裏寒病論
- 少陽人 脾受寒表寒病論
- 少陽人 胃受熱裡熱病論
- 太陰人 胃胱受寒表寒病論
- 太陰人 肝受寒裏熱病論
- 太陽人 外感腰背病論
- 太陽人 內觸小腸病論

* 경희대학교 한의과대학

B는 각 痘論 중에서의 「東醫壽世保元」 원문의 문단 순서 번호

C는 각 문단에서 문장 순서 번호

예를 들면, ○으로 시작되는 것들과 論曰 등은 '-' 다음의 번호의 단계이다.

D는 ○ 또는 論曰의 내용이 길고 복잡하거나 여러 가지의 내용을 담고 있으면, 이 번호 다음에 다시 '-'를 하고 번호를 달았다.

(예) 12-1-2

맨 앞의 '1'은 소음인 腎受熱表熱病論을 나타냄.

그 다음의 '2'는 소음인 腎受熱表熱病論의 2번째 문단을 말함.

(문단은 앞뒤의 내용을 보고, 동무 선생의 논을 근거로 하여 본인의 입의로 나누었음)

첫 번째 '-' 다음의 '1'은 2번째 문단의 1번째 글을 말한다. 예를 들면, ○으로 시작되는 것들과 論曰 등은 '-' 다음의 번호의 단계이다.

두 번째 '-' 다음의 '2' ○ 또는 論曰의 내용이 길고 복잡하거나 여러 가지의 내용을 담고 있으면, 이 번호 다음에 다시 '-'를 하고 번호를 달았다.

③ 사용한 기호에 대한 설명(김형태 씨의 교감본)

○: 고전 인용문

◎: 동무 선생님 글

♧: 동무 선생님 치험례

♣: 동무 선생님 論

I. 表

1) 少陰人 腎受熱 表熱病論

11-1○ 發熱 惡寒 脈浮者 屬表 卽 太陽證也 (張仲景 傷寒論)

11-4○ 傷寒 頭痛 身疼 不分表裏證 當用 藁香正氣散 (韓信 醫鑑)

• 11-5♣ 論曰 張仲景所論 太陽傷風 發熱惡寒者

即少陰人 腎受熱 表熱病也，此證 發熱惡寒而無汗者 當用 桂枝湯 川芎桂枝湯… 發熱惡寒而有汗者 此亡陽初證也，必不可輕易視之 先用 黃芪桂枝湯… 三日連服而汗不止 痘不愈則當用 桂枝附子湯…

12-2○ 太陽病 六七日 表證因在 脈微而沈 反不結胸 其人如狂者 以熱在下焦 小腹當滿 小便自利者 下血乃愈 抵當湯主之

12-5○ 太陽病 外證未除而數下之 隊下利不止 心下痞硬 表裏不解 人蔘桂枝湯主之 (以上 張仲景)

• 12-6-3 太陽病 表證因在者 身熱煩惱而惡寒之證 間有之 太陽病 外證除者 身熱煩惱而惡寒之證 都無之也

• 12-6-5 太陽病 外證未除則陽氣其力 雖有鬱抑猶能振寒而與寒邪相爭於表也，若外證盡除則陽氣其力不能振寒而隊爲窮因縮伏之勢也 攻下之藥 何甚好藥而必待陽氣窮因縮伏之時而應用耶 人蔘桂之湯不亦晚乎

13-3○ 陽明病 不能食 攻其熱 必嘔 傷寒 嘔多 雖有陽明病 不可攻 胃可實 不大便 若表未解 及有半表者 先以桂枝·紫胡和解 乃可下也 (以上 張仲景)

• 14-4-8 又 太陽病 表證因在時 何不早用溫補升陽之藥 與巴豆 預圖其病而必待陽明病 日晡發潮熱狂言時 用承氣湯 使人半生反死耶

• 16-6♧ 著治 少陰人 十一歲兒 汗多亡陽病 此兒勞心焦思 素證泄瀉爲憂而每飯時汗流滿面矣 忽一日頭痛 發熱 汗自出 大便秘燥 以此兒 素證泄瀉爲憂故頭痛·身熱·便祕·汗出之熱證 以其反於泄瀉寒證而會不關心 尋常治之 以黃芪·桂枝·白芍藥等屬發表矣

• 17-2-3 中古戰國秦漢之時 醫家單方經驗 其來已久 汗吐下三法 始爲盛行 太陽病 表證因在者 或以麻黃湯 發汗 或以猪苓湯 利小便 或以承氣湯 下之承氣湯下之則下利不止之證作矣 麻黃湯 猪苓湯 發汗 利小便則胃中燥煩實大便難之證作矣

• 17-3-1 胃家實·脾約二病 如陰證之太陰·少陰病 虛實證狀 顯然不同 自太陽病表證因在時 已爲兩

路分岐 元不相合

• 17-3-2 太陽病 表證因在而 其人如狂者 鬱狂之初證也，陽明病 胃家實 不更衣者 鬱狂之中證也 陽明病 潮熱 狂言 微喘直視者 鬱狂之末證也。

• 17-5-2 然 少陽人 裡熱證 太陰人 表熱證 亦有汗多而 小便赤澁者 宜察之 不可誤藥

• 17-6-1♣ 胃家實病 其始焉 汗不出 不惡寒 但惡熱而 其病垂危則 澈然 微汗出 潮熱也 澈然 微汗出 潮熱者 表寒振發之力 永竭故也 胃竭之候也

• 22-6♣ 論曰 痘發於陰而反下之云者 痘發於胃弱 當用 蕺香正氣散而 反用 大黃下之謂也 麻黃·大黃 自是太陰人藥 非少陰人藥則 少陰人病 無論表裏麻黃大黃汗下 元非可論 少陰人病 下利清穀者 積滯自解也 太陰證 下利清穀者 當用 蕺香正氣散 香砂養胃湯 薑朮寬中湯 溫胃而降陰 少陰證 下利清穀者 當用官桂附子理中湯 健脾而降陰

25-4○ 下利 腹脹滿 身體疼痛 先溫其裏 乃攻其表溫裏 宜四逆湯 攻表 宜桂枝湯 (以上 張仲景)

• 26-8♣ 少陰病 初證 因爲險證 繼而危證 此病初證 早不辨證而 措置則 危境也 凡 腹痛自利 無口渴 口中和者 為太陰病 腹痛自利而 有口渴 口中不和者 為少陰病 少陰病 有身體通 骨節痛 表證 此則 表裏俱病而 大腸寒氣 必勝胃中溫氣而 上升也 太陰病無身體痛 骨節痛 表證此則 裡病 表不病而 胃中溫氣猶勝大腸寒氣而 下降也

3) 少陽人 脾受寒 表寒病論

• 31-2♣ 論曰 發熱 惡寒 脈浮緊 身痛 不汗出而煩躁者 卽 少陽人 脾受寒 表寒病也 此證 不當用 大青龍湯 當用 荊防敗毒散

• 32-6-6 噢 後來龔信所製 荆防敗毒散 豈非 表寒病 三神山 不死藥乎

• 32-6-7 此證 清裡熱而 降表陰則 痰飲自散而結胸之證 預防不成也，清痰而燥痰則 無益於陰降 痰散延拖 結胸將成而 或別生奇證也。

• 33-2♣ 論曰 少陽人病 無論表裏病 手足掌心 有汗則 痘解 手足掌心 不汗則 雖全體皆汗而病不解

• 33-3-1♣ 少陽人 傷寒病 有再痛發汗而 愈者此病 非再三感風寒而再痛發汗 三痛發汗也 少陽人頭痛 腦強 寒熱往來 耳聾 胸滿 尤甚之證 元來如此表邪深結 至於三痛然後 方解也

34-1○ 少陽證 澈汗出 心下痞硬滿 引脇下痛 乾嘔 短氣 不惡寒 表解裡未知也 宜十棗湯 若合下不下令人脹滿 遍身浮腫

34-2○ 傷寒 表未解 醫反下之 脫內拒痛 手不可近心下滿而 硬痛者 此爲結胸 宜大陷胸湯

• 34-6-5 張仲景 曰 傷寒 表未解 醫反下之云者以承氣湯下之謂也 非十棗陷胸之謂也 然 十棗陷胸不如 單用甘隊 或用 甘隊天一丸 結胸 甘隊末 例用三分 大結胸 用五分

• 35-1♣ 甘隊 表寒病 破水結之藥也 表病可用甘隊而不用石膏 石膏 裡熱病 通大便之藥也 裡病可用石膏而不可用甘遂 然 揚手擲足引飲泄瀉證 用石膏 滯風膝寒 大便不痛證 用甘隊

• 35-2♣ 少陰人 傷汗病 有小腹硬滿之證 少陽人傷寒病 有心下結胸之證 此二證 俱是 表氣陰陽虛弱 正邪相爭 累日不決之中 裡氣亦秘滯不和而 變生此證也

• 39-1-2 陰盛格陽於上則 陽爲陰抑 不能上升於胸膈 下陷大腸而 外遁膀胱故 背表煩熱而?? 也煩熱而 汗出者 非陽盛也 此 所謂內水外炭 陽將亡之兆也

• 39-3♣ 少陰人 平居 裡煩汗多者 得病則 必成亡陽也 少陽人 平居 表寒下多者 得病則 必成亡陰也

• 39-4-2 少陽人 痘愈之泄 手足掌心先汗而 一次滑泄 表氣清寧而 精神麥明 亡陰之泄 手足掌心不汗屢次泄利 表氣遡寒而 精神鬱冒

• 310-3-3 伊時 未知大便驗法故 不察大便之秘閉機日 然 想必此病人 先自表寒病 得病後 有大便秘閉而 發此證矣

• 310-5♣ 其後 又有少陽人 一人 初得頭痛 身熱表寒病 其間 用黃連·瓜萎·羌活·防風 等屬 痘勢少愈

而永不快祛矣 扱爲發狂三日 病家以尋常例證視之 而祇用黃連·瓜萎等屬 又譖語數日 始用地黃白虎湯一貼

• 310-6-2 凡少陽人表病 有頭痛 裹病 有便祕則已爲重病 不當用之藥 一二三貼 誤投則必殺人險病 危證 當用之藥 一二三貼不及則亦不救命

• 43-5♣ 少陽人表裏病結解 必觀於大便

• 44-3-1 凡少陽人表病 有頭痛則自是表病明白 易見之初證也 若復引飲小便赤則可畏也泄瀉揚手擲足則大畏也

• 44-4 凡少陽人表病 有頭痛則必用荊防敗毒散

• 48-4♣ 論曰上消中消裡陽升氣雖則虛損表陰降氣猶持完壯故其病雖險猶能歲月支撑以此也

• 48-4-2 若夫陰虛午熱 飲水背寒而嘔者表裏陰陽俱虛損所以爲病尤險與下消略相輕重

2-8-2 蓋少陰人藏結表陽溫氣雖在幾絕裡陰溫氣猶持完壯少陽人鼓脹裡陽清氣數在幾絕表陰清氣猶持完壯故皆經歷久遠而死也

5) 太陰人胃脘受寒表寒病論

• 51-2♣ 論曰此卽太陰人傷寒背頸貢表病輕證也此證麻黃湯非不當用而桂枝甘草皆爲叢材此證當用麻黃發表湯

• 52-2♣ 論曰此謂之厥者但惡寒不發熱之謂也非手足厥逆之謂也太陰人傷寒表證寒厥四五日後發熱者重證也

• 53-1-2 此證原委勞心焦思之餘胃脘衰弱表局虛薄不勝寒而外被寒邪所圍正邪相爭之形勢客勝主弱

• (의안)58-1♣ 警治太陰人胃脘寒證瘟病有一太陰人素有怔仲·無汗·氣短·結咳忽焉又添出一證泄瀉數十日不止卽表病之重者也用太陰調胃湯加樗根一錢日再服十日泄瀉方止連用三十日每日流汗滿面素證亦減而

• 59-2 * 大凡瘟疫先察其人素病如何則表裏虛

實可知已

• (의안)510-1-2 有一太陰人素病咽嗌乾燥而面色青白表寒或泄

• (의안)510-1-2 蓋咽嗌乾燥者肝熱也面色青白表寒或泄者胃脘寒也此病表裏俱病素病之太重者也

61-2-3 热在表則目疼不眠宜解肌湯熱入裏則狂譖宜調胃承氣湯(李梃)

62-5○ 萬歷丙戌余寓大染瘟疫大作士民多斃其證增寒壯熱頭面項頰赤腫咽喉腫痛昏憤余發一秘方名二聖救苦丸大黃四兩猪牙皂角二兩麵糊和丸綠豆大五七十九一服卽愈稟壯者百發百中皂角開關竅發其表大黃瀉諸火通其裏

• 62-7-4 寒勝則表證而太重證也當用太陰調胃湯加升麻黃芩

3-2○ 太陰人證有泄瀉病表熱證泄瀉當用葛根蘿蔔子湯麻黃發表湯補肺元湯

○虛弱人表症寒證多者宜用

○虛弱人裏症多者宜用

○治浮腫表症寒多者宜用 1 3-5

* 面色青白而素有寒證表虛者卒中風則

• 72-2 有解併證者必無大惡寒發熱身體疼痛之證也太陽人若有大惡寒發熱身體疼痛之證則腰背表氣充實也其病易治其人亦完健

• 85-1-2 日否太陽人噫膈病太重於解併病而怒心所傷者太重於哀心所傷也太陽人哀心深着則傷表氣怒心暴發則傷裡氣故解併表證以戒哀遠怒兼言之也

1. 表氣

• 35-2♣ 少陰人傷寒病有小腹硬滿之證少陽人傷寒病有心下結胸之證此二證俱是表氣陰陽虛弱正邪相爭累日不決之中裡氣亦秘滯不和而變生此證也

• 39-4-2 少陽人病愈之泄手足掌心先汗而一次滑泄表氣清寧而精神爽明亡陰之泄手足掌心不汗

屢次泄利 表氣溯寒而 精神鬱冒

• 72-2 有解体證者 必無大惡寒發熱 身體疼痛之證也 太陽人 若有大惡寒發熱 身體疼痛之證則 腰背表氣 充實也 其病易治 其人亦完健

• 85-1-2 日否 太陽人 噎膈病 太重於解体病而 怒心所傷者 太重於哀心所傷也 太陽人 哀心深着則 傷表氣 怒心暴發則 傷裡氣 故 解体表證 以戒哀遠怒兼言之也

2. 表陰

• 32-6-7 此證 清裡熱而 降表陰則 痰飲自散而 結胸之證 預防不成也 清痰而燥則 無益於陰降 痰散 延拖 結胸將成而 或別生奇證也

• 48-4♣ 論曰 上消中消 裡陽升氣 雖則虛損 表陰 降氣 猶恃完壯故 其病雖險 猶能歲月支撑 以此也

2-8-2 蓋 少陰人 藏結 表陽溫氣 雖在幾絕 裡陰溫氣 猶恃完壯 少陽人 鼓脹 裡陽清氣 雖在幾絕 表陰 清氣 猶恃完壯故 皆經歷久遠而 死也

3. 表陽

2-8-2 蓋 少陰人 藏結 表陽溫氣 雖在幾絕 裡陰溫氣 猶恃完壯 少陽人 鼓脹 裡陽清氣 雖在幾絕 表陰 清氣 猶恃完壯故 皆經歷久遠而 死也

4. 表熱

1) 少陰人 腎受熱 表熱病論

• 11-5♣ 論曰 張仲景所論 太陽傷風 發熱惡寒者 卽 少陰人 腎受熱 表熱病也 此證 發熱惡寒而 無汗者 當用 桂枝湯 川芎桂枝湯 香蘇散 芎歸香蘇散 發熱惡寒而 有寒者 此亡陽初證也 必不可輕易視之 先用 黃芪桂枝湯 補中益氣湯 升陽益氣湯 三日連服而 汗不止 痘不愈則 當用 桂枝附子湯 人蔘桂枝附子湯

升陽益氣附子湯

• 17-5-2 然 少陽人 裡熱證 太陰人 表熱證 亦有 汗多而 小便赤澁者 宜察之 不可誤藥

表熱證泄瀉 當用 葛根蘿蔔子湯

3-2◎ 太陰人證 有泄瀉病 表寒證泄瀉 當用 太陰 調胃湯 表熱證泄瀉 當用 葛根蘿蔔子湯

5. 表寒

• 17-61♣ 胃家實病 其始焉 汗不出 不惡寒 但惡熱而 其病垂危則 激然 微汗出 潮熱也 激然微汗出 潮熱者 表寒振發之力 永竭之候也

3) 少陽人 脾受寒 表寒病論

• 31-2♣ 論曰 發熱 惡寒 脈浮緊 身痛 不汗出而 煩躁者 卽 少陽人 脾受寒 表寒病也 此證 不當用 大青龍湯 當用 荊防敗毒散

• 32-6-6 噫 後來龔信所製 荆防敗毒散 豈非 表寒病 三神山 不死藥乎

• 35-1♣ 甘遂 表寒病 破水結之藥也 表病可用甘遂而不用石膏 石膏 裡熱病 通大便之藥也 裡病可用石膏而不可用甘遂 然 揚手擲足引飲泄瀉證 用石膏 滯風膝寒 大便不通證 用甘遂

• 39-3♣ 少陰人 平居 裡煩汗多者 得病則 必成亡陽也 少陽人 平居 表寒下多者 得病則 必成亡陰也

• 310-3-3 伊時 未知大便驗法故 不察大便之秘閉 幾日 然 想必此病人 先自表寒病 得病後 有大便秘閉而 發此證矣

• 310-5♣ 其後 又有少陽人 一人 初得頭痛 身熱 表寒病 其間 用黃連·爪癩·羌活·防風 等屬 痘勢少愈而 永不快祐矣 仍為發狂三日 痘家 以尋常例證視之而 禁用黃連·爪癩等屬 又 謳語數日 始用 地黃白虎湯一貼 其翌日午後 動風 急煎地黃白虎湯 連三貼 救急而 艱辛下咽 其翌日則 白虎湯 加石膏一兩 午前用之 以備動風而 連三日 用之 痘人 自起坐立 能大小

便 病勢此前 快蘇快壯矣 不幸 病加於少愈 廬不周於完治 此人 意不救 恨不 午前 稀用白虎湯二貼 以備動風而 午後 全不用藥以繼夜則 好矣 不必待譖語後而用藥 發狂時 當用藥 加也 不必待發狂後而用藥 發狂前 早察發狂之漸可也

5) 少陰人 胃院受寒 表寒病論

• (의안) 510-1-1 有一太陰人 素病 咽嗌乾燥而面色青白 表寒或泄

• (의안) 510-1-2 蓋咽嗌乾燥者 肝熱也 面色青白 表寒或泄者 胃院寒也 此病 表裏俱病之太重者也

3-2◎ 太陰人證 有泄瀉病 表寒證泄瀉 當用 太陰調胃湯 表熱證泄瀉 當用 葛根蘿蔔子湯

II. 裡

11-4○ 傷寒 頭痛 身疼 不分表裏證 當用 藿香正氣散(龔信 醫鑑)

12-5○ 太陽病 外證未除而 數下之 遂下利不止 心下痞硬 表裏不解 人參桂枝湯主之(以上 張仲景)

• 17-5-2 然 少陽人 裹熱證 太陰人 表熱證 亦有汗多而 小便赤澁者 宜察之 不可誤藥

3) 少陰人 胃受寒 裹寒病論

• 22-6♣ 論曰 痘發於陰而反下之云者 痘發於胃弱 當用 藿香正氣散而 反用 大黃下之謂也麻黃·大黃 2自是太陰人蔘 非少陰人蔘則 少陰人病 無論表裏 麻黃大黃汗下 元非可論 少陰人病 下利清穀者 機滯自解也 太陰證 下利清穀者 當用 藿香正氣散 香砂養胃湯 薑尤寬中湯 溫胃而降陰 少陰證 下利清穀者 當用 官桂附子理中湯 健脾而降陰

25-4○ 下利 腹脹滿 身體疼痛 先溫其裏 乃功其表 温裏 宜四逆湯 攻表 宜桂枝湯(以上 張仲景)

26-5○ 少陰病 脈細沈數 痘爲在裏 不可發汗 少陰

病 但厥 無汗而 強發之 必動其血 或從口鼻 或從目出 是爲下厥上渴 難治(以上 張仲景)

• 26-8♣ 少陰病 初證 因爲陰證 繼而危證 此病初證 早不辨證而 措置則 危境也 凡 腹痛自利 無口渴 口中和者 爲太陰病 腹痛自利而 有口渴 口中不和者 爲少陰病 有身體痛 骨節痛 表證 此則 表裏俱病而 大腸寒氣 必勝胃中溫氣而 上升也 太陰病 無身體痛 骨節痛 表證此則 裹病 表不病而 胃中溫氣 猶勝大腸寒氣而 下降也

• 213-11♣ 論曰 陰黃 即 少陰人病也 當用 茵陳橘皮湯 茵陳四逆湯 女勞之黃 热家之黃 利少便之黃 想或非少陰人病而 余所經驗 未嘗一遇黃疸而治之故 未得仔細裏許 然 痘滿·黃疸·浮腫 同出一證而 有輕重 若 欲利小便則 乾薑·良薑·陳皮·香附子·益智仁 能利少陰人 小便 茄芥·防風·羌活·獨活·茯苓·澤瀉 能利少陽人小便

〈소양인 비수한표한병〉

32-6-2 此證 嘘者 外寒 包裹熱而 挾疾上逆也 寒熱往來者 脾局陰氣 欲降未降而 或降故 寒熱 或往或來也

• 32-6-7 此證 清裹熱而 降表陰則 痰飲自散而 結胸之證 預防不成也 清痰而燥痰則 無益於陰降 痰散延拖 結胸將成而 或別生奇證也

• 33-2♣ 論曰 少陽人病 無論表裏病 手足掌心 有汗則 痘解 手足掌心 不汗則 雖全體皆汗而病不解

34-1○ 少陰證 潑濶汗出 心下痞硬滿 引脇下痛 乾嘔 短氣 不惡寒 表解裡未知也 宜十棗湯 若合下不下 令人脹滿 編身浮腫

34-4○ 裹未和者 蓋 痰與燥氣 壊於中焦故 頭痛 乾嘔 汗出 痰隔也 非十棗湯 不治(杜王)

• 35-1♣ 甘遂 表寒病 破水結之藥也 表病可用甘遂而不用石膏 石膏 裹熱病 通大便之藥也 裹病可用石膏而不可用甘遂 然 揚手擲足人飲泄瀉證 用石膏 治風膝寒 大便不通證 用甘遂

• 35-2♣ 少陰人 傷寒病 有小腹硬滿之證 少陽人 傷寒病 有心下結胸之證 此二證 俱是 表氣陰陽虛弱 正邪相爭 累日不決之中 裡氣亦秘澁不和而 變生此證也

• 310-6-2 凡 少陽人 表病 有頭痛 裹病 有便秘則 已為 重病也 重病 不當用之藥 一二三貼 誤投則 必 殺人 險病 危證 當用之藥 一二三貼不及則 亦不救命

• 39-1-3 陽盛格陰於下則 陰為陽壅 不能下降於膀胱 上逆背脊而 內遁膈裡故 腸胃畏寒而泄下也 畏 寒而 泄下者 非陰盛也 此 所謂內炭外水 陰將亡之兆也

• 39-3♣ 少陰人 平居 裡煩汗多者 得病則 必成亡陽也 少陽人 平居 表寒下多者 得病則 必成亡陰也

• 39-6♣ 亡陰證 古醫 別無經驗 用藥頭話而 李子建 朱震亭書中 若干論及之 然 自無明的快驗 蓋 此 痘 從古以來 殺人孟浪甚速 未暇經驗猶得 裡虛故也

4) 少陽人 胃受熱 裡熱病論

43-1○ 陽厥者 初得病 必身熱頭痛 外有陽證 至四五日 方發厥 厥至半日 却身熱 蓋 熱氣深方能發厥 若 微厥 却發熱者 热甚故也 其脈 雖伏 按之滑者 為 裡熱 或飲水 或揚手擲足 煩躁不得眠 大便秘 小便赤 外證 多昏憤 用白虎湯(朱肱)

• 43-2♣ 論曰 少陽人 裡熱病 地黃白虎湯 為聖藥 而用之者 必觀於大便之通不通也 大便 一晝 夜有餘 而不通則加用也 二晝夜不通則必用也

• 43-5♣ 少陽人 表裏病結解 必觀於大便

• 44-1♣ 少陰人 裡寒病 脇腹冷證 受病之初 已有 腹鳴之機驗而其機 甚顯則 病執證易見而用藥可早也 少陽人 裡熱病 胸膈熱證 受病之初 雖有胸煩悶燥之機驗而其機 不甚顯則 病執證難見而 用藥太晚也

• 44-3-2 少陽人 裡病 大便 過一晝夜有餘而 不通則 自是裡病明白 易見之初證也

• 44-4-2 裡病 有大便過一晝夜不通證則 用 白虎湯

• 48-4♣ 論曰 上消中消 裡陽升氣 雖則虛損 表陰 降氣 猶持完壯故 其病雖險 猶能歲月支撐 以此也

• 48-4-2 若 夫陰虛午熱 飲水背寒而嘔者 表裏陰陽 俱虛損 所以為病尤險 與下消 略相輕重

2-8-2 蓋 少陰人 藏結 表陽溫氣 雖在幾絕 裡陰溫氣 猶持完壯 少陽人 鼓脹 裡陽清氣 雖在幾絕 表陰清氣 猶持完壯故 皆經歷久遠而 死也

• 59-2 * 大凡瘟疫 先察其人素病如何則 表裏虛實 可知已

• (의안) 510-1-2 蓋咽喉乾燥者 肝熱也 百色青白 表寒或泄者 胃脘寒也 此病 表裏俱病 素病之太重者也

6) 太陰人 肝受熱 裡熱病論

61-2-3 热在表則 目疼 不眠 宜解肌湯 热入裏則 狂譫 宜調胃承氣湯(李梴)

62-5 萬歷丙戌 余寓大梁 瘟疫大作 士民多斃 其證 增寒壯熱 頭面項頰赤腫 咽喉腫痛 昏憤 余發一秘方 各 二聖救苦丸 大黃四兩 猪牙皂角二兩 麵糊丸 綠豆大 五七十九 一服即 汗 一汗即 愈 穉壯者 百發百中 皂角 開關竅 發其表 灑諸火 通其裏 62-7-3 體熱 腹滿 自利者 热勝則 裹證也 當用 葛根解肌湯

(의안) 64-1-2 一太陰人 十歲兒 得裏熱瘟病 粥食全不入口 藥亦不入口 壯熱穰穰 有時陰冷水 至于十一日則 大便不通

○ 虛弱人 表症寒證多者 宜用

○ 虛弱人裏症多者 宜用

升麻三錢 大黃皂角同局

○ 治浮腫裏症熱多者 宜用

• 81-4-4 太陽人 若有腹痛 腸鳴 泄瀉 痢疾之證 則 小腸裡氣 充實也 其病易治 其人 亦完健

• 85-1-2 曰否 太陽人 噫膈病 太重於解体病而 怒心所傷者 太重於哀心所傷也 太陽人 哀心深着則 傷表氣 怒心暴發則 傷裡氣 故 解壹表證 以戒哀遠怒 兼言之也

1. 裡氣

• 35-2♣ 少陰人 傷寒病 有小腹硬滿之證 少陽人 傷陽人 傷寒病 有心下結胸之證 此二證 此二證 俱是 表氣陰 陽虛弱正邪相爭 累日不決之中 裡氣亦秘澁不和而 變生此證也

• 81-4-4 太陽人 若有腹痛 腸鳴 泄瀉 痢疾之證 則 小腸裡氣 充實也 其病易治 其人 亦完健

• 85-1-2 曰否 太陽人 噫膈病 太重於解你病而 怒心所傷者 太重於哀心所傷也 太陽人 哀心深着則 傷表氣 怒心暴發則 傷裡氣 故 解你表證 以戒哀遠怒兼言之也

2. 裡陰

2-3-2 蓋 少陰人 藏結 表陽溫氣 雖在幾絕 裡陰溫氣 猶恃完壯 少陽人 鼓脹 裡陽清氣 雖在幾絕 表陰清氣 猶恃完壯故 皆經歷久遠而 死也

3. 裡陽

2-8-2 蓋 少陰人 藏結 表陽溫氣 雖在幾絕 裡陰溫氣 猶恃完壯 少陽人 鼓脹 裡陽清氣 雖在幾絕 表陰清氣 猶恃完壯故 皆經歷久遠而 死也

4. 裡熱

• 17-5-2 然 少陽人 裡熱證 太陰人 表熱證 亦有 汗多而 小便赤澀者 不可誤藥

• 17-6-2 脾約病 其始焉 汗自出 不惡寒而 其病垂危則 發熱汗多而 惡寒也 發熱汗多而 惡寒者 裡熱 摧支之勢 已窮故也 脾絕之候也

• 32-6-2 此證 嘘者 外寒 包裡熱而 挾疾上逆也 寒熱往來者 脾局陰氣 欲降未降而 或降故 寒熱 或往或來也 口苦 咽乾 目眩 耳聾者 陰氣囚滯脅間 欲降

未降故 但寒無熱而 至於耳聾也

• 32-6-7 此證 清裡熱而 降表陰則 痰飲自散而 結胸之證 預防不成也 清痰而燥痰則 無益於陰降 痰散延拖 結胸將成而 或別生奇證也

• 35-1♣ 甘遂 表寒病 破水結之藥也 表病可用甘遂而不用石膏 裡熱病 通大便之藥也 裡病可用石膏而不可用甘遂 然 揚手擲足引飲泄瀉證 用石膏 滯風膝寒 大便不通證 用甘遂

4) 少陽人 胃受熱 裡熱病論

• 43-2♣ 論曰 少陽人 裡熱病 地黃白虎湯 爲聖藥而用之者 必觀於大便之通不通也 大便 一晝 夜有餘而不通則可用也 二晝夜不通則必用也

• 44-1♣ 少陰人 裡寒病 膽腹冷證 受病之初 已有腹鳴泄瀉之機驗而其機 甚顯則 痘執證易見而用藥可早也 少陽人 裡熱病 胸膈熱證 受病之初 雖有胸煩悶燥機驗而其機 不甚顯則 痘執證 難見而 用藥太晚也

6) 太陰人 肝受熱 裡熱病論

5. 裡寒

2) 少陰人 胃受寒 裡寒病論

44-1♣ 少陰人 裡寒病 膽腹冷證 受病之初 已有腹鳴泄瀉之機驗而其機 甚顯則 痘執證易見而用藥可早也 少陽人 裡熱病 胸膈熱證 受病之初 雖有胸煩悶燥機驗而其機 不甚顯則 痘執證 難見而 用藥太晚也

III. 陰 氣

• 32-6-1♣ 張仲景所論 少陽病 口苦 咽乾 目眩 耳聾 胸脇滿 或 往來寒熱之證 卽少陽人 腎局陰氣 爲熱邪所陷而 脾局陰氣 爲熱邪所壅 不能下降 連接於腎局而 凝聚脅間 膠固囚滯之病也

• 32-6-2 此證 嘔者 外寒 包裡熱而 挾疾上逆也
寒熱往來者 脾局陰氣 欲降未降而 或降故 寒熱 或往
或來也 口苦 咽乾 目眩 耳聾者 陰氣囚滯脊間 欲降
未降故 但寒無熱而 至於耳聾也

• 32-2-2 少陽人病 一日滑利 陰氣下降 手足掌心
汗則 痘必愈也而二日三日 泄不止 痘不愈則 陰不下
降而 亡陰 無疑也

IV. 陽 氣

• 12-6-2 張仲景所論 下焦血證 卽 少陽人 脾局
陽氣 為寒邪所俺抑而 腎局陽氣 為邪所拒 不能直升
連接於脾局 鬱縮膀胱之證也 其人如狂者 其人亂言也
如見鬼狀者 恍惚譖語也

• 12-6-5 太陽病 外證未除則 陽氣其力 雖有鬱抑
猶能振寒而 與寒邪相爭於表也 若外證盡除則 陽氣其力
不能振寒而 遂為窮困縮伏之勢也 功下之藥 何甚好藥而

必待陽氣窮困縮伏之時而 應用耶 人蔘桂枝湯 不亦晚乎

18-2○ 凡厥者 陰陽氣 不相順接 便為厥 厥者 手
足逆冷是也

1-1● 論曰 發熱惡寒者 為太陽病 發熱不惡寒者
為陽明病 太陽陽明之 發熱刑證 一也而 惡寒不惡寒
之間 相去遠甚而 陽氣之進退強弱 泰山之比岡陵也
自利而不渴者 為太陰病 自利而渴者為少陰病 太陰少
陰之 自利形證 一也而 渴不渴之間 相去遠甚而 冷氣
之聚散輕重雲霧之比瀦澤也 是故 薑香正氣散·香砂養
胃湯之證勢 平地駿馬之病勢也 獨蔘八物湯·桂附理中
湯之證勢 太行短篠之病勢也 (篠 공대 공)

• 39-2♣ 少陰人病 一日發汗 陽氣上升 人中公先
汗則 痘必愈也而二日三日 汗不止 痘不愈則陽不上升
而 亡陽 無疑也

• 45-6♣ 平心靜思則 陽氣上升 輕清而 充足於頭
面四肢也 此 元氣也 清陽也

45-6-2 勞心焦思則 陽氣下陷 重濁而 鬱熱於頭面
四肢也 此 火氣也 耗陽也