

# 痔疾, 痔漏의 治療法에 對한 文獻的 考察

金弼洙\* · 盧石善\*

## I. 緒 論

肛門은 直腸의 끝부분으로 直腸에 屬하는 直腸膨大部와 肛門管으로 나누어지며, 肛門管은 皮膚組織처럼 中層 扁平上皮로 그 길이는 약3cm 정도이다. 肛門管의 粘膜에는 8~14개 정도의 모르가니 원주가 있는데 그 밑으로 약 1cm 폭으로 된 고리모양으로 隆起된 痔疾帶가 있으며 그 안에는 매우 複雜하게 된 靜脈叢이 分布하고 여기에서 血液循環이 障礙되면 그 벽이 늘어나서 痔疾結節이 發生한다<sup>1-4)</sup>. 痔疾은 肛門管內의 粘膜下層에 血管, 平滑筋, 彈力 및 結合組織을 含有한 排便衝擊緩和組織이지만 지주조직의 變性으로 粘膜下層의 分離性 腫塊를 이루어 肛門管 內層에서 下向 移動되며 대개 反復되는 出血이나 脫肛의 症勢을 보여준다<sup>1,3-4)</sup>. 痔核은 대개 內痔核과 外痔核으로 區分하는데 內痔核은 上痔靜脈 終末枝의 擴張으로 이행성 上皮와 원주상피에 덮여 있으며, 外痔核은 下痔靜脈 終末枝의 擴張으로 편평상피에 덮여 있으나 이 兩者는 흔히 痔上線을 지나 서로 疏通되기도 한다. 痔漏는 肉芽組織으로 된 纖維性管으로 肛門管이나 直腸에 內孔이 있고 肛門周圍 皮膚에 1개 또는 그 이상의 外孔이 있는 것을 말한다<sup>1-4)</sup>.

韓醫學에서 痔와 關係되는 內容으로는 <<黃帝內經 素問>> <<生氣通天論>><sup>5)</sup>에 “因而飽食,

筋脈橫解, 腸澀爲痔”라고 最初로 記錄되었으며, <<神農本草經>><sup>6)</sup>에서는 五痔, 腸痔, 疽痔, 瘡痔, 癭痔 등의 病名이 提出되었다. 巢<sup>7)</sup>는 痔를 牝痔, 牡痔, 脈痔, 腸痔, 血痔, 酒痔, 氣痔 등으로 分類하고 傷風, 勞傷經絡, 房室不慎, 醉飽合陰陽 등으로 발생한다고 하였고 孫<sup>8)</sup>은 巢<sup>7)</sup>의 說을 따라 痔를 分類하면서 槐子丸, 槐實丸, 蛻皮丸, 外痔方, 穀道通方 등 具體的인 處方을 提示하고 禁할 것은 寒冷食, 豬肉, 生魚菜, 房室 등을 強調하였다. <古今醫統><sup>9)</sup>에서는 “初生 肛門生成不破者爲痔, 久而破潰膿血黃水浸淫 淋瀝不止者曰漏”라 하여 痔와 漏에 대하여 보다 精確한 認識을 하였는데 歷代 醫家들은 痔는 肛門周圍에 小肉突起가 있는 것, 漏는 오랫동안 治療되지 않고 穿穴이 생겨 崩潰된 것으로 痔를 痔瘡, 漏를 漏瘡이라고 言及하였다<sup>7,10-15)</sup>.

以後 醫學이 發達하면서 痔疾, 痔瘻에 대한 認識이 多樣해 지면서 治法, 處方, 藥物에 대하여 多角的인 發展이 있었는데, 原因으로는 傷風, 勞傷經絡, 房室不節, 醉飽合陰陽, 坐中寒濕, 酒色過度, 飽食, 嗜好食, 七情 등으로 發生한다<sup>5,7,9,15-21)</sup>. 治療法에 있어서는 補中益氣, 清熱涼血, 活血祛瘀, 苦寒瀉火, 涼血燥濕, 祛風燥濕, 疏風止痛하는 治療法을 爲主로 槐子丸, 蛻皮丸, 廣濟五痔方, 秦艽當歸湯, 芎歸湯, 秦艽蒼朮湯, 秦艽防風湯, 五倍子湯, 木香檳榔丸 등이 多用되었고<sup>9,10,12-16,18,20-24)</sup>, 外治法으로는 熏洗法, 外敷

\* 大田大學校 韓醫科大學 外官科學教室

法, 塞藥法, 枯痔法 등이 사용되었다<sup>8-11,13,15,18-23,25</sup>).

이에 著者는 痔疾, 痔漏에 대한 治療法 中心으로 歷代文獻을 考察한 結果 若干의 知見을 얻었기에 이에 報告하는 바이다.

25. 程國彭：吳批 醫學心悟
26. 山東中醫學院：針灸甲乙經校釋
27. 鄧鐵濤：中醫診斷學
28. 李順東：東醫處方大全(3)
29. 申天浩：問答式 오관외과학

## II. 資料 및 研究方法

### 1. 資料

黃帝內經 의 28種의 文獻을 調査資料로 하였다.

1. 洪性國, 朴在甲：대장항문학
2. 顧伯華：實用中醫外科學
3. 顧伯康：中醫外科學
4. 吳存亮：中醫痔瘻病學
5. 洪元植 譯：精交黃帝內經素問
6. 吳普：神農本草經
7. 南京中醫學院：諸病源候論校釋
8. 孫思邈：秘急千金療方
9. 徐春甫：古今醫統大全
10. 周喜民：金元四大家醫學全書
11. 龔廷賢：增補萬病回春
12. 許俊：原本 東醫寶鑑
13. 朱震亨：丹溪治法心要
14. 張子和：儒門事親提要
15. 李東垣：東垣十種醫書
16. 劉道清, 周一謀：中醫名言大辭典(上·下)
17. 王焘：外臺秘要
18. 陳實功：外科正宗
19. 周命新：醫門寶鑒
20. 虞搏：醫學正傳
21. 樓英：醫學綱目
22. 許芝銀, 史慕山：外科病實用方
23. 馬紹堯：中醫外科(臨床袖珍手冊)
24. 金定濟：東洋醫學 診療要鑑

### 2. 研究方法

위 參考文獻을 中心으로 痔疾, 痔漏에 대한 治法, 治方에 대하여 調査整理 하였다.

## III. 本 論

### 1. 黃帝內經 素問<sup>5)</sup>

〈生氣通天論編〉

因而飽食 筋脈橫解 腸澼爲痔

### 2. 諸病源候論<sup>7)</sup>

〈痔病諸候 凡六論〉

#### 一. 諸痔候

諸痔者, 謂牡痔, 牝痔, 脈痔, 腸痔, 血痔也. 其形症各條如後章. 又有酒痔, 肛邊生瘡, 亦有血出. 又有氣痔, 大便難而血出, 肛亦出外, 良久不肯入.

諸痔皆由傷風, 房室不慎, 醉飽合陰陽, 致勞拔血氣, 而經脈流溢, 滲漏腸間, 沖發下部. 有一方而治之者, 名爲諸痔, 非爲諸病共成一痔. 痔久不差, 變爲瘻也.

#### 二. 牡痔候

肛邊生鼠乳出在外者, 時時出膿血者是也.

#### 三. 牝痔候

肛邊腫生瘡而出血者, 牝痔也.

#### 四. 脈痔候

肛邊生瘡, 痒而腹痛出血者, 脈痔也.

#### 五. 腸痔候

肛邊腫核痛, 發寒熱而血出者, 腸痔也.

## 六.血痔候

因使而清血隨出者，血痔也。

〈瘡病諸候 凡六十五論〉

### 一一五.痔病候

痔病，由勞傷經絡，而血流滲之所成也。而有五種：肛便生瘡，如鼠乳出在外，時出膿血者，牡痔也。肛邊腫，生瘡而出血者，牝痔也。肛邊生瘡，痒而腹痛出血者，爲脈痔也。肛邊腫核痛，發寒熱而出血者，腸痔也。因使而清血出者，血痔也。

## 3. 備急千金要方<sup>8)</sup>

〈五痔第三〉

論曰 夫五痔者 一曰 牡痔 二曰 牝痔 三曰 脈痔 四曰 腸痔 五曰 血痔。牡痔者 肛邊如鼠乳 時時潰膿血出。牝痔者 肛腫痛生瘡。脈痔者 肛邊有瘡瘍痛。腸痔者 肛邊核痛發寒熱。血痔者 大便清血隋 大便汚衣。又五痔有氣痔 寒溫勞濕即發 蛇蛻皮主之。牡痔 …… 衣鼈甲主之 …… 蟬皮主之。腸痔 …… 左足懸蹄甲主之。脈痔 …… 更衣出清血蜂房主之。 …… 禁寒冷食 猪肉 生魚菜房室 惟得食乾白肉病差之後 百日乃通房內 又用藥導下部有瘡內藥瘡中 無瘡內孔中 又用野葛燒末 刀圭內藥中 服藥五日知 二十日 若三十日愈 痛通忌 卑菜

槐子丸，槐實丸，猬皮丸，外痔方，穀道通方。

五痔方：眞珠，雄黃，雌黃，竹茹，猪膏 猪膏에 和調하여 外部에 부친다。

## 4. 古今醫統大全<sup>9)</sup>

〈痔漏門〉

### ○痔漏敘論

〈素門·生氣通天論〉曰：因而飽食，筋脈橫解，腸澀爲痔。

痺論曰：飲食自倍，腸胃乃傷。

〈巢氏病源〉云：痔有五種，曰牡痔 ……。

李東垣曰：飽食 用力 房勞，脾胃濕熱之氣下迫，大腸至澀裂努出，其肉如櫻桃 鷄心等狀，贅於肛門而成痔。蓋爲病者，皆是濕熱 風燥四氣所傷，而熱爲最多也。四氣者非六淫之邪，乃五臟之氣擾動，內發而作成也。如飲食勞卷動乎脾，憂恐動乎肺，恚怒動乎肝。諸動屬火，故熱多也。其腫而後重者，濕兼熱也，大便結者，燥兼熱也。

### ○久痔成漏

《仁齋直指》云：內蘊熱毒，醉飽勞役，多慾白狀，以致氣血下墜，結聚肛門，宿滯不散而衝突爲痔也。經云：諸痛瘡瘍，皆屬於心。心主血，熱而下迫於大腸，所以爲痔也。諸痔出血，肛門別有小竅，下血如線，不與大便同道。痔久不愈，必至穿穴，瘡口不合，漏無已時，痔即變而爲瘻矣。

### ○痔漏總爲濕熱風燥四氣所成

初生肛門成疔不破者，爲痔，久而破潰膿血黃水浸淫，淋瀝不止者，曰漏。此疾者皆由濕熱風燥四氣相合而痔之也。蓋因人之縱慾恣飲，喜怒無常，臟腑抑鬱，飲食自倍，腸胃乃傷，陰陽不和，關格壅滯，熱毒下注，血滲大腸，而爲腸澀痔漏之患矣。

### ○痔漏有謂肝筋爲病

《靈樞經》云：足太陽膀胱之脈及筋，皆抵腰中，入絡腎，其支者貫腎足，故主筋爲病即生此疾。由是推之，足闕陰之脈，環繞前後兩陰，故亦能爲痔矣。每見患痔發即色清痛甚 謂筋苦急而然也。

### ○痔漏病久致有蟲 生即爲蟲痔

《直指》云：痔漏患久，歲月積累，淫蝕腸頭，濕爛可畏，此果何物致然哉？蟲是也。其間用劑，又當爲之化蟲，不然古方何以謂之蟲痔？

### ○治痔漏大法以瀉火涼血流濕潤燥爲主

東垣云：痔病皆濕熱風燥四氣爲病，其腫而後重者，濕兼熱也；大便結者，燥兼熱也；腸頭成塊者，濕也；大痛者，風熱也。此皆穢氣爲病而顯其形也。治宜行氣和血，瀉火疏風，流濕潤燥，以調其內，澆洗塗敷，以治其外。腫痛惟定，而痔猶存也。若不去其根本，遇觸即發。以枯藥消去其

痔，而絕其源。亦須調飲食，戒房勞，慎憂怒，內觀白養，瀉火不起，可保全安。否卽惟服良藥，難復效也。

#### ○痔與漏 治法 不同

丹溪云：治痔必須治血爲主。大法用條芩涼大腸，人參 黃連 生地黃 槐角子生血涼血，當歸和血，升麻 川芎 枳殼寬腸。

漏瘡須服補藥，以生氣血，參 耆 歸 朮主之，外以附子爲末作餅子如錢厚，以艾灸之。隨漏大小令微熱，不可令痛，乾卽易之，再和再灸。如因且止，直至肉平爲度。或用補氣血藥作膏貼之。

藥方：秦艽蒼朮湯，秦艽當歸湯，秦艽羌活湯，紅花桃仁湯，清心丸，清冷飲，槐角丸，芎歸丸，乾葛湯，橘皮湯，荆枳湯，逐瘀湯，寬腸丸，豬臍丸，消痔千金散，半夏散，龍腦散，熊膽膏等等。

灸法：命門 長強

熏洗方：側柏葉湯，七物湯，葱青散，神效散，茄柯湯：茄柯、槐花、冬瓜皮、枳殼 煎湯先熏後洗却敷後項藥愈。

敷藥：眞熊膽 以新水調成漿鷄羽敷之。

熏洗法：槐花，蓮房，荊芥，五倍子，地榆 爲末 煎入明礬三錢 如法熏洗。

熊膽膏：熊膽，冰板，左細研 井花水調 敷之。

豬膽膏：豬膽 鷄卵殼 膏을 만들어 붙인다. 先用槐根白皮煎湯洗痔後敷藥。

拔毒散：大黃，黃柏，白及，石膏，黃芩，黃連，白欬，梔子，朴草 爲末 以井花水調 塗患處。

## 5. 金元四大家醫學全書<sup>10)</sup>

黃帝素問宣明論方

### 〈痔瘻門〉

#### 〈痔漏總論〉

夫腸風痔病者，所發手太陽，手陽明經，以應動脈，謂肺與大腸相表裏，主爲傳道，以行糟粕。腸風痔病有五種，其症亦異。蓋因陽氣虛而玄腑疏，風邪乘而熱自生，風濕邪熱攻于腸中，致使大便澁而燥熱郁，血熱散而流溢，沖浸浚腸里，故以先血

後便。熱在下，先便後血；熱在上，先血後便，久而不愈乃作痔。

《素問》云：因而飽食，筋脈橫解，房室勞傷，腸癖爲痔。風熱不散，谷氣流溢，傳于下部，故令肛門腫滿，結如梅李核，甚至而變成瘻也。五臟切宜保養，勿令受邪。

#### 藥證方

香殼丸，烏荊丸，黃耆葛花丸，黃連散，乳香沒藥散，木香厚朴湯。

#### 蘭室秘藏

### 〈痔瘻門〉

#### 〈痔漏論〉

……因飽食行房忍泄，前陰之氣歸于大腸，木乘火勢而侮燥金，故火就燥也，大便必閉。其疾甚者，當以苦寒瀉火，以辛溫活血潤燥，疏風止痛，是其治也。以秦艽 當歸硝和血潤燥；以桃仁潤血；以皂角仁除風燥；以地榆破血；以枳實之苦寒補腎，以下泄胃實；以澤瀉之淡滲，使氣歸于前陰，以補清燥受胃之濕邪也；白朮之苦甘，以苦補燥氣之不足，其甘味以瀉火而益元氣也。故曰：甘寒泄火，乃假枳實之寒也。古人用藥，爲下焦如瀆。又曰：在下者引而竭之，多爲大便秘澁，以大黃推去之，其津血益不足，以當歸和血，及油潤之劑，大便自然軟利矣。宜作湯以與之，是下焦有熱，以急治之之法也。以地榆酸苦以杯胃，故宿食消盡，空心作丸服之。

秦艽白朮丸，秦艽蒼朮湯，秦艽防風湯，秦艽羌活湯，當歸郁李仁湯，紅花桃仁湯。

#### 丹溪心法

### 〈痔瘻二十六〉

痔瘻專以涼血爲主。

入方：人參 黃耆 生地黃 川芎 當歸 升麻 條芩 枳角 槐角 黃連 一方無黃連。

熏洗方：五倍子 朴硝 桑寄生 蓮房 又加荊芥 煎湯 先熏後洗。

…… 治法總要，大抵以解熱調血順氣先之。蓋熱即血傷，血傷即經滯，經滯即氣不運行，氣與血俱滯，乘虛而墜入大腸，此其所以為痔也。諸痔久不愈，必至穿穴為漏矣。

治方：清心丸，清冷飲，槐角丸，蛻皮丸，豬甲丸，芎歸丸，乾葛湯，橘皮湯。

煎洗方：槐花 荊芥 枳殼 艾葉

### 《漏瘡二十七》

漏瘡，先須服補藥生氣血，用參朮耆芎歸為主，大劑服之。…… 痔漏，涼大腸，寬大腸，用枳殼，入巴豆……。

漏者，諸瘻之潰漏也。浪瘻 鼠瘻 蟻蛄瘻 蟲瘻 蚘蚘瘻 蟻蟻瘻 浮疽瘻 瘰癧瘻 轉脈瘻，古所謂九瘻是爾。

治方：黃連散，豬腎丸，乳香散，生地黃膏。

## 6. 增補 萬病回春<sup>11)</sup>

### 〈痔漏〉

腸溼為痔 如大澤中有小山突出為痔 人於九竅中 但有小肉突起 皆曰痔 不特於肛門邊生者名之 亦有鼻痔 眼痔 牙痔 等其狀不一 …… 治宜解熱調血順氣為主 若久而不愈 必至穿穴為漏矣… 漏者 潰出膿血也。

治方：當歸連翹湯，黑白散，消毒百應丸，釣腸丸，臟連固本丸，洗痔漏神方

敷洗藥：皮硝 五倍子 黃柏 黃連 滑石 血竭 乳香 沒藥 密陀僧 荊戒皮草，五倍子을 煎湯하여 患處을 洗하고 나머지 약을 細末하여 麻油로 調敷한다。

## 7. 東醫寶鑑<sup>12)</sup>

### 〈痔有內外〉

腸痔 脈痔 氣痔 血痔 酒痔 屬內， 牡痔 牝痔 瘻痔 屬外。

### 〈瘻痔〉

浸淫濕爛歲積月累蟲生其間食腸穿穴與下痔瘻 同治法。

治方：五痔散，神應散，槐角元，神應黑玉丹，釣腸丸，逐癆湯，加味香蘇散，乾葛湯，加味槐角丸，秦芫蒼朮湯。

### 〈痔漏〉

即瘻痔也。痔核已破謂之痔漏。

### 〈痔病治法〉

痔以涼血為主 大要槐花槐角生地黃涼血 川芎 當歸桃仁化血生血 枳角行氣寬腸 黃芩黃連梔子 清熱 黃柏防己澤瀉去濕 麻仁大黃潤燥 秦芫荊芥 疏風。

### 〈痔病禁忌〉

久痔虛者 當服補藥如黑地黃丸腎氣丸 以滋化源 更節嗜慾謹起居 方可斷根

…… 痔根本是冷慎冷飲食及房勞鷄肉最毒而房勞為尤甚 蕎麥麵亦須忌之

## 8. 丹溪心法心要<sup>13)</sup>

### 〈痔漏第六十五〉

痔漏 專以涼血為主。

漏瘡，先服大劑補藥，以生氣血，參耆歸朮芎為主。外以附子末，津補和作餅如饅厚，安患處，灸之。只令微熱，不可令痛，乾即易之。再以乾者研末，如前作餅，灸之。

困倦且之。次日再灸，直至肉平為效。仍用前補氣血藥煎膏藥貼，或用附子片灸之亦可。肢體上癰疽瘡癤，久不收口者，亦宜用此法。

痔瘡，大法用條芩涼大腸，人參 黃連 生地 枳角涼血生血，芎歸和血，枳亮寬腸，升麻升舉。外用五倍 朴硝 桑寄生 蓮蓬煎湯煎洗。腫者，用木鱉子 五倍子為末，敷。

原有痔漏，就肛門又生一塊皮厚腫作膿，就在痔孔出，作食積注下治之。黃連 阿魏 神曲 山楂 桃仁 連翹 槐角 犀角 丸服之。

## 9. 儒門事親提要<sup>14)</sup>

### 〈痔漏腫痛十九〉

夫痔漏腫痛……久而不愈 變而為漏 同治濕法而治之 可先用導水丸 禹功散 瀉訖 次服枳殼丸 木香檳榔丸 更加以葵菜豬羊血等 通利腸胃 大忌 房室 鷄 魚 酒 醋等物 勿食之。

## 10. 東垣十種醫書<sup>15)</sup>

### 〈外科精義〉

#### 〈論痔漏〉

夫痔漏之候其名有五 一曰牝痔 二曰牡痔 三曰氣痔 四曰血痔 五曰酒痔 又曰腸風痔 脈痔 雌雄痔 皆五痔之別名也。其狀初生在肛邊 或如鼠乳 或結小核 痒痛注悶 甚者 身熱 惡寒 諸方論之 皆由房酒過度 久嗜肥甘不愼 醉飽以合陰陽 勞傷脈脈腸癰滲漏 衝注下部…… 治法 始覺痔作便 服通氣丸 槐角丸 熱貫者 服諸利湯 疏利臟腑及 浴洗薰蔚 以取內消 切忌 酒 麵 辛熱房室 嗜欲腐潰膿血……。

## 11. 中醫名言大辭典<sup>16)</sup>

### 〈痔漏〉

痔，熱疾也。

痔漏之源，由于酒色過度，濕而生熱，克于臟腑，溢于經絡，墮乎谷道之左右，

沖突為痔，久而成漏者也。痔輕而漏重，痔實而漏虛。治痔之法，不過涼血清熱而已。至于治漏，初即宜涼血清熱燥濕，久即宜塞竅殺蟲而兼乎溫散也。

或曰：痔漏火是根源，何故而用溫澁？殊不知痔止出血，始終是熱；漏流膿水，始是濕熱，終是濕寒。不用溫藥，何以去濕而散寒乎？

大凡痔屢下血，服涼血藥不效者，必因中氣虛，不能攝血，非補中升陽之藥不能愈也。切忌寒涼之劑。

治痔之法，不過涼血解毒。至于痔漏，即當峻補氣血，兼以溫散，方可奏效。

漏瘡，先須服補藥以生氣血，即參耆朮歸芎為

主，大劑服之。外以附子末，唾和作餅如錢厚，以艾柱灸之。

大便秘澁或作痛者，滋燥除濕。下墮腫痛或作痒者，祛風膿濕。肛門下墮或作痛，瀉火導濕。腫痛小便秘澁者，清肝導濕。

## 12. 外臺秘要<sup>17)</sup>

### 〈五痔方一十二首〉

崔氏論曰 凡痔病有五 若肛邊生肉如鼠乳出孔外 時時膿出者 名牡痔者也。若肛邊腫痛生瘡者 名酒痔也。若肛邊有核痛及寒熱者 名腸痔也。若大便斗清血出者 名血痔也。若大便肛良久肯入者 名氣痔也。此皆坐中寒濕 或房室失節 或醉飽過度所得 當時不為患 久久不差 終能困人 別有大方 今單行亦要便宜依按用之。

廣濟療五痔方，蝟皮散，紫蔘丸，桃葉蒸痔方，千金療五痔方，等等一十二首

## 13. 外科正宗<sup>18)</sup>

### 〈痔瘡論 第三十〉

夫痔者，乃素積濕熱，過食灸燻，或因久坐而血脈不行，又因七情而過傷生冷，以及擔輕負重，竭力運行，氣血縱橫，經絡交錯；又或酒色過度，腸胃受傷，以致濁氣於血流注肛門，俱能發痔。此患不論老幼男婦皆然，蓋有生於肛門之內，又突于肛門外之傍。治分內外，各自提方。…… 凡療內痔者，先用通利藥湯滌臟腑，然後用喚痔散，塗入肛門，片時內痔自然泛出，即用蔥湯洗淨；…… 外痔者，用消毒散煎洗，隨用枯痔散照內痔法用之，……。

### 〈痔瘡治法〉

初起及已成漸漸大而便澁作痛者，宜潤燥及滋陰。肛門下墮，大便去血，時或疼痛堅硬者，宜清火滲濕。紫色疼痛，大升虛秘兼作痒者，涼血去風疏利濕熱。腫痛堅硬，後重墜刺，便去難者，外宜薰洗，內當宣利。內痔去血，登廁脫肛而難上收者，當健脾 升奉中氣。便前便後下血，面色痿黃，心

恫耳鳴者，宜養血健脾。諸痔欲斷其根，必須枯藥，當完其窺，必杜房勞乃愈。

防風秦朮湯，提肛散，加味四君子湯，當歸郁李湯，芎歸湯，三黃二地湯，五倍子散，喚痔散，枯痔散，起痔湯，生肌散 人中白散，三品一條湯。

洗痔枳角湯：枳殼，荔枝草 二味煎數滾 先煎後洗 良久湯留 再煎煎洗 甚者 三次即消。

洗痔腫痛方：魚腥草，苦楝根，朴硝，馬齒莧，瓦花 各一兩을 끓여서 先煎後洗한다.

#### 14. 醫門寶鑑<sup>19)</sup>

##### <痔漏>

…… 蓋由酒色過度 久嗜甘肥蘊積熱毒 及憤鬱之氣所致也 或藏於肛門之內 或出於肛門之外 治宜在外者 點之洗之 在內者 去風除濕清熱解毒 初即涼血燥濕 久即澁窺殺蟲 兼以溫散 ……。

通用 五痔 秦朮蒼朮湯 神應散 外以却毒湯 或龍葵煎 水洗之 又以熊水膏塗之。

一曰 牡痔者：秦朮蒼朮湯加槐角丸

一曰 牝痔者：治同牡痔

一曰 腸痔者：通用參耆湯 蝟皮散 外以五倍子 煎洗

一曰 氣痔者：加味香蘇散。

一曰 血痔者：治有三。色鮮者 腸風也 宜栝葉湯。色濁者 腸毒也 宜槐花散。水穀與血作派嚼節有力遠射者 腸疝也 宜涼血地黃湯 當歸和血散 升陽除濕和血散。

一曰 脈痔者：釣腸丸 逐於湯 神應黑玉丹。

一曰 酒痔者：乾葛湯

一曰 瘦痔者：涼血飲 蝟皮丸 外用田螺膏 熊水膏 蜈蚣油

#### 15. 醫學正傳<sup>20)</sup>

##### <痔漏>

…… 又曰：脾胃者，倉稯之官，五味出焉。大腸者，傳道之官，變化出焉。若夫飽食太過，即脾氣倦甚，不能運化精微，朝傷募損，清濁混激，故

食積下流于大腸之間而為病也。…… 治法以苦寒瀉火，芩 連 梔子 槐花之類。以辛溫和血，用歸川芎 桃仁之類。風邪在下，以秦朮 防風 升麻之類提之。燥熱佛郁，以大黃 枳亮 麻仁之類潤之。

##### <方法>

丹溪曰：痔病，因風熱燥歸于大腸也，治血為主，大法用條芩 涼大腸，人蔘 黃連 生地黃 槐角 涼血生血，當歸和血，川芎 升麻 枳亮寬腸。

漏瘡，先須用補藥以補氣血，蔘 耆 歸 朮為主，大劑服之。外以附子為末，津和作餅子如錢厚，以艾多灸之，漏大者艾柱亦大，漏小者艾柱亦小，灸令微熱，不可令痛，餅乾即易之，再和再灸。又以補氣血藥，作膏藥貼之。

一方：治痔瘡腫痛，用蝟牛 陰乾為末，數之即愈。或用香油浸蝟牛月余，而以其油沫敷，亦效。

秦朮羌活湯，秦朮蒼朮湯，秦朮當歸湯，秦朮防風湯，秦朮白朮丸，當歸郁李仁湯，紅花桃仁湯。

#### 16. 醫學綱目<sup>21)</sup>

##### <痔>

(仲) 小腸有熱者 必痔

(垣) 秦朮蒼朮湯。治痔疾，若破謂之痔漏，大便秘澁，必作大痛。此由風熱乘食飽不通，氣逼大腸而作也。受病者，燥氣也。為病者，胃濕也。胃刑大腸即化燥火，以乘燥熱之實，勝風附熱而來，是濕熱風燥四氣相合，故大腸頭成塊者 濕也，作大痛者風也。若大便燥結者，主病兼受火邪也，熱結不通祛燥屎者，其西方肺主諸氣，其體收下，亦助疾病為邪，須當破氣藥兼之，……。

秦朮白朮丸，蒼朮澤瀉丸，白朮丸。

(丹) 痔漏，專一涼血為主。

痔藥膏子，鱉甲丸，七聖散丸，秦朮防風湯，秦朮羌活湯，當歸郁李仁湯，治痔神應散。

淋洗法：天仙子，茴荊穗，小椒，蔓荊子 左水煎湯洗。

枯痔法：明礬，赤石脂，辰砂，黃丹을 가루을 내서 調塗四圍好肉。

## 17. 外科病實用方<sup>22)</sup>

### <痔方>

痔是直腸下段粘膜下和肛管皮膚下痔靜脈雙瘀血擴張和屈曲而形成的柔軟靜脈閉。……治療採用清熱涼血祛風利濕活血祛瘀補氣升陷養陰潤燥之法配合熏洗外敷寒藥及枯痔等外治法。本病晚期宜採用注射結扎切除等中西醫結合療法。

#### ○內服方

涼血地黃湯，槐角丸，槐花散，臟連丸，防風秦芫湯，活血散瘀湯，血府逐瘀湯，桃紅四物湯，痔瘡丸，黃土湯，八珍湯，潤腸丸，苦參地黃丸。

#### ○外治方

復方荊芥湯，洗痔腫痛方，洗痔枳角湯，五倍子散，消痔散，玉露散，二黃枯痔釘，發射丸。

五倍子湯：五倍子，朴草，桑寄生，蓮房，荊芥煎湯熏洗患處。

洗痔黃附湯：大黃，朴草煎湯熏洗患處。

活血膏：自然銅，紅花，木鱉子，血竭，乳香，沒藥，川芎細末하여酒精，香油을 적당량 넣고軟膏을 만들어 사용.

## 18. 中醫外科(臨床袖珍手冊)<sup>23)</sup>

### <肛腸疾患>

#### 一. 內痔

##### 【診斷】

1) 局部症狀：肛門內有柔軟的腫塊突出……便血，塊物脫出。一般無疼痛感覺，中後期患者可伴有肛門墮脹，瘙癢。……可致腫痛，糜爛，壞死，甚至化膿，繼發性肛漏等。

2) 全身症狀：一般無全身症狀。……長期便血而合併繼發性貧血，大便困難，小便不暢等症狀。

#### 3) 分期

一期：痔核較小，質軟，色鮮紅，常因大便擦破痔核而出血，

二期：痔核較大，質較柔軟，其色鮮紅或青紫，大便時可脫出肛外，便後自行回納，便血或多或少。

三期：痔核更大，表面帶灰白色，大便時痔核脫出肛外，甚至行走，咳嗽，噴嚏，站立時也會脫出，不能自行回納，須用手推回或平臥……便血不多或不出血。

#### 【治療】

1) 一般治療：保持大便通暢，養成定時大便的習慣，多吃蔬菜，少吃辛辣刺激性食物。保持肛門部清結，鍛煉身體，注意休息。

#### 2) 中藥治療

(1) 內治：治宜清熱利濕，止血消痔。涼血地黃湯合槐角丸加減。

#### (2) 外治

熏洗法：五倍子湯，苦參湯以活血消腫，收斂止痛。

外敷法：清熱消腫止痛。常用藥物有消痔膏，黃連膏等。

塞藥法：消腫止痛止血。常用藥物有痔瘡寧栓，消痔錠，九貨栓，洗必泰痔瘡栓等。

#### 3) 手術療法

注射療法，結扎療法

## 二. 外痔

### 【治療】

#### 1) 結締組織性外痔

(1) 熏洗：五倍子湯合苦參湯熏洗

(2) 外敷：消痔膏，黃連膏外敷

(3) 手術療法

#### 2) 靜脈曲張性外痔

結締組織性外痔斗同治

#### 3) 血栓性外痔

(1) 內治：宜清熱涼血化瘀用涼血地黃湯加減

(2) 外治：用苦參湯熏洗

(3) 手術療法

#### 4) 炎性外痔



- (1) 內治：宜清熱利濕 解毒消腫 化痔丸
- (2) 外治：熏洗 用苦參湯 具體同血栓性外痔治療
- (3) 外敷 用消痔膏 黃連膏等

三. 混合痔

靜脈曲脹性混合痔, 結締組織性混合痔

- 痔痛, 贅竹主之.
- 痔, 會陰主之. 凡 痔與陰相通者, 死. 陰中諸病, 前後相引痛 不得大小便, 皆主之.
- 痔, 骨蝕, 商丘主之.
- 痔, 纂痛, 飛揚, 委中及扶承主之.
- 痔, 纂痛, 承筋主之.
- 脫肛, 下利, 氣衝主之.

19. 診療要鑑<sup>24)</sup>

<痔疾의 治法>

痔疾의 治法은 涼血과 清熱만 시키면 되지 만 漏의 治法은 始初에는 腸胃의 氣가 實하고 熱하므로 涼血 清熱 燥濕하여야 하니 涼血飲을 쓰고, 日久하면 腸胃의 氣가 虛하고 寒해지므로 瘡窺를 燥澁시키는 것과 殺菌 溫散을 乘行하여야 하니 蝟皮丸, 加味槐角丸을 쓰고, 氣血이 虛甚한 데는 加味十奇散으로 補氣 收斂해야 한다.

痔病의 通治藥：槐角元 加味槐角元 秦艽蒼朮湯 蝟皮丸 등을 쓴다.

痔疾의 禁忌：生冷硬物, 冷物, 酒, 濕, 麵, 五辣, 辛熱 및 薑, 桂之類. 痔疾로 腫痛하며 가려운 데는 威靈仙, 槐角을 細末하여 달인물에 먼저熏하고 洗滌하되 冷하면 交換한다.

洗痔方은 槐花, 荊芥, 枳殼, 艾葉 煎湯에 白礬을 조금넣어 先熏後洗한다.

20. 吳批 醫學心悟<sup>25)</sup>

<痔瘡>

方書有牝牡蠱血之異名, 而其實皆大腸經積熱所致. 大法, 宜用石菖蒲 忍冬藤煎水, 以瓦罐盛藥, 對痔薰透, 然後傾入盆中浸洗之. 冷即加水, 如此頻頻薰洗, 服加減六味丸及國勞散, 自然漸次消散, 可免刀針藥線之苦, 此亦醫痔之良法也.

21. 針灸甲乙經校釋<sup>26)</sup>

<足太陽脈動發下部痔脫肛第十二>

22. 中醫診斷學<sup>27)</sup>

<痔漏>

痔與漏爲見于肛門內外的兩種不同形狀的疾患. 凡肛門內外生有小肉突起爲痔. 孔竅内生管, 出水不止者爲漏; 生于肛門部的爲肛漏, 又名痔瘻.

<診斷要点>

痔漏據其形狀特征, 即可診斷.

1) 痔：古分爲七 …… 牡痔 …… 牝痔 …… 脈痔 …… 腸痔 …… 血痔 …… 酒痔 …… 氣痔. 現臨床分內痔和外痔兩種.

外痔：肛門前後方有皮下垂, 具有導物感, 肛門部濕潤及搔痒.

內痔：痔核小的不脫出肛外, 使時滴血或糞外帶血. 痔核增大, 即出血量增多, 使時脫出肛外, 使後自行收入肛門.

2) 漏：以流出膿水爲主症.

<鑒別診斷>

痔漏與脫肛, 肛周膿腫, 腸毒相鑒別. 脫肛爲直腸從肛門脫出; 肛周膿腫, 指肛門周圍感染毒邪, 欣紅腫痛, 重者化膿穿潰, 多發病急驟, 與痔漏不同. 腸毒 …… 肛門突腫 …… 初期腫痛, 紅色光亮, 毒聚熱灼肉腐者, 欣腫成膿, 潰破即溢膿.

23. 東醫處方大全(3)<sup>28)</sup>

<痔疾>

항문안팎에 작은 결절이 생기는 병증이다. 현대의학적으로는 같은 것인데 처정맥총의 정맥류성 확장을 말한다.

治方：秦艽蒼朮湯, 三神丸, 加味槐角丸, 寬腸

丸, 熊冰膏.

枯痔方 : 石雄黃, 乳黃, 白礬 가루내어 개어서 바른후 石膏, 五倍子로 씻어준다.

<痔漏>

항문 둘레의 안쪽에 하나 또는 몇 개의 구멍이 생겨 거기로부터 고름이 나오는 病證이다.

治方 : 槐角元, 涼血飲, 香殼丸,

秘傳神應膏 : 龍腦, 血竭, 乳香, 牛黃, 沒藥을 各等分하여 가루를 내고 膏藥을 만들어 痔漏구멍에 밀어 넣는다.

### IV. 總括 및 考察

肛門直腸疾患은 痔, 肛裂, 肛瘻, 肛門直腸 周圍膿瘍, 脫肛, 直腸息肉, 肛門直腸癌, 肛門直腸의 先天畸形 등을 包含하며 韓醫學에서는 痔, 痔漏라고 表現하였다<sup>1,3)</sup>. 《古今醫統》<sup>9)</sup>에서는 “初生肛門生成正不破者爲痔, 久而破潰膿血黃水浸淫淋瀝不止者曰漏”라 하였고, 歷代醫家들은 痔는 肛門周圍에 小肉突起가 있는 것, 漏는 오랫동안 治療되지 않고 穿穴이 생겨 崩潰된 것으로 痔를 痔瘡, 漏를 漏瘡이라고 言及하였다<sup>7,10-15)</sup>

韓醫學에서 痔와 關係되는 內容으로는 <<黃帝內經 素問>> <<生氣通天論>><sup>5)</sup>에 “因而飽食, 筋脈橫解, 腸澀爲痔”라고 最初로 記錄되었으며, <<神農本草經>><sup>6)</sup>에서는 五痔, 腸痔, 疽痔, 瘡痔, 瘻痔 등의 病名이 提出되었다.

歷代醫家들은 痔漏의 原因으로 傷風, 勞傷經絡, 房室不節, 醉飽合陰陽, 坐中寒濕, 酒色過度, 飽食, 嗜好食, 七情 등으로 發生하며 出血, 脫出, 便秘를 主要 症狀으로 言及하였다<sup>5,7,9,15 21)</sup>. 現代醫學에서는 이를 痔疾, 痔核, 痔漏로 區分하여 說明하고 있는데 痔疾은 肛門管內의 粘膜下層에 血管, 平滑筋, 彈力 및 結合組織을 含有

한 排便衝擊緩和組織이지만 지주조직의 變性으로 粘膜下層의 分離性 腫塊를 이루어 肛門管內層에서 下向 移動되며 대개 反復되는 出血이나 脫肛의 症勢을 보여준다<sup>1,3,4)</sup>. 痔核은 대개 內痔核과 外痔核으로 區分하는데 內痔核은 上痔靜脈 終末枝의 擴張으로 이행성 상피와 원주 상피에 덮여 있으며, 外痔核은 下痔靜脈 終末枝의 擴張으로 편평상피에 덮여 있으나 이 兩者는 흔히 痔上線을 지나 서로 疏通되기도 한다. 痔漏는 肉芽組織으로 된 纖維性管으로 肛門管이나 直腸에 內孔이 있고 肛門周圍 皮膚에 1개 또는 그 이상의 外孔이 있는 것을 말한다<sup>1-4)</sup>.

痔疾, 痔漏의 治療에 대하여 살펴보면 <<內經>><sup>5)</sup>에서는 痔疾의 原因을 飽食으로 규정하였고, 巢<sup>7)</sup>는 痔를 牝痔, 牡痔, 脈痔, 腸痔, 血痔, 酒痔, 氣痔 등으로 分類하고 傷風, 勞傷經絡, 房室不節, 醉飽合陰陽 등으로 발생한다고 하였다. 孫<sup>8)</sup>은 巢<sup>8)</sup>의 說을 따라 痔를 分類하면서 槐子丸, 槐實丸, 蝟皮丸, 外痔方, 穀道通方 등 具體的인 處方을 提示하고 禁할 것은 寒冷食, 豬肉, 生魚菜, 房室 등을 強調하였다. 王<sup>17)</sup>은 牝痔, 脈痔 대신 酒痔, 氣痔를 添加하여 五痔로 區分하였는데 坐中寒濕, 房室失節, 醉飽入房 등을 原因으로 提示하면서 處方으로는 廣濟療五痔方, 蝟皮散, 紫蓼丸, 挑葉蒸痔方, 千金五痔方 등을 使用하였다.

<<針灸甲乙經>><sup>26)</sup>에서는 足太陽脈動하여 痔가 發生한다고 보고 贊竹, 會陰, 商丘, 飛陽, 委中, 扶承, 承筋, 氣衝 등 具體的인 治療穴을 제시하였는데 “痔與陰相通者, 死”라 하였다.

金元時代에는 金元四大家을 中心으로 臟腑辯證에 대하여 活潑히 研究되면서 痔瘻의 治療原則과 治療藥物에 대해서도 많은 研究가 進行되었다. 朱<sup>23)</sup>는 痔漏의 治療에 대하여 涼血을 爲主로 治療해야 한다고 하였는데 痔瘻에는 先服補藥하여 生氣血해야 한다고 하여 治療藥物

로 條芩, 人蔘, 黃連, 生地, 枳殼, 芎歸, 升麻 등을 提示하였다. 또한 外用으로는 五倍子, 朴硝, 桑寄生 등을 使用하여 煎洗하는 方法과 五倍子末을 使用하여 敷하는 治療方法을 活用하였다.

劉<sup>10)</sup>는 肺와 大腸의 表裏關係를 言及하면서 陽氣가 虛한 狀態에서 玄府에 風邪가 侵犯하여 熱을 發生하거나 腸에 濕熱邪가 侵犯하면 腸風痔가 發生한다고 하여 經絡과의 關係에서 痔를 說明하였고 處方으로는 香殼丸, 烏荊丸, 黃耆葛花丸, 黃連散, 乳香沒藥散, 木香厚朴湯 등을 使用하였다.

李<sup>15)</sup>는 牝痔, 牡痔, 氣痔, 血痔, 酒痔 등 五痔로 區分하였고 原因으로는 濕, 熱, 風, 燥 등을 言及하였는데 이는 六淫之邪가 아니고 房室過道, 久嗜肥甘不慎, 醉飽合陰陽, 勞傷血脈 등으로 發生한 것이라고 하였다. 治療는 苦寒瀉火, 辛溫和血潤燥, 疏風止痛하는 治法으로 秦芫白朮丸, 秦芫蒼朮湯, 秦芫防風湯, 秦芫羌活湯 등을 使用하였고 酒, 麵, 辛熱房室, 嗜欲腐潰膿血 등을 忌하라고 하였다.

張<sup>10)</sup>은 痔가 오래되어도 治療되지 않으면 漏가 된다고 하면서 通利腸胃, 治濕하는 治法을 提示하고 導水丸, 禹功散, 枳殼丸, 木香檳榔丸 등을 使用하였다.

明代 樓<sup>21)</sup>는 李<sup>15)</sup>와 朱<sup>13)</sup>의 治法, 治方을 따랐으며 天仙子, 荊芥穗, 蔓荊子 등을 使用하여 煎湯洗하는 淋洗法을 使用하였다. 陳<sup>18)</sup>은 痔을 처음으로 內痔와 外痔로 區分하여 言及하였는데 原因으로는 積濕熱, 久坐而血脈不行, 七情而過傷生冷, 酒色過度 등을 말하였고 出血, 便秘, 疼痛 등에 따라 潤燥及滋陰, 清火滲濕, 涼血去風, 疎利濕熱, 健脾, 升舉中氣, 涼血健脾하는 具體的인 治療原則을 提示하였다. 處方으로는 防風秦芫湯, 提肛散, 加味四君子湯, 當歸郁李仁湯, 芎歸湯, 三黃二地湯, 洗痔枳殼湯, 五倍子散 등을 使用하였다. 또한 內痔는 通利藥으로 湯滌臟腑後에 喚痔散으로 치료하고, 外痔는 消毒散

으로 煎洗한 후 枯痔散을 使用하라고 하였다.

徐<sup>9)</sup>는 巢<sup>7,13,15)</sup>등의 原因과 治法을 따랐고 處方으로 秦芫蒼朮湯, 秦芫當歸湯, 秦芫羌活湯, 紅花桃仁湯, 清心丸, 清冷飲 등 內服藥을 주로 使用하였으며 灸法으로는 命門과 長強을 提示하였다. 虞<sup>20)</sup>는 <<內經>><sup>5)</sup>의 說을 따라 脾胃와 肺, 大腸 그리고 肝과의 臟腑生理 側面에서 痔를 說明하였는데 그 治療法으로는 苦寒瀉火하는 黃芩 黃連 梔子 槐花, 辛溫和血하는 川芎 當歸 桃仁, 燥熱佛郁하는 大黃 枳殼 麻仁 등의 藥物을 使用하였다.

明代以後 許<sup>12)</sup>는 腸痔, 脈痔, 氣痔, 血痔, 酒痔 등은 內痔로 牝痔, 牡痔, 癭痔는 外痔로 區分하였고, 周<sup>19)</sup>는 點之洗之하는 外治法과 去風除濕清熱解毒하고 初卽涼血燥濕, 久卽澀斂殺蟲兼以溫散하는 內治法을 使用하였고 五痔에 따른 各各에 處方을 提示하였다.

最近에 出刊된 文獻<sup>2-4,22-23,27-28)</sup>에서는 內痔와 外痔로 나누어 內痔는 血絡受傷, 濕熱下注, 氣血兩虛, 腸燥便秘로 나누어 辨證施治 하였는데 血絡受傷에는 清熱涼血을, 濕熱下注에는 清熱解毒 祛風除濕을, 腸燥便秘에는 泄熱通腑 潤腸通便을 爲主였다. 또한 外痔는 下焦濕熱, 血熱瘀阻로 나누어 下焦濕熱에는 清熱除濕 活血散瘀를, 血熱瘀阻에는 清熱涼血散瘀를 爲主로 辨證施治 하였다.

痔疾의 治療에 있어서는 補中益氣, 清熱涼血, 活血祛瘀, 苦寒瀉火, 涼血燥濕, 祛風燥濕, 疏風止痛하는 治療法을 爲主로 槐子丸, 蝟皮丸, 廣濟五痔方, 秦芫當歸湯, 芎歸湯, 秦芫蒼朮湯, 秦芫防風湯, 五倍子湯, 木香檳榔丸 등을 多用하였고<sup>9,10,12-16,18,20-24)</sup>, 外治法으로는 煎洗法, 外敷法, 塞藥法, 枯痔法 등이 使用되었는데, 煎洗法에는 洗痔枳殼湯, 洗痔腫痛方, 茄柯湯, 側柏葉湯, 七物湯, 洗痔漏神方 등이 言及되었고, 外敷法으로는 熊膽膏, 水銀棗子膏, 豬膽膏, 拔毒散, 田疔膏, 蜈蚣油, 熊水膏, 痔藥膏子, 蝸牛散, 消痔膏,

黃連膏 등이고, 寒藥法에는 九貨栓, 消痔錠, 洗必泰痔瘡栓 등이 言及되었으며<sup>8-13,15,18-23,25)</sup> 現代醫學에서는 注射療法, 結扎療法 등 주로 外科의인 治療에 重點을 두었다.

複雜한 現代社會에서는 生活環境, 嗜好食, 環境汚染 등 不內外因의 要因도 痔, 漏의 發生에 重要한 要因이 되고 있어 이에 대한 韓醫學의인 治療方法에 대한 研究가 必要하다고 思慮된다.

表1. 原因別 分類

原 因	引用文獻番號	備考
傷 風	7. 8.	
勞傷經絡	7. 15. 16.	
房室不節	7. 8. 17. 18.	
醉飽合陰陽	7. 9. 15. 17.	
座中寒濕	17. 18.	
酒色過度	15. 16. 19.	
飽 食	5. 9. 10. 15. 18. 20. 21.	
嗜 好 食	15. 19.	
七 情	9. 18.	
濕熱風燥	8. 10.	

表2. 治法別 分類

治 法	引用文獻番號	備考
補中益氣	10. 13. 16. 18. 22.	
清熱涼血	9. 10. 12. 13. 16. 18. 21. 22. 23.	
活血祛瘀	15. 20. 22. 23.	
苦寒瀉火	10. 20. 23.	
涼血燥濕	10. 14. 16. 18. 23. 24.	
祛風燥濕	14. 15.	
疏風止痛	9. 10. 15.	

表3. 治方別 分類

治 方	引用文獻番號	備考
蒼朮澤瀉丸	21.	
秦艽白朮湯	10. 20. 21.	
槐 子 丸	8. 9. 10. 12. 22. 24. 28.	
桐 皮 丸	8. 10. 17. 24. 28.	
廣濟五痔丸	17.	
秦艽當歸湯	9. 20.	
芍 歸 湯	9. 10. 18.	
秦艽蒼朮湯	9. 10. 12. 18. 19. 20. 24.	
秦艽防風湯	10. 18. 21. 22.	
五倍子 湯	10. 12. 18. 22. 23.	
木香檳榔丸	10. 14.	
千金療五痔方	17.	
紫 蓼 丸	17.	
當歸郁李仁湯	10. 18. 20. 21.	
洗痔枳殼湯	18. 22.	
加味四君子湯	18. 22.	
秦艽羌活湯	9. 10. 20. 21.	
紅花桃仁湯	9. 10. 20. 22.	
橘 皮 湯	9. 10.	
寬 腸 丸	9. 10.	
潤 腸 丸	22.	
秘使神應膏	28.	
釣 腸 丸	11. 14.	
黃芪葛花丸	10.	
黃 連 散	10.	
乳香沒藥散	10.	
乾 葛 湯	10. 12.	
豬 腎 丸	10.	
涼血地黃湯	22. 23.	
活血散瘀湯	22.	
活 血 膏	22.	
洗痔腫痛方	10. 22.	
五 痔 散	8. 12.	
消 痔 膏	23.	
當歸連翹湯	11.	

表4. 外治法別 分類

外治法	引用文獻番號	備考
熏洗法	9. 10. 11. 13. 15. 18. 19. 21. 22. 23. 27. 28.	
外敷法	9. 11. 12. 13. 15. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 25. 27.	
塞藥法	9. 22. 23.	
枯痔法	9. 15. 18. 21. 22. 23.	

## V. 結 論

痔疾, 痔瘻에 對한 治療 中心으로 諸 文獻을 考察한 結果 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 治法으로 重要視되는 것은 補中益氣, 清熱涼血, 活血祛瘀, 苦寒瀉火, 涼血燥濕, 疏風止痛 등이 있으며 痔病에는 治血爲主로 清熱涼血, 涼血生血, 活血祛瘀하며 漏病에는 補血한 후 清熱涼血하는 方法을 使用하였다.

2. 處方으로는 槐子丸, 蛻皮丸, 廣濟五痔方, 秦艽當歸湯, 芎歸湯, 秦艽蒼朮湯, 秦艽防風湯, 五倍子湯, 木香檳榔丸 등이 多用되었다.

3. 藥物은 條金, 人參, 生地黃, 枳殼, 黃金, 黃連, 梔子, 麻仁, 秦艽, 木香, 大黃, 등이 多用되었다.

4. 禁忌할 것으로는 寒冷食, 豬肉, 生魚菜, 房室, 酒, 麵, 醋 등이 있다.

5. 外治法으로는 熏洗法(五倍子湯, 洗痔枳角湯, 洗痔腫痛方, 茄柯湯, 側柏葉湯, 七物湯, 洗痔漏神方, 苦參湯), 外敷法(熊膽膏, 水銀棗子膏,

豬膽膏, 拔毒散, 田疔膏, 蜈蚣油, 熊水膏, 痔藥膏子, 蝸牛散, 消痔膏, 黃連膏), 塞藥法(九貨栓, 消痔錠, 洗必泰痔瘡栓, 痔瘡疔栓), 枯痔法 등이 使用되었고, 最近에는 注射療法, 結紮療法 등 手術療法이 活用되고 있다.

## 參考文獻

1. 洪性國, 朴在甲 : 대장항문학, 서울, 一潮閣, pp.2-25, pp.63-110, 1991.
2. 顧伯華 : 實用中醫外科學, 上海, 上海科學技術出版社, pp.314-331, 1985.
3. 顧伯康 : 中醫外科學, 北京, 人民衛生出版社, pp.327-344, 1987.
4. 吳存亮 : 中醫痔瘻病學, 河南, 河南科學技術出版社, pp.27-58, 147-185, 1993.
5. 洪元植 譯 : 精交黃帝內經素問, 서울, 東洋醫學研究院, p.17, p.209, p.297, p.298, 1986.
6. 吳普 : 神農本草經, 서울, 醫道韓國社, 卷6, pp.8-10, 1976.
7. 南京中醫學院 : 諸病源侯論校釋, 南京, 人民衛生出版社, pp.953-956, p.1126, 1982.
8. 孫思邈 : 秘急千金療方, 北京, 人民衛生出版社, pp.421-423, 1982.
9. 徐春甫 : 古今醫統大全, 北京, 人民衛生出版社, pp.440-459, 1991.
10. 周喜民 : 金元四大家醫學全書, 天津, 天津科學技術出版社, pp.96-97, 646-648, 1159-1161, 1994.
11. 龔廷賢 : 增補萬病回春, 서울, 一中社, pp.252-259, 1991.
12. 許俊 : 原本 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, pp.320-328, 1991.
13. 朱震亨 : 丹溪治法心要, 山東, 山東科學技術出版社, pp.123-125, 1985.

14. 張子和：儒門事親提要，臺北，旋風出版社，pp.12-13, 1978.
15. 李東垣：東垣十種醫書，臺北，五洲出版社，pp.216-219, p.573, 1984.
16. 劉道清，周一謀：中醫名言大辭典(上·下)，서울，一中社，pp.1431-1432, 1992.
17. 王 燾：外臺秘要，臺北，國立中國醫藥研究所，pp.700-705, 1964.
18. 陳實功：外科正宗，北京，人民衛生出版社，pp.169-178, 1983.
19. 周命新：醫門寶鑒，서울，一中社，pp.308-311, 1991.
20. 虞 搏：醫學正傳，서울，成輔社，pp.255-258, 1986.
21. 樓 英：醫學綱目，서울，一中社，pp.1184-1192, 1984.
22. 許芝銀，史慕山：外科病實用方，江蘇，江蘇科學技術出版社，pp.247-255, 1993.
23. 馬紹堯：中醫外科(臨床袖珍手冊)，上海，上海醫科大學出版社，pp.45-55, 1994.
24. 金定齋：東洋醫學 診療要鑑，서울，pp.443-445, 1991.
25. 程國彭：吳批 醫學心悟，臺北，旋風出版社，p.225, 1970.
26. 山東中醫學院：針灸甲乙經校釋，北京，人民衛生出版社，pp.1218-1219, 1980.
27. 鄧鐵濤：中醫診斷學，北京，人民衛生出版社，p.598, 1987.
28. 李順東：東醫處方大全(3)，서울，驪江出版社，pp.1695-1702, 1993.
29. 申天浩：問答式 오관외과학，서울，pp.453-457, 1992.