

瓜蔞仁劑의 藥物 配合에 따른 效能의 變化

노영범*

I. 緒論

瓜蔞仁은 味는 苦하고 性은 寒하며 效能은 淸肺化痰, 利氣寬胸, 滑腸通便 및 潤燥降火로 기재되어 있다.¹⁰⁾

現代的 意味로 해석하면 消炎性 鎮咳, 祛痰, 潤燥性 利咽喉, 胸膈의 痰과 水分을 대사시키고, 滋潤性 通大便작용도 하며 排膿작용도 겸하는 것으로 표현할 수 있다.⁹⁾¹⁰⁾

瓜蔞仁의 藥物配合은 得貝母하면 鎮咳, 得枳實하면 通便, 得半夏하면 寬胸消痰, 得枳實하면 消痰開結, 得薤白하면 治胸痺, 得蒲公英하면 解毒散結, 得天花粉하면 開胸散結로 다양하게 效能이 나타나는 것으로 기술하고 있다.¹⁰⁾

불기는⁹⁾ 韓藥은 한가지 藥物 속에는 여러 가지 性分이 있는데 微量의 性分이 다른 藥物속의 같은 작용의 性分을 만나면 그 效能이 증대되어 나타난다고 주장했다. 이것이 共力作用이다. 日本에서는 藥效의 方向轉換說이라고 했다.

韓藥의 한가지 藥物의 다양한 性分이 다른 藥物과 어떻게 配合하느냐에 따라서 藥物은 적절하게 활용할 수 있다.

瓜蔞仁이 配合된 後世方, 古方, 四象方의 많은 經驗處方들을 발췌 分析하여 本草學의 效能의 불확실성을 간파할 뿐만 아니라 方劑學의 특징인 藥物配合의 原理를 파악하고자 하였다.

II. 本論

處方1

小調中湯(東醫寶鑑)

瓜蔞仁	
黃連	
半夏薑製	
甘草	4g

[主治應用] 治一切痰火 及百般諸病 先調脾胃
[瓜蔞仁] 黃連, 半夏 등과 配合하여 胃部位의 消炎과 祛痰作用을 한다.

處方2

小陷胸湯(傷寒論)	
黃連	4g
瓜蔞仁	1g
半夏	0.5g

[主治應用] 小結胸病 正在心下 按之即痛 脈浮滑者 小陷胸湯主之
[瓜蔞仁] 黃連 半夏 등과 配合되어 胸部의 消炎 및 祛痰作用을 한다.

處方3

活血潤燥生津飲(醫學入門)	
瓜蔞仁	
當歸	
甘草	
麥門冬	
五味子	
熟地黃	
天門冬	

*부천한의원원장, 한의학박사

生地黃		黃芩	
麻子仁		石膏	
天花粉 4g		桔梗	4g
		枳殼	3.2g
[主治應用]通治消渴	甘草 1.2g		
[瓜萎仁]天花粉, 麥門冬, 天門冬 등과 配合하여 滋潤性 止渴作用을 한다.	[主治應用]治熱嗽 能瀉肺胃之火 火降即 痰消嗽 止		
處方4	[瓜萎仁]杏仁, 半夏, 前胡, 貝母 등과 配合하여 消炎性 祛痰鎮咳作用을 한다.		
生血潤膚湯(醫學正傳)			
天門冬	4.5g	處方6	
生地黃	3g	二母寧嗽湯(東醫寶鑑)	
熟地黃		石膏	8g
麥門冬		貝母	
當歸		知母	6g
黃芪	3g	梔子	
黃芩		黃芩	5g
瓜萎仁		桑白皮	
桃仁	1.5g	赤茯苓	
升麻	0.6g	瓜萎仁	
紅花	0.3g	陳皮	4g
[主治應用]燥證으로 피부가 벌어지고 손톱가 발 톱이 枯燥하며 긁으면 비듬이 일어나고 피가 나 며 아플 때		枳實	3g
[瓜萎仁]天門冬, 麥門冬 등과 配合하여 皮膚滋潤 作用을 한다.		生甘草	1g
處方5		五味子	10粒
清金降火湯(醫宗金鑑)		生薑	3片
陳皮		[主治應用]飲食이 傷해서 胃의 火가 上炎하여 肺氣를 衝迫하고 痰嗽가 오래 그치지 않는데 한 번 먹으면 곧 낫는다.	
杏仁	6g	[瓜萎仁]貝母, 黃芩, 桑白皮 등과 配合하여 鎮咳 祛痰作用을 한다.	
半夏薑製		處方7	
前胡		瓜萎薤白半夏湯(金匱要略)	
茯苓		瓜萎	300g
貝母		薤白	120g
瓜萎仁			

瓜萎仁	1杖	青皮
白酒	1斗	杏仁 3g
		甘草 2g
[主治應用]胸痺 不得臥 心痛激背者 瓜萎薤白半夏湯主之		生薑 3片
[瓜萎仁]半夏, 薤白 등과 配合되어 胸部의 消炎 및 祛痰作用으로 治胸痺한다.		[主治應用]痰熱이 盛하여 胸痺하고 腸痛하는 症을 다스린다.
處方8		[瓜萎仁]柴胡, 青皮등과 配合하여 祛痰作用으로 胸痺腸痛을 다스린다.

瓜萎枳實湯(方藥合編)

瓜萎仁

枳實	
桔梗	
赤茯苓	
貝母炒	
陳皮	
片芩	
梔子 4g	
當歸	
縮砂	
木香	
甘草 2g	
生薑 3片	

[主治應用]痰이 맷혀서 胸滿하고 氣急한 것을 다스린다.

[瓜萎仁]桔梗, 枳實, 貝母 등과 配合하여 消炎性祛痰作用으로 胸痺症을 다스린다.

處方9

柴梗半夏湯(方藥合編)

柴胡	8g
瓜萎仁	
半夏	
黃芩	
枳殼	
桔梗 4g	

處方10

導痰湯(壽世保元)

白茯苓	
瓜萎仁 11g	
陳皮	
半夏薑製	
香附	
青皮	
黃芩炒	
黃連薑炒 8g	
白朮 4g	
砂仁	
甘草 3g	
生薑 煎服	

[主治應用]噫氣聲聞於外, 因氣 胸膈悶, 有痰, 舌黑乃痰之症也

[瓜萎仁]青皮, 半夏, 黃芩등과 配合하여 消炎 祛痰作用으로 利咽喉를 돋는다.

處方11

瓜萎枳殼湯(東醫寶鑑)

瓜萎仁	
枳殼	
桔梗	
川芎	
蒼朮	

香附子		天花粉
杏仁		金銀花
片芩酒炒		皂角刺
貝母炒		穿山甲土炒
陳皮	4g	當歸尾
縮砂		瓜蔞仁
木香	2g	甘草節
生薑	3片	4g
[主治應用]治痰鬱		
[瓜蔞仁]桔梗, 枳殼 등과 配合하여 消炎 및 祛痰 作用으로 胸痺症을 다스린다.		
[主 治 應 用] 乳癰으로 젖이 딴딴하게 붓고 아픈 증을 다스린다.		
[瓜蔞仁]貝母, 皂角刺, 穿山甲 등과 配合하여 排 膿作用도 한다.		

處方12

桔梗湯(東醫寶鑑)

桔梗	
貝母	5g
瓜蔞仁	
薏苡仁	
當歸	4g
桑白皮	
枳殼	
黃芪	
防風	3g
杏仁	
百合	
甘草	2g
生薑	5片

[主治應用]小陰에 寒이 客侵하고 咽痛한데 쓴다.
[瓜蔞仁]桔梗, 貝母, 薏苡仁 등과 配合하여 排膿
作用을 한다.

處方13

加味芷貝散(方藥合編)

白芷

貝母

天花粉		
金銀花		
皂角刺		
穿山甲土炒		
當歸尾		
瓜蔞仁		
甘草節	4g	
[主治應用]腸癰에 脈이 더디고 緊한 痘은 肿이 되지 않는 것이니 내려야 한다.		
[瓜蔞仁]大黃, 牡丹皮 등과 配合하여 排膿作用도 한다.		

處方14

大黃牧丹皮湯(東醫寶鑑)

大黃		
芒硝	6g	
牡丹皮		
桃仁		
瓜蔞仁	10g	

[主治應用]腸癰에 脈이 더디고 緊한 痘은 肿이
되지 않는 것이니 내려야 한다.

[瓜蔞仁]大黃, 牡丹皮 등과 配合하여 排膿作用도
한다.

處方15

導赤降氣湯(四象新編)

生地黃	12g	
木通	8g	
瓜蔞仁		
玄蔘	6g	
荊芥		

獨活

羌活

澤瀉

防風

前胡
茯苓 4g

[主治應用] 少陽人의 傷寒結胸, 氣痰, 莖中痒痛, 頭痛, 乳癰, 臂痛, 足病, 小兒夜啼, 가슴앓이 등 [瓜蒌仁] 前胡 등과 配合하여 消炎性 祛痰鎮咳 및 利咽喉, 通大便作用을 한다.

5. <桔梗湯>^{처방12)} <加味芷貝散>^{처방13)} <大黃牧丹皮湯>^{처방14)}에서 桔梗, 貝母, 薏苡仁 등과 配合하여 排膿作用도 한다.
6. <導赤降氣湯>^{처방15)}에서 生地黃과 配合하여 胸腹部의 消炎, 前胡와 配合하여 氣管支 部位의 消炎 鎮咳 祛痰, 玄蔴과 配合하여 利咽喉, 木通과 配合하여 胸痺症과 通大便 作用을 兼하고 있다.

III. 結 論

參 考 文 獻

1. <小調中湯>^{처방1)} <小陷胸湯>^{처방2)}에서 黃連, 半夏등과 配合하여 胸, 腹部의 消炎 및 祛痰作用을 한다.
2. <活血潤燥生津飲>^{처방3)} <生血潤膚湯>^{처방4)}에서 麥門冬, 天門冬, 天花粉등과 配合하여 滋潤性 止渴 및 滑腸通便作用을 한다.
3. <清金降火湯>^{처방5)} <二母寧嗽湯>^{처방6)}에서 黃芩, 杏仁, 前胡 등과 配合하여 氣管支部位의 消炎作用으로 鎮咳祛痰作用을 한다.
4. <瓜萎薤白半夏湯>^{처방7)} <瓜萎枳實湯>^{처방8)} <柴梗半夏湯>^{처방9)} <導痰湯>^{처방10)} <瓜萎枳殼湯>^{처방11)}에서 枳實, 枳殼, 薤白, 桔梗 등과 配合하여 胸部位의 消炎 및 祛痰作用으로 胸痺症을 다스린다.
1. 東醫寶鑑
2. 醫學入門
3. 醫宗金鑑
4. 傷寒論
5. 四象新編
6. 醫學入門
7. 醫學正傳
8. 方藥合編
9. 바른 方劑學
10. 臨床配合本草學
11. 金匱要略