

혼합 인산염의 첨가가 어류 연육의 기능적 성질에 미치는 영향

우상규

한양대학교 식품영양학과

Effects of Phosphate Complex on the Functional Properties of Fish Meat Paste

Sang-Kyu Woo

Dept. of Food and Nutrition, Hanyang university

Abstract

Effects of four kinds of phosphate complex on the water holding capacity(W.H.C) and protein solubility of yellow-corvenia(*Pseudosciance manchurica*) and hair tail(*Trichurus lepturus*) meat paste were investigated. The formulations of four kinds of phosphate complex employed to this experiment were made by mixing several phosphates such as sodium polyphosphate, sodium pyro-phosphate, sodium acid pyro-phosphate, potassium pyro-phosphate, sodium tetra meta-phosphate, sodium ultra meta-phosphate and sodium hexa meta-phosphate, and monoglyceride at different mixture ratios. Among the four kinds of phosphate complex, phosphate B complex which was formulated by mixing sodium poly-phosphate 50%, sodium pyro-phosphate 20%, sodium tetra meta-phosphate 20%, sodium acid pyrophosphate 5% and sodium ultra meta-phosphate 5% was most effective on enhancing the W.H.C and protein solubility of yellow corvenia meat paste, and in case of hair tail meat paste, phosphate C complex which was formulated by mixing sodium poly-phosphate 40%, sodium pyro-phosphate 30%, potassium pyro-phosphate 15%, sodium tetra meta-phosphate 10%, and sodium hexa meta-phosphate 5% was more effective than other phosphate complex, and their optimum addition level was 0.4% respectively in weight of fish meat paste. Texture characteristics such as hardness, cohesiveness, and springiness value of Kamaboko(fish meat paste product) were evaluated as best when 0.3% of phosphate B complex was added. The optimum cooking condition of Kamaboko to get good texture was heating for 45 mimutes at 85°C.

Key words : fish meat paste, phosphate complex, functional properties.

서 론

어육연제품의 품질은 독특한 조직에 의해서 결정되며 이러한 조직은 어종, 선도상태, 인산염 및 식염 등 부재료의 첨가수준과 가열조건에 따라 다양하게 형성된다^{1~3)}. 특히 인산염은 식염과 같이 혼합하여 작용하게 되면 단백질의 용출성을 증대시킬 뿐만 아니라, 연육의 보수력 및 연제품의 결착력 증대와 색택의 안정화 그리고 품질변화 억제효과가 있기 때문에 많이 사용하고 있다⁴⁾. 인산염의 첨가가 연제품의 탄력을 증진시키는 효과

는 있으나 어종, 선도상태 및 동결처리 등의 조건에 따라 그 효과는 다르게 나타난다고 알려져 있으며⁵⁾, 연제품의 생산량이 점차로 증가⁶⁾함에 따라 여러 가지 원료의 사용과 각 어종별로 육단백질 기능성이 각기 다르기 때문에 현재의 복합 인산염의 종류 및 첨가수준별로 연제품 원료용 연육의 보수력 및 단백질의 용출설 등 연육의 기능적 성질과 가열온도에 따른 어묵제품의 물리적인 성질을 조사함으로써 인산염의 첨가가 연제품의 품질에 미치는 영향에 관하여 실험하였다.

재료 및 방법

1. 재료

1) 원료어

서해안 지역에서 어획된 신선한 조기(*Pseudoscincus manchurica*)와 갈치(*Trichiurus lepturus*)를 1996년 10월 20일 가락동 농수산물 도매시장에서 구입 운반하고 채육한 후에 연육 가공을 위한 원료로 하였다.

2) 인산염의 종류 및 첨가수준

연육 및 가열후 어묵 제품의 인산염의 첨가효과를 검토하기 위하여 사용한 시판 복합인산염의 종류 및 그 배합조성을 Table 1에 나타내었다. 그리고, 원료육 중량에 대하여 0.2%, 0.4%, 및 0.6%로 각각 첨가하여 다음의 방법에 따라 연육을 만들었다.

2. 연육 및 어묵의 제조

1) 연육의 제조

조기와 갈치의 육을 채육하여 수세한 후, 수분함량이 85% 정도 되게 탈수하고 인산염을 종류와 농도별로 첨가하였다. 다음 5분간 고기갈이 하고 시료중량의 2.5%에 해당하는 식염을 첨가한 후에 10분간 고기갈이 하여

Table 1. Composition of phosphate complex

Sample	Mixed ratio of phosphate
A	Control (Phosphate was not added)
	Sodium poly-phosphate 50%
	Sodium pyro-phosphate 20%
B	Sodium tetra meta-phosphate 20%
	Sodium acid pyro-phosphate 5%
	Sodium ultra meta-phosphate 5%
	Sodium poly-phosphate 40%
	Sodium pyro-phosphate 30%
C	Potassium pyro-phosphate 15%
	Sodium tetra meta-phosphate 10%
	Sodium hexa meta-phosphate 5%
D	Sodium poly-phosphate 50%
	Sodium pyro-phosphate 50%
	Sodium poly-phosphate 35%
	Sodium pyro-phosphate 20%
E	Potassium pyro-phosphate 20%
	Sodium hexa meta-phosphate 10%
	Monoglyceride 10%
	Sodium tetra meta-phosphate 5%

연육을 제조하였다.

2) 어묵의 제조

수세 탈수한 조기육에 인산염을 원료육 중량의 0.4% 수준으로 첨가하여 1차 고기갈이 한 후에 다시 식염을 2.5% 가하여 10℃ 이하에서 15분간 2차 고기갈이 하였다. 이렇게 만든 연육에 전분 7%, M.S.G. 0.5%, 솔비톨 2.5%를 첨가하여 혼합한 후 직경 3.0cm로 성형한 다음 40℃에서 1시간 정치하여 열처리 조건별로 각각 가열하여 어묵을 만들었다.

3. 분석방법

1) 화학적 분석

일반성분의 분석은 A.O.A.C법⁷⁾으로, V.B.N.(회발성 염기태 질소)은 미량확산법⁸⁾으로, 염용성 단백질의 양은 新井⁹⁾의 방법에 따라 측정하였다.

2) 물리적 성질의 측정

연육의 보수력 및 -숙시의 유출은 Saio¹⁰⁾의 방법에 따라 Fig. 1과 같은 원심관을 사용하여 1,500rpm에서 분리되는 수분량을 조사하여 측정하였고, 연육의 백색도(L치)는 색차계(Yasuda Seikiki사 Model uc600)로써 측정하였다. 가열처리 후 어묵 제품의 texture는 texturometer(Instron Model 1140)를 이용하여 hardness는 plunger가 표면을 눌러 파단할 때까지의 압력을 kg으로 표시하였고 cohesiveness는 plunger로 두 번 눌렀을 때 형성되는 first bite와 2nd bite의 면적비로 나타냈으며 springiness는 2nd bite의 변형 초기에서 최대 peak에 이르는 데 소요되는 수평적 거리를 상대적으로 표시한 것이다. 그 측정조건은 Table 2와 같다.




Fig. 1. Apparatus for measurement of water holding capacity and cooked drip.

Table 2. Measurement condition of puncture test for Kamaboko

- Sample diameter : 3.0cm.
- Sample height : 3.0cm.
- Cross head speed : 100mm/min.
- Chart speed : 200mm/min.
- Probe diameter : 1.13cm.
- Clearance : 6mm

결과 및 고찰

1. 연육의 보수력에 미치는 영향

조기와 갈치육을 원료로 하여 4종 인산염의 첨가수준에 따른 연육의 기능적 성질을 분석하기 위하여 사용한 원료 어육의 이화학적인 성상은 Table 3과 같다.

Fig. 2와 Fig. 3은 동일한 가공조건에서 4종의 복합 인산염의 첨가 수준별로 가공한 갈치 및 조기 연육의 보수력 변화를 나타낸 것이다. 그림에서 나타난 바와 같이 인산염을 첨가하지 않은 대조구인 A를 기준으로 해서 보면 전반적인 경향은 인산염을 첨가한 연육이 인산염을 첨가하지 않은 것보다 보수력이 높게 나타났고 첨가 수준이 증가함에 따라 보수력도 점차 증가하다가 0.6% 첨가수준에서는 오히려 0.2%나 0.4% 첨가수준보다 감소하는 경향을 보였다. 이러한 원인으로써는 가수량이 일정한 상태에서 인산염의 첨가량이 일정량 이상이 되면 이온강도에 의한 영향을 더욱 많이 받게 되어 0.6%를 첨가했을 경우 어육의 단백질 구조가 sol 상태로 됨에 따라 더욱 loose 하게 되어 보수력을 측정 할 때 가열처리와 원심력에 의해서 다른 첨가수준보다 drip이 많이 유출된 것으로 추정된다. 한편 두 원료어육 공히 0.4% 첨가수준에서 가장 높은 보수력의 증가 현상을 보였고, 조기연육의 경우는 B 인산염이 갈치연육에 있어서는 C 인산염이 가장 효과적이었다.

Table 3. Physico-chemical characteristics of raw fish meat

Item	Yellow-corvenia	Hair tail
Moisture	76.5%	74.0%
Protein	19.3%	18.2%
Lipid	3.0%	6.0%
pH	6.78%	6.40%
VBN*	14.3mg%	17.8mg%
WHC**	74.5%	73.2%
Cooked drip	13.6%	14.3%

* : Volatile basic nitrogen.

** : Water holding capacity.




Fig. 2. Effect of phosphate on water holding capacity of ground yellow-corvenia meat. Legends (A, B, C, D, E) are the same as shown in Table 1.




Fig. 3. Effect of phosphate on water holding capacity of ground hair tail meat. Legends (A, B, C, D, E) are the same as shown in Table 1.

2. 염용성 단백질 용출도의 영향

염용성인 myosin구 단백질은 어육속에 actomyosin으로 존재하며 섬유상 단백질로서 어묵제품의 탄력형성

Table 4. Effect of phosphate on extractability of salt soluble protein and pH value of ground yellow-corporenia meat (Unit : mg%)

Phosphates	Phosphate concentration(%)			
	0	0.2	0.4	0.6
A	850(6.5)	—	—	—
B	—	890(6.6)	954(6.6)	947(6.7)
C	—	885(6.8)	890(6.9)	870(7.1)
D	—	870(6.6)	884(6.6)	875(6.7)
E	—	857(6.5)	868(6.5)	864(6.5)

Numericals in parentheses are represented as pH values.

Table 5. Effect of phosphate on extractability of salt soluble protein and pH value of ground hair tail meat (Unit : mg%)

Phosphates	Phosphate concentration(%)			
	0	0.2	0.4	0.6
A	597(6.3)	—	—	—
B	—	635(6.4)	674(6.5)	673(6.6)
C	—	637(6.7)	686(6.8)	663(7.1)
D	—	640(6.7)	673(6.8)	654(6.8)
E	—	635(6.3)	663(6.3)	665(6.4)

Numericals in parentheses are represented as pH values.

에 직접 관여하는 것으로 알려져 있다. 이러한 특성을 갖는 염용성 단백질의 용출성을 인산염의 종류와 첨가 수준에 따라 측정한 결과는 Table 4 및 Table 5와 같다. 조기연육에 있어서는 인산염을 첨가하지 않은 A 처리구에서 용출되는 염용성 단백질량은 850mg%, pH가 6.5였으며 Table 5에 나타난 갈치연육은 단백질량이 597mg%, pH는 6.3이었다. 첨가수준별로 보면 0.2%의 첨가수준보다 0.4%, 0.6%의 첨가수준에서 염용성 단백질의 용출량이 많았고 특히 0.4%의 첨가수준에서 조기연육은 B 인산염을 첨가할 때 염용성 단백질량이 각각 954mg%와 686mg%로 가장 높게 나타났다. 그러나 C 인산염의 경우 0.6% 첨가시 연육의 pH가 7.0이상이 되고 오히려 단백질의 용출성이 감소하는 경향을 보이고 있다. 이는 衣卷豐輔 등¹³⁾이 보고한 즉 연육의 pH가 7.0 이상이 되면 염용성 단백질의 용출도가 감소하여 어묵 제품의 gel 형성능을 감소 시킨다는 결과와 일치함을 보여주고 있다. 따라서 인산염의 사용은 원료 어종, 선도상태에 따라 각기 그 육의 pH는 다르게 나타나기 때문에 원료 어육의 특성에 따라 조정하여 사용할 필요가 있었다.

3. 어묵제품의 texture에 미치는 영향

인산염의 첨가가 어묵제품의 texture에 미치는 영향을 알아보기 위하여 열처리 조건 및 인산염의 종류에 따라 가공한 어묵의 texture의 특징을 나타낸 결과는 Fig. 4~Fig. 6과 같다. Fig. 4에 나타낸 가열처리 후의 어묵제품의 hardness는 85°C에서 45분간 가열한 것이 다른 가열조건으로 가공한 어묵제품보다 우수하였고 인산염을 첨가하지 않은 A 처리구를 제외하고는 75°C에서 60분간 가열한 어묵제품보다는 95°C에서 40분간 가열한 어묵제품이 hardness가 높게 나타났다. 121°C에서 10분간 가열한 것은 인산염 C 제품을 첨가한 어묵의 hardness가 가장 높게 나타나 다른 인산염에 비해 열에




Fig. 4. Effect of phosphate and cooking condition on hardness of Kamaboko. Legends(A, B, C, D, E) are the same as shown in Table 1.




Fig. 5. Effect of phosphate and cooking condition on cohesiveness of Kamaboko. Legends(A, B, C, D, E) are the same as shown in Table 1.




Fig. 6. Effect of phosphate and cooking condition on springiness of Kamaboko. Legends(A, B, C, D, E) are the same as shown in Table 1.

다소 안정한 것을 알 수 있었다. 어묵제품의 cohesiveness도(Fig. 5) 역시 85°C에서 45분간 가열한 것이 가장 높은 값을 나타냈고 인산염의 종류별로는 B 인산염이 가장 효과적이었다. 또한 75°C에서 60분간 가열한 어묵이 95°C에서 40분간 가열한 어묵보다 cohesiveness가 높게 나타나 Fig. 4에 나타난 어묵의 hardness와 다소 상이한 경향을 보이고 있다. Fig. 6은 역시 가열조건별 및 인산염의 종류별로 가공한 어묵의 springiness의 변화를 나타낸 것이다. 85°C에서 45분간 가열한 어묵의 springiness는 hardness 및 cohesiveness의 경우와 마찬가지로 다른 열처리 조건에 비해 높게 나타났으며 특히 인산염 B 제품과 C 제품의 효과가 두드러지게 나타났다. 한편 95°C에서 40분간 열처리한 어묵이 75°C에서 60분간 가열한 어묵보다 springiness가 높았다. 그러나 121°C에서 10분간 가열한 어묵에 있어서는 인산염 C 제품이 다른 인산염보다 hardness, cohesiveness, springiness가 높게 나타나 장기적인 유통을 위한 가열살균시에는 매우 효과적일 것으로 사료되었다.

요약

인산염의 첨가가 조기 및 갈치연육의 보수력 및 단백질의 용출성에 미치는 영향과 가열처리 후에 조기연육을 원료로 가공한 어묵의 texture에 미치는 영향을 조사하기 위하여 인산염을 첨가하지 않은 대조구와 4종의 시판 복합 인산염을 첨가수준별로 사용했을 때의 기능적 성질을 분석 검토하였다. 연육의 보수력 및 염용성 단백질량은 조기연육에는 인산염 B(sodium poly-phos-

phate 50%, sodium pyro-phosphate 20%, sodium tetra meta-phosphate 20%, sodium acid pyro-phosphate 5%, sodium ultra meta-phosphate 5%)를, 갈치연육에는 인산염 C(sodium poly-phosphate 40%, sodium pyro-phosphate 30%, potassium pyro-phosphate 15%, sodium tetra meta-phosphate 10%, hexa meta-phosphate 5%)를 각각 0.4% 첨가한 경우가 가장 효과적이었고 그 때의 염용성 단백질의 용출률은 조기연육이 954mg%, 갈치연육이 686mg%였다. 조기연육을 원료로 하여 가공한 어묵의 적정 가열조건은 85°C에서 45분간 가열한 것이 조직감이 양호하였다. 한편 121°C에서 10분간 가열한 경우는 C 인산염이 다른 인산염에 비하여 어육 단백질의 열안정성이 높은 것으로 나타났다.

감사의 글

이 논문은 1997년도 한양대학교 교내 연구비에 의해 연구되었으며 이에 감사드립니다.

참고문헌

- 綱田捻 : 東海水研報, 41, 71 (1965).
- Tanikawa, E. : Marine Products in Japan, koseishokkou company, Tokyo, p.358 (1971).
- 衣卷豊輔, 橫關源廷, 綱田捻 : 魚肉練製品理論應用, 恒星社厚省閣, p.180 (1974).
- 大橋司郎, 花御正昊, 小錢維安 : New Food Industry, 9 (4), 33 (1969).
- 朴榮浩 : 水產食品加工學, 螢雪出版社, p.348 (1979).
- 農水產部 : 水產統計年譜 (1983).
- A.O.A.C : Official Methods of Analysis, 11th ed., Washington, D.C. (1980).
- 日本厚生省 : 水產食品衛生指針, p. 13(1960).
- 新井健一 : 水產生物化學 · 食品學實驗, 恒星社厚省閣, p. 179 (1974).
- Saio, K. : J. of Texture Studies, 9, 159 (1978).
- D.E. Man, J. M., Voisey, P. W., Rasper, V. F. and Stanley, D. S. : Rheology and Texture in Food Quality, AVI, p.256 (1976).
- 土屋晴彥 : 水產化學, 恒星社厚省閣, p.19 (1965).
- 農漁村開發公社 : 魚貝練製品技術教育教材 (1982).

(1997년 10월 27일 접수)