

會員 經驗方

羅 宥 臣
(전남 경희당 한약방)

• 急慢性盲腸炎 治療方

處方：加減 雙和湯

金銀花 五錢 連요 白芍藥 各 三錢 當歸, 生地黃, 大黃, 知母, 黃栢, 黃連, 桂枝,
甘草 各 一錢 生干三 大棗 二 介
十~二十貼可

• 婦人 月經不通 五色帶下 子宮內膜炎 治療方

處方：加減 五積散

金銀花 三錢 蒼朮 制조 各 二錢 麻黃 陳皮 厚朴 當歸 川芎 白芍藥 白芷 桔梗 枳角
乾干 半夏 桂皮 荊芥 防風 白茯苓, 甘草 各一錢
鷄猪酒 禁忌

× 藥 二~三十貼 得效

金 鍾 彥
(光州 智理山 韓藥房)

• 治 小兒腹癰

白朮, 陳皮, 厚朴, 訶子, 肉豆久 各 一錢. 只實, 甘草 各 五分.

金 雄 義
(京畿 城南韓藥房)

• 治 婦女神經痛 및 產後諸毒症

薺니, 黃기, 防風, 黑豆 各一兩

紅花, 牛膝, 桃仁 各五錢. 甘草 三錢.

白雄鷄 一首 白 雄鷄를 물 12흡에 삶아서 4흡으로 졸인뒤 기름을 건어 내고 나머지 藥을 넣
어 달이기 2흡 반쯤 한다. 朝夕 食後에 各各 1回씩 10日間을 服用한다.

李 應 穆
(光州 大林堂 韓藥房)

• 主 喘息 咳소

加味 小青龍湯

麻黃 二錢, 白芍藥, 五味子, 半夏, 桂枝 各一錢五分, 細辛, 乾干, 杏仁, 桑白皮, 麥門冬,
과 藁仁, 甘草 各一錢

張 文 榮
(전북 중일 한약방)

(1) 第一方 肋膜炎의 治療

肋膜炎에 對하여 初에 外感으로 因하여 肺炎及肝熱이 并發함에 寒熱往來하고 咳수와 胸비
脇疼한지리 二三日內는 柴梗半夏本方의 香付子 桑白皮 各一錢 白芥子 七分을 加入하여 煎水
의 竹역干汁을 한수저씩調服則二三貼의完治됨

若失期가 되어 病劇化膿하나이

渴症이 有則 金銀花 五錢 赤芍藥 二錢五分

只角 木通 白何首烏 小回香半夏陳皮當歸

獨活南星기角刺아山甲炒一錢酒水相拌

煎腹六貼腹 특히 渴症有無를 살펴서 先後를 擇하여 使用하되 合上下方十二貼用함.

(2) 第二方 胃痙攣症治療

胃痙攣症(즉, 가슴아리) 男女를 莫論하고 七情所致와 傷食으로 因하여 胃部가 硬化됨에
依하여 動蛔가 되어 胃神經에 痙攣이 劇烈하여 刺痛이 온바 數十分 乃至 數時間을 또는 六,
七日을 作痛함도 有함에 自少至老로 一生을 通하여 各方面으로 治療하여도 根治가 안됨이
多有한지라 君子湯 三貼으로 十中八九 는 完治가 됨.

苦鍊皮 五돈 意苡仁 使君子炒 卽 丁力子各二錢 元甘草 一錢五分 煎服時 먼저 雪糖 半수저
服하고 腹藥後 更히 黑糖半수저를 服用함

黃連 蒼朮 山查肉 藿香 烏藥 厚朴 甘草 各七分 工砂仁炒 五分 木香 三分水 煎服함 初期 十
貼 中期二十貼 末期三四十貼 卽 完治가 됨.