

崩漏의 治方에 對한 文獻的 考察

姜東煥 · 柳同烈*

I. 緒 論

崩漏는 血崩 血漏의 뜻으로 女性性器의 非正常的의 出血을 말한다. 崩은 ‘忽然暴下 若山崩然’의 形象이고, 漏는 ‘非時而血下 淋瀝不止’의 形象이니 一般的으로 崩中 혹은 血崩이라 함은 突然히 暴注하는 下血을 意味하고, 血漏 혹은 漏下라고 함은 持續的으로 小量씩 點滴하는 下血을 意味한다. 漏하면 淋하고, 淋하면 崩하니 微한 것과 甚한 것이 다를 뿐이며 兩者는 基本的으로 同一한 病證이다.^{1,2,3)} 西洋醫學의으로 崩漏는 各種의 子宮出血病을 概括하는 것으로 例를 들면 機能性子宮出血, 流產, 產後, 骨盤腔炎과 生殖系統의 腫瘤, 癌腫等이 일으키는 子宮出血 모두가 崩漏의 範圍에 屬한다.⁴⁾

崩漏의 原因은 《黃帝內經素問》⁵⁾에서 “陰虛陽搏, 謂之崩” 이라고 明確히 밝힌 以後, 歷代醫家들은 血熱, 衝任之脈虛損, 脾虛不攝中氣陷, 暴怒傷肝, 悲哀太甚, 故貴奪勢 心氣不足 등 이라 하였으며^{6,7,8,9,10)}, 最近에 와서는 腎虛, 脾虛, 血熱, 血瘀等으로 辨證하고 있다.^{4,11,12)} 治療法에 대하여 蕭¹³⁾는 《女科經綸》에서 “崩宜理氣降火升提; 漏宜滋陰養氣養血, 或兼制火.” 와 “初用止血, 中用清熱涼血, 末用補血” 이라 하였는데 一般的으로는¹⁴⁾ 急性일 경우 標를 治療하고 慢性일 경우 本을 治療하되, 暴崩에는 補氣止血하여 虛脫을 防止하여야 하고, 緩即 寒熱虛實을 鑑別하여 그 本을 堅實하게 하여야 한다.

崩漏는 房事過度나 지나친 思慮, 肝氣鬱結, 飲食失調等으로 惹起되는 臨床에서 흔히 接할 수 있는 疾患중의 하나이지만 崩漏에 對한 研究는 不足

한 實情이다. 이에 著者는 女性性器의 非正常的의 出血인 崩漏의 治療에 있어 臨床에서의 活用을 높이고자, 臨床의으로 多用되어왔던 歷代治方과 그 治方의 構成藥物에 대한 文獻的 考察을 通하여 若干의 知見을 얻었기에 이에 報告하는 바이다.

II. 本 論

1. 資料調查 및 研究方法

1) 資料調查

韓醫學의 歷代文獻中 金匱要略부터 最近의 文獻에 이르기까지 29種의 文獻을 選定하여 各種의 子宮出血病을 概括하는 崩漏의 治方에 關한 部分을 拔萃하여 이를 研究資料로 삼았다.

2) 研究方法

(1) 崩漏에 使用된 治方에 關하여 文獻調查 整理하였다

(2) 構成藥物의 分布에 있어서 各 文獻에 나타난 治方中 重複되지 않게 選定하여 分布調查 하였다.

2. 文獻調查

1) 《金匱要略方論》¹⁵⁾

婦人則半產漏下旋覆花湯主之

(1) 旋覆花湯方

旋覆花三兩 蔥十四莖 新絳少許

婦人陷經漏下黑不解 膠姜湯主之

2) 《備急千金要方》¹⁶⁾

(1) 慎火散

治崩中漏下赤白青黑腐臭不可近令人而黑無顏色皮骨相連月經失度往來無常小腹弦急或若絞痛上至心兩脇腫脹食不生肌膚令人偏枯氣息乏少腰痛連脇不能久立每嗜臥困懶

* 大田大學校 韓醫科大學 婦人科學教室

慎火草 白石脂 禹余糧 鱉甲 乾薑 細辛 當歸 芎藭 石斛 芍藥 牡蠣各二兩 黃連

(2) 禹餘糧圓

治崩中赤白不絕因篤方

禹餘糧五兩 白馬蹄十兩 龍骨三兩 鹿茸二兩 烏賊魚骨一兩

(3) 增損禹餘糧圓

治女人勞損因成崩中狀如月經來去多不可禁止赤白不斷五臟空虛失色黃瘦崩竭暫止少日復發不耐動搖小勞輒劇

禹餘糧 龍骨 人蔘 桂心 紫石英 烏頭 寄生 杜冲 五味子 遠志各二兩 澤瀉 當歸 石斛 茯苓 乾薑各三兩 蜀椒 牡蠣 甘草各一兩

(4) 治女人白崩及痔病方

槐耳 白朮 艾葉 蒲黃 白芷各二兩 黃芪 人蔘 續斷 當歸 禹餘糧 橘皮 茯苓 乾地黃 蝟皮各三兩 牛角四兩 猪後懸蹄二十個 白馬蹄四兩

(5) 治婦人忽暴崩中去血不斷或如鷺鴨肝者方

小薊根六兩 當歸 阿膠 續斷 青竹茹 芎藭各三兩 生地黃八兩 釜月下土 地榆各四兩 馬通一升

(6) 治女人崩中去赤白方

白馬蹄五兩 蒲黃 鹿茸 禹餘糧 白馬毛 小薊根 白芷 續斷各四兩 人蔘 乾地黃 柏子仁 五賊骨 黃耆 茯苓 當歸各三兩 艾葉 茯苓 伏龍肝各二兩

(7) 當歸湯

當歸 芎藭 黃芩 芍藥 甘草各二兩 生竹茹二兩

(8) 治崩中晝夜十數行衆醫所不能癒者方

芎藭八兩 咬咀以酒五升煮取三升分三服不飲酒者水煮亦得

(9) 治崩中下血服之即斷或月經來過多及過期不來者服之亦佳方

吳茱萸 當歸各三兩 芎藭 人蔘 芍藥 牧丹 桂心 阿膠 生薑 甘草各二兩 半夏八兩 麥門冬一升

(10) 治暴崩中去血不止方

牡蠣 兔骨各二兩半灸

(11) 治女人白崩方

芎藭 桂心 阿膠 赤石脂 小薊根各二兩 乾地黃四兩 伏龍肝如鷄子大七枚

(12) 伏龍肝湯

治崩中赤白或如豆汁方

伏龍肝如彈丸七枚 生薑五兩 生地黃四升 甘草 艾葉 赤石脂 桂心各二兩

(13) 大牛角中仁散

治積冷崩中去血不止腰背痛四肢沈重虛極方

牛角仁一枚燒 續斷 乾地黃 桑耳 附子 龍骨 當歸各三兩 人蔘一兩 蒲黃 防風 禹余糧各二兩

(14) 治崩中去血積時不止起死方

肥羊肉三斤 乾薑 當歸各三兩 生地黃二升

(15) 生地黃湯

治崩中漏下日去數升方

生地黃一斤 細辛三兩

(16) 治崩中漏下赤白不止氣虛竭方

龜甲 牡蠣各三兩

(17) 治崩中下血羸瘦少氣調中補虛止血方

澤蘭 蜀椒二兩 藁本 柏子仁 山茱萸 厚朴 乾地黃 牡蠣各一兩半 代赭 桂心 防風 細辛 乾薑各一兩 甘草 當歸 芎藭各一兩 蕪荑半兩

(18) 治崩中方

白茅根三斤 小薊根五斤

(19) 丹蔘酒

治崩中去血及產餘疾方

丹蔘 艾葉 地黃 忍冬 地榆各五斤

(20) 牧丹皮湯

治崩中血盛 併服三劑即癒方

牧丹皮 乾地黃 斛脈各三兩 禹餘糧 艾葉 龍骨 柏葉 厚朴 白芷 伏龍肝 青竹茹 芎藭 地榆各二兩 阿膠一兩 芍藥四兩

(21) 白堊圓

治女人三十六疾胞中病漏下不絕方

邯鄲白堊 禹余糧 白芷 白石脂 乾薑 龍骨 桂心 瞿麥 大黃 石葦 白朮 細辛 芍藥 甘草 黃連 附子 當歸 茯苓 鍾乳 蜀椒 黃芩各半兩 牡蠣 五賊骨

(22) 治女人漏下或瘵或劇常漏不止身體羸瘦飲食減少或赤或白或使人無子者方

牡蠣 伏龍肝 赤石脂 白龍骨 桂心 五賊骨 禹餘糧各等分

(24) 治女人漏下不止散方

鹿茸 阿膠 各三兩 五賊骨 當歸各二兩 蒲黃一兩

(25) 治女人產後漏下及治病下血方

礬石一兩 附子一枚

(26) 芎藭湯

治帶下漏血不止方

芎藭 乾地黃 黃耆 芍藥 吳茱萸 甘草各二兩 當歸 乾薑各三兩

(27) 治漏下去血不止方

取水蛭治下篩酒服一錢許日二惡血消即愈

(28) 治漏下神方

取槐子燒末酒服方寸匕日三立瘥

(29) 漏下去黑方

乾漆 麻黃 細辛 桂心 各一兩 甘草半兩

(30) 治漏下去赤方

白朮二兩 白薇半兩 黃蘗二兩半

(31) 治漏下去黃方

黃連 大黃 桂心 各半兩 黃芩 蟻蟲 乾地黃各六兩

(32) 治漏下去青方

大黃 黃芩 白薇各半兩 桂心 牡蠣各六錢

(33) 治漏下去白方

鹿茸一兩 白薇十八銖 狗脊半兩

(34) 馬通湯

治漏下血積月不止方

赤馬通汁一升 生艾葉 阿膠各三兩 當歸 乾薑各二兩 好墨半圓

(35) 馬蹄圓

治白漏下絕方

白馬蹄 禹餘糧各四兩 龍骨三兩 五賊骨 白僵蠶 赤石脂各二兩

(36) 慎火草散

治漏下方

慎火草十兩 當歸 鹿茸 阿膠 各四兩 龍骨半兩

(37) 蒲黃散

治漏下不止方

蒲黃半升 鹿茸 當歸各二兩

3) 《婦人大全良方》⁷⁾

(1) 小薊湯

小薊莖葉 取汁壹盞 生地黄汁一盞 白朮半兩剉 右三件, 入水一盞, 煎至一半, 去滓溫服。

(2) 阿茄陶圓

胡椒 紫檀 鬱金 茜根 小檳皮 右等分, 爲細末, 滴水圓如梧桐子大, 阿膠湯化下二圓。

(3) 琥珀散

治崩暴下血。

赤芍藥 香附子 荷葉 男子髮 當歸 棕櫚炒焦 烏紗帽 右等分, 除棕外, 其餘並切粗片, 新瓦上煨成黑炭, 存性三分, 爲細末。每服三, 五錢, 空心童子小便調下。

(4) 五靈脂散

治婦人血山崩, 及治丈夫脾積氣。張氏云 治血崩諸藥不能止者妙。好五靈脂炒令煙盡爲末, 每服一錢, 溫酒調下。此藥兼能解藥毒及蛇, 蝎, 蜈蚣咬塗傷處立愈。

(5) 荊芥散

治婦人崩中, 連日不止。

用荊芥穗於燈盞, 多着燈心, 好麻油點燈, 就上燒荊芥焦色, 爲細末。每服三錢, 童便調下。

(6) 獨聖散

治婦人血山崩不止。

防風 右不以多少爲細末, 酒煮, 白麵清調下二錢, 空心, 食前, 日二服。更以麵作糊酒投之極驗。

(7) 神應散

治婦人血崩不止。

桂心, 不拘多少, 甘鍋內煨, 微存性。爲末, 每服一, 二錢, 米飲調下。

(8) 金華散

治婦人血室有熱, 崩下不止, 服溫藥不效者。

延胡索 瞿麥穗 當歸 乾葛 牡丹皮各一兩 石膏二兩 桂心 三分 蒲黃半兩 威靈仙三分 右爲細末, 每服二錢。水一盞, 煎至肉分, 空心溫服, 日二服。

(9) 如聖散

治婦人血山崩。

棕櫚 烏梅 各一兩 乾薑 一兩五分 右爲細末, 每服二錢, 烏梅酒調下, 空心, 食前服, 久患者不過三服即愈。

(10) 縮砂散

治血崩。

新縮砂仁不以多少, 於新瓦上炒香, 爲細末, 米飲調下三錢。

(11) 如神散

治婦人血崩不止, 赤白帶下。

香附子 赤芍藥各等分 右爲細末, 每服二錢。鹽一捻, 水一盞, 煎至七分, 溫服無時候, 日二服。十服見

效。

(12) 煮附圓

治婦人，室女一切血氣，經脈不調，臍腹痛，面色痿黃，心怔乏力，腹脹脇痛，頭暈惡心，飲食減少，崩漏帶下，大場便血，積聚癥瘕，並皆治之。虔心服餌，自見其功爾。

香附子不以多少，先擦去毛，用好醋煮出，焙碾為末，醋煮好為圓，如梧桐子大，每服三十圓，米飲送下，無時候。婦人數墮胎，由氣不下降，所以胎氣不固，此藥尤妙，一方有艾亦好。

(13) 竹茹圓

治婦人崩中，赤白帶下。

當歸 白朮 青木香 蠶蛻煨 黑棕刷煨 川山甲煨 各一兩 地榆 竹茹 川芎 白茯苓 粉草 血餘煨 牡蠣 綿子煨 各半兩 熟地黃四兩 赤石脂煨 三兩 右七味煨，藥用綿子裹定，入瓶子內，用鹽泥固濟，用炭則半煨存性，却同前藥碾為細末，煉蜜圓如梧桐子大。每服四十圓，空心，溫酒吞下。

(14) 如聖無比散

治血山崩。

晚暫沙一兩，伏龍肝半兩，同為細末，酒調二錢匕。

4) 《聖濟總錄》¹⁷⁾

(1) 艾葉散

治婦人漏下血淋瀝不斷 身體黃瘦 不思飲食

艾葉炒 阿膠炙令燥 赤石脂 龍骨 各一兩 縮砂仁半兩 附子炮裂去皮臍 當歸 硫黃研 各三分 熟乾地黃一兩半 吳茱萸湯沈焙乾半兩

(2) 烏金散

治婦人血漏 日久不止 或經脈不斷 或暴下血不止

烏賊魚骨去甲 椶櫚 羊角尖 蠶退 新綿 各一兩 白礬半兩 乾薑一分

(3) 沈香牧丹丸

治婦人內挾瘀血 經候淋瀝不斷 或多或少 四肢煩倦

沈香剉一兩半 牧丹皮 赤芍藥 當歸 桂去粗皮 芎藭 黃耆 人參 白茯苓 山芋 白芷 吳茱萸湯沈焙乾炒 巴戟天去心 陳橘皮湯沈去白焙 木香 牛膝去苗酒沈切焙 枳殼麩炒 肉荳蔻去殼 厚朴去粗皮生薑汁炙 乾薑炮 白龍骨 各一兩

(4) 赤石脂散

治婦人漏下 淋瀝不止

赤石脂煨赤 側柏微炙 烏賊魚骨 各一兩

(5) 槐蛾散

治婦人漏下 淋瀝不絕

槐蛾不以多少燒灰

(6) 馬蹄湯

治婦人赤白漏下 淋瀝不止

白馬蹄鑄炒令焦二兩 禹餘糧煨醋淬七遍 龍骨 烏賊魚骨去甲炙 各一兩 甘草炙 牡蠣燒 白殭蠶炒 赤石脂 附子炮裂去皮臍 熟乾地黃 當歸 各一兩

(7) 地黃飲方

治婦人血漏 點滴不斷

生地黃五兩 細辛去苗葉二兩

(8) 蒲黃散

治婦人漏血不止 日久虛損

蒲黃微炒二兩 鹿茸 當歸 各一兩

(9) 蒲黃阿膠湯

治婦人血漏 非時而下 淋瀝不斷

蒲黃微炒一兩 鹿茸 當歸 各二兩 阿膠炙令燥 烏賊魚骨 各一兩半 生地黃汁一碗

(10) 鹿茸散

治婦人漏下不止

鹿茸 阿膠炙燥 烏賊魚骨去甲 各一兩半 當歸 蒲黃微炒 各一兩

(11) 龍骨散

治婦人漏下不止 或少或多 遂致常漏 身體虛瘦 飲食減少 困怠無力

龍骨 灶中黃土 赤石脂 牡蠣燒研 烏賊魚骨去甲 桂去粗皮 禹余糧煨醋淬五七遍 各一兩

(12) 繁甲散

治婦人漏下或赤或白

繁甲醋炙 牡蠣燒研 各一兩

(13) 桑耳散

治婦人漏下赤白 日久不止

桑耳二兩 鹿茸酒浸炙去毛一兩

(14) 桑耳續斷散

治婦人赤白漏下 日月浸久 淋瀝不斷

桑耳炙 續斷 熟乾地黃 各二兩 阿膠炙燥 百葉微炙 芎藭 赤石脂 各一兩半 丹蔘一兩 槲葉二兩半 地榆二兩 小薊根 鹿茸 牛角腮燒灰 各一兩半 繁甲二

兩 當歸 牡蠣粉 熟艾炒 各一兩半

(15) 乾漆散

乾漆炒令煙盡 大黃炒 細辛去苗葉 桂 各一兩 甘草炙三分

(16) 白朮散

治婦人漏下赤白

白朮剉炒 黃蘗去粗皮炙 各一兩半 白薇半兩

(17) 續斷散

治婦人帶下白色

續斷 百葉 芎藭 禹余糧煨醋淬三五七遍 熟艾炒 阿膠炙令燥 赤石脂 牡蠣燒研 生乾地黃 當歸 丹蔘 鹿茸去毛炙 鱉甲醋炙 各一兩半 鮫甲醋炙 地榆 各二兩

(18) 白薇散

治婦人漏下白色

白薇三分 狗脊去毛半兩 鹿茸酒浸炙去毛一兩

(19) 黃耆湯

治婦人漏下赤白 淋瀝不斷

黃耆一兩半 阿膠炙燥二兩 甘草炙一兩 大棗去核五十顆

(20) 生乾地黃散

生乾地黃焙 陳橘皮去白炒 甘草炙 白芷 酸石榴皮 牛角鯁灰 續斷 人蔘 地榆炙 一兩

(21) 紫石英湯

紫石英細研 人蔘 桂去粗皮 白茯苓去黑皮 各一兩 甘草炙二兩 赤小豆二百粒 麥門冬去心焙三兩

(22) 當歸湯

治婦人經血下不止 臍下虛痛

當歸切焙 赤芍藥炒 各一兩半 禹余糧醋淬五七遍 麒麟竭 黃蘗微炙剉 地榆剉碎炒 各一兩 生乾地黃焙二兩

(23) 劉寄奴湯

治婦人經血下不止

劉寄奴二兩半 赤芍藥剉炒二兩 白茯苓一兩 芎藭 當歸切焙 各一兩半 艾葉炒四兩

(24) 蒲黃湯

蒲黃輕炒 當歸 百葉炙令黃色 艾葉炙焙 各一兩 伏龍肝一兩半 生乾地黃焙 黃芩去黑心 各二兩

(25) 小薊根湯

小薊根三兩 當歸微炙 阿膠炙 芎藭 青竹茹 續斷

地榆根 各一兩半 伏龍肝二兩

(26) 蒲黃丸

治婦人月候過多血傷漏下不止

蒲黃三兩微炒 龍骨二兩半 艾葉一兩

(27) 如聖散

治經血不止

椶櫚一兩燒黑灰 烏梅一兩 乾薑一兩竝燒五分

(28) 防風散

治婦人經血不止

防風去叉不以多少生用

(29) 伏龍肝湯

治婦人經血不止臍腹撮痛 或時煩渴

伏龍肝 禹余糧燒通赤濕土內培一復時 赤芍藥 生乾地黃焙 地榆 白茅根 各一兩 龍骨 當歸切焙 各一兩半 甘草炙 麒麟竭細研 各半兩

(30) 禹余糧丸

治婦人經血日夜不絕煩悶困絕

禹余糧燒赤炒淬七遍 白馬蹄灰 鹿茸 各二兩 烏賊魚骨燒赤色 龍骨 各一兩

(31) 附子丸

治婦人經血不止并下五色 臍下痛

附子炮裂去皮臍 硫黃研 乾薑炮 赤石脂 各一兩

(32) 續斷丸

治婦人經血日久不止 或五色相兼而下 面黃體瘦 腰中無力

續斷 芎藭 阿膠炙令燥 青石脂 甘草炙 當歸微炙 地榆根 百葉炙 鹿茸 小薊根 丹蔘 各一兩 牛角鯁燒灰 鱉甲醋炙令黃 生乾地黃炒 各二兩

(33) 芍藥散

治婦人經血不止兼五色不定

芍藥剉炒 龍骨 黃耆 白朮微炒 各一兩 乾薑炮半兩 烏賊魚骨去甲酥炙 附子炮裂去皮臍 桂去粗皮 牡蠣燒研 生乾地黃焙 各三分

(34) 馬蹄屑散

治婦人經血不定

馬蹄屑炒令黃焦 赤石脂 各三兩 禹余糧醋淬三五遍 龍骨 牡蠣燒研 當歸炙令香剉 生乾地黃焙 烏賊魚骨去甲 附子 各二兩 甘草炙一兩 白僵蠶炒三分

(35) 側柏丸

治婦人經血不止 或黑或赤 及臍下痛

側柏 黃耆 生乾地黃焙 續斷 各一兩一分 艾葉炒
當歸 各一兩 鱉甲炙 桑耳炙 禹余糧醋淬 芍藥炒 代
赭研 牛角腮炙焦 各一兩半

(36) 白石脂丸

治夫人經血五色雜下 或獨赤獨白 日久不止

白石脂 芎藭 大薊 伏龍肝 各六兩 熟乾地黃十二
兩焙 阿膠炒令燥三兩

(37) 馬蹄丸

治婦人血藏虛冷 經血不止 或赤或白 或五色相雜

白馬蹄剉炒 白石脂 各一兩一分 禹余糧醋淬三五
遍 牡蠣粉 龍骨 烏賊魚骨去甲 各一兩 白殭蠶炒四
兩 熟乾地黃焙七兩半 當歸 附子炮 各九兩 甘草炙
六兩

(38) 鮫甲散

治婦人經血不止五色不定

鮫甲炙 桑耳 各二兩半 當歸 吳茱萸湯洗焙乾炒
各一兩半 赤芍藥半兩 百葉熬 桑寄生 熟乾地黃焙
烏賊魚骨去甲 人蔘 禹余糧 各二兩

(39) 地黃湯

治婦人經血不止 顏色不定。

生乾地黃焙五兩 艾葉 黃芩去黑心 當歸 各二兩
地榆四兩 伏龍肝 百葉 生薑切焙 蒲黃 各三兩

(40) 白芷湯

治婦人血海虛冷 經行太過

白芷 鹿茸 訶黎勒煨去核 厚朴 牡丹皮 地榆 黃耆
肉荳蔻去皮 白朮 黃連 附子炮裂去皮臍 代赭 桂 去
粗皮各一兩 黃芩半兩 龍骨去土二兩

(41) 龍骨飲

治婦人經血暴下不止

龍骨三兩 青竹茹二兩 乾薑炮一兩 伏龍肝五兩 槲
葉七枚炙

(42) 當歸湯

治婦人下血不止 腹痛

當歸半兩 栝葉一兩 薤白六莖切 禹余糧煨醋淬三
遍研末三分

(43) 栝葉湯

治婦人下血不止臍下痛

栝葉二兩 芍藥三分

(44) 二灰散

治經血不止

蠶紙不計多少燒灰 箬葉燒灰

5)《東垣十種醫書》¹⁸⁾

(1) 升陽除濕湯

治女子漏下惡血 月事不調 暴崩不止

當歸 獨活各伍分 蔓荊子 防風 灸甘草 升麻 藥本
各壹錢 柴胡 羌活 蒼朮 黃芪 各壹錢伍分 右剉如麻
豆大 勿令作末 都作一服 以潔淨新汲水 三大盞 煎
至一大盞 去粗 空心 熱服 待少時 以早飯 壓之 可
一服而已。

(2) 涼血地黃湯

治夫人血崩是腎水陰虛不能鎮守胞絡相火故血走而
崩也。

黃芩 荊芥穗 蔓荊子 已上各壹分 黃蘗 知母 藥本
細辛 川芎 已上各貳分 黃連 羌活 柴胡 升麻 防風
已上各參分 生地黃 當歸 已上各伍分 甘草 壹錢 紅
花少許 右咬咀都作一服 水三大盞煎至一盞去粗 稍
熱空心服之。

6)《衛生寶鑑》¹⁹⁾

(1) 膠艾湯

治衝任虛損 月水過多及妊娠胎動不安 腹痛下墜
阿膠 川芎 甘草炙各二兩 當歸 艾葉炒各三兩 白
芍藥 熟地黃各四兩

(2) 伏龍肝散

治經血崩下
伏龍肝 赤石脂各一兩 熟地黃 艾葉微炒各二兩 甘
草 肉桂各半兩 當歸 乾薑各七錢半

(3) 丁香膠艾湯

治崩漏走下不止
阿膠六分炮 當歸身一錢二分 生艾末一錢 川芎 丁
香末 熟地黃各四分 白芍藥四分

(4) 柴胡調經湯

治經水不止 鮮紅 項筋急 脊骨強 腦痛 不思飲食
羌活五分 蒼朮一錢 柴胡七分 藥本 獨活 升麻各
五分 當歸 葛根 甘草炙三分 紅花少許

(5) 涼血地黃湯

治婦人血崩不止 腎水陰虛 不能鎮守胞絡相火 故
血走而崩也

柴胡 防風各三分 黃蘗 知母 黃連 藥本 川芎 升
麻 羌活各二分 生地黃 當歸尾各五分 黃芩 細辛 甘
草炙 荊芥穗 蔓荊子各一分 紅花少許

(6) 益胃升陽湯

治血脫益氣古人之良法也 先補胃氣以助生發之氣 故曰陽生陰長 用諸甘劑 爲之先務 舉世皆以爲補氣 殊不知甘能生血 此陽生陰長之理也 故先理胃氣 人之身內 穀氣爲寶

白朮三錢 黃芪 甘草炙各二錢 人蔘一錢半 陳皮 當歸身各一錢 炒麴一錢半 柴胡 升麻 生黃芩各半錢

(7) 升揚舉經湯

治經水不調

黃芪 白朮 當歸身各三錢 柴胡 藁本 防風 羌活各二錢 獨活一錢半 川芎炙 地黃 白芍 甘草 人蔘各一錢 細辛六分 黑附子炮去皮臍五分 肉桂五分 桃仁十個湯洗去皮尖 紅花少許

(8) 備金散

治婦人血崩不止

香附四兩炒 當歸尾一兩二錢炒 五靈脂一兩炒 爲末每服五錢 醋湯調空心服立效

7) <景岳全書>²⁰⁾

○若陰虛血熱妄行者 宜保陰煎 加減一陰煎○若火盛迫血妄行 而無虛證者 宜徒薪飲 黃金散加續斷丹參○若血熱兼滑者宜保陰煎 槐榆散生地黃湯○若肝經怒火動血者 加味四物湯○若肝經怒火動血 逆氣未散者化肝煎或保陰煎加減主之○若血有滯逆而妄行者 四物湯丹參散○若營氣不足 血不能調而妄行者 五福飲四物湯四君子湯八珍湯擇宜用之○若脾氣虛陷不能收攝而脫血者 壽脾煎歸脾湯四君子加芎歸 再甚者舉元煎○若脾胃虛寒兼嘔兼瀉泄而畏寒者 理陰煎五君子煎理中湯○若脾胃陰氣不固者 固陰煎五陰煎秘元煎○若肝膽氣虛不能藏血者 必多驚恐畏怯 宜五福飲七福飲八珍湯 兼陽虛者 仍加薑桂○若去血過多血脫氣竭者 當速用獨參湯 或用當歸補血湯○若崩淋既久 血滑不禁 宜澁宜固者龍骨散 如聖散七灰散之類 同人蔘兼用之○若因肝經之火 而血下行 用奇效四物湯 或用四勿加柴梔芩朮○若肝經風熱而血妄行 用加味逍遙散 小柴胡加梔芩丹皮○若脾經鬱結 而血不歸經 用歸脾加柴梔丹皮○若悲傷胞絡而血下崩 用四君加柴梔升麻。

(1) 加減一陰煎

治水虧火勝之劑 治腎水眞陰虛損 而脈證多陽 虛火發熱 及陰虛動血等證 或瘧疾 傷寒屢散之後 取汗

既多 脈虛氣弱 而煩渴不止 潮熱不退者 此以汗多傷陰水虧而然也 火之甚者宜用此方。

生地 芍藥 麥冬 各二錢 熟地三五錢 炙甘草五七分 知母 地骨皮 各一錢

(2) 五福飲

凡五臟氣血虧損者 此能兼治之

人蔘隨宜心 熟地隨宜腎 當歸二三錢 白朮炒一錢半 炙甘草一錢

(3) 七福飲

治氣血久虛而心脾爲甚者。

前方加棗仁二錢 遠志三五分製用

(4) 保陰煎

治男婦帶濁遺淋 色赤帶血 脈滑多熱 便血不止 及血崩血淋 或經期太早 凡一切陰虛 內熱動血等證。

生地 熟地 芍藥 各二錢 山藥 川續斷 黃芩 黃柏 各一錢半 生甘草一錢

(5) 壽脾煎

治脾虛不能攝血等證 凡憂思鬱勞積勞 及誤用攻伐等藥 凡損脾陰 而治中氣虧陷 神魂不寧 大便脫血不止 或婦人無火崩淋等證 凡兼嘔惡 尤爲危候 速宜用此 單救脾氣 則統攝固而血自歸源 此歸脾湯之變方 其效如神

白朮二三錢 當歸二錢 山藥二錢 甘草一錢 棗仁錢半 遠志三五分 乾薑炮一二三錢 蓮肉去心炒二十粒 人蔘隨宜一二錢。

(6) 秘元煎

治遺精帶濁等病 此方專主心脾。

遠志炒八分 山藥炒二錢 芡實炒二錢 棗仁炒二錢 白朮炒 茯苓各錢半 炙甘草一錢 人蔘一二煎 五味十四粒 金櫻子二錢。

(7) 四君子湯

治脾胃虛弱 飲食少思 惑大便不實 體瘦面黃 或胸膈虛憊 吞酸痰嗽 或脾胃虛弱善患瘧病等證

人蔘 白朮 茯苓 各二錢 炙甘草一錢

(8) 四物湯

治血虛營弱 當爲此爲主

熟地黃 當歸 各三錢 川芎一錢 芍藥二錢

(9) 加味四物湯

四物湯加山梔柴胡丹皮。

(10) 奇效四物湯

治肝經虛熱 血沸騰而崩 久不止

當歸 熟地 白芍 川芎 阿膠 艾葉 黃芩 每服四錢
水煎

(11) 增損四物湯

治不能攝血去不止。

人參 當歸 芍藥 川芎 乾薑炒 各一兩 灸甘草四錢
每服四錢水煎服

(12) 栝葉散

治元氣虛弱 崩中漏血 年久不愈 亦治白帶。

栝葉炒 當歸 生地 續斷 川芎 龜甲灸 禹餘糧 各一兩半 阿膠炒五錢 鱉甲灸一兩半 赤石脂煨 地榆 艾葉炒 鹿茸灸 各五錢 爲末每服二錢粥飲調下。

(13) 七灰散

治血崩神效。

蓬蓬殼 罌粟殼 醃蟹殼 益母草 旱蓮草 棕毛葉 藕節 各分俱燒存性爲末 空心醋點湯調下三錢。

(14) 黃芩散

治壯熱崩中下血 是陽乘陰分 故經血泛溢 宜清其北方。

條黃芩不拘多少爲細末 燒秤錘碎酒食前調下三四錢。

(15) 歸脾湯

治思慮傷脾 不能攝血 治血妄行 或健忘怔忡 驚悸盜汗 嗜臥小食 或大便不調 心脾疼痛

人參 黃芪 白朮 茯苓 棗仁 各二錢 遠志 當歸 各一錢 木香 灸甘草 各五分 水二鍾 加圓眼肉七枚 煎七分 食遠服。

(16) 加味逍遙散

治肝脾血虛發熱 小水不利

當歸 芍藥 白朮 茯苓 甘草 柴胡 各等分 丹皮 梔子 各七分

(17) 槐榆散

治血崩及腸風下血

槐花 地榆 各等分炒焦 用酒煎飲之

(18) 如聖散

治血崩 三服全癒

棕櫚子 烏梅肉 乾薑 俱燒存性爲末各等分 每服二錢 空心烏梅湯調服。

(19) 防風黃芩丸

治肝經風熱以治血崩便血尿血等證。

條芩炒黑 防風等分 爲末酒糊丸桐子大每服三五十丸 食遠或食前米飲 或溫酒送下

(20) 一味防風散

治肝經有風以致血得風而流不歸經者。

用防風去蘆爲末每服一錢 白湯調服

(21) 棕灰散

治大腸下血不止 或婦人崩漏下血

敗棕 不拘多少燒灰存性爲細末 每服二錢 空心好酒或清米飲調服。

(22) 龍腦雞蘇丸

治上焦之火 除煩解勞 安吐血衄血 清五臟虛煩 心志不定 上而酒毒膈熱消渴 下而血滯五淋血崩等疾。

麥冬四兩 甘草一兩半 龍腦 薄荷葉一斤 阿膠炒 人參各二兩 黃芪灸一兩 生地六兩 木通 銀柴胡 各二兩

(23) 當歸補血湯

治血氣損傷 或因誤攻致虛 肌熱口渴目赤面紅 脈大而虛 重按全無 及病因饑飽勞役者。

黃芪灸一兩 當歸三錢

8) <醫學入門>⁹⁾

○經行犯房 及勞役過度 損傷衝任 氣血俱虛 不能制約 經血忽然暴下 宜大補氣血 大溫經湯 氣虛者 四物湯加參芪 血虛者 四物湯加膠艾炒乾薑 久不止者 百子附歸丸 黑附丸 虛寒臍腹冷痛者 伏龍肝散 一切虛證 內灸散 虛火 涼血地黃湯 生地芩連湯 補陰丸 久者當歸龍骨丸 大小烏雞丸○有因膏粱厚味 以致脾濕 下流於腎 與相火 合爲濕熱 迫經下漏 其色紫黑腐臭 宜解毒四物湯 涼血地黃湯 膠艾四物湯 加黃芩 或單芩心丸 四勿坎離丸 固經丸○有因飲食失節 火乘脾胃 下陷 顏容似無病者 外見脾 困倦煩熱不臥等證 經水不時暴至 或適來適斷 升陽調經湯 升陽舉經湯○風冷搏動者 五積散去麻黃 入醋煎服 不換金正氣散加川芎官桂 四物湯加荊芥○寒冷所乘 及年老久崩者 伏龍肝散 加附子鹿茸阿膠蒲黃糯米糊丸服○暑月單芩心丸 益元散加百草霜○濕者升陽除濕湯○悲哀心則胞絡絕 胞絡絕則陽氣內動 發則心下崩 數澀血也 宜備金散 四製香附丸 烏藥湯 古橋歸丸○憂鬱因先富後貧先順後逆 心事不足 鬱火旺於血脈之中 宜四物湯加香附白朮各一錢地榆黃芪人參各五分升麻二分甚者加棕櫚灰酒調服○有瘀積凝成 又

恐昏暈 必先服五靈脂末一錢 單五靈脂散 烏紗帽散 十灰散 古黑神散 單夏枯草膏 有火者 固經丸 虛者 女金丹.

(1) 固經丸

治經水過多

黃芩 白芍藥 龜板 各一兩 椿根皮七錢 黃柏三錢 香附二錢半 爲末酒糊丸

(2) 四製香附丸

治經候不調

香附一斤 用酒醋童便鹽水各沈七日 焙乾爲末炒糊丸 梧子大

(3) 單五靈脂散

治血崩諸藥不能止

一味炒 烟盡爲末每一錢 溫酒 調服

(4) 單芩心丸

治天癸當住不住或過多不止

條芩二兩用醋沈七日 灸乾 又沈又灸 如此者七次 爲末醋糊丸 梧子大

(5) 烏紗帽散

漆紗頭巾 赤芍 香附 乾荷葉 男子髮 當歸 棕櫚 各等分 焙存性爲末 每五錢童便調服

(6) 女金丹

治婦人無子 或無痰火等疾 崩中淋瀝

白芍 當歸 川芎 人蔘 白朮 茯苓 藥本 白芷 白薇 桂心 玄胡索 牡丹皮 赤石脂 各一兩 俱酒浸三日乾 沒藥 甘草各五錢 香附一斤 醋沈共爲末 蜜丸 梧子大 每五十九丸 溫酒下

(7) 膠艾四物湯

治勞傷氣血 月水過多 或崩漏不止 及妊娠 胎氣不安 或因損動 漏血傷胎

阿膠 艾葉 當歸 川芎 甘草各四分 芍藥 熟地各八分 水酒各半空心煎服.

(8) 當歸龍骨丸

治月事失常 經水過多 及赤白帶下淋瀝 妊娠 胎動不安 疼痛漏下 產後惡露不止 大人小兒痢疾

當歸 芍藥 黃連 梔子 艾葉 茯苓 各五錢 龍骨 黃柏各一兩 木香一錢半 爲末 水丸小豆大 每五十九丸 米飲下.

(9) 備金散

治血崩不止

香附四兩 當歸一兩二錢 五靈脂一兩 爲末 每五錢 淡醋湯調服.

(10) 古橘歸丸

治婦人肌膚手足俱有血絲露 此 怒氣傷肝血失常 經故也

橘皮四兩 當歸二兩 爲末 蜜丸 梧子大 每五十九丸 酒下.

(11) 黑附丸

治婦人久無子而經水不調及素墮胎者

四製香附一斤 淨綿艾四兩用醋一碗 煮二味 至乾 入石臼內 搗攔成餅子 焙乾 入白茯苓 當歸 人蔘 熟地 微墨 火煨醋淬各一兩 木香五錢 爲末炒糊丸 梧子大.

(12) 百子附歸丸

調經養血安胎順氣 胎前 產後 及月事參差 有餘不足諸症 悉治 久服有孕

四製香附十二兩 阿膠 艾葉 四物湯料各二兩 爲末 用陳石榴一枝 連皮搗碎煎水 呷糊丸 梧子大 每百丸 空心 淡醋湯下.

(13) 古黑神散

治橫生逆產瘦胎 及胎前產後 虛損月水不止 崩漏等證

百草霜 白芷各等分 爲末 每一錢 水煎 入童便微炒少許 調服

(14) 內灸散

治胎前產後 一切血疾血崩虛憊 腹脅疼痛 氣逆嘔吐 冷氣凝積 塊硬刺痛泄下清白 或下五色 腹中虛鳴 氣滿堅硬瀝血腰疼嘔吐清水 頻產血衰 顏色青黃 勞傷劣弱 月經不調下血墮胎 血迷血暈血痛時發疼痛 瀕目眩暈 惡露不止 體虛漏下手足逆冷

藿香葉 丁香皮 茴香 肉桂 熟地各一兩半 甘草 白朮 當歸 山藥 白芷 各八兩 每三錢 姜艾煎服 或爲末 溫酒調服.

(15) 大溫經湯

治衝任虛損 月事不調 或崩中去血過多 或經損孕 瘀血停留 小腹急痛 五心煩熱

阿膠 芍藥 川芎 當歸 人蔘 肉桂 牡丹皮 吳茱 甘草各二分 半夏二分半 麥門冬五分 姜煎溫服.

(16) 伏龍肝散

治先便後紅 及吐衄血

伏龍肝六分 艾葉 川芎各一錢二分 赤石脂 麥門冬各四分 乾薑 當歸 各三分 肉桂 甘草 熟地各二分 棗 煎 溫服 或爲末米飲調服。

(17) 解毒四物湯

治婦人經脈不住 或如豆汁 五色相雜 面色痿黃 臍腹刺痛 寒熱往來 崩漏不止

黃連 黃柏 黃芩 山梔 當歸 川芎 白芍 熟地 各一錢 水煎溫服。

9) 《丹溪心法附餘》²¹⁾

(1) 膠艾湯

治勞傷血氣 衝任虛損 月水過多 淋瀝不斷 及妊娠調攝失宜 胎氣不安 或因損動 漏血傷胎 並宜服之

阿膠炒 芎藭 甘草炙 各二兩 艾葉炒二兩 熟乾地黄 白芍藥 各四兩 當歸二兩

(2) 伏龍肝散

治血氣勞傷 衝任脈虛 經血非時注下 或如豆汁 或成血片 或五色相雜 臍腹冷痛 經久不止

川芎三兩 肉桂去皮五錢 當歸去芦炒 乾薑炮 各七錢 赤石脂一兩 艾葉炒三兩 熟地黄 甘草炙半兩 麥門冬一兩 伏龍肝一兩即鍋心土

(3) 神仙聚寶丹

治婦人血海虛寒 外乘風冷 搏結不散 血氣攻注 腹脇疼痛 及經候不調 崩中帶下 並宜服之

沒藥 琥珀別研各一兩 辰砂別研一錢 木香煨末一錢 乳香別研二錢半 當歸洗焙取末一兩 麝香別研一兩

(4) 艾煎丸

治崩後 淋瀝不已 小腹滿痛 常服 益榮調經

吳茱萸 當歸 各七錢半 熟地黄 白芍藥 各一兩半 石菖蒲炒 川芎 人蔘 熟艾四兩

(5) 鎮宮丸

治婦人崩漏不止 或下五色 如豆汁 或傷若豚肝 或下瘀血 臍腹脹痛 頭暈目眩

代赭石 紫石英煨醋淬 禹余糧煨醋淬七次 川芎 陽起石炒紅研 鹿茸 蒲黃炒 香附子醋炙 各一兩 當歸一兩

(6) 柏子仁湯

治婦人 憂思過度 勞傷心經 不能藏血 遂致崩中下血不止

鹿茸 柏子仁炒各一兩 芎藭一兩 香附子炒去毛二

兩 當歸一兩 甘草炙半兩 川續斷一兩半 茯神一兩 小草一兩 阿膠一兩炒成珠

(7) 鹿茸丸

治衝任虛損 以致經候過多 又爲風冷所乘 尺脈微細

鹿茸 赤石脂 禹余糧各一兩 艾葉 柏葉 附子炮去皮 各半兩 熟地黃洗焙 當歸酒浸 續斷各二兩

(8) 涼血地黃湯

治婦人血崩 是腎水真陰 不能鎮守胞絡相火 故血走而崩也

生地黄 當歸各五分 黃連 黃蘗 知母 蘘本 川芎 升麻各二分 柴胡 羌活 防風各三錢 黃芩 甘草炙 細辛 荊芥 蔓荊子各一分 紅花少許

(9) 金華散

治婦人經血 得熱 崩漏不止

延胡索 當歸 瞿麥 牡丹皮 威靈仙 各七錢半 乾葛五錢 蒲黃五錢 石膏二兩

(10) 黃芩湯

治崩中下血

黃芩研爲細末 燒秤錘 滓酒 調下三錢 食前服

(11) 如神散

治婦人血崩不止 赤白帶下

香附子 赤芍藥 等分 爲末 鹽一捻 水二鍾 煎至一鍾 去滓 食前 溫服

(12) 當歸龍骨丸

治月事失常 經水過多 帶下淋瀝 無問久新 赤白諸症 并產後 惡物不止 或孕婦 胎動不安 疼痛漏下 及大人小兒下痢 正宜服之

當歸 芍藥 黃連 槐子 艾葉炒 茯苓各五錢 龍骨 黃柏各一兩 木香二錢半

(13) 解毒四物湯

治婦人經脈不住 或如豆汁 五色相雜 面色痿黃 臍腹刺痛 寒熱往來 崩漏不止 並宜服之

黃連 黃柏 黃芩 山梔子 當歸 川芎 白芍藥 熟地黄各一錢

(14) 栝黃散

療經血不止

黃芩一兩一錢半 當歸 柏葉 蒲黃各一兩 生薑半兩 艾葉二錢五分 生地黄六兩 伏龍肝二兩

(15) 芎心丸

治婦人四十九歲以後 天癸當住 每月却行 或過多不止

黃芩新枝條者二兩重以米醋沈七日乾又炙如此七次

(16) 黃蘗子散

治月事不止 煩渴悶亂 心腹急痛 肢體困倦 不美飲食

黃蘗子 當歸 芍藥 生地黃 人蔘 白朮 知母 石膏 各一錢 川芎 桔梗 甘草 紫堯 柴胡 槐花子各二分半

(17) 小蘇湯

小蘇莖葉研取汁一鍾 生卞汁一盞 白朮半兩

(18) 奇效四物湯

治血崩

四物湯 艾葉 阿膠炒 黃芩

(19) 如聖散

治婦人血崩

棕櫚 烏梅各一兩 乾薑一兩半 並燒過存性

(20) 十灰丸

治崩中 下血不止

黃絹灰 馬尾灰 藕節灰 艾葉灰 蒲黃灰 蓮蓬灰 油髮灰 棕櫚灰 赤松皮灰 綿灰各等分

(21) 荊芥散

治婦人崩中 連日不止

用荊芥穗 以燈盞多着燈 好麻油 點燈 就上 燒荊芥 焦色 爲末 每服三錢 童子小便 調下。

(22) 獨聖散

治婦人血崩不止

用防風去芦 隨多少 爲末 酒煮麵清 調下二錢 空心 日二錢 更以麵 作湖 酒投之 極險

(23) 當歸散

治婦人血崩不止

當歸 龍骨燒赤 香附子炒 各一兩 棕毛灰五錢

(24) 必效散

治婦人月水經不調 及崩漏不止

棕皮燒 木賊去節燒灰尊姓 各二兩 麝香研一錢

(25) 備金散

治婦人血崩不止

香附子炒四兩 當歸一兩二錢 五靈脂一兩

(26) 蓮蓬散

治經血不止

用蓮蓬 燒灰存性 爲細末 每服二錢 調下。

10) 《赤水玄珠全集》²²⁾

(1) 獨聖散

治肝經有風血崩

防風去叉蘆 爲末，每服二錢，空心食煎，酒煮白麵 清飲調下極險

(2) 神應散

治血虛內熱，血不歸經而崩

桂心燒存性 爲末，每服一，二錢，米飲調下

(3) 黃芩湯

治崩中下血，陽乘陰，經水沸溢

黃芩爲末，每日二錢，燒秤鎚碎酒調下。

(4) 伏龍肝散

治氣血勞傷，衝任經虛，血非時崩下，臍腹疼痛，脈 遲弱，食或小或赤白帶下

伏龍肝 赤石脂 麥冬各一兩 灸甘草半兩 川芎三兩 當歸 乾薑七錢半 桂心半兩 艾葉三兩 熟地二兩 每 服六錢，棗一枚，水煎服

(5) 備金散

治婦人血崩不止

香附子炒四兩 當歸尾一兩二錢 五靈脂炒一兩 空 心酒調服五錢。

(6) 縮砂散

治血崩

縮砂仁不以多少，於新瓦上炒香爲末，米飲調下三 錢

(7) 桂枝茯苓丸

治婦人有症在臍上動，下血不止

桂枝 茯苓 桃仁去皮尖 炒 芍藥 丹皮去心 各等分 爲末，煉蜜爲丸，梧桐子大，

(8) 益胃升陽湯

黃芪二錢 人蔘 神曲炒各一錢半 升麻 柴胡 各五 分 白朮三錢 當歸身 甘草炙 陳皮一錢 生黃芩二錢

(9) 柴胡調經湯

治經水不止，下皆鮮血，項筋急，腦痛，脊骨強痛， 不思飲食

羌活 獨活 蘗本 升麻 各五分 蒼朮一錢 葛根 當 歸 甘草炙 各三分 紅花少許。

(10) 栝黃散

療經血不止

黃芩一兩二錢半 側柏葉 蒲黃 各一兩 伏龍肝一兩

(1) 黃芩湯

治經血不止

黃芩五分 川芎 側柏葉 蒲黃各四分 艾葉一分 生地二錢半 伏龍肝二錢

11) 《萬病回春》²³⁾

(1) 溫清散

治婦人經水不住 或如豆汁 五色相雜 面色痿黃 臍腹刺痛 寒熱往來 崩漏不止

當歸 白芍 熟地黃 川芎 黃連 黃芩 黃柏 梔子各一錢半

(2) 益母湯

治婦人血崩

當歸 川芎 白芍 熟地黃 條芩 陳皮 香附 阿膠 各一錢 益母草 白朮各一錢半 玄蔘 蒲黃炒各八分 甘草四分

(3) 五灰散

治血不止成崩漏

蓬蓬殼 黃絹 血餘 百草霜 棕皮 牛角燒灰 加山柃炒黑 蒲黃炒 黑墨 血竭 共爲細末 調入煎藥服之 或煉蜜爲丸每服五十丸清米湯送下

(4) 樗白湯

治崩漏不止

樗白皮二錢 枯芩一錢半 熟地黃一錢 當歸頭一錢半 地榆一錢 川芎一錢 白芍酒炒八分 生地黃七分 伏龍肝一錢 艾葉五分 右剉一劑水二鐘 醋一匙 煎入分空心腹 三五劑卽愈

12) 《葉天士女科》²⁴⁾

<崩漏標本證治>

(1) 加減四物湯

當歸尾,生地黃,川芎,赤芍,白芷,荊芥穗炒黑,甘草各一錢,水煎服.

(2) 十灰丸

藕節,艾葉,側柏葉,棕櫚皮,頭髮,大蘄,小蘄,牡丹皮,乾薑,白茅根各燒灰存性爲末 等分 醋炙 糯米糊丸.

(3) 地黃湯

白芍,生地黃,當歸身,川芎各一錢,羌活,防風,柴胡,荊芥穗炒黑,升麻炒,甘草各七分 黃芩 酒炒,黃連薑汁炒,黃柏酒炒,蘘本,蔓荊子各五分,細辛,紅花各一分 水煎空心腹.

(4) 奇效四物湯

生地黃,川芎,當歸,白芍酒炒,阿膠,艾葉,條芩酒炒各一錢,姜五片水煎空心腹.

(5) 加減補中益氣湯

人蔘三錢,黃芪蜜炒,白朮蜜灸,白芍酒炒,當歸身,川芎,陳皮各一錢,柴胡,白芷,茯苓,黃柏酒炒,知母酒炒,生地黃各七分,炙甘草五分,姜三片,棗二枚

<崩漏虛實證治>

(6) 舉元益血丹

人蔘三錢,白朮蜜灸,當歸,熟地黃各二錢 黃芪蜜灸三錢,白芍酒炒,條芩,炙甘草各一錢,升麻炒五分

(7) 四物涼膈湯

當歸身,赤芍,川芎,生地黃,黃芩酒炒,黃連,連翹去心,桔梗,甘草,薄荷葉,嫩竹葉,共爲細末韭菜汁調服

(8) 獨行散

五靈脂一兩炒令烟盡 極研細末.

(9) 荊防五積散

蒼朮二錢,荊芥,防風,陳皮,各一錢 厚朴薑汁炒,桔梗,枳殼,當歸,乾薑,白芍,茯苓,各八分 白芷,川芎,半夏製,肉桂,各七分 甘草六分 姜三片,葱二莖,醋水各半煎服

(10) 備金散

香附炒黑四兩,當歸尾一兩二錢 五靈脂炒令烟盡一兩 共爲末每服二錢 醋調空心服

(11) 十灰散

百草霜,側柏葉,蓬蓬殼,棕櫚皮,油頭髮,黃絹,艾葉,藕節,白茅根,蒲黃,阿膠,各等分燒灰存性 共研細末 入阿膠末和勻每服三錢

(12) 八珍湯

人蔘,白朮,茯苓,各二錢 炙甘草一錢,熟地黃,當歸,各三錢 白芍二錢,川芎一錢,水二鍾煎一鍾服

<崩漏不止證治>

(13) 補中養胃湯

人蔘,白朮,當歸,側柏葉炒,生地黃,各一錢 炙甘草五分 茯苓,川芎,蘇葉各八分

<鬱氣崩漏>

(14) 開鬱四物湯

香附米炒,當歸身,白芍酒炒,熟地黃,白朮,各一錢 川芎,黃芪蜜灸,蒲黃炒,地榆,人蔘各五分 升麻炒三分.

<腎虛崩漏>

(15) 涼血湯

當歸,生地黃,各一錢 黃連,黃芩,黃柏酒炒,知母酒炒,

防風,荊芥,各八分 細辛,蔓荊子,羌活,各六分 藥本四分,甘草,升麻,各三分

<怒後崩漏>

(16) 養血湯

當歸,白芍,白朮,茯苓,香附,青皮,柴胡,各一錢 炙甘草五分

<崩久不止>

(17) 鷄子湯

鷄子三個,葱三莖,薑一兩 將葱薑共搗如泥 鷄子去殼 和勻入麻油半兩 鍋內同炒 酒煮溫服

(18) 加味四物湯

熟地黃三錢,川芎,當歸,玄胡索,烏藥,各一錢 白芍,小茴香,各八分 薑三片

<久崩成漏>

(19) 補中益氣湯

人蔘三錢,黃芪蜜炙,白朮蜜炙,白芍酒炒,當歸身,川芎,各一錢 陳皮一錢,柴胡七分,炙甘草五分,薑三片棗二枚

(20) 鹿角丸

當歸身,茯神,龍骨煨,阿膠,柏子仁炒,香附酒炒,山藥,各二兩 川芎,川續斷,各一錢 炙甘草五分 共爲末 取白茅根搗汁糊丸 補中益氣湯送下七十丸 空心腹

<崩後下白帶>

(21) 補經固真湯

乾薑研末,人蔘,各二錢 郁李仁,柴胡,炙甘草,陳皮,黃芩,各一錢 白葵花

(22) 養陰丸

龜板酒炒,黃柏酒炒,枳殼,乾薑,炙甘草,爲末 醋丸日服二次 溫湯下

<漏下不止>

(23) 黃龍湯

黃芪一錢五分,當歸,白芍,白朮,蒼朮米泔沈,陳皮,各一錢 生地黃,炙甘草,各三錢 熟地黃五錢,柴胡二錢,水煎服

13) 《醫宗金鑒》⁸⁾

(1) 補中益氣湯

黃芪 人蔘 白朮 甘草炙 各一錢 當歸 陳皮 各七分 升麻 柴胡各三分 姜棗水煎服

(2) 益胃升陽湯

黃芪二錢 人蔘一錢 神曲炒一錢五分 白朮三錢 當

歸 陳皮 甘草炙各一錢 升麻 柴胡各五分 生黃芩二錢

上爲粗末,每服三錢或五錢. 如食添,再加之;如食減,只服三錢,或更減之,不可多服.水煎去滓熱服

(3) 升陽除濕湯

黃芪 蒼朮 羌活各一錢五分 防風 藥本 升麻 柴胡 甘草炙各一錢 獨活五分 蔓荊子七分

上咬咀,水五大盞,煎至一大盞,去滓,稍熱服.

(4) 失笑散

五靈脂 蒲黃各等分

上爲末,先用醋調二錢,熬膏,入水一盞,煎至七分,食前熱服 良驗

(5) 地榆苦酒煎

地榆一兩

醋煎,露一宿,次阜溫服立之.止後隨証調治之.

14) 《醫學心悟》²⁵⁾

(1) 加味四物湯

大熟地 當歸 白芍各一錢五分 川芎五分 加 丹皮 阿膠 黃芩 黑山梔

(2) 八珍湯

治氣血虛,發熱潮熱

人蔘 白朮 茯苓 甘草炙 熟地 當歸 白芍各一錢 川芎五分 棗二枚,水煎服

(3) 獨聖丸

治瘀血凝積 瘀血不去,則新血不得歸經,此丸主之 虛人以補藥相間而用

五靈脂去土炒烟盡 爲末. 醋丸綠豆大 每服一二錢,淡醋水下,清酒亦得

(4) 加味逍遙散

治肝經鬱火,胸肋脹痛,或作寒熱

柴胡 甘草 茯苓 白朮 當歸 白芍 丹皮 黑山梔各一錢 薄荷五分 水煎服

(5) 四君子湯

人蔘 白朮 茯苓 炙甘草各一錢 大棗二枚 生薑一片 水煎服

(6) 歸脾湯

白朮 人蔘 當歸 棗仁炒 白芍各一錢 黃芪一錢五分 遠志去心泡七分 甘草炙五分 圓眼肉五枚 水煎服

(7) 十全大補湯

八珍湯 加 黃芪,肉桂

15) 《傳青主男女科》²⁶⁾

<血崩昏暗>

(1) 固本止崩湯

大熟地九蒸一兩 白朮土焦炒一兩 黃芪三錢 當歸五錢 黑薑二錢 人蔘三錢 水煎服

<年老血崩>

(2) 加減當歸補血湯

當歸一兩 黃芪一兩 三七根末三錢 桑葉十片 水煎服二劑而血少止;四劑不再發

<少婦血崩>

(3) 固氣湯

人蔘一兩 白朮五錢 大熟地五錢 當歸三錢 白茯苓二錢 甘草一錢 杜沖炒黑三錢 山萸肉蒸二錢 遠志去心一錢 五味子炒十立 水煎服

<交感血出>

(4) 引精止血湯

人蔘五錢 白朮土炒一錢 茯苓三錢 熟地九蒸一兩 芥穗三錢 黑薑一錢 黃柏五分 山萸肉五錢 車前子酒炒五錢 水煎,連服四劑愈;十劑不再發

<鬱結血崩>

(5) 平肝開鬱止血湯

白芍酒炒一兩 白朮土炒一兩 當歸一兩 丹皮三錢 生地酒炒三錢 甘草二錢 三七根研末三錢 黑芥穗二錢 柴胡一錢 水煎服

<閃跌血崩>

(6) 逐瘀止血湯

生地酒炒一兩 大黃三錢 赤芍三錢 丹皮一錢 枳殼炒五錢 當歸尾五錢 龜板醋炙三錢 桃仁泡炒研十粒 水煎服

<血海太熱血崩>

(7) 清海丸

大熟地九蒸一斤 山萸蒸十兩 山藥炒十兩 麥冬六十兩 北五味炒二兩 丹皮十兩 白朮土炒一斤 白芍酒炒一斤 地骨皮十兩 龍骨二兩 元麥一斤 乾桑葉一斤 沙蔘十兩 石斛十兩 上十四味合為細末煉蜜丸桐子大早晚每服五錢 白滾水送下

16) 《六科準繩》²⁷⁾

(1) 固經丸

艾葉 赤石脂煨 補骨脂炒 木賊各半兩 附子炮一枚 為末陳米飯和丸如梧子大每服二十九食前溫酒下米飲

亦可

(2) 芎藭湯加芍藥方

芎藭 當歸 芍藥各等分 咬咀每服四錢水一盞半煎至七分去滓熱服無時

(3) 熟乾地黄散

治產後崩中頭目旋運神思昏迷四肢煩亂不知人事
熟乾地黄 伏龍肝 黃芪 赤石脂各一兩 阿膠 甘草 白朮 艾葉炒 川芎 人蔘各半兩 當歸七錢半 咬咀每服四錢水一盞半薑三片煎至七分去滓溫服

(4) 白芍藥散

治產後崩中下血淋瀝不絕黃瘦虛損
白芍藥 牡蠣 乾薑 熟乾地黄 桂心 黃芪 烏賊魚骨 鹿角膠 龍骨各一兩 為末每服二錢食前溫酒下

(5) 阿膠丸

治產後崩中下血不止虛羸無力
阿膠 赤石脂各一兩半 續斷 川芎 當歸 甘草 丹蔘 各一兩 龍骨 鹿茸 烏賊魚骨 鱉甲各二兩共為細末煉蜜丸如梧子大空心溫酒下二三十丸

(6) 菖蒲酒

治產後崩中下血不止
菖蒲一兩半細剉以酒二盞取一盞去滓分溫三服食前

(7) 瑞蓮散

治產後惡血崩漏狀如泉水
瑞蓮百枚燒存性 棕櫚燒存性 當歸 桂心各一兩 鯉魚鱗燒 川芎各七錢半 檳榔二枚 為細末每服三錢煨薑酒調下

17) 《女科輯要》²⁸⁾

(1) 奇效四物湯

治陰血不足 陽邪有餘 為失血內崩
當歸 川芎 白芍炒 熟地以上為四物 阿膠 艾葉 黃芩炒 各一錢

(2) 加味逍遙散

治肝經風熱 怒動肝火
當歸 白芍 柴胡 甘草 茯苓 白朮 丹皮 黑梔 加薄荷, 薑, 棗煎

(3) 女人因氣不先理, 然後血脈不順, 生崩帶諸症. 香附是婦人仙藥, 醋炒為末, 久服為佳, 每服二錢, 清米飲調下

(4) 瘀而腹痛, 血行則痛止. 崩而腹痛, 血住則痛止. 芎藭湯加薑, 附, 止其血而痛自止.

(5) 有婦患崩，過服寒藥，脾胃久虛，中病未已，寒病復起，煩渴引飲，粒米不進，昏憤時作，脈洪大，按之微弱。此無根之火，內虛寒而外假熱也，十全大補加附子，崩減，日服八味丸而愈。

(6) 有久患崩，服四物湯涼血劑，或作或止，有主降火。加腹痛，手足厥冷，此脾胃虛寒所致，先用附子理中湯，次用濟生歸脾，補中益氣湯

(7) 崩證極驗方

地榆二錢 生地四錢 白芍三錢 川連五分 黃芩一錢 五分 甘草炒八分 蓮鬚一錢 丹皮錢半 黑梔一錢 牡蠣二錢

18) <胎產心法>²⁹⁾

(1) 尊生升舉大補湯

治產後血塊痛止崩證

人蔘 當歸 白朮土炒 各二錢 川芎 麥冬去心 黃芪 蜜炙 各一錢 熟地三錢 陳皮 炙草 白芷 荊芥穗炒黑 升麻 血餘灰 各四分 棗二枚 水煎服

(2) 千金伏龍肝湯

治勞傷衝任，崩中去血，赤白相兼，或如豆汁，臍腹冷痛，口乾食少

伏龍肝如彈子大七枚 生薑 生地 各一兩五錢 甘草 艾葉 赤石脂 桂心 各六錢

19) <醫方集解>³⁰⁾

(1) 固經丸

治經行不止 及崩中漏下 紫黑或塊

龜板炙四兩 芍藥酒炒 黃蘗酒炒三兩 黃芩炒二兩 香附童便酒炒 梔皮炒兩半 酒丸

(2) 升陽舉經湯

治崩漏 身熱自汗 短氣 倦怠懶食

補中益氣湯 加白芍 黑梔子 薑三片 棗三枚煎

(3) 升陽舉經湯(蘭室秘藏)

黃耆，當歸，白朮，各三錢 羌活，防風，藥本，各二錢 獨活，附子炮，甘草炙，各錢半 人蔘，熟地，川芎，各一錢 細辛，六分 桃仁，十個去皮尖研 紅花，肉桂，芍藥各五分 每服三錢。漸加至五錢 治經水不止

(4) 如聖散

治崩漏不止

檳榔燒 烏梅一兩 黑薑兩半 爲末 每服二錢 烏梅湯下

20) <東醫寶鑑>¹⁰⁾

(1) 備金散

治血崩不止

香附子炒黑四兩 當歸尾一兩二錢 五靈脂炒一兩 爲末每二錢醋湯調空心服

(2) 解毒四物湯

治崩漏面黃腹痛

黃芩 黃連 黃柏 梔子 生乾地黃 當歸 白芍藥 川芎 各一錢。

(3) 涼血地黃湯

治血崩是腎水陰虛不能鎮守胞絡相火故血走而崩

羌活 防風 柴胡 各一錢 生地黃 當歸各五分 知母 黃柏 荊芥 細辛 蔓荊子 黃芩 川芎 藥本 黃連 升麻 甘草 各三分 紅花一分

(4) 固經丸

治經水過多

黃芩 白朮 龜板 各一兩 椿根白皮一錢 黃柏炒三錢 香附子童便浸焙二錢半 爲末酒糊丸梧子大白湯下 五七十九

(5) 開鬱四物湯

治崩漏多因心氣所使而下故貴奪勢先富後貧皆是也

香附米炒 當歸身 白芍藥酒炒 熟地黃 白朮各一錢 川芎 黃芪 蒲黃炒 地榆 人蔘各五分 升麻三分

(6) 升陽調經湯

治內傷中氣下陷暴崩不止

柴胡 羌活 蒼朮 黃芪各一錢 當歸 防風 升麻 藥本 甘草各七分 蔓荊子五分 獨活三分

(7) 益胃升陽湯

治血塊暴下並水泄俱作是前後二陰有形血脫竭於下也血脫益氣古聖人之法此 陽生陰長之義也

白朮一錢半 黃耆一錢 人蔘 神曲炒各七分半 當歸身 陳皮 甘草炙五分 柴胡 升麻各三分 生黃芩二分

(8) 升揚除濕湯

治崩漏不止因脾胃虛而心包乘之故血漏而下

黃芪 蒼朮 羌活各一錢 柴胡 升麻 防風 藥本 炙甘草 各七分 蔓荊子五分 獨活 當歸各三分

(9) 柴胡調經湯

治同上

蒼朮一錢半 柴胡一錢 羌活 獨活 藥本 升麻各七分 葛根 當歸 甘草各五分 紅花二分

(10) 伏龍肝散

治衝任經虛崩漏不止臍腹冷痛

川芎 艾葉各一錢半 伏龍肝一錢 赤石脂 麥門冬各七分 當歸 乾薑 熟地黃 肉桂 甘草各五分 右剉作一貼入棗二枚水煎服或爲末米飲調二錢服

(11) 丁香膠艾湯

治崩漏不止間有如茅屋漏水或下白帶臍下如水

當歸一錢半 生艾葉一錢二分 阿膠珠七分 川芎 丁香各五分 熟地黃 白芍藥各四分

(12) 當歸芍藥湯

治經漏不止氣弱困倦此中氣虛弱下陷之甚

蒼朮 白朮 當歸 白芍藥各一錢半 黃芪一錢 陳皮 熟地黃各五分 灸甘草 生地黃各三分 柴胡二分

(13) 奇效四物湯

治血崩神效

四物湯加阿膠珠 艾葉 黃芩共七錢 右剉作一貼薑五片煎服

(14) 如聖散

止血崩

棕櫚 烏梅各一兩 乾薑一兩半 右並燒存性爲末每二錢烏梅湯酒調下空心

(15) 立效散

治血崩

當歸 蓮花榮 白綿子 紅花 茅花各一兩 右剉紙包鹽泥固濟火煨存性爲末入麝香少許每二錢溫酒調下空心

(16) 全生活血湯

治崩漏太多昏冒不省瞑目無所知覺蓋因血暴亡也血去則心神無所養暴損氣血豈能久活今當補而升舉之助其陽則目張神不昏迷矣今立一方補血養血生血益陽以補手足厥陰之不足

白芍藥 升麻各一錢 防風 羌活 獨活 柴胡 當歸身 葛根 甘草 各七分 藥本 川芎各五分 生地黃 熟地黃各四分 蔓荊子 細辛各三分 紅花一分 右剉作一貼水煎服

21)《濟衆新編》³¹⁾

(1) 備金散

治血崩不止

香附子炒黑四兩 當歸尾一兩二錢 五靈脂炒一兩 右末每二錢炒湯調空心腹

(2) 涼血地黃湯

治腎水虛不能鎮胞絡相火爲血崩

羌活 防風 柴胡各一錢 生地黃 當歸 各五分 知母 黃柏 荊芥 細辛 蔓荊子 黃芩 川芎 藥本 黃連 升麻 甘草各三分 紅花一分

(3) 開鬱四物湯

治故貴奪勢先富後貧因心氣所使而下爲崩漏

香附米炒 當歸身 白芍藥酒炒 熟地黃 白朮各一錢 川芎 黃芪 蒲黃炒 地榆 人蔘 各五分 升麻三分

(4) 伏龍肝散

治衝任經虛崩漏不止臍腹冷痛

川芎 艾葉各一錢五分 伏龍肝一錢 赤石脂 麥門冬各七分 當歸 乾薑 熟地黃 官桂 甘草各五分 棗二枚煎服或末米飲調二煎服

(5) 奇效四物湯

治血崩神效

四物湯加 阿膠珠 艾葉 黃芩共七錢薑五片

(6) 全生活血湯

治崩漏多血暴亡心神無所養昏冒不省瞑目

白芍藥 升麻各一錢 防風 羌活 獨活 柴胡 當歸身 葛根 甘草 各七分 藥本 川芎各五分 生地黃 熟地黃各四分 蔓荊子 細辛各三分 紅花一分

22)《中醫婦產科學》¹⁴⁾

<血熱型>

(1) 養陰止血湯

生地八錢,生白芍三錢,黃芩三錢,元蔘三錢,石斛三錢,地骨皮三錢,煨牡蠣一兩,花蕊石一兩,棕櫚炭四錢,側柏葉五錢,藕節炭四錢。

(2) 清經止血湯

鮮生地一兩,當歸炭三錢,生白芍三錢,丹皮三錢,槐花四錢,旱蓮草五錢,仙鶴草五錢,炒蒲黃四錢,熟軍炭錢半

(3) 十灰散

大小薊,荷葉,側柏葉,茅根,西草根,大黃,山梔,棕櫚,丹皮。日服兩次,每次錢半至一錢

<氣虛型>

(4) 歸脾湯

人蔘三錢,白朮三錢,茯神三錢,酸棗仁三錢,當歸二錢,黃芪三錢,遠志錢半,桂圓肉二錢,木香錢半,甘草一錢,紅棗五只,生薑三片。

(5) 固本止崩湯

熟地一兩,白朮五錢,黃芪三錢,人蔘三錢,當歸三錢,

炮薑五分

(6) 膠艾湯加味

阿膠三錢,艾葉一錢,熟地五錢,當歸三錢,白芍三錢,
川芎一錢,炙甘草一錢,黨參三錢,黃芪三錢.

(7) 獨蔘湯

吉林參四錢至五錢,濃煎.

(8) 蔘附湯

吉林參五錢,熟附塊四錢,濃煎

(9) 參三七末一錢吞服

(10) 黨參五錢,黃芪五錢,仙鶴草五錢,濃煎,加參三七
末一錢半,分三次吞服.

<血瘀型>

(11) 四物湯合失笑散

生地四錢,赤芍二錢,當歸二錢,川芎錢半,蒲黃三錢,
五靈脂三錢.

(12) 逐瘀止血湯

生地四錢,當歸二錢,赤芍二錢,丹皮二錢,龜板三錢,
桃仁錢半,枳殼錢半,熟軍炭二錢.

(13) 震靈丹

乳香,沒藥,五靈脂,硃砂,紫石英,大赭石,赤石脂,禹余
糧.

23) 《中醫婦科學》¹¹⁾

<血熱型>

(1) 保陰煎加沙蔘,麥冬,五味子,阿膠.

(2) 上下相資湯

人蔘,沙蔘,玄蔘,麥冬,玉竹,五味子,熟地,棗皮,車前子,
牛膝

(3) 清熱固經湯加沙蔘

生黃芩 焦梔子 大生地 地骨皮 地榆 阿膠 生藕節
陳棕炭 炙龜板 牡蠣粉 生甘草

(4) 滋水清肝飲

柴胡 當歸 白芍 山梔 棗皮 茯苓 淮藥 丹皮 澤瀉
生地 大棗

(5) 三妙紅藤湯

黃柏 蒼朮 苡仁 紅藤 敗醬 大薊 小薊 仙鶴草 益
母草 香附 夏枯草

<腎虛型>

(6) 右歸丸去肉桂,當歸,加黃耆,覆盆子,赤石脂

製香附 肉桂 熟地 山藥 山茱萸 枸杞子 兔絲子
鹿角膠 當歸 杜沖

(7) 通脈大生丸

杜沖 續斷 兔絲子 艾葉 肉蓯蓉 紫河車 鹿角霜
枸杞子 首烏 當歸 砂仁 茯苓 山藥 台烏 車前子

(8) 贊育丹

杜沖 仙茅 巴戟 淫羊藿 兔絲子 蛇床子 熟地 棗
皮 肉蓯蓉 當歸 白朮

(9) 左歸丸去牛膝合二至丸

熟地 山藥 枸杞子 山茱萸 牛膝 兔絲子 鹿角膠
龜板

(10) 補腎調經湯

熟地 製首烏 枸杞子 黃精 桑寄生 鹿角霜 金櫻子
兔絲子 續斷 黨參 白朮 甘草

(11) 大造丸去牛膝

紫河車 杜沖 生地 天冬 麥冬 黃柏 龜板 人蔘 牛
膝

<脾虛型>

(12) 固本止崩湯去當歸,加升麻,山藥,大棗,五賊骨

人蔘 黃耆 白朮 熟地 當歸 黑薑

(13) 濟生歸脾湯

人蔘 黃芪 白朮 甘草 當歸 龍眼肉 茯神 棗仁 木
香

(14) 補腎固衝丸

兔絲子 續斷 阿膠 鹿角霜 巴戟 杜沖 枸杞 當歸
黨參 白朮 砂仁 熟地 大棗

<血瘀型>

(15) 四物湯合失笑散加三七粉 茜草炭 五賊骨

(16) 紅花桃仁煎

紅花 桃仁 熟地 當歸 川芎 白芍 丹蔘 延胡 香附
青皮

(17) 開鬱四物湯

香附 白芍 當歸 川芎 熟地 人蔘 黃芪 白朮 升麻
地榆 蒲黃

24)《方藥合編》³²⁾

(1) 益胃升陽湯

治內傷諸症 血脫 益氣 古聖人之法 先理胃氣 以
助生發之氣

白朮一錢半 黃芪一錢 人蔘 神麴炒各七分半 當歸
身 陳皮 炙甘草各五分 升麻 柴胡各三分 生黃芩二
分

(2) 全生活血湯

治崩漏過多 昏冒不省 此補血 養血 生血 益陽 以補手足厥陰

白芍藥 升麻各一錢 防風 羌活 獨活 柴胡 當歸身 乾葛 甘草各七分 藁本 川芎各五分 生地黃 熟地黃各四分 蔓荊子 細辛各三分 紅花一分

(3) 壽脾煎

治脾虛不能攝血 或誤用攻伐 犯損脾陰 或婦人無火 崩淋 等證

人蔘二錢 白朮 當歸 山藥 乾薑炮各二錢 酸棗仁炒一錢半 炙甘草一錢 遠志五分 蓮肉二十枚

(4) 復元養榮湯

治崩漏過多 心神恍惚 虛暈

人蔘一錢半 當歸 白芍藥 黃芪 酸棗仁炒 地榆 白朮各一錢 荊芥八分 遠志五分 甘草三分

(5) 舉元煎

治氣虛下陷 血崩 血脫

人蔘 黃芪炙各三-五錢 甘草 白朮炒各一-二錢 升麻炒五-七分

(6) 歸脾湯

治憂思 勞傷心脾 健忘 怔忡

當歸 龍眼肉 酸棗仁炒 遠志 人蔘 黃芪 白朮 白茯苓神各一錢 木香五分 甘草三分 薑五 棗二

崩帶日久倍蔘 加地榆荊防升麻之類

25) 《漢方臨床學》³³⁾

(1) 人蔘, 白朮 各12g, 熟地黃6g, 川芎, 黃芪 各4g, 白芷, 荊芥炒黑, 羌活, 防風, 陳皮, 黃連, 黃柏炒各2g

(2) 脾虛食少하여 자궁출혈이 있을때는 다음방을 응용한다

人蔘, 白朮, 茯苓, 半夏, 陳皮, 當歸, 川芎 各8, 柴胡, 五靈脂炒黑, 甘草 各4 薑三 棗二

(3) 자궁출혈 과다로 인해 정신이 혼미하고 힘이 없는 증 에는 加味芎歸湯이 좋다

川芎, 當歸 各 22g, 鹿茸12g, 人蔘20g, 益母草12g, 艾葉8g

(4) 열이 조금 있고 氣血兩虛로 인하여 漏血不止 한증에는 十全大補湯을 달인 물에 香附子 五靈脂를 새까맣게 태워서 분말로 만들어 타서 20첩을 복용한다.

(5) 성생활을 과도하게 하여 발생된 고감출혈에

는 引精止血湯이 效果가 있다.

白朮土炒, 熟地黃 各 20g, 人蔘. 山茱萸 各12g, 茯苓, 車前子, 荊芥炒黑, 乾薑炒黑 各4g, 黃柏2g

(6) 출혈하면서 가슴이 뛰고 머리가 어지럽고 氣虛한 證이있으면 加味歸脾湯을 응용한다.

黃芪, 人蔘, 白朮, 白茯苓, 龍眼肉, 酸棗仁炒, 荊芥穗炒黑, 地榆炒黑 各6g, 遠志3g, 木香2g, 牡蠣8g, 阿膠8g, 甘草2g, 生薑3편 大棗2매

(7) 환자가 崩漏가 있으면서 신경과민으로 정서적 불안에 의하여 우울한 증상이 있으면 平肝開鬱湯을 使用하는 것이 좋다.

白芍炒, 白朮土炒, 當歸水洗, 香附子炒 各12g, 牡丹皮, 乾地黃酒炒, 荊芥穗炒黑 各8g, 甘草, 柴胡 各4g을 물에 달이고 五靈脂를 새까맣게 태워서 분말로 만들어 4g을 타서 20첩 정도를 복용하면 效果가 있다.

(8) 환자가 崩漏가 있으면서 타박상 또는 기타원인으로 자궁 내에 瘀血이 있어 止血劑가 效果가 없을 때는 加味桂枝茯苓湯이 좋다

桂枝, 芍藥, 當歸尾, 牡丹皮, 各 8g, 桃仁研, 大黃 各4g

(9) 脾胃가 虛弱하여 崩漏가 오래 멎지 않는 환자는 加味益胃升陽湯이 效果가 있다.

人蔘, 白朮土炒 各8g, 當歸身, 陳皮, 升麻, 柴胡, 熟地黃, 乾薑炒黑, 荊芥炒黑 各4g, 黃芪, 神麩炒 各6g, 甘草炙, 黃芩各2g, 生薑3편 棗2매

(10) 崩漏症 通用方으로는 黃芪升舉湯

黃芪12g, 山藥, 當歸各9g, 升麻, 荊芥穗炒黑 各8g

26) 《晴崗醫鑑》34)

(1) 加味惜紅煎

血海不固하여 崩漏不止하는데 쓰인다

地榆炒三錢, 白芍藥炒, 白朮, 山藥炒, 續斷炒各二錢, 乾薑炒黑, 荊芥炒黑, 炙甘草各七分, 五味子十粒 烏梅二個

(2) 加味壽脾煎

脾虛로 不能攝血하여 胞宮虛損하고 崩漏下血하는데 쓰인다

人蔘, 白朮, 山藥炒各二錢, 當歸身, 酸棗仁炒, 白芍藥炒, 蓮子肉各一錢半, 乾薑炒, 炙甘草一錢, 遠志

五分

27) <<臨床婦產科學>>¹²⁾

① 腎虛

(1) 涼血地黄湯

羌活 防風 柴胡 各3.75g 生地黄 當歸 各1.87g
知母 黃柏 荊芥 細辛 蔓荊子 黃芩 川芎 藁本 黃連
升麻 甘草 各1.12g 紅花0.37g

(2) 固經丸

黃芩 白芍 龜板 各37.5g 樗皮26.25g 黃柏11.25g
香附子9.37g

(3) 育陰止崩湯

生地黄15g 山藥20g 白芍25g 山茱萸20g 杜沖15g
續斷20g 桑寄生20g 五賊20g 牡蠣50g 阿膠15g 蒲
黃炒20g 地榆炒50g

(4) 溫經湯

半夏10g 吳茱萸 生薑各6g 川芎 當歸 白芍藥 人
蔘 桂枝 阿膠珠 牡丹皮 甘草 各4g

② 氣虛

(5) 舉元煎에 阿膠炒 艾葉炒 五賊骨을 적절하게
가한다

人蔘 黃芪炙11.25g, 炙甘草3.75-7.5g, 升麻炒
1.87-2.62g, 白朮炒3.75g-7.5g

(6) 歸脾湯

人蔘11.25g, 白朮11.25g, 茯神11.25g, 酸棗仁
11.25g, 當歸7.5g, 黃芪11.25g, 遠志5.6g, 龍眼肉
7.5g, 木香 5.6g, 甘草3.75g, 紅棗五個, 生薑三片

(7) 固本止崩湯

熟地黄37.5g, 白朮18.75g, 黃芪11.25g, 人蔘11.25g,
當歸11.25g, 炮薑1.87g

(8) 膠艾湯加味

阿膠11.25g, 艾葉3.75g, 熟地黄18.75g, 當歸
11.25g, 白芍11.25g, 川芎3.75g, 炙甘草3.75g, 人蔘
11.25g, 黃芪11.25g

③ 血熱

(9) 養陰止血湯

生地30g, 生白芍11.25g, 黃芩11.25g, 元蔘11.25g,
石斛11.25g, 地骨皮11.25g, 煨牡蠣37.5g, 花蕊石
37.5g, 棕櫚炭1.5g, 側柏葉18.75g, 藕節炭1.5g .

(10) 清經止血湯

鮮生地37.5g, 當歸炭11.25g, 生白芍11.25g, 牡丹

皮11.25g, 槐花1.5g, 旱蓮草18.75g, 仙鶴草18.75g,
蒲黃生15g, 熟軍炭5.62g

④ 瘀血

(1) 四物湯合失笑散

生地15g, 赤芍7.5g, 當歸 7.5g, 川芎5.62g, 蒲黃炭
11.25g, 五靈脂11.25g

(2) 逐瘀止血湯

生地黄15g, 當歸 赤芍 牡丹皮各7.5g, 龜板11.25g,
桃仁5.62g, 枳殼5.62g, 熟軍炭7.5g

28) <<方證新編>>³⁵⁾

(1) 清經止血湯

清熱涼血 止血하므로 血熱崩漏를 治한다
生地黄 白茅根各6g 牡丹皮 黃芩 益母草 棕櫚
炭各4g 地榆 蒲黃各2.8g

(2) 固本止崩湯

補氣攝血하므로 虛火로 血崩또는 昏暈하는 자를
治한다

熟地黄 白朮各40g 當歸20g 人蔘 黃芪各12g
乾薑炮8g

(3) 獨蔘湯

大補元氣하므로 脾肺氣虛 倦怠少氣 虛熱自汗 脈
大而虛 大失血 血脫 或은 氣虛崩漏不止등을 治한다
人蔘40-100g

(4) 聖愈湯

補氣攝血하므로 氣血俱虛로 因한 月經不順 崩漏
經閉등을 治한다

人蔘 黃芪 熟地黄 白芍藥各8g 當歸 川芎各4g

(5) 歸脾湯

養心和脾 益氣補血하므로 憂思로 勞傷心脾하여
健忘 怔忡 驚悸 遺精 不眠 發熱 盜汗 思慮過度 嗜
臥 食慾不振 體痛 大便不調 月經不順등을 治한다.

當歸 龍眼肉 酸棗仁炒 遠志 人蔘 黃芪 白朮 白
茯神各4g 木香2g 甘草1.2g 薑五 棗2枚

崩漏久者는 人蔘을 倍增하고 地榆 荊芥 防風 升
麻등을 加한다

(6) 龜鹿補衝湯

補氣 養陰 止血하므로 勞傷崩漏를 治한다

黨參 黃芪 龜板 鹿角膠 烏賊骨各4g

(7) 開鬱四物湯

理氣解鬱 和營止血하므로 先貴後賤 先富後貧으

로 心氣鬱閉되어 發하는 崩漏를 治한다

香附子炒 當歸身 白芍藥酒炒 熟地黄 白朮各4g
川芎 黃芪 蒲黃炒 地榆 人蔘各2g 升麻1.2g

(8) 震靈丹

止血消瘀하므로 男子眞元衰憊 五勞七傷의 症증과 婦人血氣不足 崩中漏下 虛損帶下등을 治한다

(9) 調經止崩湯

活血行瘀하므로 血瘀崩漏를 治한다

丹蔘 香附子 玄胡索 艾葉炒 澤蘭 赤芍藥 山查炭 黑豆炒各4g

(10) 益腎升陽湯

內傷諸症을 治한다 崩漏가 오래된 데에는 人蔘을 12-20g으로 증량하고 熟地黄 乾薑炒黑 地榆를 加한다

白朮6g 黃芪4g 人蔘 神麴炒各3g 當歸身 陳皮 甘草各2g 升麻 柴胡各1.2g 黃芩0.8g

(11) 全生活血湯

補血養血 生血益陽 補手足厥陰하므로 崩漏過多하여 眩暈 昏冒不省한자를 治한다.

白芍藥 升麻各4g 防風 羌活 獨活 柴胡 當歸身 乾葛 甘草各2.8g 藁本 川芎各2g 生地黄 蔓荊子 細辛各1.2g 紅花0.4g

(12) 壽脾煎

脾虛하거나 攻瀉之劑를 誤用하여 脾陰을 損傷했을 때 或은 婦人이 陽虛無火하여 崩漏하는 症을 治한다

白朮 當歸 山藥 乾薑炮各8g 酸棗仁炒6g 甘草炙4g 遠志2g 蓮子肉20枚

(13) 參苓白朮散

內傷으로 脾胃虛弱하여 飲食을 먹지 못하고 吐瀉하는 證을 치하며 大病후에 服用하면 調理脾胃한다 人蔘 白朮 白茯苓 山藥 甘草炙各12g 薏苡仁 蓮子肉 桔梗 砂仁 白扁豆各6g

下血日久에는 地榆 荊芥炒黑 乾薑炒黑 烏梅를 加한다

(14) 舉元煎

氣虛下陷하여 血崩 血脫된 症을 治한다

人蔘 黃芪各12-20g 甘草 白朮炒各4-8g 升麻炒2-3g

29) <<診療要鑑>>³⁶⁾

(1) 補氣益元湯

勞役 勞心 傷胃諸症으로 元氣가 下陷되어 崩漏下血이 過多한데 쓴다

白朮11.25g 黃芪蜜灸7.5g 山藥5.625g 側柏葉 五靈脂炒黑 大薊 地榆炒黑 山查肉 神麴炒各3.75g 當歸身 陳皮 甘草 各2.625g 升麻 柴胡 各1.875g 黃芩酒炒1.125g 生薑三片 大棗2枚

(2) 補血固本湯

血漏諸症의 要藥인데 思慮傷心으로 心胞脈이 內崩하여 血漏 血崩이 되는데 쓴다

當歸身 川芎 白芍藥 熟地黄 各4.5g 香附子 黃芩 五靈脂炒黑 側柏葉 地榆炒黑各3.75g 白茯苓 藁本 艾葉 縮砂 甘草各2.062g

(3) 備金散

血崩證을 治한다

香附子炒黑150g 當歸尾46.87g 五靈脂炒37.5g

(4) 解毒四物湯

崩漏로 인한 面黃 腹痛證을 治한다

黃芩 黃連 黃柏 梔子 生乾地黄 當歸 白芍藥 川芎各3.75g

(5) 涼血地黄湯

腎水不足 陰虛로因하여 胞絡의 相火를 鎮壓하지 못하여 發하는 血崩證에 쓴다

羌活 防風 柴胡 各3.75g 生地黄 當歸各1.875g 知母 黃柏 荊芥 細辛 蔓荊子 黃芩 川芎 藁本 黃連 升麻 甘草各1.125g 紅花0.375g

(6) 開鬱四物湯

崩漏를 治한다 大개 先貴後賤, 先富後貧 등으로 心氣가 鬱閉된데 起因한다

香附米炒 當歸身 川芎 黃芪 蒲黃炒 白芍藥酒炒 熟地黄 地榆 人蔘 各1.875g 升麻1.125g

(7) 伏龍肝散

衝任經이 虛해서, 崩漏가 不止하고, 臍腹이 冷痛한 證을 治한다

川芎 艾葉各5.625g 伏龍肝3.75g 赤石脂 麥門冬 各2.625g 當歸 乾薑 熟地黄 肉桂 甘草各1.875g 大棗2枚

(8) 丁香膠艾湯

崩漏가 年久不止하며, 간혹 茅屋의 漏水와 같은 것 或은 白帶下가 流出되며 臍下部가 얼음같이 寒

冷한데 쓴다

當歸5.625g 生艾葉4.5g 阿膠珠2.625g 川芎 丁香
各1.875g 熟地黄 白芍藥各1.5g

(9) 當歸芍藥湯

蒼朮 白朮 當歸 白芍藥各5.625g 黃芪3.75g 陳皮
熟地黄各1.875g 炙甘草 生地黃1.125g 柴胡1.75g

(10) 全生活血湯

崩漏過多로 인하여 昏冒되어 人事不省하는데 쓴
다

白芍藥 升麻 各3.75g 防風 羌活 獨活 柴胡 當歸
葛根 甘草各2.625g 藁本 川芎各1.875g 生地黃 熟
地黄各1.5g 蔓荊子 細辛各 1.125g 紅花0.375g

Ⅲ. 總括 및 考察

崩漏는 血崩 血漏의 뜻으로 女性性器의 非正
常의 出血을 말한다. 崩은 ‘忽然暴下 若山崩然’의
形象이고, 漏는 ‘非時而血下 淋瀝不止’의 形象이
니 一般의 崩中 或은 血崩이라 함은 突然히
暴注하는 下血을 意味하고, 血漏 或은 漏下라고
함은 持續의 小量씩 點滴하는 下血을 意味한
다. 漏하면 淋하고, 淋하면 崩하니 微한 것과 甚한
것이 다를 뿐이며 兩者는 基本的으로 同一한 病證
이다.^{12,3)} 西洋醫學的으로 崩漏는 各種의 子宮出血
病을 概括하는 것으로 예를 들면 機能性子宮出血,
流産, 産後, 骨盤腔炎과 生殖系統의 腫瘤, 癌腫등
이 일으키는 子宮出血 모두가 崩漏의 範圍에 屬한
다⁴⁾. 또한 子宮出血^{37,38)}은 出血機轉에 따라 子
宮의 氣質의 損傷에 의한 不正出血과 排卵과 月經
에 關聯이 있는 機能性子宮出血로 區分되는데 機
能性 子宮出血이란 非器質的 或은 內分泌性 原因
에 起因되어오는 子宮出血을 말하는 것으로 近來
에는 紊亂한 性生活 中絶手術 및 七情過傷 情緒의
不安定 등으로 增加하는 趨勢이다.

崩漏의 病因 病理를 살펴보면 <黃帝內經>⁵⁾에
“陰虛陽搏,謂之崩”이라고 하였으며 巢⁶⁾는 “由勞
傷血氣, 衝任之脈虛損故也. 崩中者,臟腑傷損,衝脈
任脈 血氣俱虛故也”라고 하여 勞動過度로 인한
衝任氣虛가 崩漏의 重要한 原因으로 보았고 李¹⁸⁾

는 脾胃虛損으로 인한 中氣下陷과 故貴奪勢 或은
先富後貧으로 인한 心氣不足을 原因으로 보았다.
李⁹⁾는 崩漏의 原因에는 虛와 熱이 있으니 經行犯
房 및 勞役過度로 損傷衝任하고 膏粱厚味로 인한
脾胃濕熱과 飲食失節로 인한 脾胃下陷을 原因으로
보았으며 吳⁸⁾는 熱瘀와 損傷衝任과 脾虛로 인한
中氣下陷과 暴怒傷肝으로 인한 血妄行을 原因으로
보았으며 許¹⁰⁾는 悲哀太甚으로 인한 胞絡絶과 脾
胃虛損으로 인한 中氣下陷과 故貴奪勢 或 先富後
貧으로 인한 心氣不足 등을 崩漏의 原因으로 보았
다. 따라서 이를 총괄하여 볼 때 血熱 衝任之脈虛
損 脾虛不攝中氣陷 暴怒傷肝 悲哀太甚 故貴奪勢로
인한 心氣不足 등이 崩漏의 原因과 關聯됨을 알
수 있다.

崩漏의 治法 治方을 살펴보면 李¹⁸⁾는 脾胃虛損
에는 마땅히 大補脾胃하여 升舉益氣 한다고 하였고
故貴奪勢 或 先富後貧으로 인한 心氣不足에는 大
補氣血之藥으로 舉養脾胃하고 鎮墜心火之藥을 약
간 加味하여 心을治하고 補陰瀉陽하여야 한다고
하였다. 方²¹⁾에 의하면 “初期에는 止血法을, 中期
에는 清熱涼血法을, 末期에는 補血法을 用한다”
하였으며 龔²³⁾은 “初期에 濕熱에 屬할 경우는 마
땅히 解毒하고 조금 오래되어 虛熱에 屬할 경우는
마땅히 養血清火한다” 고하였으며 蕭¹³⁾는 “崩爲
急症, 漏爲緩病으로 崩宜理氣, 降火, 升提, 漏宜滋
陰, 養氣, 養血, 或兼制火”를 主張하였으며 羅¹¹⁾는
原因에 따라 “滋陰清熱, 瀉熱涼血, 溫腎固衝, 滋
水益陰, 補氣攝血 養血調經, 活血化瘀 해야한다”
고 하였고 <中醫婦產科學>¹⁴⁾에서는 急性일 경우
表를 治療하고 慢性일 경우 本을 治療하되 暴崩에
는 補氣止血하여 虛脫을 防止하여야 하고, 緩則 寒
熱虛實을 鑑別하여 그 本을 堅實하게 하여야 한다
고 하였다.

本論에 收錄된 29種의 文獻에 나타난 總 治方數
는 355方이고 그 中 重複되지 않은 處方의 數는
245方이었다. 그 中에서 多用된 處方은 益胃升陽
湯(7) 備金散(7) 奇效四物湯(6) 歸脾湯(6) 伏龍肝散(6)
如聖散(6) 開鬱四物湯(6) 固本止崩湯(5) 固經丸(5) 全
生活血湯(5) 膠艾湯(4) 解毒四物湯(4) 涼血地黄湯(4)
壽脾煎(4) 舉元煎(3) 當歸湯(3) 逐瘀止血湯(3) 黃芩湯

(3) 加味逍遙散(3) 獨聖散(3) 升陽除濕湯(3) 丁香膠艾湯(3) 清經止血湯(3) 等이 多用되었으며, 原因別로 分類하여보면 血熱型에는 養陰止血湯 清經止血湯 十灰散 等이 言及되었고, 氣虛型에는 歸脾湯 固本止崩湯 膠艾湯 參附湯 舉元煎 壽脾煎 益胃升陽湯 등이 言及되었고, 血瘀型에는 四物湯合失笑散 逐瘀止血湯 震靈丹 等이 言及되었고, 腎虛에는 涼血地黃湯 固經丸 等이 言及되었고, 血崩 血漏가 甚하여 眩暈을 發하며 甚하면 昏冒하여 人事不省하는 是는 全生活血湯이 言及되었고, 寒濕凝滯하여 經血不調하고 崩漏不止하면 升陽調經湯 惜紅煎 升陽除濕湯 等이 言及되었고 思慮傷脾하고 暴怒傷肝하여 氣鬱不舒하고 脇腹脹痛하며 崩漏不止에는 加味四物湯 加味逍遙散 開鬱四物湯 等을 言及하였고 心氣鬱閉에는 備金散 古橋歸丸 四製香附丸 等이 言及되었다. 또한 本論에서 言及된 崩漏治方에 對한 藥物의 構成을 살펴보면 主로 補氣助陽藥 補血養陰藥 收斂血管藥 活血通絡藥이 言及되었는데, 補氣助陽藥에는 甘草(81) 人蔘(47) 白朮(42) 黃芪(38) 鹿茸(19)等이 多用되었고, 補血養陰藥에는 當歸(137) 地黃(66) 白芍藥(62) 阿膠(37) 山藥(14)等이 多用되었고, 收斂血管藥에는 地榆(26) 禹余糧(24) 赤石脂(22)等이 多用되었고, 活血通絡藥에는 續斷(22) 蒲黃(22) 赤芍藥(13) 五靈脂(10)等이 多用되었고, 收斂精氣藥에는 龍骨(26) 牡蠣(20) 등이 主로 使用되었으며, 發散風寒藥에는 柴胡(23) 升麻(15) 細辛(12), 發散風濕藥에는 防風(15) 白芷(15), 利水通淋藥에는 茯苓(23), 通氣行滯藥에는 香附子(22), 化痰藥에는 陳皮(10) 遠志(9), 溫運中氣藥에는 乾薑(27) 木香(7), 溫和血分藥에는 川芎(42) 艾葉(38) 伏龍肝(18), 清熱燥濕藥에는 黃芩(28) 黃柏(11), 清熱涼血藥에는 牡丹皮(20)가 多用되었다. 現代人은 複雜한 生活로 因하여 지나친 思慮 혹은 飲食의 失調라든가 過勞 또는 肝氣鬱結로 因한 化熱 等에 起因하여 崩漏가 더욱 多發할 素地가 많으며 臨牀에서 흔히 接할 수 있는 疾患 中의 하나이다. 이에 그 發病의 原因을 分別하여 崩漏의 治方을 適宜하게 活用한다면 좋은 治療效果를 期待할 수 있을 것으로 思料된다.

<표 1> 文獻에 나타난 崩漏의 治方

| | |
|--------|---|
| 金匱要略 | 旋覆花湯 |
| 備急千金要方 | 慎火散 禹餘糧圓 增損禹餘糧圓 治女人白崩及痔病方 治女人忽暴崩中去血不斷或鵝鴨肝者方 治女人崩中去赤白方 當歸湯 治崩中晝夜十數行 治崩中晝夜十數行衆醫所不能瘥者方 治崩中下血服之即斷或月經來過多及過期不來者服之亦佳方 治暴崩中去血不止方 治女人白崩方 伏龍肝湯 大牛角中仁散 治崩中去血積時不止起死方 生地黃湯 治崩中漏下赤白不止氣虛竭方 治崩中下血羸瘦少氣調中補虛止血方 治崩中方 丹蔘酒 牧丹皮湯 白朮圓 治女人漏下或瘥或劇常漏不止身體羸瘦飲食減少或赤或白使人無子者方 治女人漏下不止散方 治女人產後漏下及治病下血 芎藭湯 治漏下去血不止方 治漏下神方 治漏下去黑方 治漏下去黑方 治漏下去青方 治漏下去青方 馬通湯 馬蹄圓 慎火草散 蒲黃散 |
| 女人大全良方 | 小薊湯 阿茄池圓 琥珀散 五靈脂散 荊芥散 獨聖散 神應散 金華散 如聖散 縮砂散 如神散 煮附圓 竹茹圓 如聖無比散 |
| 聖濟總錄 | 艾葉散 烏金散 沈香牡丹丸 赤石脂散 槐蛾散 馬蹄湯 地黃飲方 蒲黃散 蒲黃阿膠湯 鹿茸散 龍骨散 鱉甲散 桑耳散 桑耳續斷散 乾漆散 白朮散 續斷散 白薇散 黃香湯 生乾地黃散 紫石英湯 當歸湯 劉寄奴湯 蒲黃湯 小薊根湯 蒲黃丸 如聖散 防風散 伏龍肝湯 禹余糧丸 附子丸 續斷丸 芍藥散 馬蹄屑散 側柏丸 白石脂丸 馬蹄丸 鮑甲散 地黃湯 白芷湯 龍骨散 當歸湯 栝葉湯 二灰散 |
| 東垣十種醫書 | 升陽除濕湯 涼血地黃湯 |
| 衛生寶鑑 | 膠艾湯 伏龍肝散 丁香膠艾湯 柴胡調經湯 涼血地黃湯 益胃升陽湯 升陽舉經湯 備金散 |
| 景岳全書 | 加減一陰煎 五福飲 七福飲 保險煎 壽脾煎 秘元煎 四君子湯 四物湯 加味四物湯 奇效四物湯 增損四物湯 栝葉散 七灰散 黃芩散 歸脾湯 加味逍遙散 槐榆散 如聖散 防風黃芩丸 一味防風散 棕灰散 龍腦雞蘇丸 當歸補血湯 |

| | |
|--------|--|
| 醫學入門 | 固經丸 四製香附丸 單五靈脂散 單芩心丸 烏紗帽散 女金丹 膠艾四物湯 當歸龍骨丸 備金散 古橘歸丸 黑附丸 百子附歸丸 古黑神散 內灸散 大溫經湯 伏龍肝散 解毒四物湯 |
| 丹溪心法附餘 | 膠艾湯 伏龍肝散 神仙聚寶丹 艾煎丸 鎮宮丸 柏子仁湯 鹿茸丸 涼血地黃湯 金華散 黃芩湯 如神散 當歸龍骨丸 解毒四物湯 栝黃散 芩心丸 黃蘗子散 小蘇湯 奇效四物湯 如聖散 十灰丸 荊芥散 獨聖散 當歸散 必效散 備金散 蓮蓬散 |
| 赤水玄珠全集 | 獨聖散 神應散 黃芩湯 伏龍肝散 備金散 縮砂散 桂枝茯苓丸 益胃升陽湯 柴胡調經湯 栝黃散 黃芩湯 |
| 萬病回春 | 溫清散 益母湯 五灰散 樗白湯 |
| 葉天士女科 | 加減四物湯 十灰丸 地黃湯 奇效四物湯 加減補中益氣湯 舉元益血丹 四物涼膈湯 獨行散 荊防五積散 備金散 十灰散 八珍湯 補中養胃湯 開鬱四物湯 涼血湯 養血湯 鷄子湯 加味四物湯 補中益氣湯 鹿角丸 補經固真湯 養陰丸 黃龍湯 |
| 醫宗金鑒 | 補中益氣湯 益胃升陽湯 升陽除濕湯 失笑散 地榆苦酒煎 |
| 醫學心悟 | 加味四物湯 八珍湯 獨聖丸 加味逍遙散 四君子湯 歸脾湯 十全大補湯 |
| 傳青主男女科 | 固本止崩湯 加減當歸補血湯 固氣湯 引精止血湯 平肝開鬱止血湯 逐瘀止血湯 清海丸 |
| 六科準繩 | 固經丸 芎藭湯加芍藥方 熟乾地黃散 白芍藥散 阿膠丸 菖蒲酒 瑞蓮散 |
| 女科輯要 | 奇效四物湯 加味逍遙散 芎歸湯加薑附 十全大補湯加附子 八味丸 附子理中湯 補中益氣湯 崩證極驗方 |
| 胎產心法 | 尊生升舉大補湯 千金伏龍肝湯 |
| 醫方集解 | 固經丸 升陽舉經湯 升陽舉經湯(蘭室秘藏) 如聖散 |
| 東醫寶鑑 | 備金散 解毒四物湯 涼血地黃湯 固經丸 開鬱四物湯 升陽調經湯 益胃升陽湯 升陽除濕湯 柴胡調經湯 伏龍肝散 丁香膠艾湯 當歸芍藥湯 奇效四物湯 如聖散 立效散 全生活血湯 |
| 濟衆新編 | 備金散 涼血地黃湯 開鬱四物湯 伏龍肝散 奇效四物湯 全生活血湯 |
| 中醫婦產科學 | 養陰止血湯 清經止血湯 十灰散 歸脾湯 固本止崩湯 膠艾湯加味 獨參湯 參附湯 四物湯合失笑散 逐瘀止血湯 震靈丹 |

| | |
|--------|--|
| 中醫婦科學 | 保陰煎 上下相資湯 清熱固經湯加沙蔘 滋水清肝飲 三妙紅蘇湯 右歸丸 通脈大生丸 贊育丹 左歸丸 補腎調經湯 大造丸 固本止崩湯 濟生歸脾湯 補腎固衝丸 四物湯合失笑散 紅花桃仁煎 開鬱四物湯 |
| 方藥合編 | 益胃升陽湯 全生活血湯 壽脾煎 復元養榮湯 舉元煎 歸脾湯 |
| 漢方臨床學 | 加味芎歸湯 十全大補湯加香附子 五靈脂 引精止血湯 加味歸脾湯 平肝開鬱湯 加味桂枝茯苓湯 加味益胃升陽湯 黃芪升舉湯 |
| 晴崗醫鑑 | 加味惜紅煎 加味壽脾煎 |
| 臨床婦產科學 | 涼血地黃湯 固經丸 育陰止崩湯 溫經湯 舉元煎 歸脾湯 固本止崩湯 膠艾湯加味 養陰止血湯 清經止血湯 四物湯合失笑散 逐瘀止血湯 |
| 方證新編 | 清經止血湯 固本止崩湯 獨參湯 聖愈湯 歸脾湯 龜鹿補衝湯 開鬱四物湯 震靈丹 調經止崩湯 益胃升陽湯 全生活血湯 壽脾煎 參苓白朮散 舉元煎 |
| 診療要鑑 | 益元湯 補血固本湯 備金散 解毒四物湯 涼血地黃湯 開鬱四物湯 伏龍肝散 丁香膠艾湯 當歸芍藥湯 全生活血湯 |

<표2> 崩漏治方에 活用된 藥物的 分布

| | |
|-------|---|
| 補氣助陽藥 | 人蔘(47) 黃芪(38) 白朮(42) 甘草(81) 桂皮(14) 附子(15) 鹿茸(19) 鹿角(5) 補骨脂(1) 巴戟天(3) 陽起石(1) 杜沖(4) 大棗(4) 白茯苓(6) 石硫黃(2) 狗脊(2) 淫羊藿(1) 菟蓉(2) 紫河車(1) 仙茅(1) 肉桂(13) |
| 補血養陰藥 | 當歸(137) 白芍藥(62) 地黃(66) 蓮子肉(3) 龍眼肉(3) 山藥(14) 山茱萸(6) 兔絲子(5) 枸杞子(4) 麥門冬(4) 柏子仁(2) 何首烏(2) 沙蔘(2) 黃精(1) 石斛(3) 鱉甲(8) 龜板(7) 阿膠(37) 天門冬(1) 玉竹(1) |
| 收斂血管藥 | 地榆(26) 赤石脂(22) 樗白皮(1) 陳石榴(1) 烏梅(2) 旱蓮草(2) 花蕊石(1) 礬石(1) 禹余糧(24) 藕節(4) 側柏葉(4) 槐花(3) 三七根(2) 棕櫚(8) 槐蛾(2) 槲葉(2) 白礬(1) 百草霜(2) 白石脂(5) 桑耳(5) 小蘗(9) 蓮鬚(1) 仙鶴草(3) |
| 收斂精氣藥 | 五味子(7) 酸棗仁(9) 罌粟殼(1) 肉苁蓉(2) 牡蠣(20) 龍骨(26) |
| 發散風寒藥 | 桂枝(1) 荊芥(11) 升麻(15) 乾葛(3) 柴胡(23) 細辛(12) 生薑(6) 麻黃(1) |

| | |
|-------|---|
| 發散風熱藥 | 薄荷(6) 蔓荊子(5) 桑葉(1) |
| 發散風濕藥 | 防風(15) 白芷(15) 威靈仙(1) 藁本(11) 羌活(8) 獨活(6) 蛇床子(1) 桑葉(1) |
| 發散寒濕藥 | 蒼朮(7) 茴香(1) 木賊(1) 蜀椒(3) 白僵蠶(4) |
| 利水通淋藥 | 木通(1) 瞿麥(2) 車前子(3) 茯苓(23) 澤瀉(2) 赤小豆(1) 石葦(1) |
| 瀉下藥 | 大黃(5) 郁李仁(1) |
| 化痰藥 | 半夏(3) 遠志(9) 陳皮(10) 枳殼(2) 橘皮(4) |
| 通氣行滯藥 | 香附子(22) 藿香(1) 青皮(2) 山楂(2) 神麩(1) 白扁豆(1) |
| 溫運中氣藥 | 乾薑(27) 厚朴(5) 丁香(1) 木香(7) 胡椒(1) |
| 溫和血分藥 | 川芎(42) 艾葉(38) 玄胡索(3) 吳茱萸(8) 伏龍肝(8) |
| 行氣通竅藥 | 麝香(2) 石菖蒲(2) |
| 活血通絡藥 | 赤芍藥(13) 澤蘭(2) 牛膝(3) 續斷(22) 蒲黃(22) 血竭(1) 沒藥(3) 五靈脂(10) 川山甲(1) 桑寄生(3) 丹蔘(7) 鬱金(1) |
| 破血祛瘀藥 | 益母草(4) 紅花(7) 敗醬(1) 劉寄奴(1) 桃仁(2) 水蛭(1) 蟻蟲(1) 琥珀(1) 紫檀(1) |
| 清熱降火藥 | 知母(5) 夏枯草(1) 石膏(2) 梔子(9) 薄荷葉(6) 代赭石(4) |
| 清熱燥濕藥 | 黃連(10) 黃芩(28) 黃柏(11) 連翹(1) |
| 清熱解毒藥 | 白薇(4) 忍冬(1) 蓮蓬(5) |
| 清熱涼血藥 | 牡丹皮(20) 地骨皮(1) 玄參(2) 白薇(4) 大薊(4) 白茅根(4) 槐子(1) 竹茹(6) 黃藥子(1) |
| 殺蟲藥 | 蕪荑(1) 乾漆(2) |

IV. 結 論

崩漏의 治方에 對하여 文獻의 으로 考察한 結果 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 崩漏의 治方으로 益胃升陽湯 備金散 奇效四物湯 歸脾湯 伏龍肝散 如聖散 開鬱四物湯 固本止崩湯 固經丸 全生活血湯 等이 多用되었다.

2. 崩漏의 治方에 對한 藥物構成에는 補氣助陽藥 補血養陰藥 收斂血管藥 活血通絡藥이 主로 言及되었는데, 補氣助陽藥으로는 甘草 人蔘 白朮 黃芪 鹿茸, 補血養陰藥에는 當歸 地黃 白芍藥 阿膠

山藥, 收斂血管藥에는 地榆 禹余糧 赤石脂, 活血通絡藥에는 續斷 蒲黃 赤芍藥 五靈脂, 溫和血分藥에는 川芎 艾葉 等이 多用되었다.

3. 收斂止血하고 破血祛瘀하는 治方보다는 補氣補血하고 開鬱安神시키는 治方이 多用되었다.

參考文獻

1. 宋炳基 : 韓方婦人科學, 서울, 杏林出版, p.220, 1978.
2. 李鐘華.朴炳烈 : 標準漢方婦人科, 서울, 正和文化印刷社, p.125, 1979.
3. 李鐘華 : 漢方婦人科臨床診療, 서울, 癸丑文化社, p.164, 1982.
4. 上海中醫學院 : 婦產科學, 香港, 商務印書館香港分館, p.59, 1976.
5. 楊維傑 : 黃帝內經素問譯解, 台北, 台聯國風出版社, p.75, 1973.
6. 巢元方 : 諸病源候論校釋, 北京, 人民衛生出版社, pp.1062,1067, 1982.
7. 陳自明 : 婦人大全良方, 北京, 人民衛生出版社, p.38, 1985.
8. 吳謙 : 醫宗金鑑, 北京, 人民衛生出版社, p.32, 1963.
9. 李挺:醫學入門,서울,大星文化社,p.35,1981.
10. 許浚:醫寶鑑,서울,南山堂,p.159,1966.
11. 羅元愷 : 中醫婦科學, 上海, 上海科學技術出版社, p.129, 1986.
12. 姜明孜 : 臨床婦產科學, 서울, 成輔社, pp.154-159, 1989.
13. 蕭燾 : 女科經綸, 江蘇省, 江蘇科學技術出版社, pp.279-280, 1986.
14. 上海中醫藥院 : 中醫婦產科學, 서울, 成輔社, p.58, 1980.
15. 張仲景 : 中景全書.金匱要略, 서울, 大星文化社, p.436, 1984.
16. 孫思邈 : 備急千金要方, 서울, 大星文化社, pp.119-126, 1992.
17. 徽宗勅 : 聖濟總錄, 台北, 新文豐出版公司,

pp.1205-1211, 1967.

18. 李東垣 : 東垣十種醫書, 서울, 大星文化社, pp.197-198, 1983.

19. 羅天益 : 衛生寶鑑, 香港, 商務印書館, pp.307-310, 1981.

20. 張介賓 : 景岳全書, 서울, 大星文化社, pp.10-13, 1988.

21. 方 廣 : 丹溪心法附餘, 서울, 大星文化社, pp.733-739, 1993.

22. 孫一奎 : 赤水玄珠全集, 北京, 人民衛生出版社, pp.799-802, 1986.

23. 龔廷賢 : 增補萬病回春, 서울, 杏林書院, pp.83-85, 1972.

24. 葉 桂 : 葉天士女科, 서울, 醫道韓國社, pp.34-39, 1978.

25. 程國彭 : 醫學心悟, 香港, 友聯出版社, p.234, 1961.

26. 傅青主 : 傅青主男女科, 서울, 大星文化社, pp.85-89, 1984.

27. 王肯堂 : 六科準繩, 上海, 翰成社, pp.510-511, 1982.

28. 沈嘉封 : 女科輯要, 北京, 人民衛生出版社, pp.24-27, 1988.

29. 閻純璽 : 胎產心法, 北京, 人民衛生出版社, p.375, 1988.

30. 汪訥庵 : 醫方集解, 台北, 文光圖書有限公司, pp.409-410, 1975.

31. 康命吉 : 濟衆新編, 서울, 驪江出版社, p.131, 1992.

32. 黃度淵 : 方藥合編, 서울, 南山堂, pp.145, 194, 196-197, 228-229, 263, 1989.

33. 蔡仁植 : 漢方臨床學, 서울, 大星文化社, pp.565-566, 1987.

34. 金永勳 : 晴崗醫鑑, 서울, 成輔社, pp.397-399, 1984.

35. 宋炳基 : 方證新編, 서울, 東園出版社, p.105, 1983.

36. 金定濟 : 診療要鑑, 서울, 成輔出版社, pp.656-657, 1974.

37. 大韓產婦人科學會 : 婦人科學, 서울, 現代醫

學書籍社, pp.847-850, 1987.

38. 金錫煥 : 婦人科學, 서울, 日朝閣, PP.301-303, 1979.