

口眼喎斜의 治療穴에 對한 文獻的 考察

黃載然·李秉烈*

報告하는 바이다.

I. 緒論

口眼喎斜는 正氣가 不足하여 經絡이 空虛하고 衛氣가 不固하여 風邪가 經絡中에 乘虛하여 入中함에 氣血痹阻하고 面部 足陽明經筋이 濡養을 失하여서 肌肉이 縱緩不收한 所致로 發生되는 一種의 症狀이다.¹⁾

本病의 名稱은 《內經》에서 “口喎” “口僻”, 《金匱要略》에서 “喎僻”, 《諸病源候論》에서 “風口喎”, 《三因方》에서 “口眼喎斜”라 稱하였으며, 이외에 또한 面癱, 吊線風, 歪咀風 等의 名稱이 있다.¹⁾

口眼喎斜에 대한 鍼灸治療는 《靈樞·經筋篇》에서 “足之陽明, 手之太陽, 筋急則口目爲僻, 皆急不能卒視, 治皆如右方也(燔鍼劫刺, 以知爲數, 以痛爲俞).”라고 하였고, 《鍼灸甲乙經》에 “口僻, 失欠……大迎主之”, “口僻, 偏歷主之.”라 하였으며,以後로 《千金要方》, 《千金翼方》, 《外臺秘要》等에 嘎僻의 鍼灸治療에 對한 記載가 있다. 《針灸資生經》에는 “口眼喎”的 專節이 있고, 口眼喎斜를 治療하는 31個에 達하는 臟穴이 提出되었다. 그후로 《針灸聚英》, 《鍼灸大成》等에 鍼灸治療에 對한 記述이 있다. 이 外에도 皮膚鍼, 電針, 藥鍼와 埋線, 穴位敷貼療法, 頭鍼, 耳鍼, 鋸鍼 等의 新鍼療法을 適用함에 따라 治療方法이 豐富해졌다.¹⁾

口眼喎斜는 治療 方法이 多樣하고 臨床에서 흔히 接할 수 있는 疾患임에도 治療 穴位에 대한 報告는 少數에 불과했다.

이에 著者는 歷代文獻에 記載되어 있는 口眼喎斜의 治療穴을 考察하여 若干의 知見을 얻었기에

II. 本論

一. 文獻資料

1. 黃帝鍼灸甲乙經
2. 備急千金要方
3. 外臺秘要
4. 太平聖惠方
5. 聖濟總錄
6. 鍼灸資生經
7. 鍼灸聚英
8. 醫學入門
9. 鍼灸大成
10. 類經圖翼
11. 醫宗金鑑
12. 神應經
13. 醫心方
14. 鍼灸集要
15. 鍼灸要法指南
16. 中國鍼灸學
17. 中國鍼灸治療學
18. 鍼灸學(新編中醫學教材, 上海中醫學院)
19. 鍼灸治療學
20. 鍼灸治療手冊
21. 病證診治
22. 精解鍼灸學
23. 許任鍼灸經驗方
24. 最新鍼灸學
25. 臨床韓方講座
26. 鍼灸學(高等醫藥院教材)
27. 鍼灸經緯
28. 漢方臨床四十年

* 大田大學校 韓醫科大學 鍼灸學教室

29. 電針治療의 理論의 臨床
 30. 舍岩鍼灸正傳
 31. 舍岩鍼法體系的研究
 32. 鍼灸學 (全國韓醫科大學教材)

II. 調查內容

1. 黃帝鍼灸甲乙經²⁾

- 厥口僻失欠下牙痛頰腫惡寒口不收食不能言不得嚼大迎主之；口僻不正失欠口不開翳風主之；舌下腫難言舌縱喎戾不端通谷主之；口僻刺太淵引而下之；口僻偏歷主之。
 - 斷口喎僻 內庭 主之。
 - 口喎僻 完骨 主之。
 - 口僻 觀膠，及觀交，下觀 主之。
 - 瘦瘻口僻 巨膠 主之。
 - 口不能水漿 喎僻 水溝(人中) 主之。
 - 口僻瘻 外關 主之。
 - 口喎戾頸強 強間 主之。
 - 口喎喘悸者 大迎 主之。
 - 目瞤動 與項口參相引 喎僻口不能言 刺承泣 主之。
 - 目痛口僻，泪出，目不明，四白 主之。
 - 口僻 大迎 主之。
 - 口僻不正 翳風 主之。
 - 喎戾不端 通谷 主之。
 - 口僻 刺太淵 引而下之。
 - 口僻 偏歷 主之。
 - 喎僻多涕 迎香 主之。
 - 鼻窒口僻 清涕出 不可止 禾膠 主之。
 - 口喎 行間 主之。
2. 備急千金要方³⁾
- 承泣，四白，巨膠，禾膠，上關，大迎，觀膠，強間，風池，迎香，水溝 主口喎僻。
 - 頰車，觀膠，主口喎僻。
 - 外關，內關，三里，太淵，商丘，主僻瘻。
 - 水溝，觀交，主不能禁水漿喎僻。
 - 偏歷，口僻
3. 外臺秘要⁴⁾

- 太淵 口僻
 - 列缺 主偏風口喎
 - 偏歷 口僻
 - 禾膠 主鼻窒口僻清滯出不可止
 - 水溝 口喎喎僻睞目
 - 觀交 口僻
 - 行間 口喎
 - 完骨 喎僻
 - 四白 主目痛口僻淚出目不明
 - 迎香 喎僻多涕
 - 巨膠 口僻
 - 地倉 主口緩不收，不能言語
 - 大迎 口喎，口僻
 - 上關 口僻
 - 下關 口僻
 - 通谷 主失欠口喎僻，舌縱喎戾不端
 - 強間 口喎戾頸強
 - 外關 口僻瘻
 - 觀膠 主口僻痛
4. 太平聖惠方⁵⁾

1) 鍼 經

- 承漿 主療偏風口喎
- 承泣 主療至見 眼喎不正，口喎目瞤，面動葉葉然，牽口眼
- 禾膠 主鼻窒口僻
- 巨膠 瘦瘻口僻
- 地倉 多主偏風口喎，失音不言，不得飲水漿食漏落……口轉喎
- 客主(上關) 偏風，眼喎通睛
- 列缺 主療偏風，口喎

2) 明 堂

- 禾膠 主鼻窒口僻 清滯出不可止。
- 通谷 主笑久口喎。
- 上關 口眼偏斜。
- 二間 口眼斜。
- 承漿 主偏風，口眼喎斜。
- 翳風 口喎不閉，及口吻喎也。
- 列缺 主偏風，半身不遂，口喎。

5. 聖濟總錄⁶⁾

- 列缺 偏風口喎。

- 太淵 口僻.
 - 二間 口喎.
 - 偏歷 口喎.
 - 溫溜 治口喎.
 - 迎香 偏風口喎.
 - 下關 偏風口目喎.
 - 承泣 治口眼喎斜.
 - 巨髎 口喎.
 - 地倉 治偏風口喎 目不得閉 失音不語 飲食不收
水漿漏落 眼瞤動不止.
 - 大迎 口喎.
 - 衡陽 治偏風口眼喎.
 - 內庭 口喎.
 - 觀髎 治口喎.
 - 承光 口喎.
 - 通天 偏風口喎.
 - 通谷 治失欠口喎.
 - 翳風 口眼喎斜.
 - 客主人(上關) 偏風口眼喎斜.
 - 完骨 偏風口眼喎斜
 - 行間 口喎
 - 承漿 偏風口喎
6. 鍼灸資生經⁷⁾
- 承泣, 四白, 巨髎, 上關, 大迎, 觀髎, 強間, 風池, 迎香, 水溝, 主口喎僻不能言.
 - 頰車, 觀髎, 主口僻痛.
 - 水溝, 齒交, 主口不能禁水漿喎僻.
 - 口喎僻 完骨 主之.
 - 上關, 下關 治偏風口目喎.
 - 承光 治口喎.
 - 通天 治口喎.
 - 列缺, 完骨 治口面喎.
 - 列缺, 完骨 治口面喎.
 - 翳風 治口眼喎斜.
 - 承漿 治偏風口喎.
 - 巨髎 治瘻瘻口喎.
 - 觀髎 治口喎眼瞤動.
 - 承泣 治口眼喎斜 目瞤動而葉葉動牽口眼.
 - 地倉 治偏風口喎 目不得閉 失音不語 飲食不收
水漿漏落 眼瞤動不止.
 - 行間 治口喎.
 - 通谷 治失欠口喎.
 - 太淵 治口僻.
 - 溫溜, 偏歷, 二間, 內庭 治口喎.
 - 衡陽 治偏風口眼喎.
 - 禾髎 療口僻.
 - 列缺, 地倉 療口喎.
 - 巨髎 瘰瘻口僻.
 - 地倉 療偏風口喎 失音不言 不得飲水 食漏落脈
瞤動.
7. 鍼灸聚英⁸⁾
- 口眼喎斜 治太淵, 列缺申脈與二間, 內庭行間地五等, 水溝頰車合谷連復有通谷不可疾, 十一穴治病卽痊.
 - 列缺 主偏風口面喎斜.
 - 太淵 狂言口僻.
 - 二間 口乾口喎.
 - (手)三里 中風口僻.
 - 迎香 偏風口喎.
 - 承泣 目瞤動 與項口相引 口眼喎斜.
 - 四白 口眼喎斜不能言.
 - 巨髎 口喎僻.
 - 地倉 主偏風口喎 目不得閉.
 - 頰車 口眼喎.
 - 下關 偏風口眼喎斜.
 - (足)三里 口僻.
 - 衡陽 主偏風口眼喎斜.
 - 內庭 口喎.
 - 腹兌 口喎唇胗.
 - 觀髎 主口喎面赤 眼瞤動不止.
 - 通天 口喎.
 - 通谷 主失欠口喎.
 - 翳風 口眼喎斜.
 - 和髎 口僻.
 - 聽會 中風口喎斜.
 - 完骨 口眼喎斜.
 - 素髎 鼻喎僻.
 - 水溝 口喎僻.
 - 承漿 口眼喎斜.
8. 醫學入門⁹⁾
- 列缺 口喎.

- 二間 多驚口喎.
- 偏歷 口喎.
- 溫溜 主頭痛面腫口喎.
- 禾髎 主鼻窒口噤.
- 下關 口喎.
- 頰車 主口僻痛不可以嚼.
- 巨髎 口僻，令人口轉喎，主偏風口喎.
- 大迎 目瞤口喎口噤.
- (足)三里 口喎
- 衡陽 口眼喎斜.
- 內庭 口喎.
- 觀髎 口喎僻.
- 通天 口喎.
- 通谷 口喎.
- 翳風 口噤口眼喎斜.
- 上關 口喎.
- 完骨 主頭面痛口喎.
- 風池 口僻.
- 行間 主目盲淚出口喎.
- 水溝 口喎不能開.
- 齒交 口喎僻.
- 承漿 主偏風口喎.
- 9. 鍼灸大成¹⁰⁾
 - 口喎眼喎：頰車 水溝 列缺 太淵 合谷 二間 地倉 絲竹空
 - 列缺 主偏風 口眼喎斜.
 - 二間 口喎.
 - 手三里 中風口噤.
 - 迎香 偏風口喎.
 - 下關 口目喎.
 - 頰車 口眼喎斜.
 - 承泣 口眼喎斜.
 - 四白 口眼喎斜.
 - 巨髎 口喎噤.
 - 地倉 主偏風口喎 目不得閉.
 - 大迎 口喎數次.
 - 頰車 口喎歪斜 不可嚼物.
 - 下關 主治偏風口眼喎斜.
 - 衡陽 主治偏風面腫 口眼喎斜.
 - 內庭 咽痛口喎.
 - 觀髎 主治口喎.
 - 承光 目翳口喎.
 - 通天 偏風口喎.
 - 絡鄰 主治頭旋口喎.
 - 申脈 中風口眼喎斜.
 - 腹通谷 主治口喎暴瘡.
 - 翳風 口眼喎斜.
 - 和髎 口僻瘦瘻
 - 聽會 中風瘦瘻喎斜.
 - 主客人(上關) 主治苟安偏斜，瘦瘻，口噤不能嚼

物。

- 完骨 口眼喎斜.
- 行間 中風口喎四逆.

- 承漿 口眼喎斜.

- 素髎 嘶僻衄血.

- 水溝 口眼喎僻.

11. 醫宗金鑑¹²⁾

- 水溝 口眼歪.
- 承漿 口眼喎邪.
- 地倉 口眼歪邪.
- 聽會 中風瘓瘻喎斜病.

12. 神應經¹³⁾

- 口眼喎

列缺 太淵 二間 申脈 內庭 行間 通谷 地倉 水溝
頰車 合谷

13. 醫心方¹⁴⁾

- 水溝一穴：主寒熱 頭痛 癱疾 水腫 人中盡滿脣皮死 手捲 目不利 口喎僻 鼷不止.
- 四白二穴：主目痛 口僻 況出 目不明.
- 顴髎二穴：主口僻 齒痛 面赤 目黃 口不能嚼
頰腫脹.
- 巨髎二穴：主面目惡風 翳膜 口僻 青脣.
- 迎香二穴：主鼻不利 窪洞氣塞 嘶僻 多淚 鼻衄
有癰.
- 犀膠二穴：主鼻窒 口僻 清淨不止 鼇衄有癰.
- 地倉二穴：主口緩不收 不能言 手足痿躄 不能
行.
- 頰車二穴：主牙車骨痛 齒不可用 噬頰 口急.
- 大迎二穴：主寒熱頰瘻瘻 口喎 桡齒痛寒瘻口噤
不能言.

14. 鍼灸集要¹⁵⁾

- 諸證的治應穴

一、中風

風中血脉 口眼喎斜 聽會 頰車 地倉 凡三穴.

右喎灸右左各十一壯，喎向右左者 左邊脈中風而緩 右邊脈中風而緩也 宜灸 左喎陷中 右喎陷中 各二七壯.

15. 鍼灸要法指南¹⁶⁾

· 口眼斜喎 左向左脈風中緩也 左陷中二七壯灸，右向右脈中緩也 右陷中二七壯灸.

· 翳風 頰車 地倉 水溝 聽會 承漿 客主人 下關
列缺 合谷 通谷 二間 內庭 行間 申脈.

16. 中國鍼灸學¹⁷⁾

- 口眼喎斜（周圍性面神經麻痺）

口眼喎斜，多因經絡空虛，感受風寒，筋脈失養而突然發病，症狀表現以患側口眼喎斜等面部表情肌癱瘓為特徵，現代醫學稱周圍性面神經麻痺.

治療主要選取患側風池，翳風，頰車，地倉，陽白，四白，太衝，雙側合谷，平補平瀉，配合雀啄灸法，以疏風通絡.

常規消毒後，鍼陽白，以疏通額部經氣；鍼四白，以疏通顏部經氣；鍼風池，以疏風；鍼翳風，以疏風經絡；鍼頰車透地倉，鍼地倉透頰車，以疏通頰部經氣.

鍼合谷，為循經遠取法，以疏導頭面部經氣。鍼太衝，為循經遠取法，以疏通脣頰部經氣。鼻脣溝平坦，加迎香；鼻中溝歪斜，加水溝；各脣溝歪斜，加承漿。配合雀啄艾灸翳風，地倉，頰車，以溫通經絡氣血.

以上治療，每日或隔日1次，12次為一療程.

17. 中國鍼灸治療學¹⁸⁾

- 面神經炎

[治療方法]

(一) 辨證施治

① 風邪外襲，口眼喎斜

症狀：突然口眼喎斜，面部感覺異常，耳後隱痛，或伴惡寒發熱，頭痛骨楚。舌淡紅或薄黃，脈浮數或浮緊，亦有見弦細脈象者.

治則：祛風通絡

處方：風池 地倉 頰車 四白 陽白 合谷

加減：若兼惡寒發熱，頭痛骨楚等表證者，加大椎；露睛有淚者，加攢竹或魚際；耳後痛者，加翳風；味感覺退者，加廉泉.

方義：本證乃風中經絡，氣血壅阻，經筋失濡，縱緩不收所致。故取風池祛風通絡；地倉，頰車，四白，陽白皆為足陽明胃經腧穴，鍼而灸之以溫經散寒，疏通本經氣血，濡潤溫煦筋肉；合谷為治療面部諸症之遠取要穴，鍼以瀉之，概可疏邪解表，又能和營通絡，局部加拔火罐，可以行氣活血，改善面肌營養，促進癱瘓恢復。若兼有惡寒發熱等表證者，加瀉大椎以助風池，合谷祛風解表之力。露睛流泪者，加刺攢竹或魚際；耳後疼痛者，加刺翳風；味覺減退者，加鍼廉泉，

均為局部取穴，平補平瀉以調暢該部氣血，達到改善功能之目的。

② 虛風內動，口眼喎斜

症狀：口眼喎斜，面部麻木或有板緊之感，面肌運動，每于情緒激動或說話時發生口眼抽動，或閉目難睜，舌質淡，苔薄白或少苔，脈弦細。

治則：養血熄風

處方：頰車 地倉 遠香 四白 顴髎 風池 足三里
加減：閉目難睜者，加攢竹，太陽；口歪難正者，加人中，承漿。

方義：血虛生風則面肌抽搐，血不養筋則面肌萎縮。氣主煦之，血主濡之，故取穴原則以調補局部氣血，近取面部輸穴為主。頰車，地倉，遠香，四白，顴髎諸穴採用棱形透刺鍼法，輕刺激，久留鍼，加溫灸，以調和氣血，濡養肌肉，舒緩筋脈，解除痙攣。再配風池熄風解痙以治標，足三里補氣益血以固本，遠近結合，標本兼顧，能得氣旺血行，則虛風自熄。

(二) 電針療法

處方：頰車 地倉 陽白 四白

(三) 皮膚鍼療法

處方：取麻痺側陽白 攢竹 魚際 絲竹空 四白 地倉 頰車 奉正

(四) 耳鍼療法

處方：面頰區 肝 眼 口 皮質下 配腎上腺 枕

(五) 鋸鍼療法

處方：割割患側口腔粘膜，上部病變割患側大臼齒對面頰粘膜；中部病變割患側小臼齒對面頰粘膜；下部病變割患側口角上下犬齒對面頰粘膜；新患割硬結或麻痺區，亦可按經絡循行部位割割。向患側歪斜者割健側。

(六) 水鍼療法

處方：取麻痺側臉穴：陽白，四白，頰車，地倉；太陽，奉正，下關，翳風。

18. 鍼灸學(新編中醫學教材，上海中醫學院)18)

[治法]

① 鍼刺法

常用穴- 風池，翳風，陽白，迎香，地倉，合谷。

備用穴- 攢竹，太陽，四白，禾髎，人中，太衝，聽會，頰車。

風池，翳風以疏解風邪，翳風為面神經出莖乳突孔

處，宜向下領骨前鍼刺。面部各穴均可按麻痺部位選用，多用透鍼法。如陽白透魚腰，迎香透四白，地倉透頰車等。遠道配取合谷或太衝。眼不能合，還可配取陽蹻，陰蹻的穴位申脈，照海以濡養眼目。急性期宜以遠隔穴為主，可每日或隔日一次。面穴不宜刺激過強，或各穴輪換使用。

② 穴位注射法

用維生素 B1 或 B12 液注射翳風，牽正等穴，每次 0.5-1 毫升，每日或隔日一次。各穴位輪換交替使用。

③ 電針法

在發病二週後使用。選取面部穴鍼刺，通電 5-10 分鐘，以癱瘓肌肉出現收縮為有效。每天或隔天一次。

④ 皮刺拔罐法

用皮膚鍼叩刺陽白，太陽，四白，牽正等部，使輕微出血，用小口徑火罐吸拔 5-10 分鐘，隔天一次。本法活用于炎症期或面部牽扯等面癱後遺症。

⑤ 穴位敷貼法

將馬錢子銼成分，約一二分，散于淡膏藥上，貼在患側的壓痛點上(于太陽，下關，頰車等處找壓痛點)，隔 2-3 日更換一張，一般更換 4-5 次。

19. 鍼灸治療學¹⁹⁾

· 顏面神經麻痺(Facial palsy)

感冒，外傷，中毒，耳 腦 疾患，神經炎，筋萎縮等의 원인으로 發生한다。患側前額部의 주름이 없어지고 顔面筋은 麻痺를 일으키며 表情은 固定되고，瞼裂이 크게 되어서 閉眼할 수 없게 되고，囗는 健側으로 당겨져서 唾液을 流出한다。

應用穴：筋縮 天柱 身柱 手三里 陽陵泉 肝俞 迎香 大迎 翳風 聽會 下關

20. 鍼灸治療手冊²⁰⁾

· 顏面神經麻痺

治法/

① 通治法

頰車，地倉，風池，攢竹，翳風，睛明，瞳子髎，聽會에 鍼

② 얼굴이 뜻는 것

水溝，復溜(또는 陽陵泉，解谿)에 鍼

③ 舌嚙神經麻痺

風府，百會，天鼎(또는 廉泉)，通里，合谷에 鍼

(이상 모두 가볍게 자극한다.)

혹은 天柱, 風脅을 추가하기도 한다.

左側에 통증이 있을 때는 食竇에 鍼하는 것을 추가한다.

④ 舌咽神經麻痺

天突, 廉泉, 天牖, 天柱, 大椎, 少商, 曲池, 合谷에 鍼

이와는 별도로 金津玉液, 聚源에 鍼刺한다.

⑤ 口眼喎斜

合谷, 曲池, 頰車, 下關, 地倉에 鍼

혹은 曲池를 추가한다.

⑥ 입, 눈, 코가 일그러진 것

頰車, 人中, 地倉, 攢竹, 合谷에 鍼

⑦ 입과 코가 일그러지고 오른쪽 눈이 감겨서 떠지지 않고 눈물이 흐르는 것

患側: 翳風, 頰車, 下關, 人中, 地倉, 晴明, 太陽에 鍼

頰車에 灸

⑧ 입, 눈, 코가 왼쪽으로 일그러진 것

地倉, 頰車에 鍼 그리고 下關, 太陽, 陽白에 鍼

21. 痘症診治²¹⁾

· 面癰

辨證論治

· 風寒傷絡

治法: 祛風散寒

鍼刺: 下關, 頰車, 合谷, 風池穴을 取한다.

· 風熱中絡

治法: 祛風清熱, 調理氣血

鍼刺: 下關, 頰車, 地倉, 合谷, 風池穴을 取하고, 별도로 大椎, 支溝穴을 加한다.

· 風痰沮絡

治法: 祛風化痰, 定抽通絡

鍼刺: 耳門, 聽宮, 豊隆, 內關穴을 取한다.

通用治療

鍼療

陽白, 絲竹空, 四白, 地倉, 迎香, 合谷穴에 鍼刺 한다. 乳頭狀突起部에 疼痛이 있으면 翳風, 人中溝가 비뚤어져 있으면 承漿穴을 加한다.

耳鍼法으로는 面頰, 枕, 眼, 口穴點을 取한다.

22. 精解鍼灸學²²⁾

· 口眼喎斜

治療: 地倉, 頰車, 手三里, 曲池, 太淵, 間使, 翳風, 大迎, 合谷, 左傾者는 右治하고, 右傾者는 左治한다.

23. 許任鍼灸經驗方²³⁾

· 顏面神經麻痺- 肝俞, 筋縮, 天柱, 身柱, 手三里, 陽陵泉, 翳風, 聽會.

24. 最新鍼灸學²⁴⁾

· 顏面神經麻痺

① 鍼刺療法

常用穴 : 風池, 陽白, 地倉, 四白, 合谷.

豫備穴 : 人中, 夾承漿, 太陽, 下關, 足三里, 內庭, 禾髎.

② 電鍼療法

常用穴 : 翳風, 聽靈, 地倉에서 頰車로 透刺.

③ 水鍼療法

常用穴 : 牽正, 溫溜, 太陽, 翳風, 風池, 陽白, 地倉, 四白, 合谷.

豫備穴 : 人中, 夾承漿, 太陽, 下關, 足三里, 內庭, 禾髎.

④ 穴位埋線療法

常用穴 : 耳垂下 5分에서 頰車로 透刺, 四白에서 額髎로 透刺, 地倉에서 散笑로 透刺, 陽白에서 頭光明穴로 透刺하고, 合谷 列缺 血海를 配用한다.

⑤ 頭鍼療法

常用穴 : 患側 또는 反對側의 顏面運動區.

處方實例

(1) 翳風, 天容, 聽會, 巨髎, 四白, 攢竹, 絲竹空, 曲翳, 頰車, 瞳子髎, 地倉, 禾髎(新鍼灸學)

(2) 口眼喎斜 : 頰車, 水溝, 列缺, 太淵, 合谷, 二間, 地倉, 絲竹空(神應經)

(3) 口眼喎斜 : 聽會, 頰車, 地倉.(鍼灸資生經)

(4) 口眼喎斜 : 먼저 地倉, 頰車, 人中, 合谷에 刺鍼한다. 治療後 1個月이나 半個月이 지나 再發하는 경우는 聽會, 承漿, 翳風에 刺鍼한다.(鍼灸大成)

(5) 口喎 : 溫溜, 偏歷, 二間, 內庭(普濟方)

25. 臨床韓方講座²⁵⁾

鍼灸治療

① 基本- 兩足三里(補), 合谷(補; 健側), 聽會(瀉),

患側), 內庭(健)

② 面部는 足陽明經이 支配- 手陽明 大腸經에서 선택

合谷 足三里 그리고 木剋土이니 加 太衝

③ 少陽經에서는 完骨部 疼痛이 있을 때는 翳血後 위의 ②의 穴을 놓고 健側은 手陽明 三焦經, 患側은 翳風을 선택

④ 眼瞼- 屬脾

上- 太陽經

下- 陽明經

a. 眼合이 안될 때- 攢竹, 絲竹空 手足에서는 健側의 手少陽經 手太陽經을 선택

b. 주름이 안 잡힐 때- 陽白 頭維

手足에서는 胃經- 手陽明 膽經- 手少陽 膀胱經- 手太陽

⑤ 患側周圍穴

a. 이마에 주름- 陽白

b. 眼合不能- 絲竹空

c. 口喎가甚- 太衝 地倉 頬車

d. 鼻에 异常- 四白穴

e. 人中이 빠뜰어 졌을 때- 太衝 人中 禾髎

f. 乳樣突起部 風邪侵入- 翳風必刺 風池

g. 面腫- 內庭 列缺

26. 鍼灸學(高等醫藥院教材)²⁶⁾

[治療]

① 鍼灸

治法

以手足陽明經為主, 手足少陽為輔. 采取局部近取與循經遠取相結合的方法. 初期宜淺刺, 一週後予平刺透穴或斜刺.

處方

風池, 翳風, 頬車, 地倉, 合谷, 太衝

方義

本病為風寒侵襲面部陽明, 少陽經絡, 故取風池, 翳風, 有疏散風邪之效, 其中翳風可祛風止痛, 活用于初病耳後乳突痛; 頬車, 地倉同屬陽明, 平刺透鍼以推動經氣; 合谷, 太衝為循經遠取法, 合谷善治頭面諸疾, 太衝用瀉法治脣吻喎斜最為有效.

隨證配穴

鼻脣溝平坦: 迎香 禾髎; 鼻中溝歪斜: 水溝; 頤脣

溝歪斜: 承漿; 目不能合: 陽白 攢竹或申脈 照海; 面頰板滯: 四白 巨髎. 根據麻痺部位, 選取適當穴位分組輪換治療.

② 水鍼

注射液注射翳風, 奉正等穴

27. 鍼灸經緯²⁷⁾

第十七章. 刪補十四經特效主治要目

· 足陽明胃經

下關- 齒痛, 齒齦炎, 顏面神經麻痺, 三叉神經痛

頬車- 牙關不開, 口眼喎斜, 耳下腺腫, 牙齦癰腫
(配合谷穴)

地倉- 口眼喎斜, 腹中蟲痛

第十八章. 十四經穴主治特性提要

· 胃經常用穴主治提要

通經活絡 去痰除濕- 口眼斜歪- 上巨虛, 足三里

第十九章. 鍼灸歌賦辨證取穴摘要

第一節. 玉龍歌賦辨證取穴摘要

口喎- 地倉, 頬車

第二節. 百症賦辨證取穴摘要

口喎- 頬車, 地倉

第十一節. 玉龍歌賦辨證取穴摘要

口眼喎斜- 地倉, 頬車(喎左斜右, 喎右斜左)

28. 漢方臨床四十年²⁸⁾

治法

頬車, 地倉, 聽會, 人中, 承漿, 間使(灸), 合谷, 風池, 完骨, 翳風, 過香, 顴髎, 耳門, 晴明, 絲竹空, 曲池, 足三里, 絶骨, 陽陵泉, 客主人, 却門(灸), ...澤田流(日本人), 口內頰部(置鍼), 後谿(置鍼), 以上諸穴에 先鍼健側 次鍼患側 口眼喎斜症의 發病期 進行期 治療期를 莫論하고 每日 或은 隔日로 施鍼한다. (특히 要穴은 頬車, 地倉, 聽會이다.)

29. 電針治療의 理論과 臨床²⁹⁾

· 顏面神經麻痺

本疾患과 有關한 經絡은 胃經, 三焦經, 小腸經, 大腸經, 膽經 等의 經絡이며, 그 中 三焦經의 反應이 가장 顯著하다.

主要 經穴은 患側의 頬車, 下關, 水溝, 顴髎, 太陽穴 等이며, 耳前方의 反應點은 眼部歪斜에 非常效果의이다. 同時に 外關, 合谷, 解谿, 足三里穴 等을 配合하기도 한다.

30. 舍岩鍼灸正傳³⁰⁾

· 口眼喎斜

- ① 症狀- 口眼牽引過斜之狀.
② 治法- 心實: 三里迎. 完骨正. 心海補. 然谷瀉.

31. 舍岩鍼法體系的研究³¹⁾

서울① -偏風口喎(肝實) - 尺澤補 - 然谷瀉 - 完骨瀉 - 前谷迎

釜山 -偏風口喎(肝實) - 勞宮補 - 照海瀉 - 完骨瀉 - 前谷迎

杏林 -偏風口喎(肝實) - 腕骨瀉 - 前谷迎

서울② 杏林 采堂 -偏風口喎(肝實)- 勞宮補 - 照海瀉

서울①. 采堂- 口眼喎斜(肝虛)- 少海補- 然谷瀉

杏林 - 口眼喎斜(肝虛)- 少海補- 然谷瀉

서울②- 口眼喎斜(肝虛)- 經渠補- 中封補 - 少府瀉 - 行間瀉

서울③- 口眼喎斜(肝虛)- 少海補- 照海瀉 - 然谷瀉 - 三里迎 - 靈道正

釜山 -口眼喎斜(肝虛)- 少海補- 然谷瀉 - 三里迎 -陽輔正 - 天重斜

· 네 가지 筆寫本의 治法을 比較하여 提示하였는데 五行鍼法 舍岩鍼經을 서울版이라 稱하고, 鍼灸篇은 釜山版이라 하고, 朴采堂鍼鑑은 采堂版이라 하고, 舍岩道人鍼灸要訣은 杏林版이라 稱하였다.

32. 鍼灸學(全國韓醫科大學教材)³²⁾

· 面

顏面은 諸陽經의 會合處로서 手三陽經脈은 手部에서 面部에 이르는 것이고, 足三陽經은 頭部에서 下行하여 足部에 이른다. 手足의 陽經脈이 모두 頭部에 到達한 것인데 足陽明胃經脈만은 鼻의 交頰部에서 起始하며 齒牙로 들어가서 口唇을 끼고 돌아 頰車를 依支하여 耳前部의 客主人을 지나서 顏面의 大部分을 廣絡하였다. 故로 顏面病은 오로지 胃經에 屬한다.

(1) 面部와 經絡과의 關係

- ① 額: 足少陽經과 足陽明經의 關係
② 鼻: 手陽明經, 手太陽經, 足陽明經과 督脈의 關係

- ③ 人中: 督脈과 手足陽明經의 關係

- ④ 肾: 足陽明과 足太陰의 關係

- ⑤ 承漿: 足陽明과 任脈의 關係

⑥ 眉至額: 鼻直線上은 督脈, 內眞의 直線上은 足太陽經, 瞳子의 直線上은 足少陽經, 銳眞의 直線上은 手足少陽經이다.

⑦ 頰: 內眞의 直下는 足陽明經, 瞳子의 直下는 足陽明經

- ⑧ 頰車: 足少陽經과 足陽明經의 關係

(2) 口眼喎斜

顏面神經麻痺를 面癱이라고도 하며, 腦神經病變中에서 가장 흔히 볼 수 있는 疾患이다. 나이와는 關係없이 發病하며, 本病에는 中樞性과 末梢性의 二種類가 있다. 中樞性은 腦血管疾患이나 腦腫瘍 등으로 일어난다.

여기서는 末梢性에 대해 論及한다.

原因은 莖乳突孔內部의 顏面神經에 急性 非化膿性으로 起因하거나, 或은 顏面의 風, 寒冷의 刺戟을 받기 때문이며, 一般的으로 局所神經의 營養血管이 風寒의 邪氣로 因해 瘙攣하고 該當神經의 虛血과 浮腫을 일으켜 發病하는 것으로 認識된다. 또한 局所의 바이러스 感染과도 關係가 있는 것으로 본다.

이밖에 慢性中耳炎, 乳樣突起炎 等도 本病을 誘發케 한다.

原因

① 風邪가 血脈에 侵襲하여 ② 外感寒의 顏面經絡을 侵襲하여 經氣의 循環에 異常을 일으켜, 氣血이 調和되지 못하고 經筋의 滋養이 失調되어 弛緩不收해서 發病한다.

症狀

① 風邪가 侵襲하면 邪氣는 緩慢하고, 正氣는 도리어 急하게 되므로, 或은 左로 或은 右로 嘴斜된다.

② 종종 갑자기 發病되며, 或 睡眠後 한쪽 眼瞼이 닫히지 않거나 또는 口唇이 비뚤어진다.

③ 發病前 患側 耳後에 不快感이 생기는 수도 있다.

④ 麻痺는 대개 一側性이다.

⑤ 患側의 耳下 或 乳樣突起部에 疼痛이 있다.

- ⑥ 患側 顏面의 表情이 消失된다.
- ⑦ 眉筋, 前頭筋, 眼輪筋 等의 麻痺로 患側의 眼이 開하고 눈물이 나며, 이마의 주름이 안 생긴다.
- ⑧ 口輪筋, 頰筋의 麻痺로 因해 口角이 健側으로 당기어 비뚤어 鼻脣溝가 얇아지며 말이 잘되지 않고 流涎하며 飲食이 患側의 치아와 볼 사이에 끼며 물이 흐른다.
- ⑨ 때로 味覺이 減退한다. 聽覺은 過敏하다.
- ⑩ 病程이 長期化되면 患側의 顏面筋이 痙攣하고, 口角이 反對로 患側으로 咬斜되는데 이를 倒錯現象이라 한다.
- 治法
- ① 經氣를 疏通
- ② 通經活絡 逐風祛邪
- 治療穴
- ① 宜灸聽會, 頰車, 地倉
- ② 地倉, 頰車, 翳風, 攢竹, 四白, 陽白, 人中, 承漿, 顴髎, 合谷, 絲竹空, 間使, 迎香
- ③ 地倉, 頰車, 迎香, 中渚, 臨泣, 足三里

III. 總括 및 考察

口眼喎斜에 대해 韓醫學에서는 입과 눈이 돌아간 경우를 口眼喎斜, 口眼歪斜로서, 口角만 비뚤어진 것을 咬僻 口僻 口喎 口噤喎斜 口噤眼合 或은 口歪僻으로서 表現하였다.³³⁾

口眼喎斜一症은 前人們은 “中風”門下에서 많이 列舉하였는데, 이는 口眼喎斜를 하나의 獨립된 疾病으로 본 것이 아니라 中風의 한 症狀으로 본 것이라 할 수 있다. 明·樓英은 《醫學綱目·口眼喎斜》에서 “凡半身不遂者，必口眼喎斜，亦有無半身不遂之證而喎斜者”라 하여 이미 單純口眼喎斜를 觀察하였다. 中風의 中經絡에 있어서도 口眼喎斜의 症狀이 있을 수 있는데 이는 周圍性面神經麻痺에相當한다.¹¹⁾

口眼喎斜의 原因을 時代別로 보면, 《內經》에서는 口眼喎斜를 足陽明胃經의 病變으로서 論하고 있다. 《金匱要略·中風歷節病脈證并治》에서는

“經脈空虛，賊邪不瀉，或左或右，邪氣反緩，正氣卽急，正氣引邪，喎僻不遂。”라 하였다. 《諸病源候論·風口喎斜》에서는 “風邪入于足陽明，手太陽之經，遇寒則筋急引頰，故使口喎僻。”이라 하였다. 金元時期에 있어서, 李東垣은 口眼喎斜가 邪中血脈의 所致라 하였고, 朱丹溪는 血虛有痰과 相關있다고 論하였다. 明 《景岳全書·癥風》에서는 “口眼喎斜有寒熱之辨……然而血氣無虧，則雖血未必(筋)緩，雖寒未必(筋)急，亦總由血氣之衰可知也。”라고 하였다. 清 《醫林改錯·口眼歪斜辨》에서는 “若壯盛人，無半身不遂，忽然口眼喎斜，乃受風邪阻滯經絡之症。經絡爲風邪阻滯，氣必不上達，氣不上達頭面，亦能病口眼歪斜。”라하여 風邪阻絡，氣滯血瘀의 所致라 하였다.¹⁾

이에 口眼喎斜의 原因을 要約해 본다면 顏面經絡上에 風·寒·熱·氣虛·血虛·內傷 等이 口眼喎斜의 根本原因이라 할 수 있을 것이다.³³⁾

口眼喎斜의 隨伴症狀으로는 顏面筋肉의 麻痺, 流涎, 構音障礙, 落淚, 耳痛, 聽覺過敏, 偏側味覺喪失 等이 있다.

本病은 韓醫學中의 名稱이 매우 많은데, 《內經》中에서는 “口喎” “口僻”라고 稱하였고, 《金匱要略》에서는 “喎僻”，《諸病源候論》에서는 “風口喎”，《三因方》에서는 “口眼喎斜”라 稱하였으며, 이외에 또한 面癱, 吊線風, 歪咀風 等의 名稱이 있다.¹⁾

口眼喎斜에 대한 鍼灸治療의 文獻을 찾아보면, 가장 먼저 《靈樞·經筋篇》에서 “足之陽明，手之太陽，筋急則口目爲僻，皆急不能卒視，治皆如右方也(燔鍼劫刺，以知爲數，以痛爲俞)。”라고 하였고, 晉 《鍼灸甲乙經》에 “口僻，失欠……大迎主之”，“口僻，偏歷主之.”라 하였으며, 以後로 《千金要方》，《千金翼方》，《外臺秘要》 等에 咬僻의 鍼灸治療에 對한 記載가 있다. 《針灸資生經》에는 “口眼喎”的 專節이 있고, 口眼喎斜를 治療하는 31个에 達하는 脣穴이 提出되었다. 그후로 《針灸聚英》，《鍼灸大成》等에 鍼灸治療에 對한 記述이 있다. 近代文獻中에도 有關한 報道가 매우 많으며, 治療方法에 있어 傳統鍼灸外에도, 또한 皮膚鍼, 電針, 藥物注射와 埋線 等의 新鍼療法이 있어 治療

方法이 豐富해졌으며 治療效果가 또한 있는 것으로 알려져 있다.

口眼喎斜의 鍼治療穴을 알기위해 口眼喎斜가 일어날 수 있는 部位의 經絡分布를 알아보면, 顏面은 諸陽經의 會合處로서 手三陽經脈은 手部에서 面部에 이르는 것이고, 足三陽經은 頭部에서 下行하여 足部에 이른다. 手足의 陽經脈이 모두 頭部에 到達한 것인데 足陽明胃經脈만은 鼻의 交頸部에서 起始하며 齒牙로 들어가서 口唇을 끼고 돌아 頰車를 依支하여 耳前부의 客主人을 지나서 顏面의 大部分을 廣絡하였다. 故로 顏面病은 오로지 胃經에 屬한다.

面部와 經絡과의 關係는 額은 足少陽經과 足陽明經이 關係하고, 鼻는 手陽明經, 手太陽經, 足陽明經과 脊脈이 關係, 人中은 脊脈과 手足陽明經이 關係, 脣은 足陽明과 足太陰이 關係, 承漿은 足陽明과 任脈이 關係, 眉至額은 鼻直線上은 脊脈, 內眞의 直線上은 足太陽經, 瞳子의 直線上은 足少陽經, 銳眞의 直線上은 手足少陽經이다. 頰은 內眞의 直下은 足陽明經, 瞳子의 直下은 足陽明經, 頰車: 足少陽經과 足陽明經이 關係한다.³²⁾

이에 口眼喎斜의 鍼治療穴의 經絡別 分布를 살펴보면, 手太陰肺經은 列缺, 太淵, 尺澤, 經渠의 穴이 있었고, 手陽明大腸經에는 二間, 合谷, 迎香, 禾髎, 手三里, 溫溜, 偏歷, 曲池의 穴이 있었으며, 足陽明胃經은 地倉, 頰車, 內庭, 巨髎, 四白, 大迎, 下關, 豐隆, 上巨虛, 承泣, 衡陽, 厥兌의 穴이 있고, 足太陰脾經은 商丘, 手少陰心經은 少海, 少府, 靈道의 穴이, 手太陽小腸經은 顴髎, 聽宮, 後谿, 前谷, 腕骨의 穴이, 足太陽膀胱經은 申脈, 攢竹, 天柱, 肝俞, 晴明, 絶骨, 通天, 承光, 絡却의 穴이 있었으며, 足少陰腎經은 照海, 腹通谷, 然谷의 穴이, 手厥陰心包經은 內關, 間使, 勞宮의 穴이, 手少陽三焦經은 翳風, 耳門, 支溝, 絲竹空, 中渚, 外關, 和髎의 穴이, 足少陽膽經은 聽會, 上關(客主人), 風池, 陽白, 瞳子髎, 曲鬚, 完骨, 頭維, 水溝, 承漿, 素髎, 強間, 韻交의 穴이 있고, 胸腹部에는 腹通谷의 穴이, 背部에는 肝俞, 筋縮, 大椎, 身柱의 穴이 있으며, 手部에는 列缺, 太淵, 尺澤, 經渠, 二間, 合谷, 手三里, 溫溜, 偏歷, 曲池, 少海, 少府, 靈道, 後谿, 前谷, 腕骨, 內關, 間使, 勞宮, 支溝, 中渚, 外關의 穴이 있고, 足部에는 內庭, 豐隆, 上巨虛, 衡陽, 厥兌, 商丘, 申脈, 絶骨, 照海, 然谷, 陽陵泉, 陽輔, 臨泣, 行間, 太衝, 中封의 穴이 있었다.

以上을 整理하면, 頭面部(頸部)에는 34穴, 胸腹部에는 1穴, 背部에는 4穴, 手部에는 22穴, 足部에는 16穴이 使用되었다.. 이에 頭面部를 가장 많이 選用하였고, 手部, 足部의 順으로 選用하였으니, 近位取穴을 主로 하였고, 遠位取穴을 그 다음으로 하였음을 알 수 있다.<表2>

口眼喎斜의 多用穴을 살펴볼 것 같으면 地倉(26回), 頰車(22回), 翳風(17回), 水溝, 四白(15回), 顴髎, 巨髎, 列缺, 合谷, 禾髎, 聽會(10回 以上 言及)의 順으로 多用되고 있음을 알 수 있었다.

灸法을 살펴보면, 聽會, 頰車, 地倉을 要穴로 하고, 翳風, 間使, 鄭門의 穴을 利用하고 있음을 알 수 있었다.

이밖에도 傳統鍼灸法 뿐만이 아니라, 口眼喎斜의 治療方法에 있어 또한 皮膚鍼, 電針, 藥鍼와 埋線, 穴位敷貼療法, 頭鍼, 耳鍼, 鍼鍼等의 新鍼療法이 있어 새로운 治療方法의 새로운 試圖가 계속되

以上을 整理하면, 手太陰肺經은 4穴, 手陽明大腸

고 있음을 알 수 있었다. 이에 있어서는 主로 既存의 穴位를 利用한 채, 鍼刺의 方法上의 差異가 主로 나타났다.

回), 頰車(22回), 翳風(17回), 水溝, 四白(15回), 頸膠, 巨膠, 列缺, 合谷, 禾膠, 聽會(10回 以上 言及)의 順으로 나타났다.

表1. 口眼喝斜의 鍼治療穴의 經絡別 分布

陰經	手三陰	手太陰肺經	列缺, 太淵, 尺澤, 經渠	
		手少陰心經	少海, 少府, 靈道	
		手厥陰心包經	內關, 間使, 勞宮	
	足三陰	足太陰脾經	商丘	
		足少陰腎經	照海, 腹通谷, 然谷	
		足厥陰肝經	行間, 太衝, 中封	
陽經	手三陽	手陽明大腸經	二間, 合谷, 邪香, 禾膠, 手三里, 溫溜, 偏歷, 曲池	
		手太陽小腸經	顴膠, 聽宮, 後谿, 前谷, 腕骨	
		手少陽三焦經	翳風, 耳門, 支溝, 絲竹空, 中渚, 外關, 和膠	
	足三陽	足陽明胃經	地倉, 頰車, 內庭, 巨膠, 四白, 大迎, 下關, 豐隆, 上巨虛, 承泣, 衝陽, 廉兌	
		足太陽膀胱經	申脈, 攢竹, 天柱, 肝俞, 睛明, 絶骨, 通天, 承光, 絡却	
		足少陽膽經	聽會, 上關(客主人), 風池, 陽白, 陽陵泉, 瞳子膠, 曲鬚, 完骨, 頭維, 陽輔, 臨泣	
督 脈		水溝, 筋縮, 身柱, 大椎, 素膠, 強間, 鬱交		
任 脈		承漿		

表2. 口眼喝斜 治療穴의 部位別 分布

部 位	經 穴	穴數
頭面部(頸項部)	迎香, 禾膠, 地倉, 頰車, 巨膠, 四白, 大迎, 下關, 承泣, 顴膠, 聽宮, 攢竹, 天柱, 睛明, 通天, 承光, 絡却, 翳風, 耳門, 絲竹空, 和膠, 聽會, 上關, 風池, 陽白, 瞳子膠, 曲鬚, 完骨, 頭維, 水溝, 承漿, 素膠, 強間, 鬱交	34穴
胸腹部	腹通谷	1穴
背 部	肝俞, 筋縮, 大椎, 身柱	4穴
手 部	列缺, 太淵, 尺澤, 經渠, 二間, 合谷, 手三里, 溫溜, 偏歷, 曲池, 少海, 少府, 靈道, 後谿, 前谷, 腕骨, 內關, 間使, 勞宮, 支溝, 中渚, 外關	22穴
足 部	內庭, 豐隆, 上巨虛, 衝陽, 廉兌, 商丘, 申脈, 絶骨, 照海, 然谷, 陽陵泉, 陽輔, 臨泣, 行間, 太衝, 中封	16穴

5. 鍼治療穴의 經絡分布는 足陽明胃經(12穴), 足少陽膽經(11穴), 足太陽膀胱經(9穴), 手陽明大腸經(8穴), 手少陽三焦經(7穴)의 順이었으며, 陰經穴보다는 陽經穴이 多用되었다.

6. 鍼治療穴의 部位別 分布는 頭面部(頸部) 34穴, 胸腹部 1穴, 背部 4穴, 手部 22穴, 足部 16穴이었다.

7. 灸法에 活用된 穴은 聽會, 頰車, 地倉, 翳風, 間使, 鄭門의 穴을 利用하고 있었다.

IV. 結論

口眼喝斜의 治療穴에 대하여 歷代 文獻을 考察한 結果 다음과 같은 結論을 얻었다.

- 原因은 顏面經絡上에 風·寒·熱·氣虛·血虛·內傷 等으로 나타났다.
- 隨伴症狀은 顏面筋肉의 麻痺, 流涎, 構音障礙, 落淚, 耳痛, 聽覺過敏, 偏側味覺喪失 等이 있었다.
- 治法은 祛風通絡, 養血熄風 等을 為主로 하였다.
- 鍼治療穴은 總 77穴로서, 多用穴은 地倉(26

參 考 文 獻

- 邱茂良외: 中國鍼灸治療學, 江蘇, 江蘇科學技

- 術出版社, 1988. p.330-337.
2. 皇甫謐: 黃帝鍼灸甲乙經, 台北, 東方書店, 中華民國49年. p.278-281.
 3. 孫思邈: 備急千金要方(影印), 서울, 大星文化社, 1984. p.524-525. 536.
 4. 王燾: 外臺秘要, 서울, 교육주보사출판부, 1975. p.1056-1082.
 5. 王懷隱等編: 太平聖惠方, 서울, 翰成社, 1979. p.3177-3243.
 6. 曹孝忠等纂輯: 聖濟總錄, 台北, 新文風出版公司, 中華民國67年. p.1516-1537.
 7. 王執中: 鍼灸資生經(影印), 서울, 一中社, 1991. p.12-13.
 8. 高武纂集: 鍼灸聚英, 上海, 上海科學技術出版社, 1978. p.269-270.
 9. 李梃: 醫學入門(影印), 서울, 翰成社, 1980. p.66-78.
 10. 楊繼洲: 鍼灸大成校釋, 台北, 啓業書局, 中華民國76年. p.1105-1107.
 11. 張介賓: 類經圖翼, 서울, 成輔社, 1982. p.210-215.
 12. 吳謙等編: 醫宗金鑑, 北京, 人民衛生出版社, 1992. p.2227-2231.
 13. 劉瑾重: 神應經(鍼灸醫學典籍大系中), 大阪, 出版科學總合研究所, 昭和54年. p.68-71.
 14. 宿稱康賴: 醫心方, 서울, 同仁社, 1977. p.170-177.
 15. 一谿叟道: 鍼灸集要(鍼灸醫學典籍大系中), 大阪, 出版科學總合研究所, 昭和54年. p.87
 16. 岩田利齋: 鍼灸要法指南(鍼灸醫學典籍大系中), 大阪, 出版科學總合研究所, 昭和54年. p.215-216
 17. 王德琛외: 中國鍼灸學, 天津, 天津科技翻譯出版公司, p.91-92.
 18. 上海中醫學院: 鍼灸學(新編中醫學教材), 香港, 商務印書館, 1975. p.340-341.
 19. 林鍾國: 鍼灸治療學, 서울, 集文堂, 1986. p.797. p.935.
 20. 丘崢: 鍼灸治療手冊, 서울, 癸丑文化社, 1981. p.142-143.
 21. 申天浩: 痘證診治, 서울, 成輔社, 1990, p.486-489.
 22. 崔容泰, 李秀鎬: 精解鍼灸學, 서울, 행림출판, 1985. p.848.
 23. 許任: 許任鍼灸經驗方, 서울, 一中社, 1992. p.120.
 24. 金賢濟외: 最新鍼灸學, 서울, 成輔社, 1983. p.616-618.
 25. 孫仁喆외: 臨床韓方講座, 서울, 대성문화사, 1995. p.107-112.
 26. 邱茂良외: 鍼灸學 (高等醫藥院教材), 上海, 上海科學技術出版社, 1985. p.217-219.
 27. 楊維傑: 鍼灸經緯, 台北, 樂群出版事業有限公司, 中華民國74年. p.313, p.326, p.407.
 28. 朴炳昆: 漢方臨床四十年, 서울, 大光文化社, 1987. p.276-278.
 29. 金在圭외: 電針治療의 理論과 臨床, 서울, 書苑堂, 1993. p.141-142.
 30. 黃延學: 舍岩鍼灸正傳, 大邱, 先驅者出版社, 1986. p.83-88.
 31. 趙世衡: 舍岩鍼法體系的研究, 서울, 成輔社, 1986. p.195-201.
 32. 崔容泰외: 鍼灸學(全國韓醫科大學教材), 서울, 集文堂, 1988. p.1214. p.1296-1297.
 33. 安昌範: 口眼喎斜의 鍼과 物理治療效果에 對한 臨床的 研究, 1985, 大韓鍼灸學會誌Vol.6, p.71-80.