

藥酒를 이용한 抗癌治療에 관한 文獻的 考察

鄭 熙 · 姜在春

Documental studies on anti-cancer therapy by using medi-alcohol

Hee Jung, Jae-chun Kang

Dep. of Oriental Internal Medicine, College of Oriental Medicine, Sangji University, Wonju, Korea

Anti-cancer medi-alcohols in oriental herb prescriptions were divided by chief effects. Each medi-alcohols were analyzed and studied about frequency, character, target, effect. Also, they were divided into the method of making medi-alcohols.

The results were summerized as follows.

1. The department of using medi-alcohol in anticancer herbal scriptions were limited in gynecology, dermatology and digestive internal medicine. There were a lot in gynecology.
2. In analysis about medi-alcohols of dermato scriptions by chief effect, the herbs of relieving exterior syndrome were a lot first and the herbs of invigorating-qi were second.
3. In analysis about medi-alcohols of dermato scriptions by chief effect, the herbs of promoting blood circulation to remove blood stasis were a lot first and the herbs of invigorating-qi were second.
4. The method of making medi-alcohol was divided into four types ; boiling, making up pills, extration, filtration.

I hope that the medi-alcohols will be used as practional references.

I. 緒 論

腫瘍이란 “自律成을 가진 組織의 過剩한

發育”¹⁾을 말하는 것으로 一般的으로 臨床 및 病理 形態學的으로 良性腫瘍과 惡性腫瘍²⁾으로 區分된다. 이 중 惡性腫瘍을 癌이라

* 尙志大學校 韓醫科大學 肝系內科學教室

는名稱으로代表하여부른다.

癌은細胞分裂를調節하는機能的缺陷이나惡性腫瘍遺傳子를抑制하는能力이喪失됨으로써發生하는非正常的細胞의增殖을말하는데, 전리방사선, 담배, 음주 및 바이러스, 장기간 다량의 약물복용, 식이적인 문제, 기생충질환 등과 함께 음식, 수질, 대기 등의 환경오염과 복잡한 산업사회에서의 각종 정신심리적 스트레스 등으로 발생한다^{3,4,5})고 알려져 있다.

韓醫學에서癌이라는用語는宋代〈衛濟寶書〉에서最初로記錄하고 있으나^{6,7,8}) 이에 대한 실제認識은 훨씬以前으로〈內經〉에“腸覃”, “石瘕” 등의 용어에서 엿볼 수 있으며⁹) 積聚^{6,7,10,11,12,13}), 腫瘍^{6,7,12}), 腫瘤^{6,7,10,12,13}), 瘕瘕^{6,7,11,12}), 疝瘕^{6,7,11,12}), 腸覃^{6,7,11,12}), 痞塊^{6,7,12}), 石瘕^{6,7,12}), 血蠱^{6,7,12}), 反胃^{6,7,12,14}), 石疽^{6,7,10,12}), 石癰^{6,7,12}), 등과 관련된疾患으로認識되고 있다.

癌의治療方法을 보면西醫學에서는수술요법, 방사선요법, 화학요법 및 면역요법과 유전자요법 등¹⁷)을 사용하고 있으며, 韓醫學에서는正氣補養을 위주로 하면서 淸熱解鬱法, 軟堅散結法 및 活血化瘀 등^{6,8,15,16})을 널리 사용하고 있다. 최근中國에서는西醫學의癌治療法과 并行하여漢藥材를 활용함으로써癌治療의效率을 높이고生存率을增加시키며, 西醫學的인癌治療로 인한副作用을 줄이고 있는實情이다¹⁸).

이처럼 東西醫學 모든 분야에서抗癌治療에 관한研究가 활발히 이루어지고 있으나 환경오염과 심리적 스트레스의 증가 등으로 인해癌의發生頻度는 오히려 높아지고 있으며¹¹) 아직은 많은副作用과 그治療限界가 있는 점을勘案할 때抗癌治療에 대한 보다 다양한治療法의開發이 절실히 요구되는 반면, 현재까지藥酒를 이용한抗癌治療에 관한內容이 거의 알

려지지 않았으므로 이에筆者는抗癌治療에술을 이용한 예를文獻적으로考察, 사용된藥劑 및 修治方法, 適應症 등을 중심으로 정리하여 보고하는 바이다.

Ⅱ. 資料調查 및 研究方法

1. 資料調查

千金翼方에서부터現在에 이르기까지參考資料로 많이利用되고 있는國內·外文獻中에서 17種의書籍을研究對象으로 하였다.

- 1) 王懷隱 : 太平聖惠方
- 2) 危亦林 : 世醫得效方
- 3) 樓英 : 醫學綱目
- 4) 徐彥純 : 玉機微義
- 5) 朱震亨 : 丹溪心法附餘
- 6) 楊緒性 : 古今醫統大全
- 7) 孫一奎 : 赤水玄珠全集
- 8) 龔庭賢 : 萬病回春
- 9) 龔庭賢 : 壽世保元
- 10) 張璐 : 張氏醫通
- 11) 鮑相璈 : 驗方新編
- 12) 吳謙 : 醫宗金鑑
- 13) 康命吉 : 濟衆新編
- 14) 再小峰 : 歷代名醫良方注釋
- 15) 蕭源 : 永樂大典醫藥集
- 16) 陳夢雷 : 圖書集成醫部全錄

2. 研究方法

- 1) 文獻中에서 술을 사용한抗癌處方을調查하였다.
- 2) 술을 사용하는抗癌處方을主治에 따라

皮膚科, 婦人科, 內科로 分類, 圖表化하였다.

3) 處方構成 中 多用的 藥物의 使用 頻度數를 調査, 圖表化하였다.

4) 多用藥物의 分析

多用的 主要 藥物의 性味, 歸經, 效能, 主治를 調査, 圖表化하였다.

5) 藥酒製造方法의 分析

술을 사용하는 方法에 따라 處方을 分類, 圖表化하였다.

Ⅲ. 本 論

〈太平聖惠方〉¹⁹⁾

◇ 當歸煎方

治腸內癰腫

當歸 一兩 沒藥 三分 麝香 半兩細研 乳香 半兩 桂心 半兩 朱砂 半兩細研 黃芪 三分 漏蘆 半兩 自然銅 半兩 丁香 半兩 木香 三分 芎歸 半兩 麒麟竭 三分 檳榔 半兩 雲母粉 半兩 沈香 半兩 甘草 半兩 白礬半兩 白芷 半兩 密陀僧 半兩 赤芍藥 三分 野駝脂 三分 黃太脂 三分(兩) 生地黃 半斤絞取汁

右件藥 除脂 并 羅爲末 銀鍋內 先用好酒五升 以慢火煎去二升 卽下地黃汁 更煎漸濃 次入野駝脂 不住手以柳木 攪如膏 卽下藥末 更攪令勻 以瓷盒盛 每日空心午時晚間 以甘草酒調下一彈圓大服 外取塗貼患處 亦良

◇ 四等圓方

治婦人癩癧氣 心腹冷痛 飲食不消

川大黃 一兩 碎微炒 訶黎勒皮 一兩 檳榔 一兩 木香 一兩

右左藥 擣細羅爲末 以酒煮麵糊和圓 如梧

桐子大 每服食前 生薑橘皮湯下十五圓 溫酒下亦得

◇ 抵聖圓方

治婦人疝瘕 惡血積聚 並月後不通

璫砂 半兩細研 麒麟竭 半兩 沒藥 半兩 桂心 半兩 斑猫 半兩糯米拌炒令黃去翅足 莽草 半兩微炙 狼毒 半兩 兔箭羽 半兩 沒心草 半兩

右件藥 擣羅爲末 以醋煮麵糊和圓 如梧桐子大 每日 空心 煎紅藍花酒 方溫下五圓

◇ 木香圓方

治婦人疝瘕 及血氣積聚 時攻腹脅疼痛

木香 半兩 巴豆 一分去皮心 炒黃紙裹壓去油 乾漆 半兩搗碎炒茶烟出 吳茱萸 一分湯沈七遍焙乾微炒 檳榔 半兩 附子 一分暑裂去皮臍 猪牙皂莢 一分去黑皮塗令酥令黃去子 百蕪萸 一分 當歸 一分剉微炒 桂心 二(一)分 乾薑 二(一)分炮裂剉

右件藥 擣羅爲末 鍊蜜和擣三五百杵 圓如梧桐子大 每日空心 及痛發時 煎紅藍花當歸酒 下三圓

◇ 腦砂煎圓方

治婦人積年血氣 癥痞不消 四肢慢瘦 腹至以瘦 腹脅放痛 經絡不通

腦砂 一兩細研 乾漆 一兩 川大黃 一兩

以上三味 并擣羅爲末 以無灰酒一升 以慢火熬盛膏 磁入後藥

〈世醫得效方〉²⁰⁾

◇ 盧氏感應圓

治虛弱人久積

黃蠟 眞者 十兩 巴豆 百粒 去皮尖 研爲粉

用紙數重裹 搥透再易紙 至油盡盛白霜爲妙
杏仁 七十粒 去皮尖 研細 依巴豆法去油 丁香
懷乾 一兩 木香 濕紙裹外 一兩 乾薑 炮 肉豆
蔻 麵裹外 檳榔 華澄茄 各一兩 乳香 研三錢
百草霜 青皮 湯洗 去穢炒 片子薑黃 各一兩

右除巴豆粉 百草霜 杏仁 乳香外 并爲末 却
同前四味拌和研勻 先將上項黃蠟十兩於銀石
器內鎔化作汁 用重綿濾去滓 以無灰酒一升
於銀石器內煮蠟鎔滾 取起候冷 其蠟自浮於
酒上 去酒不用 春夏修合用清油一兩 秋冬用
一兩半 大銀器內熬令香熟 次下酒煮糊同蠟
化作汁 乘熱拌和前項藥末十分均勻了 候稍
凝 分作劑子 用罐子盛之 半月後方可服 如服
施圓如 羅蔔子大 任意服之二三十圓 加至五
十圓無礙 此藥以蠟多雖難圓 然圓子愈細 其
功愈博 臨睡須常服之 若欲治病 不拘時候 治
豆積 香蘇散三錢 水一盞煎服 加白芥子一撮
炒 研入用

◇ 大消石圓

治七癥八 瘕 聚結痞(一)塊 及婦人帶下絕產
消石 三兩 大黃 四兩 人蔘 甘草 各一兩半
重

右爲末 二三年苦酒三升 置銅石器中 以竹
作準 每一升作一刻柱器中 先納大黃 常攪不
息 使微沸 盡一刻 乃內餘藥 又盡一刻 極微火
熬 使可圓 則圓如梧桐子大 每服三十圓 米湯
下 四日一服 婦人服之 或下如鷄肝 或如米泔
正赤黑等三二升 後 忌風冷如產婦

◇ 琥珀圓

治血瘕 腹中有塊攻刺 小腹痛重 或腰背相
引爲痛 久而不治黃瘦羸乏

琥珀 別研 白芍藥 川烏 炮 去皮 川牛膝 去
蘆 酒浸 鼈甲 醋炙 蓬莪朮 炮 當歸 去蘆 酒浸
梓 厚朴 薑炒 各一兩 木香 不見火 澤蘭葉 官

桂 不見火 各半兩 麝香 別研 半煎

右爲末 酒糊圓 梧桐子大 每服七十圓 空心
溫酒 米飲下

〈醫學綱目〉²¹⁾

◇ 白芷升麻湯

凝滯爲癰 出身上半以上

白芷 七分 升麻 桔梗 各五分 甘草炙 黃芩
生 歸梢 生地 各一錢 酒黃芩 黃芪 連翹 各二
錢 中桂 少 紅花 少

右水酒各一盞 同煎至一盞 臨臥熱服 一服
愈

◇ 內托營衛湯

治風濕熱鬱氣手足癢痺 治血脈凝亦

黃芪 桂枝 各五錢 防風 羌活 黃芩 當歸 各
一錢半 連翹 柴胡 各二錢 甘草炙 人蔘 各一
錢 蒼朮 紅花 各三錢

右咬咀 只作一服 水酒各一大盞 同煎至一
盞 溫服

◇ 羌活當歸湯

治腦疽

黃芩 酒炒 黃連 酒炒 歸身 酒浸 甘草 炙 各
一兩 羌活 黃柏 酒浸 連翹 各五錢 澤瀉 獨活
蘘本 各三錢 防風 梔子仁 各五分

右咬咀 分作四服 水一小碗 先沈一時許 入
酒一匙 煎至八分 去渣 大溫服 食後 日二服
和渣計六服 三日服盡 去渣 清藥調下後檳
榔散

◇ 黃栢當歸湯

治背疽

黃栢 炒 七錢 黃芩 炒 當歸身 炒 甘草 炙
各一兩 黃連 炒 防風 各五錢 澤瀉 山梔 知母

地骨皮 各三錢 連翹 五分

右咬咀 分作四腹 每服水一小碗 沈一時許 入酒一匙 煎至八分 去渣 調下檳榔散 大溫服 如前藥同

◇ 保安湯

治瘡托裏 或已成者速潰

瓜萹 新者一個 去皮 火焙 沒藥 通明者一錢 研 金銀花 甘草 生薑 各半兩

右爲細末 用好無灰酒三升 于銀石器內 煎至一升 分作三盞 三次飲盡 病微者 只一服 如服托裏藥不能發散 又作瘡者用此

◇ 神效托裏散

治癰疽 發背 腸癰 疔癰 無名腫毒 焮赤疼痛 憎寒發熱 不問老幼虛弱 并治之

黃芪 去蘆 忍冬藤葉 各五兩 當歸 一兩八錢 粉草 炙 八錢

右爲細末 每服二盞 酒日盞半 煎至一盞 病在上 食後服 在下 食前服 少傾再進 留滓外敷

◇ 回春金銀花湯

諸瘡瘍痛 色變黑紫者

金銀花 并梗 二兩 黃芪 四兩 甘草 一兩

右用酒一升 重湯煮三兩時 去渣溫服

◇ 忍冬酒

初發便當服此 或貧乏中 或居鄉僻田夫野老 百發百中

忍冬藤 生取一把 以葉入砂盆研爛 入酒少許 調和得所 塗傅四圍 中心留一口 右取五兩 用木槌碎 不犯鐵器 甘草 一兩 生 剉

右二味 入砂瓶內 用水二碗 文武火煎至一碗 入好酒一大碗 煎十數沸 去渣 分爲三服 一日連夜進盡 病勢重 一日夜可二劑 忍冬藤補血 如氣虛及寒多人不宜用 是故田夫野老 百

發百中也

◇ 神效瓜萹散

治乳癰乳癌 神效

瓜萹 一個 去皮焙爲末 子多者有力 甘草 生當歸 酒浸 焙 各三兩 乳香 別研 沒藥 別研 各二錢半

右爲末 用無灰酒四升 於銀石器內慢火熬取一升 清汁分作三服 食後良久服 如有奶巖 便服此藥可杜絕病根 如毒氣已成 能化膿爲黃水 毒未成 卽於大小便中通利 如疾甚 再合服 以退爲度

〈玉機微義〉²²⁾

◇ 寶鑑見眼丹

治婦人石瘕 狀如懷子者

附子 四錢 炮 鬼箭羽 紫石英 各三錢 肉桂 玄胡索 澤瀉 木香 各二錢 血竭 水蛭 一錢 炒 研盡 檳榔 二錢半 桃仁 三十枚 炒 三稜 五錢 大黃 二錢 同三稜酒浸一宿 焙

右末 酒糊丸 桐子大 每三十九 食前鹽湯或酒下

〈丹溪心法附餘〉²³⁾

◇ 消塊丸(硝石大黃丸)

止可磨塊 不令人困 須量度虛實

硝石 六兩 人參 三兩 甘草 三兩 大黃 八兩 右爲末 二三年苦酒三升 又云三斗 置磁器中 以竹片作準 每入一升 作一各柱 豎器中 先納大黃 不住手攪 使微沸 盡一刻 乃下餘藥 又盡一刻 微火熬 使可丸 則取丸 如鷄子中黃大 每一丸 米飲下

◇ 烏梅丸

治酒積 消食化痰

烏梅 一斤 半夏 半斤 生薑 一斤 右件 石臼
細末 新瓦兩片來定 火上焙 三日三夜 爲度 次
下

神麩 麥芽 陳皮 青皮 莪朮 丁皮 大腹子 枳
殼 各四兩

右共爲細末酒糊爲丸 每服四五十丸 薑湯
下

〈古今醫統大全〉²⁴⁾

◇ 黑神丸

神麩 茴香 各四兩 木香 花椒 炒去汗 丁香
各半兩 檳榔 四枚 乾漆 六兩 半生 半用重湯
煮半日 炒令香

右除椒 漆 餘五味皆半生半炒爲細末 用前
生熟漆和丸 如彈子大 茴香末十二兩 鋪陰地
蔭乾 後外乾 茴香收器中 極乾去茴香 腎餘盲
腸膀胱疝瘕 及疝墜五膈 血崩 產後諸穴漏下
赤白 並一環分四服 死胎一丸 皆綿灰酒下 難
產 炒葵子四十枚搗碎 酒煎下一丸 諸疾不
過三服 疝氣十服 隔氣癥瘕五服 血瘕三丸當
差

◇ 大硝石丸

治婦人七癥八瘕 結聚痞塊 及婦人帶下絕
產 腹中有癥 瘕者

硝石 三兩 大黃 四兩 人參 甘草 各一兩

右爲末 二三年苦酒三升 治銅石器中 先納
大黃 微火熬數沸 常攪不住 至七分 內餘藥復
熬成膏 至可丸卽丸 如梧桐子大 每服三十九
米飲下

◇ 鬱金散

治婦人血氣撮痛 月水不通 預先嘔吐 疼痛
及腰腹脹

片薑黃 一錢 牡丹皮 莪朮 紅花 當歸 赤芍
藥 川芎 桂心 延胡索 各七分

右咀 水盞半 酒半盞 煎八分 溫服 日三次

◇ 沒藥散

婦人血氣疼痛不可忍者

沒藥 紅花 當歸 延胡索 炒 各等分

右爲末 每服二錢 童便 酒各半盞 同煎至六
分 熱服 只用秤錘燒紅淬過 調藥下亦可

◇ 牡丹皮散

治婦人久虛羸瘦 血塊走注 心腹疼痛

牡丹皮 桂心 當歸 延胡索 各一兩 莪朮 牛
膝 赤芍藥 各二兩 京三稜 兩半

右水一盞 煎半盞 加酒半盞 同煎七分溫服

〈赤水玄珠全集〉²⁵⁾

◇ 寶鑑見睨丹

治婦人石瘕 狀如懷子者

大附子 炮 鬼箭羽 紫石英 各三錢 肉桂 玄
胡索 澤瀉 木香 各二錢 血竭 水蛭 一錢 炒研
盡 檳榔 二錢半 桃仁 三十枚 炒 三稜 五錢
大黃 二錢 同三稜酒浸一宿 焙

右末 酒糊丸 桐子大 每三十九 食前鹽湯或
酒下

◇ 當歸丸

治婦人月經不調 血積

當歸 赤芍 川芎 熟地 京三稜 廣茂 各五分
神麩 百草霜 各二錢半

右末 酒糊丸 桐子大 溫水下

◇ 牡丹散

婦人久虛羸瘦 血塊走注 心腹疼痛

牡丹皮 玄胡索 桂心 當歸 各一兩 牛膝 赤

芍藥 莪朮 各三兩 京三稜 一兩半
每服三錢 水酒各半盞 煎服

◇ 四聖散 一名神效括囊散

治腸癰 癰疽 五發 乳癰 便毒 服之神應
大生括囊 一枚 去皮 粉草 研末 四錢 乳香
研末 一錢 沒藥 研末 三錢

右用好酒二大盃 慢火煎至一盃 分作二次
兩日盡 大便順導惡物妙 約乾枯樓則用兩枚
若疾甚者再服 以退爲度 此方極佳 聖音碗

〈萬病回春〉²⁶⁾

◇ 神奇散

治便毒 魚口

穿山甲 土炒 三斤 木鼈子 去殼 三個 牡蠣
大黃 各三錢 黃連 黃芩 黃栢 金銀花 連翹 各
一錢五分 黃腦 三錢

右를 捰하여 一劑로 하고 酒·水 各半分
에 煎하여서 空心에 服用한다.

◇ 赤白丸

治瘰癧未破

白礬 三兩 朱砂 九錢

右를 細末로 만들어 酒糊에 綠豆大의 丸을
만든다. 每回 二十丸을 服用하되 淸茶에
送下한다. 하루 三服을 한다.

◇ 涌泉散

治乳癰發痛

天花粉 金銀花 皂角刺 穿山甲 土炒 當歸尾
白芷稍 瓜蒌仁 貝母 甘草節

右를 捰하여 一劑로 하고 酒煎하여 服用
한다.

◇ 瓜蒌散

婦人의 乳癰 奶勞하는 것을 다스린다.

黃瓜蒌 子가 많은 것 皮를 버리지 않고 研
爛한다. 當歸 五錢 乳香 研碎 一錢 沒藥 研
一錢 甘草 五錢

右를 捰하여 一劑로 하고 好酒三碗에 銀石
器 속에서 慢火로 熬하여 半碗이 되게 하고
二分하여 두 번 食後에 服用한다.

〈壽世保元〉²⁷⁾

◇ 消積補中丸

治五積六聚狀如癥瘕隨氣上下發作有時 心
腹疼痛上氣塞塞小腹脹滿大小便不利

陳皮 去白一兩 半夏 湯沈切片一兩 白茯苓
去皮二兩 白朮 去蘆炒二兩 香附 醋炒一兩 青
皮 去肉四錢 木香 三錢不見火 檳榔 七錢 莪
朮 醋炒八錢 三稜 醋炒八錢 羅蔔子 炒一兩
砂仁 炒四兩 神麴 炒一兩 麥芽 炒六錢 白芥
子 炒一兩 川芎 八錢 黃連 薑炒一兩 桃仁 去
皮尖一兩 梔子仁 薑汁炒一兩 紅花 五錢 當歸
酒炒一兩 乾漆 炒黃五錢 眞阿魏 醋沈五錢

右爲細末 薑汁酒打稀糊爲丸 如梧桐子大
每服八十丸 食後 白湯送下 體虛人 加入麥一
兩 外宜化鐵膏貼之

◇ 消癭湯

治癭瘤癰疽便毒惡瘡 久漏不愈者

海藻 洗 龍膽草 海蛤粉 各二兩 通草 昆布
燒存性 苦白礬 松蘿 各一兩 半夏 二兩五錢
麥斛 一兩五錢 白芷 一兩

右爲末 每服五錢酒煮 氣感草下於諸肉汚
身諸毒等物 又要彈半納丸

◇ 加減真人活命飲

又名千金內消散

治癰疽發背 腫痛如錐刺 不可認者

當歸味 酒洗一錢五分 赤芍 一錢 白芷 一錢
木鼈子 去殼一錢 穿山甲 三大升 蛤粉炒 金銀
花 三錢 乳香 僵蠶 天花粉 皂角刺 大黃 各一
錢 瓜蒞仁 去殼二錢 沒藥 五分 甘草切 五分
右剉一劑 水酒煎服

◇ 加味千金內托散

治癰疽潰後

黃芪 鹽水炒 人蔘 當歸 酒洗 川芎 白芍 酒
炒 白芷 防風 川朴 薑炒 桔梗 官桂 瓜蒞仁 去
殼 金銀花 甘草節

右剉 每服一兩 水煎入好酒半盞 去渣 溫服

〈張氏醫通〉²⁸⁾

◇ 鷄矢醴

治鼓脹內有濕熱停積 且食不能暮食
騙鷄矢白 但與陳米銀養 勿與雜食 則矢乾
有白

右取八合微炒 入無灰酒三升 煮取一升五
合 五更熱服

與無 以不落水鷄內金炙脆爲末 荷葉裹陳
米飯爲丸 每服二三錢 空心溫酒送下

◇ 和血通經湯

治婦人寒客胞分 月事不來 結爲石瘕 及一
切血結成績

當歸 熟地黃 蘇木 各一錢 三稜 炮 廣茂 炮
木香 貫衆 肉桂 各八分 紅花 三分 血竭 五分
食前紅酒煎服 忌酸炒生冷之物

◇ 見睨丸

治寒氣客於下焦 血氣閉塞而成石瘕 腹中
堅大 久不消者

附子 炮 去皮 臍 四錢 鬼箭羽 如無 鯪鯉甲
代之 肥人痰悶 鬼白南星代之 紫石英 各三錢

別飛 澤瀉 肉桂 勿見火 延胡索 木香 各二錢
檳榔 二錢五分 血竭 一錢五分 別研 水蛭 一
錢 如無 廣茂代之 桃仁 三十粒 去皮尖 乾漆
灰 拌炒 去漆灰 京三稜 五錢 熨 大黃 三錢 剉
用酒同三稜沈一宿 焙

右十三味 除血竭 桃仁外同爲末 入別研二
味和勻 紅酒打糊丸 如桐子大 每服三十九 淡
醋湯下 食前溫酒亦得 虛者 去水蛭 三稜 加入
蔘一兩 當歸五錢 虛甚用十全大補湯送下

〈驗方新編〉²⁹⁾

◇ 消痞膏

治積年惡痞 至重貼至兩張即消 屢試神驗

密陀僧 六兩 阿魏 五錢 羌活 水紅花子 各
一兩 穿山甲 三錢 香薷 一斤八兩

火後照常熬膏法 膏成膏時下麝香 一錢 用
布照 大小 貼 凡患 癰處 肌膚定 無毫毛 須看
准以筆圈記 用膏貼之 內用水紅花子研末三
錢 燒酒二斤 暑之 時飲一杯 痞消乃之 水紅花
子即紅蓼花子 自取爲真 藥店多假 用之 不效

◇ 小金丹

治流注 惡核 痰核 瘰癧 乳癌 橫痃 及一切無
名陰疽初起 屢時如神

白膠香 即楓樹油香 草烏 五靈脂 地龍 即蚯
蚓 又名曲蟮 制木鼈 各淨末一兩五錢 制沒藥 制
乳香 制法見藥物備要 歸身 各淨末七錢五分 麝
香 一錢 陳墨 一錢二分 用糯米粉 一兩二錢

煮稠和入各藥末 搗千槌爲丸 如芡實大 一料
藥爲二百五十九丸 晒乾 忌火烘 瓷瓶收貯 以蠟封
口 勿令泄氣 臨用取一丸 布包好 放平石上 隔布
敲碎 入杯內 以好酒浸入 用小杯蓋住一二時 以
熱陳酒送服 盡醉 蓋被睡臥取汗 即愈

〈醫宗金鑑〉³⁰⁾

◇ 血竭散

治癥瘕積痞血壅

眞血竭(如無紫癍代) 當歸 赤芍 蒲黃 延胡索

上等分 研細 再研 就盡爲度 每服一錢 用童便合好酒半大盞 煎一沸 溫調下 放散何時一服 上床良久再服 其惡血自循經下行 不致席上 免生百病

◇ 內消散

此方治癰疽發背 對口瘻瘡 乳癰 無名腫毒 一切惡瘡 能令癰腫內消 使毒內化 尿色赤污 從小便而出 勢大者 雖不全消 亦可轉重爲輕 移甚居淺

知母 一錢 貝母 一錢 花粉 一錢 乳香 一錢 半夏(制) 一錢 白芨 一錢 穿山甲 一錢 皂刺 一錢 銀花 一錢

上九味 水 酒各一碗 煎八分 隨病上下 食前後服之 留藥渣搗爛 加秋芙蓉葉一兩 研爲細末 再加白蜜五匙 用渣調敷瘡上 一宿即消 重者再用一服

◇ 治癰丸

婦人血氣成塊及血瘕

蓬朮 三兩 京三稜 二兩 久用硝磁投爲擗 丁香皮 二兩 木香 兩半 丁香 兩半 厚朴 炒 三兩 石菖蒲 二兩 良薑 兩半 川牛膝 一兩 薏苡仁 一兩 四君子 三兩 取肉 石蓮子 三兩 巴豆 五兩 去油膜 香附子 四兩 制 蠱蟲 兩半

右爲細末 稀糊丸 如小豆大 每服二十丸 用蘇木酒 童便各半 煎五七沸令溫 空心吞下

◇ 牡丹皮湯

治婦人久虛羸瘦 血塊走注 心腹疼痛

牡丹皮 桂心 當歸 延胡索 各一兩 莪朮 牛膝 赤芍藥 各二兩 京三稜 兩半

右爲細末 每服三錢 水酒各半煎服

〈韓國醫學大系(18권)-濟衆新編〉³¹⁾

◇ 仙方活命飲(寶鑑)

治一切癰疽毒腫未成內消已成即潰排膿止痛消毒

大黃 五錢 金銀花 三錢 當歸尾 皂角刺 陳皮 各一錢五分 乳香 貝母 天花粉 白芷 赤芍藥 甘草節 各一錢 防風 七分 沒藥 五分 穿山甲 三片 燒別研

用好酒入尾罐封口煎熟隨瘡上下飲之服後再飲酒二三盃側臥睡

◇ 托裏消毒散(寶鑑)

治癰疽未成即消已成即軌 能壯氣血使毒氣不致內攻

金銀花 陳皮 各三錢 黃芩 鹽水炒 天花粉 各二錢 防風 當歸 川芎 白芷 桔梗 厚朴 穿山甲 醋炒 皂角刺 炒 各一錢

分作二貼 每一貼 酒水相半煎服 病在下只用水煎

◇ 忍冬酒(寶鑑)

治癰疽惡瘡背癰乳癰 不問發在何處

忍冬藤 生取一把 以葉入砂盆研爛 入酒少許 塗付四圍中心留一口 又取 五兩槌碎 甘草一兩 剉入 砂瓶水二碗 文武火煎至一碗 入好酒一大碗煎 雖三沸分三服

◇ 白花蛇酒(寶鑑)

治大風癩瘡 白花蛇 一條

先蒸 糯米 二斗 缸底先安酒麴次將蛇以絹盛之頓於麴上後以糯飯頓於蛇上以紙封缸口

候三七日開取酒將蛇去皮骨焙乾末每溫酒一盞調蛇末一匙服之仍以酒脚並糟做餅食之

◇ 紫金丹解痰酒

治食慮思憂磨禽獸肉生丁吐利

百頸蚯蚓

塞爛火酒濾去滓陰地再導丁四圍流豆出毒

〈歷代名醫良方注釋〉³²

◇ 硝石大丸

治十二癥瘕 婦人帶下

硝石 六兩 大黃 八兩 人參 二兩 甘草 二兩
末 苦酒丸 鷄子黃大

◇ 海藻酒

療頸下卒結 囊漸大欲盛

海藻 一斤(去鹹) 漬酒 二升
上二味以絹袋海藻酒漬

◇ 紅籃花酒

主婦人腹中血氣刺痛

紅籃花 一兩

以酒一大升 未至再服

◇ 桂心酒

治月經不通 結成癥瘕方

桂心 四兩 牡丹 四兩 芍藥 四兩 牛膝 四兩
乾漆 四兩 土瓜根 四兩 牡蒙 四兩 吳茱萸 一
升 大黃 三兩 黃芩 二兩 乾薑 二兩 蠹蟲 二白
枚 螻蟲 七十枚 蟻蟻 七十枚 水蛭 七十枚 亂
髮灰 一兩 細辛 一兩 殭蠶 五十枚 大麻仁 一
兩 灶突墨 三升 乾地黃 六兩 虎杖根 五兩 鼈
甲 五兩 菴蘭子 二升

上二十四味咬咀 以酒四斗分兩甕 沈之七
日并一甕盛 攪令調 還分作兩甕

〈永樂大典醫藥集〉³³⁾

◇ 磨積丸

治婦人參拾六疾 積氣內功 經後不調 腹脅
多脹 或時刺痛 不進飲食

京三稜 煨香切 蓬莪菪 煨香切 各二兩 茴
香 微炒 附子 炮 去皮 臍 白芍藥 乾薑 炮 各
一兩半 當歸 洗 焙 一兩三分 巴戟 去心 微炒
一兩 艾葉 炒焦 一兩三分 川蓮子肉 炒 一兩
右件爲細末 酒煮麵糊丸如梧桐子大 每服
五十丸 溫酒下食前

◇ 大黃丸

治婦人疝瘕氣 心腹冷痛 食飲不消

川大黃 一兩 剉碎 微炒 訶黎勒皮 一兩 檳
榔 一兩 木香 一兩

右件藥搗細羅爲末 以酒煮麵糊和丸 如梧
桐子大 每服食前 生薑橘皮湯下十五丸 溫酒
下亦得

◇ 逐氣丸

治婦人血氣衰弱 小腹疝瘕 氣痛牽心 陰戶
浮腫脹悶 兼治男子疝氣下墜

縮砂仁 紅豆 良薑 青皮 陳皮 枳殼 炒 去瓤
皮 一兩 甘草 炙 乾薑 炮 木香 礪砂 各半兩
木瓜 乾者 一兩半 當歸 六錢

右爲細末 煉露丸如彈子大 每服一粒 細嚼
酒下 食前 一日三丸 生薑湯下亦得 病重每服
三丸 或作散子 酒調三五錢 老幼加減

◇ 抵聖圓方

治婦人疝瘕 惡血積聚 並月後不通

礪砂 半兩細研 麒麟竭 半兩 沒藥 半兩 桂
心 半兩 斑貓 半兩糯米拌炒令黃去翅足 莽草
半兩微炙 狼毒 半兩 鬼箭羽 半兩 沒心草 半
兩

右件藥 瘕羅爲末 以醋煮麵糊和圓 如梧桐子大 每日 空心 煎紅藍花酒 方溫下五圓

◇ 木香圓方

治婦人疝瘕 及血氣積聚 時攻腹脅疼痛

木香 半兩 巴豆 一分去皮心 麩炒黃紙裹壓去油 乾漆 半兩搗碎炒茶烟出 吳茱萸 一分湯沈七遍焙乾微炒 檳榔 半兩 附子 一分暑裂去皮臍 猪牙皂莢 一分去黑皮塗酥令黃去子 百蕪萸 一分 當歸 一分剉微炒 桂心 二(一)分 乾薑 二(一)分炮裂剉

右件藥 擣羅爲末 鍊蜜和擣三五百杵 圓如梧桐子大 每日空心 及痛發時 煎紅藍花當歸酒 下三圓

◇ 黑神丸

神麩 茴香 各四兩 木香 椒 炒香 出汗 丁香 各半兩 檳榔 四枚 漆 六兩 半生 半用重湯煮半日 令香

右除椒 漆 五物皆半生半炒爲細末 用前生熟漆和丸 如彈子大 茴香末十二兩 鋪陰地蔭乾 後外乾 茴香收器中 極乾去茴香 腎餘盲腸膀胱疝瘕 及疝墜五膈 血崩 產後諸穴漏下赤白 並一環分四服 死胎一丸 皆綿灰酒下 難產炒葵子四十丸搗碎 酒煎下一丸 諸疾不過三服 疝氣十服 隔氣瘕癖五服 血瘕三丸當差

◇ 硫黃丸

治婦人食瘕 久不消散

硫黃 半兩 細研 朱砂 半兩 細研 青礞石 半兩 細研 芫花 一分 醋拌炒令乾 爲末 麝香 一錢 細研 巴豆 半兩 去心皮 紙裹壓去油

右件藥擣細羅爲末 入研料藥令勻 以酒煮麵糊和丸如綠豆大 每服空腹 以生薑酒下三丸

◇ 沒藥丸

利五積氣癖 及經惡血積 瘕癖血瘕 發渴 攻刺疼痛 嘔逆 噎塞 心中痞悶 不省人事 及血蠱瘕瘕脹滿 經脈不行者

芫花 去枝梗 取二兩 用糊微炒三升 炙至一升半 去滓沸用地漿炒入石器內 入礞砂霜二兩 巴豆六七粒爛研入炒內煎盛膏 留丸藥用

木香 沒藥 別研 當歸 桂心 葦苈 各二兩 檳榔 一分 肉豆蔻 二枚 炮 斑猫 二枚 去頭足翅 糯米炒令炒黃 去尾 研細 附子 一箇 生用

右一十二味除斑猫 沒藥 餘爲細末 與斑猫沒藥一處合研令停 入前膏子勻和擣千百杵 丸如赤豆大 初服一丸 用醋炒 羅蔔子令焦黑 以酒浸同煎 一二沸 放溫吞下 漸加至五九七丸即止 如急卒血氣攻心脾 以酒醋共一銀錢煎沸吞下 婦人血瘕瘕癖結塊攻心 疼痛悶絕 久醫不效者 入禹餘糧一兩 火瘕醋焯七次研細 和藥爲丸 用蘇木節二兩細剉 酒三升 煎至七合 去滓分爲三服吞藥 併進三服 當汗出 則通大小腸逐下 其病入瘕 人弱者 每服只二丸 如是丈夫元臧小腸氣 脾積氣 瘕塊等疾 卽入丹砂 一兩細研和停 以生薑鹽湯吞下三丸

◇ 琥珀丸

治婦人血瘕 腹中有塊 攻刺小腹痛重 或腰背相引而痛 久而不治黃瘦羸之

琥珀 別研 白芍藥 川烏 暑 去皮 川牛膝 去蘆 酒浸 鼈甲 醋炙 蓬莪茂 炮 當歸 去蘆 酒浸 厚朴 薑製炒 各一兩 木香 不見火 澤蘭葉 官桂 不見火 各半兩 麝香 別研 半錢

右爲細末 酒糊爲丸如梧桐子大 每服七十丸 空心溫酒 米飲任下

◇ 琥珀散方

治婦人經絡否澁 腹內有瘀血 疼痛不可認

琥珀 半兩 細研 沒藥 半兩 細研 生地黃汁 半升

右三味除地黃汁外 二味和勻 每服二錢匕 水酒各半煎 煎至七分 地黃汁二合 再煎數沸 去滓 溫服不拘時

◇ 大黃湯方

治婦人 血瘀不消 及搏損血瘀

大黃 生用 桃仁 湯沈 去皮 尖 雙仁 各一兩 生乾地黃 焙 一兩 桂 去鹿皮 郁李仁 去皮 研 半兩

右五味麩 擗篩 每服三錢匕 水酒各半盞 同 煎至七分 去滓溫服

〈圖書集成醫部全錄〉³⁴⁾

◇ 乾薑湯

治飲食輒噫集驗名半夏湯

乾薑 石膏 各四兩 半夏 小麥 各一升 人參

桂心 瓜蒌根 各二兩 甘草 一兩 吳茱萸 二升 赤小豆 三十粒 右十味咬咀以酒五升水一斗 煮棗二十枚 去滓合煮 取三升 分三服

◇ 見睨丸

治寒氣客於下焦 血氣閉塞而成石瘕 腹中 堅大 久不消者

附子 炮 去皮 臍 四錢 鬼箭羽 如無 鯨鯉甲 代之 肥人痰悶 鬼白南星代之 紫石英 各三錢 別飛 澤瀉 肉桂 勿見火 延胡索 木香 各二錢 檳榔 二錢五分 血竭 一錢五分 別研 水蛭 一錢 如無 廣茂代之 桃仁 三十粒 去皮尖 乾漆 灰拌炒 去漆灰 京三稜 五錢 剉 大黃 三錢 剉 用酒同三稜沈一宿 焙

右十三味 除血竭 桃仁外同爲末 入別研二 味和勻 紅酒打糊丸 如桐子大 每服三十丸 淡 醋湯下 食前溫酒亦得 虛者 去水蛭 三稜 加入 麥一兩 當歸五錢 虛甚用十全大補湯送下

Table 1. 술을 사용한 抗癌處方的 主治 分析

分 類	主 治	處 方 名
外 科	癰疽, 癭瘤, 瘰癧, 瘡瘍, 惡核, 瘰癧	當歸煎方, 白芷升麻湯, 內托營衛湯, 羌活當歸湯, 黃栢當歸湯, 保安湯, 神效托裏散, 回春金銀花湯, 忍冬酒, 仙方活命飲, 托裏消毒飲, 白花蛇酒, 四聖散, 赤白丸, 消癭湯, 加減真人活命飲, 加味千金內托散, 小金丹, 內消散, 海藻酒
內 科	積聚, 癥瘕, 疝癖, 石瘕, 乳癰, 乳癌, 血瘕, 血塊	四等圓方, 抵聖圓方, 木香圓方, 腦砂煎圓方, 大消石圓, 琥珀圓, 神效瓜蒌散, 寶鑑見睨丹, 大硝石丸, 鬱金丹, 沒藥散, 牡丹皮湯, 當歸丸, 牡丹散, 通泉散, 瓜蒌散, 和血通經湯, 見睨丸, 硝石大丸, 紅籃花酒, 桂心酒, 磨積丸, 大黃丸, 逐氣丸, 黑神丸, 硫黃丸, 琥珀散方, 大黃湯方, 治癥丸, 牡丹皮湯
	腸內癰腫, 酒積, 吐利, 噎膈, 癥痞	廬氏感應圓, 消塊丸, 烏梅丸, 紫金丹解痰酒, 黑神丸, 神奇散, 消積補中丸, 鷄矢醴, 消痞膏, 血竭散, 沒藥丸, 乾薑湯

Table 2. 外科的 癌에 술을 이용한 處方중 多用的 藥物 순서

回數	藥 物
10회	甘草, 當歸
9회	葛根, 枸杞子, 白 蠶, 山茱萸
6회	金銀花, 防風, 白芷
5회	沒藥, 連翹
4회	乳香
3회	瓜蒌仁, 桔梗, 忍冬藤, 川芎, 穿山甲, 黃連, 黃芩
2회	羌活, 大黃, 木鼈子, 粉草, 麝香, 生地黃, 肉桂, 人蔘, 赤芍藥, 皂角刺, 朱砂, 陳皮, 天花粉, 澤瀉, 海藻, 紅花, 厚朴
1회	京墨, 桂心, 桂枝, 苦白礬, 昆布, 蚯蚓, 麒麟竭, 漏蘆, 獨活, 麥斛, 牡蠣, 木香, 密陀僧, 半夏, 白膠香, 白藜, 白礬, 白芍藥, 白花蛇, 檳榔, 生薑, 松蘿, 升麻, 柴胡, 野他脂, 五靈脂, 龍膽草, 雲母粉, 自然銅, 丁香, 地骨皮, 知母, 蒼朮, 草烏, 梔子, 沈香, 黃犬脂, 黃腦

Table 3. 內科的 癌에 사용된 술을 이용한 處方중 多用的 藥物 순서

回數	藥 物
20회	當歸
18회	木香
14회	大黃
13회	檳榔
11회	桂心
10회	甘草, 三稜, 蓬朮
9회	乾漆, 沒藥, 玄胡索
8회	赤芍藥
7회	乾薑, 附子, 牛膝, 肉桂
6회	瓜蒌仁, 鬼箭羽, 桃仁, 乳香, 巴豆, 血竭
5회	牡丹皮, 水蛭, 神麩, 人蔘, 丁香, 紅花
4회	腦砂, 半夏, 吳茱萸, 紫石英, 穿山甲, 青皮, 硝石, 澤瀉, 黃芩
3회	金銀花, 斑猫, 白芍藥, 百草霜, 鼈甲, 麝香, 皂角刺, 陳皮, 川芎, 琥珀, 茴香, 厚朴
2회	訶黎勒皮, 薑黃, 麒麟竭, 蘿 子, 麒麟竭, 狼毒, 虻蟲, 麥芽, 牡蒙木鼈子, 沒心草, 蕪荑, 白 蠶, 白芷, 粉草, 砂仁, 生地黃, 熟地黃, 阿魏, 菴 子, 艾葉, 良薑, 肉豆, 皂莢, 枳殼, 川烏, 天花粉, 澤蘭, 貝母, 香附子, 花草
1회	羌活, 乾地黃, 鷄屎白, 貫中, 蚓, 亂髮灰, 鯨鯉甲, 大麻仁, 密陀僧, 白芥子, 白, 白茯苓, 白朮, 使君子, 生薑, 蟻蟲, 石膏, 石菖蒲, 蘇木, 小麥, 烏梅, 郁李仁, 薏苡仁, 赤小豆, 螻蛄, 知母, 川楝子, 青礞石, 梔子, 巴戟, 蒲黃, 葶藶, 葶藶, 蛤粉, 杏仁, 香薷, 虎杖根, 紅豆, 紅藍花, 黃芩, 黃蠟, 黃連

Table 4. 皮膚癌에 多用的한 藥物의 性味, 歸經, 效能, 分類

藥名	性味	歸經	效能	分類
甘草	甘·平·無毒	十二經通行	補神益氣 清熱解毒	補益藥類
當歸	甘·辛·苦·溫·無毒	肝, 心, 脾	補血和血 調經止痛	補益藥類
葛根	辛·甘·平·無毒	脾, 胃	升陽解肌 透疹止瀉	解表藥類
枸杞子	甘·寒·無毒	肝, 腎	滋腎潤肺 補肝明目	補益藥類
白殭蠶	鹹·辛·平·無毒	肝經	息風止癢 通絡止痛	平肝藥類
山茱萸	酸·澁·微溫·無毒	肝, 腎	補益肝腎 澀精固脫	收澀藥類
金銀花	甘·寒·無毒	肺, 胃, 心	清熱解毒 涼散風熱	清熱藥類
防風	辛·甘·微溫·無毒	膀胱, 肝, 脾	祛風解表 勝濕解痙	解表藥類
白芷	辛·溫·無毒	肺, 胃, 大腸	散風除濕 消腫排膿	解表藥類
沒藥	苦·平·無毒	肝, 脾	散血祛瘀 消腫定痛	活血祛瘀藥類
連翹	苦·微寒·無毒	腎, 肺, 膽	清熱解毒 消腫散結	清熱藥類

Table 5. 內科癌에 多用的한 藥物의 性味, 歸經, 效能, 分類, 比較

藥名	性味	歸經	效能	分類
當歸	甘·辛·苦·溫·無毒	肝, 心, 脾	補血和血 調經止痛	補益藥類
木香	辛·苦·溫·無毒	肺, 肝, 脾	行氣止痛 溫中和胃	理氣藥類
大黃	苦·寒·無毒	脾, 胃, 大腸, 肝, 心包	瀉熱通腸 涼血解毒	瀉下藥類
檳榔	辛·苦·溫·無毒	脾, 胃, 大腸	殺蟲破積 下氣行水	驅蟲藥類
桂心	甘·辛·溫·無毒	心, 肺, 膀胱	發汗解肌 溫經通脈	解表藥類
甘草	甘·平·無毒	十二經通行	補神益氣 清熱解毒	補益藥類
三稜	苦·平·無毒	肝, 脾	破血行氣 消積止痛	活血祛瘀藥類
蓬朮	辛·苦·溫·無毒	肝, 脾	行氣破血 消積止痛	活血祛瘀藥類
乾漆	辛·苦·溫·無毒	肝, 胃	消腫排膿 祛風殺蟲	活血祛瘀藥類
沒藥	苦·平·無毒	肝, 脾	散血祛瘀 消腫定痛	活血祛瘀藥類
玄胡索	辛·苦·溫·無毒	肝, 脾	活血散瘀 理氣止痛	活血祛瘀藥類
赤芍藥	苦·微寒·無毒	肝經	清熱涼血 散瘀止痛	清熱藥類

Table 6. 술을 이용한 항암처방의 製造法에 따른 分類

製造方法	藥酒名
冷浸法	當歸煎方, 海藻酒, 紅藍花酒, 桂心酒, 小金丹, 仙方活命飲, 白花蛇酒
熱浸法	白芷升麻湯, 內托榮衛湯, 羌活當歸湯, 黃栢當歸湯, 保安湯, 神效托裏散, 回春金銀花湯, 忍冬酒, 神效瓜蒌散, 黑神丸, 鬱金散, 沒藥散, 牡丹皮散, 牡丹散, 四聖散, 消湯, 加減真人活命飲, 加味千金內托散, 和血通經湯, 神奇散, 通泉散, 瓜蒌散, 硝石大丸, 血竭散, 內消散, 托裏消毒飲, 琥珀散方, 大黃湯方, 治丸, 牡丹皮湯, 乾薑湯
和丸法	四等圓方, 抵聖圓方, 木香圓方, 腦砂圓方, 盧氏感應圓, 大消石圓, 琥珀圓, 消塊丸, 烏梅丸, 寶鑑見睨丹, 大硝石丸, 寶鑑見睨丹, 當歸丸, 鷄矢醴, 見睨丸, 赤白丸, 磨積丸, 大黃丸, 逐氣丸, 黑神丸, 硫黃丸, 沒藥丸, 琥珀丸, 見睨丸
盛膏法	消積補中丸, 消膏
濾過法	紫金丹解痰酒

Ⅳ. 考 察

癌은 현재 인류의 건강을 위협하는 주요한 疾病의 하나로, 傳染性疾患이 基本的으로 해결된 국가에서는 心腦血管 疾患과 더불어 死亡原因의 首位를 차지하고 있다.

癌은 세균 등에 의한 感染病과는 달리 個體를 형성하고 있는 細胞自體가 어떤 機轉에 의하여 癌細胞로 변화된 다음, 無制限的으로 增殖되어 結局 個體를 죽음에 이르게 하는데, 잘 발달되어 있는 生體의 防禦機轉에도 不拘하고 發生한다³⁸⁾.

癌의 治療法으로 西洋醫學에서는 化學요법, 방사선요법, 면역요법 및 외과적 수술방법 등이 사용되고 있으나 各 癌腫에 대한 感受性 差異, 副作用, 再發 및 合併症 등의 문제점 때문에 인체에 무해하면서도 암을 효과적으로 극복할 수 있는 새로운 약제 개발이 당면한 문제로 대두되었다.

한의학에서 암은 積聚를 비롯하여 厥疝, 疝痺, 食積, 息賁, 腸覃, 石瘕, 癥瘕, 息噎, 癭瘤, 緩疽, 石疽, 癥積, 癥聚, 噎膈, 反胃, 舌菌 등의 다양한 병증으로 표현되어 왔으며³⁹⁾, 腫瘍의 형성은 주로 正氣가 부족한 상태에서 外邪가 停滯하여 氣滯血瘀하고 痰飲獨聚하므로 서로 膠結하고 蘊鬱하여 마침내 腫塊가 형성되는 것으로 생각하고 있다⁴¹⁾.

이에 대한 치법은 清熱解毒, 化痰軟堅, 活血祛瘀, 行氣散結, 以毒除毒 등의 祛邪法과 健脾益氣, 健脾補腎, 益氣補血, 滋陰溫陽 등의 扶正法으로 大別⁴²⁾ 되는데, 최근에는 攻補兼施 위주로 치료하는 경향이 있다⁴¹⁾.

그중에서도 活血行經, 化氣通絡, 活血壯神, 禦寒酸穢하는 효능이 있는 술을 활용한 처방구성이 이같은 攻補兼施의 대표적인 예로 볼 수 있다.

한의학적으로 술은 五穀의 津液이며, 米麴의 華英으로서 그 氣味는 具陽하여¹¹⁾, <漢書·食貨志>에서는 술을 '百病之長'이라고 할 정도로 예로부터 疾病을 치료하는데 다양하게 활용되어져 왔다.

<醫學綱目>에 쌀로 빚은 술은 그味가 辛甘微苦하며 그 性이 모두 溫熱燦陰하므로 溫中禦寒하는 효능이 있는데 그중에서도 紅酒는 活血行經하며, 白酒는 化氣通絡한다 하여 색에 따라 효능을 분류하고 또한 溫飲, 少飲하면 活血壯神, 禦寒辟穢하고 冷飲, 多飲하면 積濕傷神, 生痰動火하여 損氣損陰에까지 이르러 그 害를 말로 다 할 수 없을 정도라하여³⁶⁾ 마시는 법에 따라 그 得失을 구분하였다.

또한 酒에는 大熱大毒이 있어서 嚴寒에 海面이 凝結되더라도 酒는 얼지 않을 정도의 熱性이 있다¹²⁾고 하여 그 性味를 나타내고 있다.

이같은 술의 성질 때문에 질병을 치료하는데 있어 술이 종종 활용되는데, 술을 활용하는 처방은 그 제조방법 따라 다섯가지 정도로 나눌 수 있다. 약재를 술에 담가서 약효성분이 우려나오게하는 冷浸法, 약재와 술을 함께 끓이는 熱浸法, 약재를 뺀아서 술과 함께 고아서 만드는 煎煮法, 약재 다린 물과 곡류를 이용하여 술로 발효시키는 釀酒法, 그리고 丸을 만들때 술을 쓰는 酒糊丸作法이 그것이다²⁶⁾.

이에 본 論文에서는 歷代醫書에서 술을 이용한 抗癌處方 62개의 藥酒處方을 考察하고 이를 分析하였다.

우선 술을 이용한 抗癌處方을 主治에 따라 크게 外科處方과 內科處方으로 나누고, 內科處方을 다시 婦人科와 消化器內科로 구분하여, 癰疽, 癭瘤, 瘰癧, 瘡瘍, 惡核, 癩瘰는 皮膚科에, 積聚, 癥瘕, 疝瘕, 石瘕, 乳癰, 乳癌, 血瘕, 血塊은 婦人科에, 腸內癰腫, 酒積, 吐利, 噎膈, 癥痞는 消化器內科로 분류하였다. 그 결과 內科 중

에서도 婦人科 處方이 30개로 가장 많았으며, 皮膚科 處方이 20개로 두번째로 많았고, 消化器에 해당하는 처방도 12개로 다수를 차지하였다<Table 1>. 그외 厥疝, 疝痺, 舌菌 등 主治가 泌尿器科에 해당하는 處方은 술을 이용한 예가 거의 없었다.

두번째로 술을 이용한 抗癌處方을 主治에 따른 이상의 분류에 근거하여 外科, 內科로 나누어 각각 處方의 藥物構成을 살펴보았는데 外科 處方에 사용된 약물이 총 74종, 內科 處方에 사용된 약물이 총 123종 이었다. 外科 處方에 사용된 약물 74종 중에서 甘草, 當歸가 각 10회로 가장 많이 사용되었으며 葛根, 枸杞子, 白殭蠶, 山茱萸가 9회, 金銀花, 防風, 白芷가 6회, 沒藥, 連翹가 5회로 비교적 많이 사용되었다<Table 2>. 內科 處方에 사용된 약물로는 當歸가 20회로 가장 많았고, 木香 18회, 大黃 14회, 檳榔 13회, 桂心 11회, 甘草, 三稜, 蓬朮 10회, 乾漆, 沒藥, 玄胡索 9회, 赤芍藥 8회 등의 순으로 많이 쓰였다<Table 3>.

이상의 多用된 藥物을 그 效能別로 분석하여 본 결과 外科 處方 중에서는 補益藥, 解表藥이 각각 3종, 清熱藥이 2종 그리고 平肝藥, 收藥, 活血祛瘀藥이 각각 1종 씩<Table 4>인 반면, 內科 處方 중에서는 活血祛瘀藥이 6종, 補益藥이 2종 그리고 理氣藥, 瀉下藥, 驅蟲藥, 解表藥, 清熱藥 각각 1종 씩으로 活血祛瘀藥이 압도적으로 많았다<Table 5>.

外科 및 內科 處方 모두에서 두번째로 다용한 약물이 補益藥인 이유는, 앞서 언급한 바대로 癌의 發生原因이 주로 正氣가 부족한 상태에서 外邪가 停滯하여 氣滯血瘀하고 痰飲獨聚하면서 서로 膠結하고 蘊鬱하여 형성되는 것이므로 健脾益氣, 健脾補腎, 益氣補血, 滋陰溫陽하는 扶正法의 일환으로 사용된 것임을 알 수 있다.

그리고 內科 處方에서 活血祛瘀藥이 압도적으로 많은 이유는 술의 효능을 감안할 때, 活血行經, 化氣通絡, 活血壯神, 禦寒辟穢할 필요가 있을 때 술을 활용하는 것이므로 꼭 항암처방이 아니더라도 술을 사용하는 처방은 결과적으로 活血祛瘀藥이 수위를 차지할 수 밖에 없는 데다, 암에 대한 치법 중 清熱解毒, 化痰軟堅, 活血祛瘀, 行氣散結, 以毒除毒하는 祛邪法의 일환으로 사용된 것임을 알 수 있다.

끝으로 처방에 술을 활용하는 방법에 따라 앞서 말한 다섯가지로 분류한 결과, 熱沈法이 31종, 和丸法이 24종, 冷浸法이 9종, 盛膏法이 2종, 濾過法이 1종으로 熱浸法과 和丸法이 主流를 이루었음을 볼 수 있다. 처방에 술을 활용하는 방법으로는 冷浸法이 가장 일반적인데 반해, 특이하게 抗癌處方에서는 오히려 熱浸法과 和丸法이 더욱 많았다. 이는 암이 치료하기 어려운 難治 疾患이기 때문에 오히려 술의 大熱한 성질을 적극활용한 것으로 볼 수 있다. 약효 성분을 잘 추출 하기 위한 목적으로 주로 활용하는 冷浸法의 경우 술이 처방구성에서 보조적인 역할을 하는데 비해, 抗癌處方에서 술을 활용하는 경우는 술의 活血行經, 化氣通絡, 活血壯神, 禦寒酸穢하는 효능이 치료에 직접적으로 작용하도록 하기 위한 것으로 사료된다.

以上の 結果로써 미루어 술을 이용한 抗癌處方의 主治內容과 構成內容을 살펴봄으로써 그에 따른 效能과 重要性을 개괄적으로 파악할 수 있었으며 그 製造方法을 살펴봄으로써 其他 疾患과 술을 활용하는 방법의 차이를 통해서 앞으로 藥酒開發의 必要性을 認識할 수 있어 尙後 藥酒研究와 活用に 도움이 될 것으로 사려된다.

V. 結 論

以上으로 歷代醫書에서 술을 이용한 抗癌處方 62개를 그 主治에 따라 분류하고, 이에 근거하여 각각 藥物의 使用回數分析, 多用藥物의 性味, 歸經, 效能을 分類比較分析하였으며, 술을 사용하는 方法에 따른 處方 分類를 통하여 다음과 같은 結論을 내릴 수 있었다.

1. 癌疾患 중 그 치료에 있어 술을 활용하는 경우는 婦人科와 皮膚科 그리고 일부 消化器內科癌에 한정되어 있으며, 그중에서도 특히 婦人科 系統에 속하는 암이 가장 많았다.
2. 外科處方 중 多用한 藥物 11種을 效能別로 分析하여 본 結果 解表藥과 補益藥이 각각 3種으로 가장 많은 것으로 나타나 皮膚癌에 대한 藥酒 利用에 있어서의 重點은 주로 發散解表 및 補益에 있음을 알 수 있었다.
3. 內科處方 중 多用한 藥物 13種을 效能別로 分析하여 본 結果 活血祛瘀藥이 6種으로 절대다수를 점유하고, 補益藥 2種으로 나타나 內科的 癌에 대한 藥酒 利用에 있어서의 重點은 주로 活血祛瘀 및 補益에 있음을 알 수 있었다.
4. 外科와 內科 두 경우 모두 補益藥이 두번째로 많은 사실로 미루어 抗癌治療에 있어 扶正法이 중시되었음을 알 수 있다.
5. 술을 상용한 抗癌內科處方 중 活血祛瘀藥이 압도적으로 많은 것으로 보아 活血祛瘀의 목적이 있을 때 주로 술을 활용함을 추정할 수 있다.
6. 藥酒의 製造方法에 있어서는 熱沈法이 31種, 和丸法이 24種, 冷浸法이 9種, 盛膏法이 2種, 濾過法이 1種으로 熱浸法과 和

丸法이 주로 활용되었음을 볼 수 있다. 이는 술의 大熱한 성질을 적극 활용한 것으로 볼 수 있다.

參 考 文 獻

1. 서울대학교 의과대학 : 증양학 서울 서울대학교출판부 pp. 1-27, 1989
2. 孫泰重編 : 病理學概論, 서울, 高文社, pp.227-229, 1979
3. 楊維傑主編 : 癌症腫瘤醫論醫活精選, 약군문화사업공사, pp.1-4, 1989
4. 김진웅 외 : 肝癌柱와 S-180에 대한 茵蔯分割의 抗腫瘍效果, 大韓東醫病理學會誌 10권, pp.129-245, 1995
5. 박정휘 외 : 위경탕, 가미위경탕의 A549에 대한 세포독성과 S-180D에 대한 항암효과. 大韓病理學會誌, 10권, pp.217-245, 1995
6. 錢伯文 : 腫瘤的辨證施治, 상해, 상해과학기술출판사, pp.1-10, 161-162, 220-222. 1980
7. 郁仁存 : 中醫腫瘤學, 북경, 북경과학기술출판사, pp.2-11, 131-135, 166-171, 1992
8. 李岩 : 腫瘤病, 북경, 인민위생출판사 pp.2-8, 1982
9. 洪元植 : 精校黃帝內經靈樞, 서울, 東洋醫學研究院出版部, p.38, 249, 294, 317, 1985
10. 顧伯康 : 中醫外科學, 상해, 상해과학기술출판사, p.105, 107, 1980
11. 裴元植 : 癌의 漢陽方併用治法에 對한 報告, 大韓韓醫學會誌, 2:53-57, 1986.
12. 許浚 : 東醫寶鑑, 서울, 南山堂 p.131, 239, 431, pp.446-447, p.1979.
13. 巢元方 : 巢氏諸病源候論, 台中, 照人出版社, pp.6-2(19), 11-16(권37), 1980

14. 金圭東：扶正培本法在癌症治療的應用和地位, 雲南雜誌(第14卷, 4其), 1994.
15. 李岩：腫瘤臨證備要, 북경, 인민위생출판사 pp.11-26, 1983
16. 張代釗：中西醫結合治療癌症, 산서, 산서인민위생출판사 pp.11-19, 1984
17. 이창혜 · 이봉기 · 이원형 · 김주덕：시험관 및 생체 내 암세포(S-180YS)의 adriamycin에 대한 내성세포의 염색체 분포특성, 연세의대 논문집, 16:180, 1983
18. 宋慕玲：中藥複方抗瘤粉治療腦膠質有效的初步觀察, 中西醫結合雜誌, 4(1):10, 1984.
19. 王懷隱：太平聖₁념°, 平常心出版社, p. 2232, 2235, 1986
20. 危亦林：世醫得效方, 서울, 醫聖堂, p. 117, 122, 528, 1990.
21. 樓英：醫學綱目, 서울, 一中社, pp. 681-683, 686, 690, 692, 760-761, 1991
22. 徐彥純：玉機微義, 북경, 人民衛生出版社, p. 551, 552, 1986
23. 朱震亨：丹溪心法附餘, 서울, 大星文化社, p. 627, 631, 633, 1980
24. 楊緒性：古今醫統大全, 서울, 아울로스출판사, p. 706, 1054, 1061, 1994
25. 孫一奎：赤水玄珠全集, 북경, 人民衛生出版社, p.556, 559, 560, 1149, 1986
26. 龔庭賢：萬病回春, 서울, 癸丑文化社, p. 384, 371, 238, 1973
27. 龔庭賢：壽世保元, 서울, 醫聖堂, p.215, 637, 1993
28. 張 璐：張氏醫通, 서울, 一中社, p. 750, 755, 1991
29. 鮑相璈：驗方新編, 천진, 天津科學技術出版社, p. 157, 481-482, 1991
30. 吳 謙：醫宗金鑑, 북경, 人民衛生出版社, p. 43, 59, 1982
31. 康命吉：濟衆新編, 서울, 麗江出版社, p.419, 420, 428, 429, 1992
32. 再小峰：歷代名醫良方注釋, 북경, 科學技術文獻出版社, p. 239, 613, 705, 737, 1983.
33. 蕭 源：永樂大典醫藥集, 서울, 醫聖堂, p.970, 974, 981, 988, 993, 1003, 1009, 1993
34. 陳夢雷：圖書集成醫部全錄, 서울, 醫聖堂, p. 37, 143, 1993
35. 全國韓醫科大學 本草學 教授 共編著：本草學, 서울, 도서출판행림사, 124, 129, 148, 195, 198, 199, 242, 353, 378, 412, 413, 417, 418, 439, 502, 505, 578, 596, 1998
36. 김정순：疫學原論, 서울, 신평출판사, pp.233-254, 1990.
37. 李時珍：本草綱目, 서울, 高文社, pp.891-899, 1973.
38. 조성기 · 조종관：消積白朮散의 抗癌, 免疫增強 效果 및 Cisplatin의 腎臟毒性抑制에 미치는 影響에 關한 研究, 大韓韓醫學會誌：제14권 2호 pp611-633, 1993.
39. 西琦 의：發がり. 化學同人 p.1.1989.
40. 王琦 의：黃帝內經素問今釋, 서울, 成輔社, p.60, 182, 1979
41. 洪元植：現代中國의 癌治療法, 서울, 英文社, pp.17-35, 81-84, 361-388, 1980.
42. 李中梓：醫宗必讀, 서울, 醫學社, pp. 254-255, 1976.
43. 敏濤 · 瑤啣 · 時文：藥酒治病養生, 강서, 강서과학기술출판사, pp.6-10, 1996.