

식이섭취를 통한 농약폭로의 위해도에 관한 연구

전옥경[†] · 이용목*

서울시 보건환경연구원, *서울대학교 보건대학원

A Study on the Risk of Pesticide Exposure by Food Intake

Ock-Kyoung Chun[†] and Yong-Wook Lee*

Seoul Metropolitan Government Research Institute of Public Health and Environment

* Graduate School of Public Health, Seoul National University

ABSTRACT – Limited information is available on the acceptability of Korean MRLs(maximum residue limits) and the health risk based on the pesticide exposure by food intake. The aim of this study was to evaluate TMDI(theoretical maximum daily intake) and EDI(estimated daily intake) for Korean by using MRLs, food intake, residue data, and correction factors, and compare with ADI(acceptable daily intake) in order to estimate the health risk based on the pesticide exposure. The study was performed in three steps. In the first step, the residual pesticides in each category of food were investigated using the pesticide residue analytical data(1995-96) from officially approved organizations and the analytical data for poultry was adopted from Korean food code method. In the second step, TMDI was estimated from MRLs and food factors, and was compared with ADI. In the third step, the effectiveness of each culinary treatment (washing, peeling, steaming, boiling, and salting) was evaluated and EDI was calculated using pesticide residue data, food factor, and correction factor by treatment. TMDI obtained from MRLs and food intake, and food intake was summed as 1,100.99 g, which was 79.1% of total consumption. The percent ratio of TMDI to ADI for 156 pesticides was mostly below 80% and only 30 pesticides exceeded the ADI. In particular, non-treated EDI from pesticide residue data and food intake was summed up to about 43 µg/day/capita, and the rank was procymidone(8.6 µg) > maleic hydrazide(8.2 µg) > EPN(3.7 µg) > deltamethrin(3.5 µg) > cypermethrin(3.0 µg). The treated EDI calculated from pesticide residue data, food intake, and correction factor by culinary treatment was summed up to 13.7 µg/day/capita. The percentage of ADI was TMDI(79.74%) > non-treated EDI (0.17%) > treated EDI(0.04%), and the exposure level of Korean population to whole pesticides was below the level to produce health risk. Oncogenic risk of five pesticides used in Korea whose oncogenic potency(Q*) was known were assessed from TMDI and treated EDI. Dietary oncogenic risk for Korean was estimated to be 2.0×10^{-3} on the basis of TMDI, 8.3×10^{-7} on the basis of treated EDI. The oncogenic risk from TMDI exceeded the risk level(1×10^{-6}) of EPA, whereas the oncogenic risk from treated EDI and real exposure level was lower than that of EPA.

Key words □ Pesticides, Theoretical maximum daily intake(TMDI), Estimated daily intake(EDI), Acceptable daily intake(ADI), Oncogenic risk.

농약은 농업의 생산성을 향상시키고 식량증산을 통한 농가소득 증대를 위하여 없어서는 안될 필수 농자재이나, 농약 사용의 증가는 또한 농약의 식품오염 잔류기회를 증가시키게 된다¹⁾. 따라서 농약이 지니고 있는 특성으로 인해

그 유익성보다는 오남용에 따른 부작용으로 부정적인 시각이 더 부각되고 있으며 국민 생활수준 향상과 더불어 환경과 국민보건에 대한 관심이 증대됨에 따라 국내 농산물의 농약사용에 대한 우려 또한 높아지고 있는 실정이다²⁾.

또한 점차 시험방법이 고도로 발전됨에 따라 극미량으로 존재하는 발암성 물질의 검출이 가능해졌고 다른 한편 우

[†]Author to whom correspondence should be addressed.

리들이 매일같이 접하고 있는 식품이나 환경인자 중에도 발암성 물질이 존재한다는 것이 알려짐에 따라 이들 발암성 물질의 현실적인 규제를 위하여 정량적 위해평가(quantitative risk assessment)의 기법이 1970년대에 들어와 새로이 개발되었으며^{3,6)} 이러한 결과를 정책에 반영하기 위해서는 특정 유해 화학물질에 폭로됨에 따라 발생 가능한 인체 영향에 대한 계량적인 정보와 이를 정보를 토대로 허용 가능한 오염수준을 규명하는 합리적인 위해성 평가 과정이 요구되어 진다.

위해성 평가(risk assessment)는 위해성 확인(risk identification), 폭로평가(exposure assessment), 양-반응평가(dose-response assessment)와 위해도 결정(risk characterization)과 같은 주요 4단계를 통해 수행되어진다⁷⁾. 그러나 폭로평가 및 양-반응평가에서 연구자가 판단하여 적용하는 선택 사항에 따라, 임의의 화학물질의 폭로에 따른 최종 위해도 추계치(risk estimates)에 크게 영향을 미친다. 따라서 위해성 평가를 수행하는 동안 평가에 따른 불확실성(uncertainty)은 자연히 수반하게 되고 이러한 불확실성에 대한 분석이나 기술을 하지 않는다면, 최종의사결정이나 공중보건에 크게 영향을 미칠 수 있다. 위의 불확실성은 폭로량 계산에 필요한 폭로시나리오(exposure scenario)를 가정하는데 있어 발생할 수 있다. 폭로변수에 대한 모수값을 추정하는데 있어 반복적으로 최대값을 취하여 현실적으로 매우 과대평가(overestimation)한다든지, 아니면 평균과 같은 대표값만을 사용하여 그 폭로변수의 변이(variation)를 고려하지 못하는 경우 실제 위해도 추정에 불확실성이 수반될 수 있다⁸⁾.

따라서 폭로평가에 있어서 이러한 불확실성을 감소시키는 평가방법에 의한 보다 정확한 추정은 위해성 평가의 가장 중요한 관건이라 할 수 있다.

식품 중에 존재하는 유해성분으로부터 국민건강을 보호하기 위하여 규제당국에서는 관례적으로 해당성분의 법적 허용기준을 설정하여 왔다. 그 다음 법적 기준의 준수여부를 감시하기 위하여 모니터링 제도를 실시하고 있고 나아가 유해성분의 위해성을 평가하기 위해서는 해당성분의 인체노출량(human exposure) 즉 식이섭취량(dietary intake)을 평가한 다음 독성학적 안전기준인 ADI값과 비교하는 방법이 제안되고 있다. 음식물을 통한 잔류농약 섭취량을 예측하는데는 여러 가지 요인을 고려해야 되며 그 방법에 따라 정확도가 달라진다. 국제기구인 UNEP/FAO/WHO에서는 어떤 인구집단에서 잔류농약 식이섭취량을 예측하는 4가지 방법을 제시하고 있다. 즉 ① 개략적 평가가 되는 이론적 최대섭취량(TMDI: theoretical maximum daily intake) ② 중간 평가가 되는 추정 최대섭취량(EMDI: estimated maximum daily intake) ③ 최선의 평가가 되는 추정섭취량

(EDI: estimated daily intake) ④ 현실적 평가가 되는 실측 섭취량(measured daily intake)으로서 미국에서의 식이섭취 총량조사(total diet study 또는 market basket survey)는 현실적 평가에 해당한다. Total diet study의 성과는 섭취 직전의 식품 중 유독물질의 오염 수준 및 섭취총량을 정확하게 평가함으로써 식품의 안전성을 확보하는데 있다. 이상의 네 단계는 아래로 내려갈수록 매우 과장된 예측으로부터 가장 현실적인 예측으로 전환될 수 있는 것이다.

최근 식품의 안전성 관리에서도 발암성 평가(carcinogen risk assessment)는 정량적 위해평가(quantitative risk assessment)에 의하여 많은 진전을 가져왔고 그 결과는 이미 유해 화학물질의 법적 규제에 활용되고 있다^{3,6,9)}. 한편, 발암성(carcinogenicity)에 대한 시험평가에는 막대한 경비와 시간이 소요되므로 별암성의 전단계 실험으로 종양유발성(oncogenicity)이나 돌연변이유발성(mutagenicity) 시험을 수행하여 발암성 물질의 사전규제에 대처하고 있다. 그 예로서 미국 EPA에서는 농약과 같은 화학물질의 출하전 승인을 위한 시험항목으로 종양유발성 평가를 실시하여 그 결과를 법적규제에 이용하고 있다^{10,11)}. 즉 종양유발성 평가를 실시하여 무시될 수 있는 위험수준(1×10^{-6})에 의하여 위해성을 평가한 연후에 농약의 사용허가와 허용기준치를 결정함으로써 발암성 논쟁을 사전에 예방하고 있다.

따라서 본 논문에서는 우리나라에서 기준이 설정되어 있는 농약성분의 위해도를 확인하므로써 농약잔류허용기준의 적합성을 평가하며 농약폭로량 추정에 기초한 건강위해도를 평가하고자 이론적 최대1일섭취량(Theoretical Maximum Daily Intake, TMDI)과 추정 1일섭취량(Estimated Daily Intake, EDI)을 산출하고 1일섭취허용량(ADI)과 비교하였으며, 종양유발성 평가를 실시하여 우리나라 국민의 농약폭로 위해정도를 평가하였다.

재료 및 방법

농약 폭로량 추정을 위한 기초자료

식품섭취량 – 한국인에 의한 식품별 섭취량은 1995년도 국민영양조사 결과¹²⁾의 전체 18개군 중 곡류 및 그 제품, 감자류 및 전분류, 두류 및 그 제품, 종실류 및 견과류, 채소류, 버섯류, 과실류, 조미료류, 육류 및 그 제품 등 9개군의 식품섭취량 자료를 사용하였으며 과즙과 콤은 각각 주재료인 오렌지와 딸기의 섭취량에, 조미료 중 간장, 고추장, 된장의 경우 원재료인 대두, 보리, 고추의 함량별로 계산하여 원재료에 합산하였고¹³⁾ 깨소금과 고춧가루는 각각 참깨와 고추의 섭취량에, 소시지와 햄은 돼지고기의 섭취량에, 김치는 배추의 섭취량에 합산하였다.

식품별 잔류농약자료 - 우리나라의 농약잔류허용기준(Korean MRL)은 1996년 12월 현재 보건복지부에서 고시한 자료¹⁴⁾를 이용하였으며 실제적인 농약 잔류량 자료는 국내에서 잔류농약분석 업무를 계속적으로 실시하여 분석정도관리(analytical quality control)가 실시되고 있는 공공기관의 최신분석결과¹⁵⁻¹⁸⁾만을 이용하였다. 즉 1995-96년의 분석보고결과 중에서 식품별 농약성분의 죄고잔류량과 평균잔류량을 산정하였으며 이때 잔류량은 분석시료 수에 관계없이 각 보고서를 한단위로 식품 항목별로 평균값을 얻고 여러 보고서에서의 값을 다시 평균하여 채택하였다.

한편 농약 잔류 허용기준이 설정되어 있으나 잔류량 분석에 대한 공식적인 자료가 없는 닭고기, 돼지고기, 쇠고기 등의 식육에 대해서는 식품공전의 축산식품 중 잔류농약 실험법¹⁹⁾에 준하여 실험을 실시하였다.

연구대상 농약의 선정 및 위험도 확인

식품 섭취량과 식품별 농약잔류량 자료 분석 결과 식품 섭취에 의해 인체에 폭로될 우려가 있는 것으로 판단되는 농약성분들을 대상으로 위험성 평가가 이루어졌다.

연구대상 농약들의 인체에 미치는 영향에 대해 문헌을 통하여 평가하고 위험도를 확인(risk identification)하기 위하여 IRIS (Integrated Risk Information System)²⁰⁾, TOX-LINE²¹⁾ 등 이용 가능한 연구논문 및 각종 데이터베이스를 통해 자료를 수집하였으며 이러한 증거를 종합한 뒤 미국 환경보호청(US EPA)의 분류체계²²⁾에 입각하여 인체발암물질(A), 유력한 발암물질(B), 가능한 인체발암물질(C), 인체 발암물질로 분류할 수 없는 물질(D)과 인체비발암물질(E)로 분류하였다.

농약 폭로량 산출

농약의 이론적 최대1일농약섭취량(TMDI) 산출 - 농약잔류허용기준과 식품별 섭취량을 기초로 농약의 이론적 최대1일 섭취량(TMDI)²³⁾을 산출하여 1일섭취허용량(ADI: mg/kg body weight)과 비교 평가하였다.

이때 농약성분에 대한 1일섭취허용량(ADI)값은 식량농업기구/세계보건기구(FAO/ WHO)의 자료를 이용하였으며²⁴⁾ ADI값이 설정되어 있지 않은 농약에 대해서는 무작용량(No Observable Effect Level, NOEL)값의 1/100 또는 일본에서 정하고 있는 1일섭취허용량(ADI)²⁵⁾을 이용하였다.

$$\text{TMDI} = \sum F_i M_i$$

F_i : average food consumption for the relevant commodity, as derived from the hypothetical global or national diet (kg food/ person/ day)

M_i : MRL for the relevant commodity (mg pesticide/ kg food)

한국인의 1인당 1일 식품 섭취량은 국민영양조사 결과 산출된 1995년도 식품 섭취량 자료를 이용하였다¹²⁾.

또한 1일섭취허용량(ADI)과 농약의 이론적 최대1일섭취량(TMDI)을 비교하기 위하여 1일섭취허용량(ADI)에 한국인 평균체중(55kg)을 곱하여 계산하였다²³⁾.

식품 처리과정별 농약 감소에 따른 추정1일섭취량(EDI)의 산출 - 농약의 추정1일섭취량(EDI)을 산출하기 위하여 식품 중의 농약 잔류량 자료를 기초로 식품별 처리과정에 따른 농약의 감소량을 측정하고 식이섭취를 통한 농약의 추정1일섭취량(EDI)을 산출하였다.

이때 농약 잔류량 자료만을 이용하여 산출된 값을 비처리 추정1일섭취량(non-treated EDI), 식품처리 과정에 따른 농약 감소율로 보정시킨 값을 처리 추정1일섭취량(treated EDI)으로 명명하였다.

$$\text{EDI} = \sum F_i R_i C_i$$

F_i : food consumption for the relevant commodity as derived from a specific hypothetical cultural or national diet (kg/ person/ day)

R_i : residue level in the edible portion of the commodity (mg pesticide/ kg food)

C_i : correction factor that takes into account the reduction or increase in the level of residue on preparation or cooking of the food

종양유발성 평가

식품섭취에 따른 종양유발 가능성은 한국인에 의한 농약 섭취량에 미국 EPA의 농약성분별 종양유발지수(oncogenic potency, Q*)^{10,11)}를 곱하여 다음과 같이 산출하였다. 이때 한국인의 평균체중은 55kg으로 간주하였다.

Dietary oncogenic risk (DOR: excess tumor incidence for a 70-year human life span)

$$= \text{dietary exposure(DE)} \times \text{oncogenic potency(OP)}$$

Dietary exposure(DE) = $\sum (\text{food factor} \times \text{pesticide residue data or Korea MRL})$

$$= \text{mg pesticide / person(55 kg bw) / day}$$

Oncogenic potency(Q*) (OP: excess tumor incidence for a 70-year human life span per unit dose)

$$= \text{number of tumors/mg pesticide/kg bw/day}$$

여기에서 종양유발지수 Q*는 용량-반응곡선에서 95% 상한값에 해당하는 선형계수(linear coefficient)로서 평균체중(일반적으로 70kg)의 건강한 성인이 어떤 화학물질의 단위폭로량(mg/kg/day)으로 오염된 식품을 기대수명(일반적으로 70년)동안 먹는다고 가정할 때 그로인해 발생하는 초과발암률을 의미한다.

본 연구에서는 종양유발성 평가에 있어서 동물에서 사람으로의 용량전환(dose scaling)을 위해서는 체표면적법을 적용하고, 고용량에서 저용량으로의 외삽과정에는 다른 모델에 비해 동일 용량에서 높은 위해도를 예측하는 선형다단계모델(linearized multistage model)을 이용하여 95% 상한값으로서 종양유발지수(oncogenic potency)를 산출하는 EPA의 결과¹¹⁾를 적용하였다.

결과 및 고찰

연구대상 농약의 위해도 확인

식품 중에 실제 잔류하고 있는 것으로 확인되어진 46종의 농약²⁶⁾ 중 미국 환경보호청(EPA)에 의해 발암성 여부가 분류되어 있는¹⁰⁾ 24종의 성분을 화학물질 특성별로 보면 유기염소계 농약 중 aldrin, dieldrin, heptachlor 등이 유력한 인체발암물질로 분류되었으며 유기인계 농약인 methidathion, dichlorvos, phosphamidon 등이 가능한 인체발암물질에, diazinon, EPN 등은 인체비발암물질로 분류되었다.

또한 카바메이트계인 aldicarb는 인체발암물질로 분류할 수 없는 물질로, carbofuran은 인체비발암물질로 분류되었다(표 1).

농약의 이론적 최대1일 섭취량(TMDI) 산출

본연구에서 이용한 식품 섭취량은 약 871.1g으로 식품군별 분포는 표 2와 같았으며 1995년도 국민영양조사¹²⁾ 결과 우리나라 국민의 평균 1일 총 식품섭취량은 1,100.9g으로 전체 식품섭취량 중 약 79.1%에 해당되었다.

식품위생법에 허용기준이 설정되어 있는 농약성분에 대하여 이 식품별 섭취량을 적용하여 이론적 최대1일섭취량

Table 2. Comparison of food intake for each food group per capita per day

Food groups	Daily food intake, g (%)
cereals	306.41 (35.2)
potatoes	21.10 (2.4)
legumes	37.84 (4.3)
seeds and nuts	2.90 (0.3)
vegetables	286.41 (32.9)
mushrooms	2.10 (0.2)
fruits	148.30 (17.0)
meats	66.00 (7.6)
Total	871.06 (100.0)

source: '95 National nutrition survey report¹²⁾

pesticide residue data in 1995-96¹⁵⁻¹⁸⁾.

(TMDI)을 계산하고, 이 이론적 최대1일섭취량(TMDI)과 1일섭취허용량(ADI)과의 대비율을 산출하였다(표 3).

그 결과, 현재 국내 허용기준이 설정되어 있는 203개 농약 중 47개 성분은 세계보건기구(WHO)나 다른 나라에 의해 규정된 1일섭취허용량(ADI)이나 최대무작용량(NOEL)에 대한 자료가 부재하며, 이러한 자료가 구비되어 있는 156종의 농약에 대해 이론적 최대1일섭취량(TMDI)과 1일섭취허용량(ADI)의 대비율을 계산하였는데 이 비율은 각국의 농약잔류허용기준(MRL)의 적정여부를 판정하는 기본자료가 될 수 있다²⁷⁾(표 4).

표 4에서 보듯이 현재 국내에서 잔류허용기준이 설정되어 있는 203종의 농약성분에 대하여 우리나라의 잔류농약 허용기준과 식품 섭취량 자료에 근거하여 농약의 이론적 최대1일섭취량(TMDI)을 추정해 본 결과, 1일섭취허용량(ADI)이 설정되어 있는 156종의 농약 가운데 121종의 농약은 이론적 최대1일섭취량(TMDI)이 1일섭취허용량(ADI)의 80% 이하 수준을 유지하고 있으나, 1일섭취허용량(ADI)을 초과하는 것도 30종이나 있는 것으로 나타났는데 이러한 결과는 주로 특정 식품군의 섭취량이 많거나 허용기준이 높은데 그 원인이 있다. 이론적 최대1일섭취량(TMDI)은 실제

Table 1. Hazard identification of selected pesticides by EPA's classification system for carcinogens

Classification	EPA classification system	pesticides
Carcinogenic chemicals	human carcinogen (A)	none
	probable human carcinogen (B)	alachlor, aldrin, chlorthalonil, dieldrin, folpet, carbofuran, heptachlor, heptachlor epoxide
	possible human carcinogen (C)	cypermethrin, dichlorvos, methidathion, permethrin, phosmet, phosphamidon, procymidone, triadimenol
Non-carcinogenic chemicals	not classifiable as to human carcinogenicity (D)	aldicarb, endrin
	evidence of not-carcinogenicity for humans (E)	captan, carbofuran, chlorpyrifos, diazinon, EPN, lindane

Table 3. Comparison of TMDI and ADI of pesticides according to Korean MRL as applied Korean food factors(unit : $\mu\text{g}/55\text{kg person/day}$)

Pesticide	ADI	Korean MRL		Pesticide	ADI	Korean MRL	
		TMDI	% of ADI			TMDI	% of ADI
Acephate	1650	1476.010	89.46	Dichlobenil	---	16.695	---
Acetochlor	---	4.188	---	Dichlofluanid	16500	5468.589	3314
Alachlor	110	21.670	19.70	Dichlorvos	220	243.394	110.63
Aldicarb	165	22.657	13.73	Diclofop-methyl	---	7.225	---
Aldrin & Dieldrin	5.5	19.165	348.45	Dicloran	1650	1056.125	64.01
Aluminum phosphide	23.7 ¹⁾	34.114	143.94 ⁴⁾	Dicofol	110	403.814	367.10
Amitraz	165	57.370	34.77	Difenamid	---	23.625	---
Anilazine	5500	4.412	0.08	Difenoconazole	---	100.331	---
Azinphos-methyl	275	232.083	84.39	Diflubenzuron	1100	165.017	15.00
Azocyclotin	385	91.008	23.64	Dimethipin	1100	2.051	0.19
Benalaxyd	2750	4.149	0.15	Dimethoate	550	243.322	44.24
Bendiocarb	220	10.954	4.98	Dinocap	55	9.240	16.8
Benomyl	1100	---	---	Diphenylamine	---	353.500	---
Bensulfuron-methyl	---	5.334	---	Diquat	110	140.930	128.12
Bentazone	5500	75.700	1.38	Disulfoton	16.5	282.557	1712.47
BHC	440 ²⁾	264.652	60.15	Dithiocarbamates	55000	270.480	0.49
Bifenox	---	16.963	---	Diuron	---	88.430	---
Bifenthrin	---	113.225	---	Dodine	550	380.000	69.09
Bioresmethrin	1650	28.100	1.70	Edifenphos	165	53.968	32.71
Bitertanol	550	55.909	10.17	Endosulfan	330	552.161	167.32
Bromacil	---	3.450	---	Endrine	11	13.383	121.66
Bromopropylate	1650	843.310	51.11	EPN	1100	91.203	8.294)
Buprofezin	550	272.920	49.62	Ethalfuralin	2310	3.263	0.14
Cadusafos	16.5	0.248	1.50	Ethephon	2750	454.290	16.52
Captafol	5500 ³⁾	500.218	9.09	Ethiofencarb	5500	2118.652	38.52
Captan	5500	1212.580	22.05	Ethion	110	219.240	119.31
Carbaryl	550	617.345	112.24	Ethofenprox	1650	545.669	33.07
Carbendazim	550	622.899	113.25	Ethoprophos	16.5	4.130	25.03
Carbofuran	550	163.729	29.77	Ethoxyquin	3300	212.100	6.43
Carophenothion	27.5	36.648	133.27	Ethylene dibromide	---	158.45	---
Carboxin	---	68.230	---	Etrimes	165	294.856	178.70
Cartap	5500	369.510	6.72	Fenamiphos	27.5	31.149	113.27
Chinomethionat	330	214.939	65.13	Fenarimol	550	33.940	6.17
Chlordane	27.5	16.756	6.093	Fenbuconazole	---	117.900	---
Chlorfenvinphos	27.5	93.507	340.03	Fenbutatin oxide	1650	1211.896	73.45
Chlormequat	2750 ³⁾	438.750	15.95	Fenitrothion	275	352.045	128.02
Chlorobenzilate	1100	172.040	15.64	Fenoxyprop-ethyl	---	16.557	---
Chlorpropham	5500(Jap)	655.519	11.92 ⁴⁾	Fenpropathrin	1650	550.080	30.31
Chlorpyrifos	550	435.669	79.21	Fensulfothion	16.5	7.629	46.24
Chlorpyrifos-methyl	550	248.041	45.10	Fenthion	55	176.289	320.53
Chlorsulfuron	----	3.611	---	Fentin	27.5	14.535	52.85
Chlorothalonil	1650	296.329	17.96	Fenvalerate	1100	878.717	79.88
Clethodim	550	363.860	66.16	Fluazifop-butyl	---	131.390	---
2,4-D	16500	203.270	1.23	Glyphosate	16500	663.781	4.02
Daminozide	27500	---	---	Gluazatine	1650	203.351	12.32
DDT	1100	405.471	36.86	Heptachlor	5.5	19.099	347.25
Deltamethrin	550	444.385	80.80	Hexaconazole	275	6.490	2.36
Diazinon	110	153.615	139.65	Hexazinone	---	0.100	---
Dicamba	---	20.262	---	Hexythiazox	1650	29.880	1.81

Table. 3. Continued

Pesticide	ADI	Korean MRL		Pesticide	ADI	Korean MRL	
		TMDI	% of ADI			TMDI	% of ADI
Imazalil	1650	696.892	42.24	Phosphamidon	27.5	92.994	338.16
Imidacloprid	---	568.780	---	Phoxim	55	38.677	70.32
Iprodione	11000	1661.608	15.11	Piperonyl butoxide	1650	6145.000	372.42
Isofenphos	55	29.580	53.78	Pirimicarb	1100	604.051	54.91
Isoprocarb	220	80.010	36.37	Pirimiphos-methyl	1650	993.655	60.22
Linuron	---	76.322	---	Pirimiphos-ethyl	---	1.820	---
Malathion	1100	607.015	55.18	Prochloraz	550	57.395	10.44
Maleic hydrazide	275000	14101.750	5.13	Procymidone	5500	677.300	12.31
MCPB	---	26.700	---	Profenofos	550	427.122	77.66
Mecarbam	110	68.914	62.65	Prometryn	---	19.860	---
Metalaxyl	1650	105.983	6.42	Propamocarb	5500	254.740	4.63
Methacrifos	330	0.000	0.00	Propanil	---	60.562	---
Methamidophos	220	191.966	87.26	Propargite	8250	560.850	6.80
Methidathion	55	41.379	75.23	Propiconazole	2200	34.601	1.57
Methiocarb	55	20.406	37.10	Propoxur	1100	1103.140	100.29
Methomyl	1650	244.495	14.82	Pyrazophos	220	75.396	34.27
Methoprene	5500	1528.930	27.80	Pyrethrin	2200	1385.680	62.99
Methoxychlor	---	3414.620	---	Quintozene	385	4.277	1.11
Methyl bromide	55000	20883.500	37.97	Quizalofop-ethyl	---	2.732	---
Metobromuron	---	9.988	---	Sethoxydim	7700	3471.880	45.09
Metolachlor	---	65.954	---	Simazine	275	20.600	7.49
Metribuzin	1375	200.347	14.57	Sulfur dioxide	---	51.000	---
Mevinphos	82.5	59.594	72.24	2,4,5-T	1650	2.890	0.18
Monocrotophos	33	84.038	254.66	Tecnazene	1100	11.900	1.08
Myclobutanil	1650	276.435	16.75	Tebuconazole	1650	11.970	0.73
Napropamide	---	33.541	---	Terbufos	11	13.509	122.81
Nitrapyrin	---	2.880	---	Terbutryn	---	3.621	---
Norflurazon	---	18.064	---	Tetradifon	---	332.400	---
Omethoate	16.5	33.526	203.19	Thiabendazole	5500	1258.382	22.88
Oxadiazon	---	16.701	---	Thiobencarb	495	123.446	24.94
Oxadixyl	---	390.385	---	Thiodicarb	1650	124.838	7.57
Oxamyl	1650	663.571	40.22	Thiometon	165	75.226	45.59
Oxyfluorfen	---	9.907	---	Thiophanate-methyl	4400	---	---
Paclbutrazol	5500	29.400	0.53	Tolclofos-methyl	3850	2.420	0.06
Paraquat	220	156.645	71.20	Tolyfluanide	5500	355.500	6.46
Parathion	275	159.248	57.91	Tralomethrin	412.5	224.217	54.36
Parathion-methyl	1100	481.804	43.80	Tri-allate	---	1.821	---
Penconazole	1650	14.140	0.86	Triadimefon	1650	59.785	3.62
Pendimethalin	2365	90.342	3.82	Triadimenol	2750	41.816	1.52
Permethrin	2750	1889.642	68.71	Triazophos	55	44.183	80.33
Phenothrin	3850	99.090	2.57	Trichlorfon	550	324.496	59.00
Phenthroate	165	49.125	29.77	Triclopyr	---	80.010	---
ortho-Phenylphenol	1100	1307.100	118.83	Triflumizole	1100	623.820	56.71
Phorate	27.5	8.983	32.67	Trifluralin	---	35.860	---
Phosalone	55	653.630	1188.42	Triforine	1100	129.190	11.74
Phosmet	550	1369.701	249.04	Vamidothion	440	145.282	33.02
				Vinclozoline	3850	150.600	3.91

¹⁾ ADI postulated from NOEL by applying a safety factor of 100 ²⁾ ADI of γ -BHC³⁾ ADI or MRL were withdrawn by CAC ⁴⁾ calculated from ADI other than WHO standards.

Table 4. Distribution of the ratio of TMDI to ADI according to Korean MRL as applied Korean food factors

TMDI / ADI ratio (%)	No. of pesticides (%)
< 10	38 (18.7)
11 - 30	29 (14.3)
31 - 80	54 (26.6)
81 - 100	5 (2.5)
> 101	30 (14.8)
No ADI or MRL	47 (23.2)
Total	203 (100.0)

농약잔류량이 아닌 허용기준에 근거한 것이므로 실제 폭로량과는 상당한 차이가 있다고 볼 수 있으나 독성자료에 근거하여 설정된 1일 섭취허용량(ADI)이 동물종간의 차이와 개인간의 차이, 독성자료의 불확실성만을 감안한 안전계수를 반영한 것일 뿐 개인, 지역 또는 계절에 따른 식품 섭취량의 변화나 극단소비자(extreme consumer: 특정 식품을 예외적으로 많이 먹는 소비자)를 고려하고 있지 않으므로 어떤 인구집단에 있어서 유해성분의 평균 섭취량은 1일 섭취허용량(ADI)보다 낮아야 안전하다고 간주될 수 있다(27).

Table 5. Non-treated EDI of pesticides and risk resources by food groups(unit: $\mu\text{g}/55\text{kg person/day}$)

Pesticide	EDI (% of ADI)	risk resources										
		Cereals	Potatoes	Legumes	Nuts	Veg 1	Veg 2	Veg 3	Mush-rooms	Fruits 1	Fruits 2	Meats
Alachlor	0.0191 (0.02)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0191	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Aldicarb	0.2555 (0.15)	0.0542	0.0000	0.0462	0.0000	0.0010	0.0024	0.0000	0.0000	0.1461	0.0056	0.0000
Aldrin & Dieldrin	0.0025 (0.05)	0.0000	0.0025	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Bendiocarb	0.0737 (0.03)	0.0223	0.0006	0.0006	0.0000	0.0000	0.0034	0.0086	0.0000	0.0345	0.0038	0.0000
BHC	0.0836 (0.02)	0.0000	0.0000	0.0723	0.0000	0.0000	0.0002	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0110
Captafol	0.2679 (0.00)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2679	0.0000
Carbaryl	0.0916 (0.02)	0.0167	0.0022	0.0023	0.0000	0.0000	0.0004	0.0619	0.0000	0.0078	0.0003	0.0000
Carbofuran	0.2129 (0.04)	0.1835	0.0013	0.0205	0.0000	0.0003	0.0068	0.0000	0.0000	0.0003	0.0003	0.0000
Chinomethionat	2.0967 (0.64)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	2.0967	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Chlorpyrifos	1.7023 (0.31)	0.0000	0.0110	0.0000	0.0160	0.0291	0.7271	0.5573	0.0000	0.0240	0.3377	0.0000
Chlorothalonil	0.2264 (0.01)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0127	0.0046	0.0000	0.0004	0.0000	0.2087	0.0000
Cyfluthrin	1.1304 (0.10)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0015	0.0000	0.0000	0.0000	1.1290	0.0000
Cyhalothrin	0.3388 (0.03)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.3168	0.0000	0.0000	0.0000	0.0219	0.0000
Cypermethrin	2.9593 (0.11)	0.0200	0.0000	0.1141	0.0000	0.0278	0.7602	1.4942	0.0000	0.0331	0.5099	0.0000
DDT	0.0028 (0.00)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0028
Deltamethrin	3.5054 (0.64)	2.4504	0.0000	0.0000	0.0000	0.0272	0.0021	0.8766	0.0000	0.0000	0.1491	0.0000
Diazinon	0.0029 (0.00)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0014	0.0003	0.0000	0.0011	0.0000	0.0000	0.0029
Dichlofuanid	0.0636 (0.00)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0036	0.0600	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Dichlorvos	0.0339 (0.02)	0.0000	0.0111	0.0000	0.0000	0.0027	0.0088	0.0000	0.0000	0.0000	0.0113	0.0000
Endosulfan	2.1511 (0.65)	0.0000	0.0296	0.2281	0.0032	0.3405	1.2000	0.0721	0.0019	0.1638	0.1120	0.0000
Endrin	0.0012 (0.02)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0012	0.0000
EPN	3.6585 (0.33)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.5473	0.0000	0.0000	0.1112	0.0000	0.0000
Ethalfluralin	0.0210 (0.00)	0.0000	0.0033	0.0000	0.0000	0.0056	0.0070	0.0000	0.0000	0.0050	0.0000	0.0000
Ethiofencarb	0.3020 (0.01)	0.0842	0.0048	0.0026	0.0000	0.0004	0.0083	0.0017	0.0000	0.1848	0.0153	0.3020
Ethopropophos	0.0212 (0.13)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0206	0.0000	0.0000	0.0000	0.0006	0.0000	0.0000
Fenarimol	0.0018 (0.00)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0018	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Fenitrothion	0.4036 (0.15)	0.0000	0.0566	0.0000	0.0000	0.0055	0.0076	0.0000	0.0000	0.3292	0.0048	0.0000
Fluvalinate	0.0504 (0.02)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0005	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0499	0.0000
Folpet	0.6350 (0.12)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.6350	0.0000
Heptachlor	0.0011 (0.02)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0011	0.0000
Isoprocarb	0.1916 (0.09)	0.0538	0.0030	0.0003	0.0000	0.0005	0.0048	0.0549	0.0000	0.0730	0.0013	0.0000
Maleic hydrazide	8.2128 (0.00)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	8.2128	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Metalaxyll	1.1355 (0.07)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	1.1355	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Methidathion	1.4946 (2.72)	0.0000	0.0691	0.0000	0.0000	0.0049	0.0000	0.0000	0.0000	1.3872	0.0333	0.0000
Oxamyl	0.0690 (0.00)	0.0028	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0249	0.0051	0.0000	0.0018	0.0343	0.0000

Table 5. Continued(unit: $\mu\text{g}/55\text{kg person/day}$)

Pesticide	EDI (% of ADI)	risk resources										
		Cereals	Potatoes	Legumes	Nuts	veg 1	veg 2	veg 3	Mush rooms	Fruits1	Fruits 2	Meats
Permethrin	0.3408 (0.01)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0257	0.2202	0.0000	0.0000	0.0872	0.0077	0.0000
Phenthroate	0.3378 (0.20)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.2575	0.0803	0.0000
Phosmet	0.5054 (0.09)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.5054	0.0000
Phosphamidon	0.0489 (0.18)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0489	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Pirimicarb	0.1794 (0.02)	0.0084	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0865	0.0000	0.0000	0.0813	0.0032	0.0000
Pirimiphosmethyl	0.0764 (0.00)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0764	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Procymidone	8.6464 (0.16)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	3.2413	4.8133	0.1679	0.0000	0.0029	0.4210	0.0000
Profenofos	0.0065 (0.00)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0065	0.0000	0.0000
Tetradifon	0.0758 (---)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0564	0.0194	0.0000
Triadimenol	0.0037 (0.00)	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0037	0.0000	0.0000
Total	41.6405	2.8963	0.1951	0.4870	0.0192	4.8868	20.097	5.4735	0.0035	2.9977	4.5698	0.0149
(% ratio)	(100.0)	(7.0)	(0.5)	(1.2)	(0.05)	(11.7)	(48.31)	(13.1)	(0.01)	(7.2)	(11.0)	(0.04)

¹⁾ Veg 1 means the vegetable group which is usually eaten in raw after washing²⁾ Veg 2 means the vegetable group which is usually eaten after the cooking or boiling³⁾ Veg 3 means the vegetable group which is usually eaten after the salting process for kimchi⁴⁾ Fruit 1 means the fruit group which is usually eaten after peeling⁵⁾ Fruit 2 means the fruit group which is usually eaten in raw after washing.

따라서 1일 섭취허용량(ADI)을 초과하는 이론적 최대 1일 섭취량(TMDI)을 갖는 농약성분들에 대해서는 그 주요 원인에 중점을 두어 조치를 강구해야 한다. 즉, 농약 사용상의 조치로서 농약의 사용 시기, 사용 빈도, 사용 방법 또는 대상 작물을 조정하든지, 아니면 농산물 이용시의 보정계수 (correction factor)인 가공 손실량(processing loss: Pi) 또는 조리 손실량(cooking loss: Ci)에 대한 자료의 축적과 아울러 보다 현실적인 식이 섭취량의 추정이 요구된다²³⁾.

비처리 추정 1일 섭취량(non-treated EDI)의 산출

식품 중 잔류농약의 기준은 편의상 식품원료인 농산물과 축산물에 대하여 설정하고 있는 것이 국제적인 관행이나 이러한 원료는 조리, 가공, 저장 및 유통과정을 거쳐 음식물로 섭취되어 진다. 따라서 국제농업기구와 세계보건기구 (FAO/WHO)에서는 식품의 조리, 가공 및 저장에 의한 농약성분의 제거율이 감안된 현실적인 식이 섭취량을 추정하여 농약에 의한 위해평가를 하도록 권장하고 있다. 즉, 식품원료 중 잔류농약이 조리 및 가공에 의해 제거 또는 분해된 다음 잔류하게 되는 농약성분의 비율을 보정계수 (correction factor)라 하여 국제규격인 Codex MRL을 설정할 때에 실제로 활용하고 있다^{7,8)}.

본 연구에서는 잔류가 확인되어진 농약성분에 대하여 농약 성분, 식품 종류, 조리 및 가공 방법에 따른 제거율을

산출하기 위하여 우선적으로 실제 농약 잔류량에 근거한 농약섭취량을 산출하였다.

표 5는 식품 중의 평균 농약잔류량과 식품 섭취량을 고려하여 식품 중 잔류된 농약의 현실적인 폭로량과 각 식품별 폭로 비중을 나타낸 것으로 농약의 비처리 추정 1일 섭취량(non-treated EDI)이라 할 수 있다.


**Fig 1. Major dietary intake of pesticide items.**

Table 6. Distribution of pesticide intake by food groups

Food group	Pesticide intake, µg (%)
cereals	2.8963 (7.0)
potatoes	0.1951 (0.5)
legumes	0.4870 (1.2)
nuts	0.0192 (0.0)
vegetables	30.4571 (73.1)
mushrooms	0.0035 (0.0)
fruits	7.5674 (18.2)
meats	0.0149 (0.0)
Total	41.6405(100.0)

농약의 평균 잔류량과 각 식품의 평균소비량으로부터 농약 성분별, 식품군별 1인당 1일 섭취량을 산출해 본 결과, 농약의 총섭취량은 약 42µg이며 농약별로는 그림 1에서 보듯이 procymidone 8.6µg, maleic hydrazide 8.2µg, EPN 3.7µg, deltamethrin 3.5µg, cypermethrin 3.0µg 등의 순으로 높게 나타났다. 이 중 procymidone의 경우 채소류에서의 검출량이 8.2µg으로 전체 검출량의 95%를 차지하고 있으며, 1일섭취허용량(ADI) 또한 체중 55kg을 기준으로 했을 때 5500µg으로 매우 높아 1일섭취허용량

Table 7. Treated EDI of pesticides by food intake

(unit: µg/55kg person/day)

Pesticide	total	risk resources										
		Cereals	Potatoes	Legumes	Nuts	Veg 1	Veg 2	Veg 3	Mush rooms	Fruits 1	Fruits 2	Meats
Alachlor	0.00437	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00437	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Aldicarb	0.00901	0.00428	0.00000	0.00365	0.00000	0.00016	0.00002	0.00000	0.00000	0.00000	0.00090	0.00000
Aldrin & Dieldrin	0.00106	0.00000	0.00106	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Bendiocarb	0.00361	0.00067	0.00002	0.00002	0.00000	0.00000	0.00001	0.00211	0.00000	0.00000	0.00078	0.00000
BHC	0.03479	0.00000	0.00000	0.03217	0.00000	0.00000	0.00005	0.00000	0.00002	0.00000	0.00000	0.00255
Captafol	0.09028	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09028	0.00000
Carbaryl	0.01773	0.00155	0.00020	0.00021	0.00000	0.00000	0.00000	0.01572	0.00000	0.00000	0.00005	0.00000
Carbofuran	0.00709	0.00624	0.00004	0.00070	0.00000	0.00003	0.00005	0.00000	0.00000	0.00000	0.00003	0.00000
Chinomethionat	0.97497	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.97497	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Chlorpyrifos	0.46769	0.00000	0.00253	0.00000	0.00000	0.02057	0.00800	0.19784	0.00000	0.00000	0.23875	0.00000
Chlorothalonil	0.15520	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00883	0.00121	0.00000	0.00011	0.00000	0.14505	0.00000
Cyfluthrin	0.81770	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00030	0.00000	0.00000	0.00000	0.81740	0.00000
Cyhalothrin	0.10907	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.09219	0.00000	0.00000	0.00000	0.01688	0.00000
Cypermethrin	1.96087	0.01516	0.00000	0.08649	0.00000	0.02032	0.17637	1.28949	0.00000	0.00030	0.37274	0.00000
DDT	0.00055	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00055
Deltamethrin	2.08469	1.47020	0.00000	0.00000	0.00000	0.01888	0.00036	0.49177	0.00000	0.00000	0.10348	0.00000
Diazinon	0.00180	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00098	0.00006	0.00000	0.00021	0.00000	0.00000	0.00055
Dichlofuanid	0.00748	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00202	0.00546	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Dichlorvos	0.00634	0.00000	0.00178	0.00000	0.00000	0.00073	0.00077	0.00000	0.00000	0.00000	0.00306	0.00000
Endosulfan	0.69768	0.00000	0.01222	0.09421	0.00002	0.22170	0.23760	0.05782	0.00038	0.00082	0.07291	0.00000
Endrin	0.00061	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00061	0.00000
EPN	0.68818	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.68818	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Ethalfuralin	0.00307	0.00000	0.00107	0.00000	0.00000	0.00150	0.00050	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Ethiofencarb	0.00575	0.00227	0.00013	0.00007	0.00000	0.00006	0.00002	0.00034	0.00000	0.00000	0.00226	0.00060
Ethoprophos	0.00690	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00690	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Fenarimol	0.00043	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00043	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Fenitrothion	0.03466	0.00000	0.02541	0.00000	0.00000	0.00381	0.00212	0.00000	0.00000	0.00000	0.00332	0.00000
Fluvalinate	0.03478	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00035	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03443	0.00000
Folpet	0.14415	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.14415	0.00000
Heptachlor	0.00016	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00016
Isoprocarb	0.01018	0.00022	0.00001	0.00000	0.00000	0.00008	0.00000	0.00966	0.00000	0.00000	0.00021	0.00000
Maleic hydrazide	0.83771	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.83771	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Metalaxyl	0.38380	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.38380	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Methidathion	0.02733	0.00000	0.01430	0.00000	0.00000	0.00167	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01136	0.00000
Oxamyl	0.00615	0.00005	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00010	0.00085	0.00000	0.00000	0.00515	0.00000

Table 7. Continued

(unit: $\mu\text{g}/55\text{kg person/day}$)

Pesticide	total	risk resources										
		Cereals	Potatoes	Legumes	Nuts	Veg 1	Veg 2	Veg 3	Mush Rooms	Fruits 1	Fruits 2	Meats
Permethrin	0.05108	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.01881	0.02532	0.00000	0.00000	0.00131	0.00564	0.00000
Phenthaoate	0.05308	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.05308	0.00000
Phosmet	0.31335	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.31335	0.00000
Phosphamidon	0.00147	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00147	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Pirimicarb	0.00092	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00092	0.00000
Pirimiphos-methyl	0.03400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.03400	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Procymidone	3.54903	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.11010	1.01079	0.15396	0.00000	0.00011	0.27407	0.00000
Tetradifon	0.01551	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00197	0.01354	0.00000
Total	13.6543	1.50064	0.05877	0.21752	0.00002	2.82132	3.09346	3.22853	0.00072	0.00523	2.72440	0.00441
(% ratio)		(100.0)	(11.0)	(0.4)	(1.6)	(0.0)	(20.7)	(22.7)	(23.6)	(0.0)	(0.0)	(20.0)

¹⁾Veg 1 means the vegetable group which is usually eaten in raw after washing²⁾Veg 2 means the vegetable group which is usually eaten after the cooking or boiling³⁾Veg 3 means the vegetable group which is usually eaten after the salting process for kimchi⁴⁾Fruit 1 means the fruit group which is usually eaten after peeling⁵⁾Fruit 2 means the fruit group which is usually eaten in raw after washing.

(ADI)과의 대비율은 0.2% 정도밖에 미치지 않으나, 반면에 methidathion의 경우는 총 섭취량이 $1.5\mu\text{g}$ 인데 비해 1일 섭취허용량(ADI)은 $55\mu\text{g}$ 으로 2.7%를 차지하는 것으로 나타났다.

한편 식품군별 농약의 섭취량 비율을 나타내면 표 6과 같았다. 즉 채소류가 73.1%로 가장 높게 나타났으며 과실류가 18.2%, 곡류가 7.0% 순으로 나타났는데 표 2의 식품군별 섭취량 자료에서 곡류가 35.2%, 채소류가 32.9%, 과실류가 17.0% 순인 것을 고려해 볼 때 채소류의 경우 식품 섭취량에 비해 농약 섭취량이 높은 것으로 나타난 것은 채소류의 경우 안전 사용 기준 일수, 사용량 등의 차이에 따른 농약 검출량과 검출 빈도가 높은데 기인하는 것으로 사료된다.

처리·추정 1일 섭취량(treated EDI)의 산출

표 7은 앞서 산출한 식품 중 농약 섭취량(표 5)에 각 식품군별 대표적인 처리과정에 따른 보정계수²⁸⁾를 적용시켜 식품을 섭취하였을 때 현실적으로 폭로될 수 있는 실제 1일 농약 섭취량을 추정한 것이다.

이 결과에 의하면 실제 식품을 섭취함으로써 폭로되는 모든 농약의 추정 1일 섭취량은 1인당 평균 $13.7\mu\text{g}$ 정도이며, 각 식품군별 기여도는 표 8에서 보듯이 채소류(67.0%) > 과실류(20.0%) > 곡류(11.0%) > 두류(1.6%) > 감자류(0.4%)의 순으로 나타나 표 6의 결과와 각 식품군별 순위는 동일 하였으나 보통 여러 처리과정을 거쳐 섭취되는 채소류의 경우 그 기여도가 73.1%에서 67.0%로 감소된 반면 세척 후 바로 섭취되는 경우가 많은 과실류의 경우 상대적인 비중

Table 8. Treated EDI of pesticide by food groups

Food group	treated EDI, $\mu\text{g} (\%)$
Cereals	1.5006 (11.0)
Potatoes	0.0588 (0.4)
Legumes	0.2175 (1.6)
Nuts	0.0000 (0.0)
Vegetables	9.1433 (67.0)
Mushrooms	0.0007 (0.0)
Fruits	2.7296 (20.0)
Meats	0.0044 (0.0)
Total	13.6543(100.0)

이 높아졌음을 알 수 있었다.

표 9는 식품 중의 잔류가 확인된 46종의 농약에 대하여 잔류허용기준으로 산출해낸 이론적 최대 1일 섭취량(TMDI), 농약잔류량 자료에 기초한 비처리추정 1일 섭취량(non-treated EDI), 그리고 여기에 식품처리에 따른 농약의 감소량으로 보정시킨 처리추정 1일 섭취량(treated EDI)을 산출하고 각각의 농약잔류량과 1일 섭취허용량(ADI)을 비교한 것이다.

이 결과에 의하면 TMDI(79.74%)>non-treated EDI(0.17%)>treated EDI(0.04%)의 순으로 이론적인 허용기준에서 잔류량 자료, 잔류량에서 처리과정에 따른 손실량이 보정되면서 그 위해도가 급격히 낮아짐을 알 수 있었으며, 본 연구에서 산출된 농약별 1일 섭취량은 기존 자료들을 이용하여 이론적으로 추산하였던 이등^{13,27,29,30)}의 결과보다는 낮았으며, 1995년도 이후 연차적으로 식품의약품안전청에서 실시하고 있는 식이섭취총량조사(total diet study) 결과³¹⁻³³⁾와는 유사한 수준을 나타내었다.

Table 9. Comparison between ADI and TMDI or EDI of pesticides by Korean population

Pesticide	ADI	TMDI		EDI (non-treated)		(unit : $\mu\text{g}/55\text{kg}$ person/day)	
		TMDI	% of ADI	EDI	% of ADI	EDI	% of ADI
Alachlor	110	21.670	19.70	0.0191	0.02	0.00437	0.00397
Aldicarb	165	22.657	13.73	0.2555	0.15	0.00901	0.00546
Aldrin & Dieldrin	5.5	19.165	348.45	0.0025	0.05	0.00106	0.01927
Bendiocarb	220	10.954	4.98	0.0737	0.03	0.00361	0.00164
BHC	440	264.652	60.15	0.0836	0.02	0.03479	0.00791
Captafol	5500	500.218	9.09	0.2679	0.00	0.09028	0.00164
Carbaryl	550	617.345	112.24	0.0916	0.02	0.01773	0.00322
Carbofuran	550	163.729	29.77	0.2129	0.04	0.00709	0.00129
Chinomethionat	330	214.939	65.13	2.0967	0.64	0.97497	0.29545
Chlorpyrifos	550	435.669	79.21	1.7023	0.31	0.46769	0.08503
Chlorothalonil	1650	296.329	17.96	0.2264	0.01	0.15520	0.00941
Cyfluthrin	1100	732.642	66.60	1.1304	0.10	0.81770	0.07434
Cyhalothrin	1100	308.498	28.05	0.3388	0.03	0.10907	0.00992
Cypermethrin	2750	1675.687	60.93	2.9593	0.11	1.96087	0.07130
DDT	1100	405.471	36.86	0.0028	0.00	0.00055	0.00005
Deltamethrin	550	444.385	80.80	3.5054	0.64	2.08469	0.37903
Diazinon	110	153.615	139.65	0.0029	0.00	0.00180	0.00164
Dichlofuanid	16500	5468.589	33.14	0.0636	0.00	0.00748	0.00005
Dichlorvos	220	243.394	110.63	0.0339	0.02	0.00634	0.00288
Endosulfan	330	552.161	167.32	2.1511	0.65	0.69768	0.21142
Endrin	11	13.383	121.66	0.0012	0.02	0.00061	0.00555
EPN	1100	91.203	8.29	3.6585	0.33	0.68818	0.06256
Ethalfluralin	2310	3.263	0.14	0.0210	0.00	0.00307	0.00013
Ethiofencarb	5500	2118.652	38.52	0.3020	0.01	0.00575	0.00010
Ethoprophos	16.5	4.130	25.03	0.0212	0.13	0.00690	0.04182
Fenarimol	550	33.940	7.17	0.0018	0.00	0.00043	0.00008
Fenitrothion	275	352.045	128.02	0.4036	0.15	0.03466	0.01260
Fluvalinate	275	296.679	107.88	0.0504	0.02	0.03478	0.01265
Folpet	550	574.350	104.43	0.6350	0.12	0.14415	0.02621
Heptachlor	5.5	19.099	347.25	0.0011	0.02	0.00016	0.00291
Isoprocarb	220	80.010	36.37	0.1916	0.09	0.01018	0.00463
Maleic hydrazide	275000	14101.750	5.13	8.2128	0.00	0.83771	0.00030
Metalaxyl	1650	105.983	6.42	1.1355	0.07	0.38380	0.02326
Methidathion	55	41.379	75.23	1.4946	2.72	0.02733	0.04969
Oxamyl	1650	663.571	40.22	0.0690	0.00	0.00615	0.00037
Permethrin	2750	1889.642	68.71	0.3408	0.01	0.05108	0.00186
Phenthroate	165	49.125	29.77	0.3378	0.20	0.05308	0.03217
Phosmet	550	1369.701	249.04	0.5054	0.09	0.31335	0.05697
Phosphamidon	27.5	92.994	338.16	0.0489	0.18	0.00147	0.00535
Pirimicarb	1100	604.051	54.91	0.1794	0.02	0.00092	0.00008
Pirimiphos-methyl	1650	993.655	60.22	0.0764	0.00	0.03400	0.00206
Procymidone	5500	677.300	12.31	8.6464	0.16	3.54903	0.06453
Profenofos	550	427.122	77.66	0.0065	0.00	---	---
Tetradifon	---	332.400	---	0.0758	---	0.01551	---
Triadimenol	2750	41.816	1.52	0.0037	0.00	---	---
Total	334,741	36727.674		41.6405		13.6543	
Average (%) ^{b)}		79.74		0.17		0.04	

^{b)}The percentage of ADI for individual pesticide was averaged.




Fig. 2. Comparison of ADI, TMDI, and EDIs in three major pesticides.

그림 2는 우리나라 국민이 식이섭취를 통해 가장 많이 폭로되는 것으로 나타난 chinimethionat, endosulfan, deltamethrin에 있어서의 TMDI, non-treated EDI, treated EDI의 차이를 보여주고 있는 것으로서, 이와같이 현재로서는 우리가 섭취하고 있는 식품에 의한 농약 폭로가 우려할 만한 수준이 아님을 보여주고 있으나 미국등의 선진국의 경우 유통되는 식품 중의 잔류농약 모니터링과 함께 식이섭취총량조사(total diet study)가 이미 1961년부터 체계적으로 수행되어³⁴⁾ 식이섭취로 인한 연령군별, 지역별 농약폭로량을 파악함으로써 국민들의 농약폭로에 있어서의 안전성을 확보해오고 있음을 상기할 때, 우리도 이러한 평가기법의 개발과 확립이 절실하다고 본다.

또한 세계보건기구(WHO)에서는 유기인제와 같이 유사한 독성작용을 함으로써 서로 부가적인 효과가 나타날 우려가 있는 농약에 대하여 누적섭취량(cummulative intake)을 낮추기 위하여 group ADI를 설정하도록 권고하고 있다³⁵⁾. 따라서 본 연구에서도 chlorpyrifos, diazinon, dichlorvos, EPN 등의 유기인제 농약의 경우 현재로서는 큰 위해성을 나타내고 있지 않으나 앞으로 보다 과학적이고 체계적인 연구와 지속적인 관리가 수행되어야 한다고 판단되었다.

종양유발성 평가

본 연구에서는 식품 중의 잔류가 확인되어진 46종의 농약 중 종양유발지수가 알려진 alachlor 등 7종의 농약 성분에 대하여 폭로량에 근거하여 종양유발 가능성을 산출하였다.

잔류허용기준과 식품섭취량으로 산출된 농약의 이론적 최대 1일섭취량(TMDI)에 대하여 종양유발 가능성을 산출한 결과는 표 10과 같았으며, 7종의 농약이 모두 미국환경보호

Table 10. Estimation of dietary oncogenic risk from TMDI of pesticides used in Korea

Pesticide	Oncogenic potency ¹⁾ (tumors/mg/kg b.w/day)	Dietary exposure from TMDI ²⁾ (mg/kg b.w./day)	Dietary oncogenic risk ³⁾
Alachlor	5.95×10^{-2}	3.9×10^{-4}	2.3×10^{-5}
Captfol	2.5×10^{-2}	9.1×10^{-3}	2.3×10^{-4}
Chlorthalonil	2.4×10^{-2}	5.4×10^{-3}	1.3×10^{-4}
Cypermethrin	1.9×10^{-2}	3.0×10^{-2}	5.7×10^{-4}
Ethalfuralin	8.7×10^{-2}	5.9×10^{-5}	5.1×10^{-6}
Folpet	3.5×10^{-3}	1.0×10^{-2}	3.5×10^{-5}
Permethrin	3.0×10^{-2}	3.4×10^{-2}	1.0×10^{-3}
Total		8.9×10^{-2}	2.0×10^{-3}

¹⁾ Q* : tumors/mg pesticide/kg body weight/day

²⁾ calculated from Korean MRL×food intake

³⁾ Excess tumor incidence for a 70-year human life span, calculated from Q*×dietary exposure.

청(EPA)가 설정한 무시될수 있는 위험기준(negligible risk standard: 70년 평생을 걸쳐 인구 100만명당 1명의 부가적인 암 발생율)을 초과하고 있었다. 평가 대상 농약들은 인구 100만명당 35-100명의 초과 종양유발 가능성을 나타냈으며, 7종의 농약성분에 대한 종양유발성 합계는 100만명당 2000명이라는 높은 추정치를 나타냈다. 이와같은 잔류허용기준에 근거한 추정은 실제 농약 섭취량을 이용한 것이 아니므로 위해 가능성이 과장되었다고 볼수 있으나, 잔류허용기준은 농약의 잔류 가능한 최대량을 의미하므로 안전성 확보를 위한 예방적 차원에서 과장되어야 한다고 본다.

표 11은 실제 농약잔류량에 식품처리에 따른 감소량을 보정시킨 처리 추정 1일섭취량(treated EDI)에 대한 종양유

Table 11. Estimation of dietary oncogenic risk from EDI of pesticides used in Korea

Pesticide	Oncogenic potency ¹⁾ (tumors/mg/kg b.w/day)	Dietary exposure from TMDI ²⁾ (mg/kg b.w./day)	Dietary oncogenic risk ³⁾
Alachlor	5.95×10^{-2}	7.9×10^{-8}	4.7×10^{-9}
Captfol	2.5×10^{-2}	1.6×10^{-6}	4.0×10^{-8}
Chlorthalonil	2.4×10^{-2}	2.8×10^{-6}	6.7×10^{-8}
Cypermethrin	1.9×10^{-2}	3.6×10^{-5}	6.8×10^{-7}
Ethalfuralin	8.7×10^{-2}	5.6×10^{-8}	4.9×10^{-9}
Folpet	3.5×10^{-3}	2.6×10^{-6}	9.1×10^{-9}
Permethrin	3.0×10^{-2}	9.3×10^{-7}	2.8×10^{-8}
Total		4.4×10^{-5}	8.3×10^{-7}

¹⁾ Q* : tumors/mg pesticide/kg body weight/day

²⁾ calculated from Korean MRL×food intake

³⁾ Excess tumor incidence for a 70-year human life span, calculated from Q*×dietary exposure.

Table 12. Comparison of total oncogenic risk by pesticide residues in Korea and USA

Country	Data resource	Total oncogenic risk
Korea	TMDI	2.0×10^{-3}
	treat EDI	8.3×10^{-7}
USA	TMDI	2.3×10^{-3}
	Total diet study data	9.8×10^{-7}

발 가능성을 산출한 것으로 표 10의 결과와 비교했을 때 종양유발 가능성이 매우 낮아지는 것을 알 수 있으며 미국환경보호청(EPA)이 설정한 무시될 수 있는 위험수준(1×10^{-6})을 초과하는 농약은 하나도 없는 것으로 나타났다.

또한 7종의 농약성분에 대한 종양유발성 합계도 8.3×10^{-7} 으로 위험수준에는 미치지 않았으며, 이등²⁹⁾의 결과에서 5.1×10^{-6} 의 높은 종양유발 가능성이 산출된 것은 농약잔류량 자료를 근거로 한 것으로 식품처리에 따른 손실이 고려되지 않았기 때문인 것으로 판단된다.

표 12는 미국과 우리나라의 농약에 의한 종양유발 가능성 을 비교한 것으로 우리나라의 미국 FDA의 식이섭취총량조사(total diet study) 자료에 의한 종양유발성 합계인 9.8×10^{-7} 보다는 낮은 결과를 나타냈다¹⁰⁾.

따라서 우리나라의 농약의 종양유발 가능성에 있어서 안전하다고 할 수 있으나 미국의 경우 이러한 식이섭취총량조사가 전체 인구 집단 및 계절별, 지역별, 인종별, 연령별로 세분화되어 농약폭로현황이 구체적으로 파악되어지고 있는 반면³⁾, 우리나라의 식이섭취를 통한 농약섭취량 조사³¹⁻³³⁾의 경우 이러한 체계적인 연구가 아직 미비하며, 농약 섭취량 산출의 근거 자료라 할 수 있는 식이섭취량 또한 연중 1회에 걸쳐 세대 단위로 산출되는 결과이므로 연령별, 계절

별, 지역별 섭취 유형의 차이와 변동이 파악되고 있지 못한 실정이다. 특히 안전계수의 한계를 위협하는 극단 소비자나 어린이, 노약자 등의 건강 위험군에 대한 이러한 정보가 매우 취약한데, 미국의 경우 어린이들에 대한 농약폭로의 심각성이 대두되기 시작하여 1991년도부터 연령·성별 집단을 14개로 보다 세분화하고 전체 식품 중 3분의 1을 어린이용 식품으로 선정함으로써 농약독성에 보다 민감하고 많이 폭로되어 있는 어린이들을 보호하고자 노력하고 있고³⁶⁾ 식이섭취총량조사(total diet study)와는 별도로 1991년에서 1995년까지 23개 품목의 어린이용 식품(baby food)에 대해 농약잔류량 조사를 실시하였으며³⁴⁾ 그 결과 일부 농약 성분의 잔류량이 전체 식품에 대한 결과에 비해 높게 나타났으며 어린이들의 식이섭취를 통한 농약에의 폭로정도가 전체 집단의 평균폭로량에 비해 상당히 높은 것으로 보고되었다^{8,34,36,37)}.

이러한 결과는 1일섭취허용량(ADI) 및 종양유발지수(Q*) 등 안전성 평가의 기본 요소들이 체중 kg당의 값을 나타내는데 어린이의 경우 체중 kg당 식품섭취량 및 독성에 대한 감수성이 성인과 다르기 때문에 판단되며, 우리나라로 이어한 구체적인 연구가 조속히 실시되어야 한다고 본다.

본 연구는 농약의 식품내 잔류실태를 파악하고 식품섭취량과 1일섭취허용량(ADI)에 근거하여 잔류허용기준의 타당성을 검토해 봄으로써 Codex 규격기준의 확대실시를 앞두고 있는 현 시점에서 식이를 통한 농약 폭로의 경로와 정도를 평가하는 과학적 분석 기법을 제시하고자 수행되었다.

그 결과 현재로서는 잔류허용기준 및 농약의 이론적 최대 1일섭취량, 추정 1일섭취량 모두 안전한 수준임을 확인하였으며, 농약으로부터의 식품 안전성을 확보하고 식품의 위해도를 평가하는데 과학적 근거를 제공할 수 있을 것으로 본다.

국 문 초 록

본 연구는 현재 농약잔류허용기준이 설정되어 있는 농약성분의 위해성여부를 확인하여 그 적합성을 평가하며 농약폭로량 추정에 기초한 건강위해도를 평가하고자 국민영양조사결과에 의한 각 식품별 섭취량과 농약잔류 허용기준 및 농약 잔류량 분석자료를 기초로 잔류농약 성분이 식품 처리과정 중에 소실되는 정도를 감안하여 이론적 최대 1일섭취량(TMDI)과 추정 1일섭취량(EDI)을 산출하고 1일섭취허용량(ADI)과 비교해 봄으로써 우리나라 국민의 농약폭로 위해정도를 평가하여 다음과 같은 결론을 얻었다. 1. 본 연구에서 이용한 자료의 1일 총섭취량은 871.1 μg 으로 전체 식품 섭취량의 약 79.1%에 해당되며, 식품위생법에 허용기준이 설정되어 있는 농약성분에 대하여 이 식품별 섭취량을 적용하여 이론적 최대 1일섭취량(TMDI)을 계산하고 이 값과 1일섭취허용량(ADI)과의 대비율을 산출한 결과, 1일섭취허용량(ADI)이 설정되어 있는 156종의 농약 가운데 121종의 농약은 이론적 최대섭취량이 1일섭취허용량(ADI)의 80% 이하 수준을 유지하고 있으나 1일섭취허용량(ADI)을 초과하는 것도 30종이나 있는 것으로 나타났다. 2. 농약의 평균 잔류량과 각 식품의 1일 평균섭취량으로부터 농약 성분별, 식품군별 1인당 1일 섭취량을 산출해 본 결과, 농약의 총섭취량은 약 42 μg 이며 농약별로는 procymidone이 8.6 μg , maleic hydrazide가 8.2 μg , EPN 3.7 μg ,

deltamethrin 3.5 μg , cypermethrin이 3.0 μg 등의 순으로 높게 나타났다. 식품군별로 농약의 섭취량 비율을 나타내면 채소류가 73.1%로 가장 높게 나타났으며 과실류가 18.2%, 곡류가 7.0% 순으로 나타났다. 3. 식품을 통한 농약 섭취량에 대해 각 식품군별 대표적인 처리과정에 따른 보정계수를 적용시켜 식품을 섭취하였을 때 폭로될수 있는 실제 1일 농약 섭취량을 추정한 결과, 1인당 평균 13.7 μg 정도이며, 각 식품군별 기여도는 채소류(67.0%) > 과실류(20.0%) > 곡류(11.0%) > 두류(1.6%) > 감자류(0.4%)의 순으로 나타났다. 농약잔류량과 1일섭취허용량(ADI)과의 비율을 산출한 결과에 의하면 TMDI(79.74%) > non-treated EDI(0.17%) > treated EDI(0.04%)의 순으로 이론적인 허용기준에서 잔류량 차료, 잔류량에서 식품처리에 따른 손실량이 보정되면서 그 위해도가 급격히 낮아짐을 알 수 있었다. 4. 종양유발지수가 알려져 있는 7종의 농약성분에 대하여 최대1일섭취량(TMDI) 및 처리 추정1일섭취량(treated EDI)에 근거하여 종양유발성 평가를 실시한 결과, 종양유발 가능성의 합계가 각각 2.0×10^{-3} (TMDI), 8.3×10^{-7} (treated EDI)로 이론적 최대1일섭취량(TMDI)은 미국환경보호청(EPA)이 설정한 위험수준인 1×10^{-6} 을 초과하였으나, 현실적인 폭로수준인 처리 추정1일섭취량(treated EDI)은 안전한 수준이었다.

참고문헌

- 宋炳薰: 우리나라 農產物 中의 殘留農藥과 安全性. *한국식품위생학회지*. 7, S21-32 (1992).
- 농약공업협회: 농약 - 世論과 正論. 44-47 (1992).
- Park, Jongsei: Risk assessment of hazard materials in food - An Emerging Field. *J. Food Hygiene and Safety. Topic III.* 31 (1997).
- Travis, C. C., Richter, S. A., Crouch, E.A.C., Wilson, R., and Klema, E. D.: Cancer risk management. *Environ. Sci. Technol.* 21, 415-420 (1987).
- Finley, B. L., Scott, P., and Paustenbach, D. J.: Evaluating the adequacy of maximum contaminant levels as health-protective clean-up goals: An analysis based on Monte Carlo Techniques. *Regul. Toxicol. Pharmacol.* 18, 438-455 (1993).
- Johannsen, F. R.: Risk assessment of carcinogenic and noncarcinogenic chemicals. *Crit. Rev. Toxicol.* 20, 341-367 (1990).
- Joint FAO/WHO Expert Consultation: Application of risk assessment analysis to food standards issues. FAO/WHO. Geneva. 11-20 (1995).
- Winter, C. K.: Dietary pesticide risk assessment. *Rev. Environ. Toxicol.* 127, 23-67 (1992).
- Hazelwood, R.N.: Carcinogen risk assessment. *Adv. Food Res.* 31, 1-51 (1987).
- National Research Council, U.S.A.: Regulating Pesticides in Food-The Delaney Paradox. Executive summary. National Academy Press. Washington, D.C. 1-44 (1987).
- Albert, R.E.: Carcinogen risk assessment in the U.S. Environmental Protection Agency. *Crit. Rev. Toxicol.* 24, 75-85 (1994).
- 保健福祉部, 보건정책과: '95 國民營養調查 結果 報告書. 남형문화주식회사. 서울 (1996).
- 이서래, 이미경: 한국인에 의한 유기인계 농약의 섭취량 추정. *한국환경농학회지*. 13(1), 66-75 (1994).
- 保健福祉部 告示 제1996 - 74호 (1996년 12월 5일자).
- 李哲遠, 洪茂基, 郭寅信, 朴建相, 尹熙徑, 文在辰, 姜仁鎬, 崔萬蒙, 李熹德: 食品中 殘留農藥에 관한 研究. 국립보건원 보. 32, 470-482 (1995).
- 李哲遠, 洪茂基, 吳昌桓, 崔東美, 朴建相, 黃仁均, 文在辰, 姜仁鎬, 張善英: 食品中 殘留農藥에 관한 研究. 식품의약품 안전본부연보. 1, 41-48 (1996).
- 전옥경, 김일영, 신기영, 김양숙, 조한빈, 김성단, 장민수, 윤용태, 이은순, 김복순, 강희곤: 시중 유통 농산물 중의 농약잔류실태 조사(IV). 서울특별시보건환경연구원보. 32, 153-162 (1996).
- 홍무기, 최동미, 오창환, 박건상, 황인균, 정지윤, 이정복, 장선영, 최윤주: 콩과 콩나물 중 잔류농약에 관한 연구. 식품의약품안전청연보. 1, 38-42 (1997).
- 保健福祉部: 食品公典. 별책 353-398 (1997).
- International Society for Risk Analysis: Integrated Risk Information System (1993).
- Silver Platter Database: TOXLINE (1993).
- US Environmental Protection Agency: *Federal Register* 51, (1986).
- Joint UNEP/FAO/WHO: Food Contamination Monitoring Programme: Guidelines for Predicting Dietary Intake of Pesticide Residues. 8-16. WHO. Geneva (1989).
- Joint FAO/WHO Food Standards Programme, Codex Alimentarius Commission: Residues of Pesticides in Foods and Animal Feeds. Part A. FAO/WHO. Rome (1997).
- 한국식품연구소: 농약의 잔류허용기준 설정방법, 정도관리 및 관리기준 비교검토에 관한 연구. 176-243 (1993).
- 全長懶: 食餌攝取를 통한 農藥暴露의 危害度에 관한 研究. 서울대학교 博士學位論文. (1999).
- 이서래, 이미경, 김남형: 한국인에 의한 농약의 이론적 최대섭취량 및 안전지표의 산정. *한국식품과학회지*. 27, 618-624, (1995).

28. 全下標, 李康文, 申載英: 食品處理에 따른 農藥殘留量 變化
에 관한 研究. 한국환경위생학회지. 1999년 6월호 게재예
정.
29. 이미경, 이서래: 한국식품 중 잔류농약의 종양유발성 평가.
한국식품과학회지. **27**, 871-877 (1995).
30. 이미경, 이서래: 국내 식품 중 유기인계 잔류농약의 위해
성 평가. 한국식품과학회지. **29**, 240-248 (1997).
31. 홍무기, 이철원, 곽인신, 박건상, 윤희경, 문재진, 강인호,
최만호, 경석현: 식이를 통한 농약섭취량에 관한 연구-과
류 중의 잔류농약-. 국립보건원보. **32**, 483-492 (1995).
32. 홍무기, 이철원, 최동미, 오창환, 박건상, 황인균, 문재진,
강인호, 장선영: 식이를 통한 농약섭취량에 관한 연구-과
실류 및 그 가공제품 중의 잔류농약. 식품의약품안전본부
연보. **1**, 49-57 (1996).
33. 홍무기, 오창환, 최동미, 박건상, 황인균, 우형경, 박일경,
정선미: 식이를 통한 농약섭취량에 관한 연구-채소류 및
그 가공제품 중의 잔류농약. 식품의약품안전청연보. **1**, 43-
49 (1997).
34. FDA: Pesticide Program. Residue Monitoring. *J. Assoc.
Off. Anal. Chem.* **77**, 163-185 (1994).
35. WHO: Principles for the safety assessment of food
additives and contaminants in food. WHO publication
ISBN: 92 4 154270 5 (1987).
36. Pennington, J.A.T., Capar, S.G., and Parfitt, C.H.:
History of the Food and Drug Administration's total
diet study(Part II), 1987-1993. *J. AOAC Internat'l*, **79**,
163-171 (1996).
37. National Research Council, U.S.A.: Pesticides in the
diets of infants and children. Committee on pesticides
in the diet of infants and children. National Academy
Press, Washington, D.C. (1993).