

# 돼지질병예방프로그램

## 예방접종요령

질병명	백신 종류	새끼 및 육성돈										모돈		임신돈								
		생후 1주령	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	중부 6주전	4 2	분만 8주전	7	6	5	4	3	2	
돼지콜레라	생독	긴급 초유전					1차 1ml 근육주사					2차 1ml 근육주사		연회 1ml 근육								
일본뇌염	생독													5~6월 접종(초임돈, 후보돈) 3~4주 간격 2회, 1ml씩 근육								
파보바이러스	사독													초임돈 5ml 경산돈 3ml (2~3주 간격 2회)								
전염성위장염	생독/사독																	1차 2ml 근육주사			2차 2ml 근육주사	
돼지로타감염증	생독/사독																	1차 1ml 근육주사			2차 1ml 근육주사	
돼지유행성설사	생독																	1차 1ml 근육주사			2차 1ml 근육주사	
대장균성설사	사균																	1차 2ml 근육주사			2차 2ml 근육주사	
오제스키병 (발병농장 및 발병 우려 농장에 한해 실시)	사독			3주령에 1차 2ml 근육주사 (백신비접종 모돈의 자돈)			2차 2ml 근육주사	1차 2ml 근육주사 (백신비접종 모돈의 자돈)				3주후 2차 2ml 근육주사						1차 2ml 근육주사			2차 2ml 근육주사	
돼지단독	생균							1차 1ml 피하주사				2차 1ml 피하주사		연회 1ml 피하								
위축성비염	사균	생균 1일령 비강분무				1차 1ml 근육주사		2차 1ml 근육주사										1차 2ml 근육주사			2차 2ml 근육주사	
위축성비염, 파스튜렐라, 홍막폐렴	3중혼합			1차 1ml 근육주사		2차 1ml 근육주사												1차 2ml 근육주사			2차 2ml 근육주사	
위축성비염, 대장균증, 파스튜렐라, 단독	4중혼합			1차 2ml 근육주사		2차 3ml 근육주사													1차 3ml 근육주사		2차 3ml 근육주사	
유행성페렴	사균	1차 2ml 근육주사		2차 2ml 근육주사														1차 2ml 근육주사			2차 2ml 근육주사	
클래서씨병	사균			1차 2ml 근육주사			2차 2ml 근육주사														2차 2ml 근육주사	

\* 기타 예방약은 사용설명서에 따라 접종함.

### 내·외부 기생충 구제요령

내부기생충		외부 기생충
새끼돼지	어미돼지	
생후 1개월경에 1차 구충한 다음 4주 후에 2차로 구충(광범위 구충제 이용)	분만실 이동 2~3일 전에 광범위 구충 실시	돈사에 돼지를 넣기 전 축사 소독과 동시에 약제 살포(여름철 파리, 모기 구제를 위한 정기적 약제 살포)



#### 예방약 사용시 유의사항

- 예방약 사용설명서를 먼저 읽어본 다음 사용
- 어둡고 찬곳(2~5°C)에 보관하고 유효기간 이내에 사용
- 접종부위, 접종량, 접종시기 등을 반드시 준수
- 주사기구, 주사부위를 철저히 소독한 후 접종
- 사용하고 남은 예방약 및 빈병은 땅에 깊이 묻거나 태움
- 예방접종은 수의사 등 전문자에게 의뢰하거나 협조 요청
- ※ 인근농가에 돼지콜레라 발생시 1주일 앞당겨 예방접종

#### 질병 발생시 조치요령

- 가족에 이상이 있으면 수의사나 검사기관에 즉시 의뢰
- 질병감사기관 : 각 시도 가축위생시험소 ◆ 수의과학검역원 등
- ※ 수의과학검역원병리진단과 전 화 : (0343)467-1747 F A X : (0343)467-1749
- 가검물 의뢰 요령
- 발병가족의 종류, 사육두수, 죽은두수, 발병월일, 일반증상, 예방접종 및 치료 상황 등 기록
- 가검물 재료는 신장 등 장기별로 채취하던가 죽은 가족 또는 주기 직전의 가족을 의뢰
- 법정전염병에 걸렸다고 의심되면 관할 행정기관에 신고

#### 차단방역(위생적인 사항)

- 돈사를 충분히 소독한 다음 돼지 입식
- 돈사 내·외부의 청결과 정기적인 소독 실시
- 돈사 입구 소독조 설치 및 소독약 주 1~2회 교환
- 신용있는 종돈장에서 돼지를 구입한 다음 3주간은 따로 사용하여 관찰
- 돈사 주변 모기, 파리 서식에 정기적인 약제 살포(봄~가을)
- 외부인 및 차량의 돈사 내 출입제한(출입시 소독 실시)
- 생후 7일 이내에 1~2회 철분제 주사

“돼지콜레라 근절없이 양돈산업 미래없다”  
농림부 국립수의과학검역원 · 대한양돈협회