

## 齒衄의 治療에 對한 文獻的 考察

李在庸 · 黃致元\*

### Abstract

#### The Literatual Study on Treatment of Toothbleeding

Lee, Jae Yong · Hwang, Chi Won  
Dept. of Oriental Medicine  
Graduate School of Taejon University

Through the literatual study on treatment of toothbleeding, we concluded as follows,

1. The causes of the toothbleeding are divided into heat of stomach(胃熱) and deficiency of renal(腎虛). If caused by heat of stomach, the treatment methods are Ryang-Hyul-Ji-Hyul(涼血止血), Cheong-Yul-Sa-Hwa(清熱瀉火). If caused by deficiency of renal, the treatment methods are Ryang-Hyul-Ji-Hyul(涼血止血), Ja-Eum-Gang-Hwa(滋陰降火).

2. The medications are several - taking a medicine for internal use(內服法), keeping with one's mouth full of an infusion and spoutting it Haamsoobup(含漱法), and others like taking a medicine for external use(外用法) only.

3. The treatment drugs divided by medication are as follows :

Taking a medicine for internal use : Cheongwesan(清胃散), Gamroem(甘露飲), Joweseunggitang(調胃承氣湯), Seogagjihwangtang(犀角地黃湯), Yugmijihwangtang(六味地黃湯), Palmihwan(八味丸), Soansinhwan(小安腎丸) etc...

Haamsoobup : Gudoguem(救毒飲), Jihwangtang(地黃湯), Mangchosan(莽草散) etc...

Taking a medicine for external use : Pilseungsan(必勝散), Rogposan(綠包散), Hyunggeousan(荊槐散), Bingoksan(冰玉散), Sahyongsan(麝香散), Ulgeumsan(鬱金散), Yongnoisan(龍腦散) are used.

4. A coposition of the medication : Cheong-Yul medicine(清熱藥), Bo-Ik medicine(補益藥), Ji-Hyul medicine(止血藥), Gae-Gyu medicine(開竅藥), Su-sap medicine(收澁藥) are mainly used.

Cheong-Yul medicine : Rehmanniae Radix(鮮地黃), Moutan Cortex(牡丹皮), Coptidis Rhizoma(黃連), Scutellariae Radix(黃芩)

Bo-Ik medicine : Glycyrrhizae Radix(甘草), Angelicae gigantis Radix(當歸), Rehmanniae Radix Preparat(熟地黃), Ginseng Radix(人蔘)

Ji-Hyul medicine : Biotae Cacumen(側柏葉), Sophorae Flos(槐花), Typhae Pollen(蒲黃)

Gae-Gyu medicine : Moschus(麝香), Borneolum(冰片)

Su-sap medicine : Alumem(白礬)

---

\* 大田大學校 韓醫科大學 心系內科教室

5. A result of the observation on the medication :

Taking a medicine for internal use : Glycyrrhizae Radix, Rehmanniae Radix Preparat, Rehmanniae Radix, Moutan Cortex, Scutellariae Radix are used. Yugmijihwangtang and Cheong-Yul medicine are mainly used.

Taking a medicine for external use : Alumem, Moschus, Salt(鹽), Asari herba cum Radice(細辛) are mainly used. Especially there is a method that uses a burnt drug.

Haamsoobup and taking a medicine for external use : Medicines of Cheong-Yul-Ryang-Hyul(清熱涼血) and Su-Ryum-Ji-Hyul(收斂止血) are used.

I. 緒 論

II. 本 論

齒衄은 齒齦에서 出血되는 것<sup>1)</sup>으로, 齦은 잇몸을 가리키는데, 一般的으로는 齒齦 또는 牙齦이라 한다<sup>2,3)</sup>. 齒齦은 胃經에 속하고 齒牙는 腎經에 속하는 것인데, 陽明의 病邪가 少陰으로 傳入되면 二經이 相併하므로 牙縫에서 出血되는 것이다<sup>1-3)</sup>.

本證은 最初로 《黃帝內經》<sup>4,5)</sup>의 ‘血溢’, ‘衄血’에서 言及이 되었으며, 《金匱要略》<sup>6)</sup>에서는 ‘吐血’에 包含되어 敘述되었는데, 隋代에 이르러 巢<sup>7)</sup>가 “手陽明之支脈入于齒 頭面有風 而陽明脈虛 風挾熱乘虛入齒齦 搏于血 故血出也”라 한 것이 最初의 專門的인 論述로서, 咳血, 吐血, 尿血 등의 다른 血證보다는 比較적 늦게 나타났다<sup>2)</sup>. 宋代를 거쳐 明清時代에서는 張 등<sup>8-10)</sup>이 齒衄을 血證 중의 하나로써 認識하고 論述하므로써, 齒衄의 病因病理와 治療方藥을 점차 發展시켰으며, 現代에 이르러서 齒衄은 주로 齒齦의 局部 病變이나 全身性 疾病으로 인해 발생하는 內科 範圍의 疾患으로 취급되고 있다<sup>1-3)</sup>.

西洋醫學에서는 白血病, 비타민 缺乏症 및 肝硬化 등에서 比較的 많이 볼 수 있으나<sup>2,3)</sup>, 이에 비하여 韓醫學에서의 臨床的인 活用과 研究는 아직 미흡한 實情이다.

이에 著者は 臨床에서 흔히 접할 수 있는 齒衄에 대한 韓醫學的 臨床活用을 높이고자, 齒衄의 治療에 대한 文獻的 考察을 통하여 若干의 知見을 얻었기에 이에 報告하는 바이다.

1. 資料調查 및 研究方法

(1) 資料調查

韓醫學의 歷代文獻 中에서 《千金要方》으로부터 最近의 《實用中醫內科學》에 이르기까지 34種의 文獻을 對象으로 하여 齒衄의 治療에 關한 部分을 拔萃하여 이를 研究資料로 하였다.

- ① 千金要方<sup>11)</sup>
- ② 外臺秘要<sup>12)</sup>
- ③ 濟生方<sup>13)</sup>
- ④ 太平聖惠方<sup>14)</sup>
- ⑤ 聖濟總錄<sup>15)</sup>
- ⑥ 丹溪心法附餘<sup>16)</sup>
- ⑦ 六科準繩<sup>17)</sup>
- ⑧ 古今醫統大全<sup>18)</sup>
- ⑨ 萬病回春<sup>19)</sup>
- ⑩ 醫學入門<sup>20)</sup>
- ⑪ 醫學正傳<sup>21)</sup>
- ⑫ 東醫寶鑑<sup>22)</sup>
- ⑬ 景岳全書<sup>8)</sup>
- ⑭ 醫學綱目<sup>23)</sup>
- ⑮ 症因脈治<sup>9)</sup>
- ⑯ 壽世保元<sup>24)</sup>
- ⑰ 赤水玄珠<sup>25)</sup>
- ⑱ 醫方集解<sup>26)</sup>
- ⑲ 血證論<sup>27)</sup>
- ⑳ 類證治裁<sup>28)</sup>
- ㉑ 證治彙補<sup>29)</sup>
- ㉒ 辨證奇聞全書<sup>30)</sup>

- ㉓ 張氏醫通<sup>31)</sup>  
 ㉔ 證脈·方藥合編<sup>32)</sup>  
 ㉕ 古今醫方<sup>33)</sup>  
 ㉖ 萬病治療大全<sup>33)</sup>  
 ㉗ 醫方類聚<sup>35)</sup>  
 ㉘ 金匱翼<sup>10)</sup>  
 ㉙ 普濟方<sup>10)</sup>  
 ㉚ 醫林撮要<sup>37)</sup>  
 ㉛ 中醫歷代名方集成<sup>38)</sup>  
 ㉜ 中醫症狀鑑別診斷學<sup>39)</sup>  
 ㉝ 肝系內科學<sup>40)</sup>  
 ㉞ 實用中醫內科學<sup>41)</sup>
- (2) 研究方法
- 1) 齒齲에 使用한 治方을 34種의 文獻에서 調査, 整理하였다.
- 2) 齒齲에 使用한 投藥方法을 種類別로 整理하였다.
- 3) 構成藥物의 分布에 있어서 各 文獻에 나타난 治方을 重複되지 않게 選定하여 整理하였다.
2. 文獻調査
- (1) 千金要方<sup>11)</sup>
- ① 治齒斷間津液血出不止方  
生竹茹 二兩 醋煮含之
- ② 又方  
細辛 二兩 甘草 一兩  
右二味咬咀 以醋二升煎取一升 日夜旋含之
- ③ 又方  
礬石 一兩(燒) 水三升煮取一升 先拭血 乃含之
- ④ 治齒間血出方  
以苦竹葉 濃煮之 與鹽少許 寒溫得所 含之 冷吐
- ⑤ 又方  
溫童子小便半升 取三合含之 其血即止
- ⑥ 治齒出血不止方  
刮生竹皮 二兩 苦酒浸之 令人解衣坐 使人含 撲其背上三過 仍取竹茹濃煮汁 勿與鹽 適寒溫含嗽 之 竟  
日爲度
- ⑦ 治酒醉 牙齒涌血出方  
當歸 二兩 桂心 細辛 甘草 各一兩 礬石 六銖

- 右五味咬咀 以漿水五升煮取二升 含之 日五六夜三
- ⑧ 又方  
燒釘令赤 注血孔中 止
- (2) 外臺秘要<sup>12)</sup>
- ① 千金齒間出血者方  
竹葉 濃煮著鹽含之 冷吐
- ② 又方  
童子小便 溫含之 冷吐 血即止
- ③ 備急療齒疼痛斷間血出神驗方  
好鹽熬 每夜封齒根上 瀝水盡 乃扣齒一二百遍 卽差 忌棗砂糖等
- ④ 千金療齒血不止方  
刮生竹皮 以苦酒漬之 令人解衣坐 使人含 撲其背三遍 仍取茗草濃煮汁 含之 漱咽 終日爲之
- ⑤ 又療齒斷間津液血出不止方  
生竹茹 四兩 醋浸一宿 含之
- ⑥ 又方  
細辛 甘草(炙) 各二兩 右二味 醋一升 煮夜含之 及熱尤良
- ⑦ 又方  
礬石 一兩 燒末 以水二升煮 先拭血 乃含之
- (3) 濟生方<sup>13)</sup>
- ① 莽草散  
治風壅熱氣上攻 齒齲浮腫 或連頰車疼痛 或宣露血出  
莽草 川升麻 柳枝 槐角子 鶴虱 地骨皮 藁本(去蘆) 槐白皮  
右咬咀 每服一兩 水一盞 入鹽少許 煎至七分 盞去滓 熱含冷吐之 日用三次
- ② 必勝散(續方)  
治齒齲  
蒲黃(略炒) 螻兒青 等分  
右爲細末 每用少許 擦患處 少待 用溫鹽水漱之
- ③ 驅毒飲(續方)  
治熱毒上攻 宣露血出 齒齲腫痛不可忍者  
屋遊(卽瓦屋上青蓋 不拘多少洗淨)  
右煎湯 澄清 入鹽一小撮 放溫 頻頻漱之
- (4) 太平聖惠方<sup>14)</sup>

① 治牙齒縫忽然出血 當歸散方  
當歸 桂心 甘草 各半兩 白礬 一兩(燒冷汁盡)  
右件藥 都擣粗羅 分爲三度用 每度以漿水二大  
盞 煎至一盞 去滓 熱含冷吐

② 治齒齦血出 地黃湯方  
生地黃 三(二)兩切 柳枝 剉一合 黑豆 二合  
右件藥 將豆及柳枝炒令焦 以無灰酒二盞沃之  
卽下地黃 更煎五六沸 去滓 熱含冷吐 以差爲度

③ 治齒齦間血出 喫食不得 黃連散方  
黃連 白龍骨 馬牙消 各一兩 白礬 一分 龍腦  
一錢  
右件藥 擣細羅爲散 研入龍腦令勻 每用半錢 敷  
齒根下

④ 治齒根血出 白礬散  
白礬 三分(燒灰) 蚌吧膽 一錢  
右件藥 細研爲散 先以布揩齒 令血盡 每用半錢  
以濕紙上搽藥 於患處貼之

⑤ 治齒齦血出不止方  
乾地龍末 一錢 白礬灰 一錢 麝香末 半錢  
右件藥同研令勻 於濕布上塗藥 貼於患處

⑥ 治齒齦血出不止 龍骨散方  
白龍骨 一兩 生乾地黃 一兩 乾薑 半兩(炮裂  
剉) 曲頭棘針 一分 白礬 一分(燒灰)  
右件藥 擣羅爲末 每用半錢 揩數齒齦下 卽差

⑦ 治齒縫忽然血出不止方  
胡桐淚 半兩  
研羅爲末 用貼齒縫 如血出不定 再貼神效

⑧ 治無故由齒間血出不止方  
右以竹葉濃煎湯 熱含冷吐

⑨ 治齒浮動 斷腫出血方  
右以屋下塵煤面 細羅爲散 揩數齒根下

⑩ 又方  
右以白礬一兩 燒研爲末 每用半錢 敷齒根下

⑪ 又方  
右燒銅筋烙血出處 以白礬灰敷之

(5) 聖濟總錄<sup>15)</sup>  
① 治齒齦血出 乃腫痒風冷疼痛 烏金散方

槐白皮 豬牙皂莢 威靈仙(去土) 生乾地黃 酸石  
榴皮 何首烏 青鹽 各一兩(七味同入一瓶子外用泥固  
濟燒

令通赤取出放冷細研入後藥) 細辛(去苗葉) 升麻  
各半兩 麝香(紙研) 一分

右一十味 擣羅二味爲細末 入前燒者藥 并麝香  
同研令勻 每用半錢匕 揩牙良久 以溫湯漱口 如早作  
齒藥

用 尤妙  
② 治齒齦血出 柳枝散方

柳枝 桑枝 槐枝 各一握(燒灰) 丹砂(研入) 一分  
皂莢(不蛀者炙令赤) 一分 麝香(研) 一錢 小薊根 半  
兩

凝水石(研) 二兩 生乾地黃(焙) 半兩  
右九味 擣研爲細散 每用揩齒良

③ 治牙齒搖動 血出宜露 口臭不能飲食 棘刺散方  
棘刺(燒灰) 當歸(切焙) 細辛(去苗葉) 菖蒲 莎  
草根(炒) 鷄舌香 各半兩 青木香 青黛(研) 胡桐淚  
(研) 乾薑

(炮) 各一分  
右一十味 擣羅爲細散 以綿裹半錢匕 含化 有涎  
吐之

④ 治齒齦血出 牙根有蟲 鶴虱散方  
鶴虱 半兩 膩粉 二錢 麝香(研) 一錢 細辛(去  
苗葉) 半兩 露蜂房 一枚(燒灰研)

右五味 除研藥外 擣羅爲細散 入研藥和勻 臨臥  
時 以濕帛子 搽藥半錢匕 患處貼之 差

⑤ 治齒痛宜露 血出不止 角蒿散方  
角蒿(剉) 細辛(去苗葉) 升麻 各半兩 地骨皮(去  
土) 牛膝 各一分

右五味 藏瓶內 燒灰存性 擣羅爲散 每用一錢匕  
搽濕紙上 患處貼之

⑥ 治牙齒疼痛 齒間出血 去口氣 辟風冷 龍腦散  
方  
龍腦(研) 一分 蔓荊實 細辛(去苗葉) 升麻 各一  
兩

右四味 擣羅三味爲細散 入龍腦拌勻 每用半錢  
匕 揩牙良久 以溫湯漱口

⑦ 治酒後 牙齒血涌出 當歸湯方  
當歸(焙乾) 一兩 桂(去粗皮) 甘草(炙) 各半兩  
礬石 一分(熬枯)

右四味 粗搗篩 每用三錢匕 水一盞 煎五七沸  
去滓 熱漱冷吐 日三兩度 卽差

- ⑧ 治牙縫血出 神效散方  
草烏頭 青鹽 皂莢 各一分  
右三味 瓦器內 燒灰存性 每用一字 揩牙立效
- ⑨ 治齒齲出血 生地黃湯方  
生地黃 二兩(切) 大豆 三合(炒香熟) 柳枝(節) 一合  
右三味 將豆及柳枝 炒令焦 以無灰酒四盞沃之 卽下地黃 更煎五六沸 去滓 熱漱冷吐
- ⑩ 治牙宣血出不止 胡粉散方  
胡粉 半兩 麝香(研) 半錢  
右二味 同研爲細散 臨臥淨揩牙漱口 訖 乾貼 兼能牢牙
- ⑪ 治牙痛肉爛 血出不止 細辛散方  
細辛(去苗葉) 一兩 草烏頭(罐子內燒存性) 一兩  
右二味 搗羅爲細散 用少許揩牙 出涎
- ⑫ 又方  
草烏頭大者 去皮臍 高良薑等分爲散 先用溫鹽湯淨漱口了 搵藥少許揩齒 涎出立效
- ⑬ 治牙齒宣露 及血出不止方  
莽草 一斤(剉碎)  
右用水五升 煮至三升 去莽草 熱漱冷吐
- (6) 丹溪心法附餘<sup>16)</sup>
- ① 宣牙膏(御藥院方)  
治牙齒動搖不牢 疼痛不止 齲肉出血  
麝香 一字 龍骨 定粉(別研) 各二錢半
- ② 梧棟淚散(御藥院方)  
治牙齒斷腫悶 宣露血出  
梧棟淚 川芎 細辛 白芷 各半錢 生地黃 一錢 青鹽 二分 寒水石(燒熟) 二錢  
上件 同爲細末 每用 塗貼患處 吐涎 誤嚥不妨 無時日 五七次
- ③ 地黃散(御藥院方)  
治風熱攻注陽明 牙痛斷腫 或血出 宣露  
生地黃 一錢半 防風 細辛 薄荷葉 地骨皮 藥木 各一錢 苧草葉 當歸 荊芥穗 各半錢  
上同胃粗末 作一服 水一鐘半 煎至一鐘 去滓 微熱漱口 冷吐之 煎服 尤妙
- (7) 六科準繩<sup>17)</sup>
- ① 消風散  
荊芥 甘草 各一錢 人參 茯苓 白僵蠶 川芎 防風 藿香 蟬殼 羌活 芒硝 各五分 陳皮 厚朴 各三分 右剉作  
一貼 入細茶一撮 同煎服
- ② 安腎丸  
便制香附 二兩 炮川烏 川椒 各一兩 青鹽 炒小茴香 各三兩 熟地 四兩 川棟子 三錢
- ③ 用青鹽炒香附 黑色爲末 擦之
- ④ 清胃散  
當歸尾 生地黃 牡丹皮 升麻 黃連 防風 荊芥 軟石膏 各等分  
右剉 水煎服
- ⑤ 甘露飲  
生地黃 熟地黃 天冬 麥冬 石斛 茵陳 黃芩 枳殼 枇杷葉 甘草 等分 每服五錢
- (8) 古今醫統大全<sup>18)</sup>
- ① <秘驗>清胃飲  
治一切風熱濕痰 牙痛床腫 血出動搖  
當歸 生地黃 黃芩 石膏 各一錢 升麻 五分 白芍藥 青皮 黃連 各八分 牡丹皮 甘草 各四分 梔子 仁 蒼朮 各一錢 細辛 藿香 荊芥穗 各六分  
右水二鐘煎八分 食後緩緩含呷之 效
- ② 東垣神功丸  
治多食肉口臭不可近 牙齒疳蝕 牙齲肉脫血出  
藿香葉 當歸身 木香 升麻 各一錢 生地黃(酒洗) 甘草 各三錢 黃連(酒洗) 縮砂仁 各五錢  
右爲細末 湯浸蒸餅爲丸 如綠豆大 每服一百丸 或加至二百丸 白湯食遠服
- ③ 驅毒飲  
治熱毒上攻 宣露出血 牙齲腫痛不可忍  
屋遊 卽瓦上青苔 不拘多少淨洗 水煎湯 澄清入鹽一撮 頻頻漱之
- ④ <良方>荊槐散  
治牙宣血出不止 疼痛  
荊芥穗 槐花 各等分 爲細末擦牙患處
- ⑤ 鬱金散  
治牙齒出血疼痛  
鬱金 白芷 細辛 各等分  
右爲細末 擦牙齲疼處 嚙少時 有涎吐出
- (9) 萬病回春<sup>19)</sup>

① 蘇陳坡

治熱極齒縫出血成條者  
人蔘 茯苓 麥門冬(去心) 各二錢  
上銼一劑 水一盞煎五分溫服 神效

② 牙宜膏

治牙齒動搖不牢 疼痛不止 齦肉出血  
麝香 一字 白龍骨 二錢半 官粉 二錢半 別研

(10) 醫學入門<sup>20)</sup>

① 消風散 加 芒硝

荊芥 甘草 各一錢 人蔘 茯苓 白殭蠶 川芎 防風 藿香 蟬殼 羌活 芒硝 各五分 陳皮 厚朴 各三分 右剉作

一貼 入細茶一撮 同煎服

② 四物湯 加 升麻 或 牧丹皮 知母 黃栢

熟地黃 當歸 川芎 白芍藥 升麻 或 牧丹皮 知母 黃栢

③ 四物湯 加 香附 側柏葉 牛膝

熟地黃 當歸 川芎 白芍藥 香附 側柏葉 牛膝

④ 綠袍散

黃栢 薄荷 芒硝 青黛 各等分 右爲末 入龍腦少許 糝牙床卽止

⑤ 香鹽散

香附 三兩 青鹽 五錢 爲末 擦牙  
去風熱 治蟲牙及腎虛宣露 一切齒疾

⑥ 玉池散

地骨皮 白芷 細辛 防風 升麻 川芎 當歸 槐花 藥本 甘草 各等分 水煎服

痛甚 加生薑 黑豆 煎湯 熱漱冷吐 或爲末 擦牙亦妙

(11) 醫學正傳<sup>21)</sup>

① 神功丸(東垣)

治多食肉人 口臭不可近 牙齒疳蝕 牙齦肉將脫 牙齒落 血不止

蘭香葉(如無藿香代之) 當歸身 藿香葉 木香 各一錢 升麻 一錢 生地黃(酒洗) 甘草(生) 各三錢 黃連(酒

洗) 縮砂仁 各五錢

上共爲細末 湯浸蒸餅爲丸 如綠豆大 每服一百丸 或加至二百丸止 白湯下 食遠服

(12) 東醫寶鑑<sup>22)</sup>

① 綠袍散

治齒縫出血不止  
黃栢 薄荷 芒硝 青黛 各等分 右爲末 入龍腦少許 糝牙床卽止(入門)

② 荊槐散

治牙宣出血  
荊芥穗 槐花(炒) 各等分 右爲末 常擦牙 或點服(得效)

③ 鬱金散

治齒齦出血  
鬱金 白芷 細辛 各等分 右爲末 常擦牙 仍以竹葉 竹茹 入鹽 煎水 含漱(得效)

④ 小薊散

治牙宣出血  
百草霜 小薊 香附子 蒲黃(炒) 各五錢 右爲末 常措牙齒上 立止(得效)

⑤ 解毒湯 合 犀角地黃湯

黃連 黃芩 黃栢 梔子 連翹 槐花(炒) 各一錢 細辛 甘草 各五分 生地黃 三錢 赤芍藥 二錢 犀角(鎊) 牧丹

皮 各一錢 右剉作一貼 水煎服

⑥ 生地芩連湯

生地黃 川芎 當歸 各一錢半 赤芍藥 山梔子 黃芩 黃連 各七分 防風 二錢 右剉 水煎 徐徐呷下

⑦ 齒縫多出血 以鹽湯 常常漱口 仍以鹽末 塗之

⑧ 青竹茹 醋浸一宿 含漱 又竹葉濃煎 入鹽 含漱(本草)

⑨ 治牙疼牙宣出血 香附子末 薑汁浸一宿 漱口後措齒(得效)

⑩ 滿口齒出血 地骨皮 煎湯 先漱 後喫(綱目)

(13) 景岳全書<sup>8)</sup>

① 推薪飲

治諸風火熾盛而不宜補者  
黃芩 石斛 木通 梔子(炒) 黃栢 各一二錢 枳殼 錢半 澤瀉 錢半 細甘草 三分

水一鐘半煎七分 食遠溫服 內熱甚者 冷服更佳

② 秘驗清胃飲

治一切風熱濕痰牙痛床腫血出動搖  
石膏 梔子 黃連 黃芩 當歸 生地 白芍 蒼朮 各一錢 青皮 八分 細辛 藿香 荊芥穗 各六分 升麻 五

分

丹皮 甘草 各四分

水二鐘煎八分合後 緩緩含飲之效

## ③ 東垣清胃散

治醇酒厚味或補胃熱藥太過而 致牙痛不可忍 牽引頭腦滿面發熱 或齒齲潰爛喜冷惡熱 此陽明之火也 宜用此方

生地 錢半 升麻 當歸 丹皮 各一錢 黃連 錢半 (夏月倍之)

水煎服

## ④ 冰玉散

治牙疳牙痛口瘡齒齲喉痺

生石膏 一兩 月石 七錢 冰 三分 疆蠶 一錢

右爲極細末小磁瓶盛貯數之吹之

## ⑤ 仲景調胃承氣湯

治太陽陽明不惡寒反惡熱大便秘結日晡潮熱者

大黃 芒硝 甘草 各五錢

每服三五錢水六盞煎七分溫服

## ⑥ 金匱六味地黃丸

卽金匱腎氣丸

熟地黃 八兩(蒸搗) 山茱萸 山藥(炒) 各四兩 丹皮 澤瀉 白茯苓 各三兩

右爲細末和地黃膏 加煉蜜爲丸桐子大 每服七八十丸 空心食前 滾白湯或淡鹽湯任下

## ⑦ 左歸丸

治真陰腎水不足不能滋養營衛

大懷熟 八兩 山藥(炒) 四兩 枸杞 四兩 山茱萸 肉 四兩 川牛膝(酒洗蒸熟) 三兩(精滑者不用) 兔絲子(制)

四兩 鹿膠(敲碎炒珠) 四兩 龜膠(切碎炒珠) 四兩 (無火者不必用)

右先將熟地蒸爛杵膏 加煉蜜丸桐子大 每食前用滾白湯或淡鹽湯送下百餘丸

## ⑧ 崔氏八味丸

治命門火衰不能生土以致脾胃虛寒

熟地黃 八兩(蒸搗) 山茱萸 山藥(炒) 各四兩 丹皮 澤瀉 白茯苓 各三兩 肉桂 制附子 各一兩

## ⑨ 小安腎丸

治腎氣虛乏下元冷憊夜多漩溺體瘦神倦腰膝沈重 泄瀉腸鳴眼目昏暗牙齒蛀痛

川棟子 一斤 用香附子 川烏 各一斤 (加鹽四兩水四升同煮候乾去香附川烏不容取川棟切焙) 小茴 十二兩

熟地 八兩 川椒 四兩(去閉口者微炒出汗)

右爲末酒糊丸桐子大每服二三十丸空心臨臥鹽湯或酒任下

## ⑩ 玉女煎

治水虧火盛六脈浮洪滑大 少陰不足陽明有餘 煩熱乾渴頭痛牙疼失血等證如神 若大便溏泄者乃非所宜

生石膏 三五錢 熟地 三五錢或二兩 麥冬 二錢 知母 牛膝 各半錢

水一鐘半煎七分溫服或冷服

(14) 醫學綱目<sup>23)</sup>

## ① 麝香散

治熱多寒少 牙露根肉 齲脫血出 齒動欲落 大痛妨食 惡寒少 惡熱多

麻黃 當歸 熟地 生地 人參 酒防己 各三分 升麻 一錢 草豆蔻 黃連 各錢半 益智仁 二分半 麝香 少許 羊

脛骨(灰) 二錢

上細末 依前法擦之

(15) 症因脈治<sup>9)</sup>

## ① 乾葛羌活湯

羌活 黃芩 防風 蒼朮 川芎 生地 細辛 乾葛 白芷 甘草

## ② 乾葛防風湯

乾葛 防風 荊芥 石膏 知母

## ③ 乾葛清胃湯

升麻 生地 丹皮 川連 甘草 乾葛 石膏

## ④ 犀角地黃湯 加 酒蒸大黃

犀角 生地 丹皮 白芍藥 黃芩 荊芥 山梔 大黃 (酒蒸)

## ⑤ 犀角地黃湯

犀角 生地 丹皮 白芍藥 黃芩 荊芥 山梔

## ⑥ 升麻清胃湯

升麻 生地 川連 丹皮 山梔 當歸 大黃(酒蒸)

## ⑦ 知柏肝腎丸

天門冬 地黃 白芍藥 當歸 黃柏 知母

(16) 壽世保元<sup>24)</sup>

① 加味清胃散

當歸尾 生地黃 牡丹皮 升麻 黃連 防風 荊芥  
軟石膏 各等分

右剉 水煎服

② 涼隔散

連翹 梔子 大黃(酒蒸 爲君) 芒硝 黃芩 薄荷  
知母 升麻 石膏 黃連 甘草 各等分

右剉 水煎 頻服

③ 保牙散

軟石膏 一兩 川烏 三錢 草烏 三錢 花椒 三錢  
右俱生用爲末 擦牙漱口 吐之 立已

④ 補中益氣湯

黃芪(蜜炙) 二錢五分 人蔘 一錢 白朮(去蘆 炒)  
一錢五分 當歸(酒洗) 一錢五分 陳皮 七分 柴胡 升  
麻

甘草(炙) 各五分

⑤ 甘露飲

枇杷葉 石斛 黃芩 枳殼 天門冬 麥門冬 生地黃  
熟地黃 山茵陳 甘草

右剉末 煎服

⑥ 救苦丹

蟾酥 三分(剉細 乳汁些少溶化磁盞內) 雄黃 二  
分 細辛 二分 冰片 二分

(17) 赤水玄珠<sup>25)</sup>

① <肘後方> 治齒血不止

苦竹茹 以醋浸一宿含之

② <千金方> 治同

礬石 一兩 滾湯三升 煮取一升 先拭齒 乃含之

③ 又方

濃煎竹葉湯入鹽少許含之

④ <衍義> 方治齒縫出血不止

用紙捻醮蟾酥少許 插入出血處立之

⑤ <靈苑方> 治虛氣攻牙 齒痛 出血 牙齦癢痛

骨碎補 二兩 細剉炒黑色 爲末擦之 早晨漱久吐  
出 臨睡擦畢 候津液滿口嚥之

⑥ 丹溪 治陰虛牙出鮮血 氣鬱

四物湯 加 香附牛膝生甘草側柏葉 服

當歸 熟地 川芎 白芍 香附 牛膝 生甘草 側柏  
葉

⑦ 羅太無 治牙痛腫癢動搖 牙齦宣露 出血 口氣

等疾

當歸 藥本 地骨皮 防風 白芷 槐花 川芎 甘草  
升麻 北細辛 各等分

爲末 擦痛處 甚者取三錢 水鍾半 黑豆半合 生  
薑三片 煎至一鍾 乘熱漱之 冷則吐出

⑧ <本事方> 治一切牙疼風熱 齦上出鮮血 以至  
崩落 口臭不可近人者 宜服之

大黃(米泔浸研 切片) 生地黃(大者薄切)

右二味旋切 各用一二片 合定 貼所患牙上 一夜  
即愈 未痊 可再如前用 忌說話 恐引風毒津液漬患處  
(18) 醫方集解<sup>26)</sup>

① 清胃散

治胃有積熱 上下牙痛 牽引頭腦 滿面發熱 其牙  
喜寒惡熱 或牙齦潰爛 或牙宣出血 或脣口頰腮腫痛

生地黃 牡丹皮 黃連 當歸 升麻 一方 加石膏

② 甘露飲

生地黃 熟地黃 天冬 麥冬 石斛 茵陳 黃芩 枳  
殼 枇杷葉 甘草 等分 每服五錢

③ 桂苓甘露飲

生地黃 熟地黃 天冬 麥冬 桂枝 茯苓 石斛 茵  
陳 黃芩 枳殼 枇杷葉 甘草 等分 每服五錢

(19) 血證論<sup>27)</sup>

① 犀角地黃湯 加 豎根貫中枳殼萊菔汁

犀角 錢半 生地 五錢 白芍 三錢 丹皮 三錢 豎  
根 貫中 枳殼 萊菔汁 一錢

② 甘露飲 加 蒲黃

天門冬 三錢 麥門冬 三錢 生地黃 三錢 熟地黃  
三錢 黃芩 三錢 枳殼 一錢 石斛 三錢 茵陳 三錢  
甘草

一錢 蒲黃 一錢

③ 通脾瀉胃湯 加 蒲黃藕節

黃蘗 三錢 元蔘 三錢 防風 三錢 大黃 一錢 知  
母 三錢 炒梔子 三錢 石膏 三錢 羌蔚 三錢 蒲黃  
一錢

藕節 一錢

④ 十灰散

大蓴 小蓴 茅根 椴皮 側柏 大黃 丹皮 荷葉 茜  
草 梔子 各等分 右藥燒存性爲末

⑤ 玉女煎

生石膏 三五錢 熟地 三五錢 或二兩 麥冬 二錢

知母 牛膝 各半錢

⑥ 六味地黃湯 加 牛膝 二冬 碎補 蒲黃

熟地黃 八兩(蒸搗) 山茱萸 山藥(炒) 各四兩 丹皮 澤瀉 白茯苓 各三兩 牛膝 二冬 碎補 蒲黃

⑦ 外治之法 宜用冷水漱口 取血調冷則凝之義 醋漱 爲酸以收之之義 百草霜 糝 十灰散 糝 取血見黑則之

(20) 類證治裁<sup>28)</sup>

① 甘露飲

生地 二冬 石斛 茵陳 黃芩 枳殼 枇杷葉 甘草

② 清胃散

生地 四錢 升麻 錢半 丹皮 五錢 當歸 川連 三錢

③ 調胃承氣湯

大黃 芒硝 炙甘

④ 消風散 加 犀角連翹

蔘 苓 陳 草 荊 防 羌 芎 藿香 僵蠶 蟬退 厚朴 犀角 連翹

⑤ 六味飲 加 山梔赤芍

熟地 山藥 茱萸 丹皮 澤瀉 茯苓 山梔 赤芍

⑥ 七味地黃丸

熟地 山藥 茱萸 丹皮 澤瀉 茯苓 桂心

⑦ 六味丸

熟地 山藥 茱萸 丹皮 澤瀉 茯苓

⑧ 安腎丸

便制香附 二兩 炮川烏 川椒 各一兩 青鹽 炒小茴香 各三兩 熟地 四兩 川棟子 三錢

⑨ 水玉散

硼砂 元明粉 各五錢 辰砂 五分

⑩ 外擦青鹽藥末

⑪ 外擦青鹽炒香附末

(21) 證治彙補<sup>29)</sup>

① 外治法

齒齬 用燒鹽 金墨 研勻擦之

(22) 辨證奇聞全書<sup>30)</sup>

① 六味地黃湯 加 麥冬 五味 骨碎

熟地 一兩 山藥 四錢 茱萸 四錢 丹皮 五錢 澤瀉 三錢 茯苓 三錢 麥冬 五錢 五味子 一錢 骨碎補 一錢

(23) 張氏醫通<sup>31)</sup>

① 消風散 加 犀角連翹

荊芥 甘草 各一錢 人蔘 茯苓 白僵蠶 川芎 防風 藿香 蟬殼 犀角 連翹 羌活 芒硝 各五分 陳皮 厚朴

各三分 右剉作一貼 入細茶一撮 同煎服

② 又方

外擦 青鹽 藥末

③ 小安腎丸

治風寒襲於腎經 下體沈重 夜多小便 耳鳴岐視 牙齦動搖出血 小腹寒疝作痛

香附(童便製) 二兩 川烏頭(炮淨) 一兩 檀香(青鹽微焙) 三兩 川椒(去閉口者 炒) 一兩 熟地黃 四兩 川

棟子(酒蒸取肉) 三錢

④ 六味丸 加 骨碎補

熟地黃 八兩 山茱萸 山藥 各四兩 丹皮 澤瀉 白茯苓 各三兩 骨碎補 一兩

⑤ 外用 青鹽炒香附末 擦之

⑥ 清胃散

治胃有蘊熱 中脘作痛 痛後火氣發泄 必作寒熱 乃止 及齒齬腫痛出血 痛引頭腦

生地黃 四錢 升麻 錢半 牡丹皮 五錢 當歸 川連(酒蒸) 各三錢

爲散 分三服 水煎去滓 細細呷之 半日再服

⑦ 調胃承氣湯

大黃 四錢 芒硝 二錢 甘草 一錢

(24) 證脈·方藥合編<sup>32)</sup>

① 綠袍散

黃柏 薄荷 芒硝 青黛 各等分 右爲末 入龍腦少許 糝牙床卽止

② 牛黃膏

朱砂 鬱金 各三錢 牛黃 二錢半 牡丹皮 二錢 甘草 一錢 龍腦 五分

左末 蜜丸如皂子 每一丸 井水化下

③ 調胃承氣湯

大黃 四錢 芒硝 二錢 甘草 一錢

④ 八味元

熟地黃 八兩 山茱萸 山藥 各四兩 牡丹皮 澤瀉 白茯苓 各三兩 肉桂 附子(炮) 各一兩

(25) 古今醫方<sup>33)</sup>

① 小薊散

牙痛出血을 治한다.  
百草霜 小薊 香附子 蒲黃(炒) 各五錢  
右作末 常時 牙齒를 문지른다.

② 生地芩連湯

防風 二錢 生地黃 川芎 當歸 各一錢半 赤芍藥  
山梔子 黃芩 黃連 各七分  
水煎하여 徐徐히 服飲시켜야 한다.

③ 綠袍散

齒縫出血不止를 齒한다.  
黃柏 薄荷 芒硝 青黛 各等分 龍腦少許  
右爲末하여 牙床을 문지르면 곧 맞는다.

④ 牛黃膏

朱砂 鬱金 各三錢 牛黃 二錢半 牡丹皮 二錢  
甘草 一錢 龍腦 五分  
右作末하여 蜜丸如皂子大하여 每回 一丸을 井  
水로 服用한다.

⑤ 保命生地黃散

生地黃 枸杞子 熟地黃 地骨皮 天門冬 白芍藥  
黃芪 柴胡 各一錢 黃芩 黃連 甘草 各五分

(26) 萬病治療大全<sup>34)</sup>

① 方

生地 三錢 大麥冬 二錢 澤瀉 二錢 粉丹皮 二  
錢 連翹 錢半 赤苓 錢半 潤元蔘 三錢 淮山藥 三錢  
黑山梔  
二錢 蘆根 一兩

外以豆腐渣敷患處

(27) 醫方類聚<sup>35)</sup>

① 荊槐散

治牙宣出血或痛  
槐花 荊芥穗 右等爲末 擦牙 仍煎點服

② 鬱金散

治齒出血  
鬱金 白芷 細辛  
右件等分爲末 擦牙 仍以竹葉竹皮濃煎 入鹽少

許 含咽或炒鹽傳

③ 又牙宣出血方

明白礬(煨) 三錢 乳香 半錢 少麝  
右件同研細 輕手擦 良久 鹽湯灌漱

④ 二妙丸

治齒齟

巴豆(不去壳) 蕁澄茄 七枚  
右研爛 爲細末 綿裹 左齒痛 納之左耳 右齒痛  
納之右

⑤ 齒縫出血方

齒縫出血不止 他藥不能者 鹽主之  
素問云: 鹽勝血 故也  
蘭室·寶鑿用麥門冬煎湯漱之 亦良

⑥ 又方

治齒縫出血 皆上實下虛也 八味丸服之而愈

⑦ 麝香散

治大小人口齒腐蝕出血 斷根宜爛者  
上好鹽土(不以多少) 麝香(真好者) 少許  
又熱湯淋取汁 去滓 用清汁 銀石器中熬乾 刮下  
再與麝香同研勻 糝于瘡上 以紙貼 神效

⑧ 鉛白霜散

治大小人口齒瘡 牙齒腐蝕 氣臭血出者  
鉛白霜 二錢 銅碌 二錢 白礬 一塊大許  
右爲末 以翎羽掃上瘡 以溫漿水漱之

⑨ 必勝散

治一切牙疳 齒齧蝕爛 口臭出血  
蟾酥 輕粉(別研) 定粉 人中白 各一錢 麝香 一  
字  
右爲細末 臨臥 鹽湯漱口了 貼藥末于患處 用紙  
蓋之

(28) 金匱翼<sup>10)</sup>

① 東垣清胃散

治醇酒厚味 或補胃熱藥太過 以致牙疼不可忍  
牽引頭腦 滿面發熱 或齒齧腐潰 出血不止 此陽明火  
也

生地 一錢五分 升麻 當歸 牡丹皮 犀角 連翹  
各一錢 甘草 黃連 各五分

上藥 水煎服

② <外臺>方

治滿口齒出血  
枸杞根洗 煎湯漱咽驗

③ <元戎>地黃引子

治腎虛齒齟不止  
熟地黃 生地黃 地骨皮 枸杞子 各等分  
焙乾爲末 每服二錢 蜜湯調服無時

(29) 普濟方<sup>36)</sup>

## ① 烏金散

治齒齲血出 及腫痒風冷疼痛

槐白皮 豬牙皂角 威靈仙 生乾地黃 酸石榴皮  
何首烏 青鹽 各一兩 細辛 升麻 各半兩 麝香

右爲細末 入前燒者藥并麝 同研令勻 每用半錢  
措牙良久 以溫湯漱口 如早作齒藥用尤妙 一水調藥  
半錢

塗在紙上 於牙齒上貼之 三兩次即愈

## ② 柳枝散方

治齒齲血出

柳枝 桑枝 槐枝 皂莢 丹砂 生地黃 麝香 凝水  
石 小薊根

右等分搗研爲細散 每用措齒良

## ③ 雄黃麝香散

治牙齒腫爛出血

雄黃 銅綠 枯礬 血竭 麝香 輕粉 黃丹 黃連 各  
一錢

右爲細末 每服少許 隨病大小傅上

## ④ 角蒿散

治齒痛宜露 血出不止

角蒿 細辛 升麻 各半兩 地骨皮 牛膝 各一分

右藏瓶內 燒灰存性 搗羅爲散 每用一錢 摻濕紙  
上 患處貼

## ⑤ 當歸湯

治酒醉 牙齒涌血出 亦治齒風痛

當歸 礬石 桂心 甘草 各一兩

右咬咀 以漿水五升 煮取三升 含之 日五六 夜  
三二 無細辛 水煎亦可

## ⑥ 治牙宣出血

藁本 零陵香 甘松 三柰 荊芥

右等分水煎漱之 如刷牙 用砂鍋末

## ⑦ 治齒齲間血 吃食不得

黃連 白龍骨 馬牙消 各一兩 白礬 龍腦 一錢

右爲細散 研入龍腦令勻 每用半錢 傅齒根下

## ⑧ 龍骨散

治齒齲血出不止

白龍骨 生地黃 乾薑 曲頭棘刺 白礬

右等分搗羅爲末 每用半錢 措傅齒齲上 即差

## ⑨ 生鷄桃花散

寒水石粉 朱砂 甘草 腦子

右等分爲細末 每用少許 乾捻有敷處

## ⑩ 龍腦散

治牙齒疼痛 間出血 去口氣 辟風冷

龍腦 蔓荊實 細辛 升麻 各一兩

右爲細散 入龍腦拌勻 每用半錢 措牙良久 溫湯  
漱口

## ⑪ 鬱金散

治齒出血

鬱金 白芷 細辛

右等分爲末 擦牙 仍以竹葉竹皮濃煎 入鹽少許  
含嚥 或炒鹽傅

## ⑫ 治牙宣出血

明白礬 乳香 麝香(少許)

右同研細 輕手擦良久 鹽湯灌漱

## ⑬ 神效散

治牙縫血出

草烏頭 青鹽 皂莢 各一分

右瓦器內燒灰存性 每用一字措齒立效

## ⑭ 生地黃湯

治齒齲出血

生地黃 大豆 柳枝

右等分將豆及柳枝炒焦 以無灰酒四盞沃之 卽下  
地黃根 煎五六沸 去滓 熱漱冷吐

## ⑮ 治齒齲血出不止方

乾地龍末 白礬灰 麝香末

右同研令勻 於濕布上塗藥 貼於患處

## ⑯ 必勝散

治齒齲

蒲黃 蠟兒青 等分

右等分爲細末 每用少許擦患處 少待 用溫鹽水  
漱之

## ⑰ 荊槐散

治牙宣出血或痛

槐花 荊芥穗

右等分爲末 擦牙仍煎服

## ⑱ 胡粉散

治牙出血不止

胡粉 麝香 各半錢

右同研細散 臨臥淨措牙 漱口訖 乾貼 兼能牢牙

⑲ 治齒齦間 津液血出不止  
用礬石一兩 燒酒三升 煮取一升 先拭血 乃含之  
已後不用 朽人牙齒 根落不用之可也

⑳ 又方  
治齒根血出  
用苦竹葉濃煮 與鹽少許 寒溫得所 含之 冷即吐  
一方無鹽

㉑ 又方  
治齒出血不止  
用刮生竹皮二兩 苦酒浸之 令其人解衣坐 使人  
含嘆其背上三過 仍取竹茹濃煮汁 勿與鹽 適寒溫含  
嗽之

竟日爲度

㉒ 治酒醉牙齒涌血  
用燒釘令赤 注血孔 立止

㉓ 治酒醉齒有血出  
用枸杞爲末 煎湯漱之 然後吞下立止 根亦可

㉔ 靈芝散  
治出血齒痛  
用川五靈芝 以米醋煎汁含嚥

㉕ 治齒疼 斷間出血極驗  
用鹽末 每夜厚封齒 斷上有汁瀝盡 及臥其汁出  
時 仍叩齒勿住 不過十夜 疼血止 更久尤佳 長忌猪  
肉油

㉖ 治牙疼 肉爛血出不止  
用草烏頭大者 去皮臍 高良薑等分爲散 先用溫  
鹽湯漱口了 搵藥少許措齒 涎出立效

㉗ 凡齒宣露 多是疽及蝕  
用角松灰 夜塗齒上斷間使滿 勿使食油菜 三度  
即差 食油菜即發 并桂心常忌砂糖乾棗

㉘ 又方(出肘後方)  
每日二捻東墻衣 口中暖水含 扣百遍 常爲勿脫  
不五日宣齒即牢 良驗 凡齒痛疼 皆由月蝕食深慎爲  
妙矣

㉙ 治齒縫忽然 血出不止方  
用胡桐淚半兩 研羅爲末 貼齒縫 如血出不止 再  
貼神效

㉚ 治齒浮動 斷腫出血方  
用屋下塵煤 細羅爲散 措敷齒根下

㉛ 又方(出聖惠方)  
用燒銅筋熔血出處 以白礬灰敷之

㉜ 治大人牙宣出血極多  
用消毒散 加大黃 赤芍藥 當歸 生地黃 等分 同  
煎服 仍敷貼前藥 或以綿紙醮藥塞牙縫中

㉝ 二妙圓  
治齒齦  
巴豆 葶澄茄 各七枚  
右研爛爲細末 綿裹 左齒痛納之左耳 右齒痛納  
之右耳

㉞ 齒縫出血方  
齒縫出血不止 他藥不能治者 鹽主之 蘭室·寶  
鑑用門冬煎湯漱之 亦良

㉟ 又方 治齒縫出血 蓋上實下虛也  
用八味丸服之即愈

㊱ 治牙齒出血 及走馬疳  
右用頭髮乾 用刮面刀子細切 銚內慢火炒 存性  
爲末

㊲ 治齒縫多血  
以鹽湯常漱即已 益齒走血 驗也

㊳ 治齒齦間津液血出不止  
用苦竹茹四兩 以醋漬一宿 含之 一方用酒

㊴ 治齒縫中血出  
以紙紮子醮乾蟾酥少許 於血出處按 立止

(30) 醫林撮要<sup>37)</sup>

① 措齒散  
治風疳血出牙齒虛浮  
細辛 白疾藜(炒去刺) 露蜂房(灰) 升麻 黃栢 各  
半兩 槐柳(如筋長) 二寸 白礬 半兩(一半燒令汁 一  
半生  
研細)

右末磁合收盛 便時先以熱鹽水漱口三 一與措齒  
上微痛即止有涎吐(得效牙門)

② 玉池散  
治風腫牙疼腫痒動搖牙齦潰爛宣露出血口氣等  
地骨皮 白芷 升麻 防風 細辛 川芎 槐花 當歸  
藥本 甘草(灸) 各等分

右末每用一字措牙 或痛甚取二錢水一盞半黑豆  
半合薑三片煎 溫漱候冷吐之(局方)

③ 荊槐散

治牙宣血出或痛

右用槐花 荊芥穗 等分爲末 擦牙 因煎點服(得效)

④ 生肌桃花散

水石(粉) 三兩 朱砂(飛) 二錢 甘草(炒) 一字 片腦 一字

右末研勻 每用少許 搽患處(良方齒門)

(31) 中醫歷代名方集成<sup>38)</sup>

① 瀉心湯

大黃 9克 黃連 4.5克 黃芩 4.5克 水煎服

② 清胃散

黃連 3克 當歸 9克 生地黃 9克 丹皮 9克 升麻 6克 水煎服

③ 二至丸

女貞子 旱蓮草

④ 錫類散

象牙屑 0.9克 珍珠 0.9克 青黛(飛) 1.8克 水片 0.09克 壁鐵 20个 牛黃 0.15克 人指甲 0.15克

上藥共研極細末 每用少許 吹患處

(32) 中醫症狀鑑別診斷學<sup>39)</sup>

① 清胃散

黃連 當歸 生地 丹皮 升麻

② 通脾瀉胃湯

黃芩 玄參 防風 大黃 知母 山梔 石膏 芫蔚子

③ 甘露飲 加 蒲黃

生地黃 熟地黃 天冬 麥冬 石斛 茵陳 黃芩 枳殼 枇杷葉 甘草 蒲黃

④ 玉女煎

麥冬 地黃 石膏 知母 牛膝

⑤ 知栝地黃丸 加 牛膝骨碎補

熟地 山茱萸 山藥 丹皮 茯苓 澤瀉 知母 黃栝 牛膝 骨碎補

⑥ 歸脾湯 加 仙鶴草炒側柏葉

白朮 茯苓 黃芪 人參 甘草 木香 當歸 遠志 龍眼肉 酸棗仁 仙鶴草 炒側柏葉

(33) 肝系內科學<sup>40)</sup>

① 清血地黃湯 合 黃連解毒湯

當歸身 川芎 白芍藥 熟地黃 地榆炒黑 槐花炒黑 側柏葉 各4g 黃芩 黃連 黃栝 梔子炒 荊芥炒黑 甘草

各3g

② 涼隔散

連翹 8g 大黃 芒硝 甘草 各4g 薄荷 黃芩 梔子 各2g 青竹葉 7片

③ 清胃散

升麻 8g 牡丹皮 6g 當歸 生地黃 黃連 各4g

④ 調胃承氣湯

大黃 16g 芒硝 8g 甘草 4g

⑤ 六味地黃元

熟地黃 320g 山藥 山茱萸 各160g 白茯苓 牡丹皮 澤瀉 各120g

⑥ 左歸飲

熟地黃 300g 山藥 枸杞子 山茱萸 兔絲子 鹿角膠 龜板膠 各150g 牛膝 112.5g

⑦ 生肝湯 加 地榆炒黑荊芥炒黑

茵陳 45g 澤瀉 白朮 各15g 豬苓 白茯苓 枳實 甘草 各8g 地榆炒黑 荊芥炒黑 各4g 生薑 5片

⑧ 生肝健脾湯 加 地榆炒黑荊芥炒黑

茵陳 澤瀉 各15g 白朮 山查肉 麥芽 各7.5g 陳皮 白茯苓 豬苓 厚朴 地榆炒黑 荊芥炒黑 各3.75g 藿香

羅藶子 枳實 三棱 蓬朮 青皮 唐木香 砂仁 甘草 各3g 生薑 3片

(34) 實用中醫內科學<sup>41)</sup>

① 加味清胃散(蘭室秘藏)

生地 丹皮 連翹 黃連 當歸 升麻

② 茜根散(景岳全書)

茜根 黃芩 阿膠 側柏葉 生地 甘草

③ 六味地黃丸(小兒藥證直訣)

熟地 山藥 山茱萸 丹皮 茯苓 澤瀉

④ 金匱腎氣丸(金匱要略)

桂枝 附子 地黃 山茱萸 山藥 丹皮 茯苓 澤瀉

⑤ 犀黃丸(外科全生集)

犀黃 麝香 乳香 沒藥

⑥ 生脈散(內外傷辨惑論)

人參 麥冬 五味子

⑦ 鮮白茅根 60克 搗汁 童便一小盅 治各型齒齬

⑧ 枸杞子根 15克 研末 用溫水調勻 先漱口 後服下 治齒齬

⑨ 齒齬輕者 用烏梅肉數粒 含口內

⑩ 氣陰虧虛 虛火上浮 齒痛兼有齒齲者 用西洋參片含口內

⑪ 水牛角片 30克 黃栢 黃連 大黃 各6克 生地 蚤休 各12克 煎服 治肝胃火盛所致的齒齲

⑫ 人中白散

人中白 兒茶 各30克 黃栢 薄荷 青黛 各9克 冰片 1克 共研細末 塗敷患處

### III. 總括 및 考察

齒齲는 牙宣<sup>15,17,18,31</sup> , 牙齲<sup>9,34</sup> , 齒出血<sup>11,12,43</sup> , 齒間出血<sup>11,15,36</sup> , 齒縫出血<sup>14,28,30</sup> , 牙縫出血<sup>15</sup> 등으로 命名되어 왔는데, 《黃帝內經》<sup>45</sup>에서는 ‘血溢’, ‘齲血’의 範疇에 屬하였고, 《金匱要略》<sup>6</sup>에서는 ‘吐血’, 《諸病源候論》<sup>7</sup>에서는 ‘齒間出血候’에 포함되었다가, 宋代에서부터는 ‘齒齲’이라는 名稱을 자주 使用하였다<sup>2</sup>. 以後 明清時代의 《景岳全書》 등<sup>8-10</sup>에서는 齒齲를 血證의 範疇에서 論述하였고, 점차 齒齲의 病理와 治療方藥에 대한 활발한 研究가 進行되었다<sup>1-3</sup>.

西醫學에서 齲血을 일으킬 수 있는 疾患으로는, 急·慢性白血病에서 흔히 口腔症候가 나타나는데 齒齲出血도 그 하나이고, 口腔粘膜의 點狀出血이나 潰瘍, 齒柱炎에서도 나타날 수 있으며, 血小板減少의 常態에서는 多發性的 點狀 및 斑狀出血과 齒齲出血이 보일 수 있다. 또한 vitamin C의 甚한 缺乏은 壞血病을 招來하여 口腔粘膜의 點狀出血과 齒齲出血을 일으키기도 하며, 肝硬變症에서도 止血蛋白質의 生成이 不振하여 齒齲出血이 나타날 수 있다<sup>1-3,40,42</sup>.

齒齲의 原因으로 巢<sup>7</sup>는 《諸病源候論·牙齒病諸候·齒間出血候》에서 “手陽明之支脈入于齒 頭面有風 而陽明脈虛 風挾熱乘虛入齒齲 搏于血 故血出也”라 하여 齒齲와 陽明經脈이 가장 密接한 關係에 있어 風熱相搏이 常見하는 것이라 認識하였고, 王 등<sup>12,14,16</sup>은 巢와 見解를 같이 하였다. 또한 趙 등<sup>15,36</sup>은 “風邪僭熱在上 流傳于手陽明之脈”이라 하였다. 王 등<sup>17,25</sup>은 病因을 風壅과 腎虛로 나누었고, 徐<sup>18</sup>는 風熱濕痰, 多食肉, 熱毒上攻으로 인해

齒齲이 나타난다고 하였으며, 龔<sup>19</sup>은 熱極으로 인해 齒縫出血이 된다고 하였으며, 李<sup>20</sup>는 風熱, 腎虛炎, 陰虛氣鬱을 齒齲의 原因으로 보았다. 張<sup>8</sup>은 “齒齲 手足陽明二經及足少陰腎家之病”이라 敘述하고서 “其人素好肥甘辛熱之物 或善飲胃強者多”라 하여 內因을 강조하여, 病因을 陽明實熱, 腎水不足, 陰虛有火로 나누었다. 秦<sup>9</sup>은 “牙齲者 卽牙齲出血之症也 有兩經分別 一主陽明腸胃 一主少陰腎經 若血來如涌 來勢甚暴 來血甚多 此牙齲陽明之血也 有外感 有內傷 若血來点滴 來勢緩慢 來血不多 此少陰腎經之血也 有內傷 無外感”이라 하여 外感牙齲와 內傷牙齲으로 나누어 說明하였다. 唐<sup>27</sup>은 出血의 原因은 火라고 보고서 각각 胃火上炎, 胃中虛火, 腎虛火旺으로 구분하였으며, 林<sup>28</sup>은 “血出齒縫牙齲 屬胃腎二經”이라 하여 陽明火盛과 腎陰不固가 그 原因이라 하였다. 李<sup>29</sup>는 “牙齒者 乃骨之萃也 骨乃腎主之”라 하여 腎病에 屬한다고 하였고, 錢<sup>30</sup>은 “齒縫出血 腎火之沸騰”이라 하여 腎熱과 腎虛로 나누었다. 張<sup>31</sup>은 病因을 각각 風壅, 腎虛, 胃火로 나누어 說明하였고, 趙<sup>39</sup>는 胃腸實火, 胃中虛火, 腎虛火旺, 脾不統血로 나누었으며, 黃 이후<sup>41,44</sup>로는 주로 胃火內熾와 陰虛火炎으로 인하여 出血이 나타난다고 하였다. 以上을 살펴보면, 齒齲의 原因은 주로 火가 言及되었는데, 外因에서는 風熱, 風壅, 熱毒을, 內因에서는 陽明實熱, 胃腸實火, 腎虛火旺, 腎水不足, 脾不統血을 舉論하였다. 金元時代 以前에는 주로 外因을 言及하였으나, 明代以後로는 점차 外因보다는 內因을 重視하였으며, 實證에서는 胃熱에 대한 論述이 많았고, 虛證에서는 腎虛를 강조하였으니, 따라서 齒齲의 主要原因은 胃熱과 腎虛임을 알 수 있다.

治法에서는 《醫碁》<sup>3</sup>에서 “齒齲 此胃大腸腎三經之病 蓋大腸脈入下齒中 胃脈入上齒中 而腎主骨 齒爲骨之餘也 胃火盛卽血出如涌 而齒不動搖 或見口臭 牙齲腐爛腫痛 此濃酒厚味所致 宜清胃火 便結可下之 若口不臭 牙不痛 但齒動不堅 或微痛不甚 而牙縫是多出血者 此腎陰虛火動而然 宜滋腎水 六味丸主之 若腎火虛而上浮者 八味丸主之”이라 하여, 주로 齒齲를 胃, 大腸, 腎과 가장 密接한 關係가 있는 것으로 보고, 清胃火와 滋腎水의 治法을

提示하였다. 張<sup>8)</sup>은 《景岳全書·血證·齒齲舌血論治》에서 “血從齒縫牙齦中出者 名爲齒齲 此手足陽明二經及足少陰腎家之病 蓋手足陽明入下齒中 足陽明入上齒中 又腎主骨 齒爲骨之所終也 此雖能爲齒病 然血出于經卽惟陽明爲最”라 하여, 齒齲은 胃熱로 인한 境遇가 많으니 마땅히 胃熱을 淸泄하여야 한다고 하였다. 일반적으로 胃熱의 境遇에는 實證에 속하여 齒齲血色鮮紅, 齒齲紅腫疼痛, 頭痛, 口臭, 大便秘結, 舌質紅, 苔黃, 脈數이 나타나므로, 그 治法은 淸胃瀉火, 涼血止血을 爲主로 하였고, 腎虛의 境遇에는 虛證에 屬하여 發病이 비교적 緩慢하고 病程이 비교적 길며 常因受熱及煩勞而誘發, 齒搖不堅, 舌紅苔少, 脈細數이 나타나므로 滋陰降火, 涼血止血의 治法을 爲主로 하였다<sup>1-3)</sup>.

또한 齒齲의 治療에 使用된 投藥方法을 살펴보면, 《千金要方》<sup>11)</sup>에서는 “治齒間血出方 以苦竹葉濃煮之 與鹽少許 寒溫得所 含之 冷吐”, “又方 燒釘令赤 注血孔中 止”라 하여, 最初로 含漱하는 方法과 燒烙하는 方法에 대하여 敍述하였다. 이후<sup>12-16)</sup>로는 주로 含漱法과 여러 가지 外用法이 頻用되었으나, 明代<sup>17-24)</sup>에 이르러서는 주로 藥物을 內服하는 方法을 많이 사용하였으며, 점차 세 가지 方法이 골고루 사용되었다. 첫째, 內服法은 藥物을 湯藥 또는 散劑로 만들어 服用하는 方法을 말하는 데, 同煎服<sup>17,20)</sup>, 水煎服<sup>10,22)</sup>, 食遠服<sup>21)</sup>, 溫服<sup>19)</sup>, 冷服<sup>8)</sup>, 呷之<sup>18)</sup> 등으로 表現되었다. 둘째, 含漱法은 藥物을 煎湯하여 口に 머금고 있다가 다시 嚥어내는 方法으로, 含之<sup>11,25,27)</sup>, 漱之<sup>35,36)</sup>, 含漱之<sup>11)</sup>, 熱含冷吐<sup>13)</sup>, 頻頻漱之<sup>13,18)</sup>, 漱口<sup>15)</sup>, 漱咽<sup>10,11)</sup> 등으로 表現되어 있다. 마지막으로 外用法은 여러 가지가 있는데, “燒釘令赤 注血孔中 止”<sup>11)</sup>, “燒銅筋烙血出處”<sup>14)</sup>라 하여 出血部位를 직접 燒烙하는 方法이 있고, 揩牙(齒)<sup>11,19-20,29)</sup>, 牢牙<sup>13-28,31,37)</sup>, 糝牙床<sup>16,38)</sup>, 封齒根上<sup>24,36)</sup>, 擦患處<sup>32-36)</sup>, 插入出血處<sup>23-24)</sup>, 乾捻有竅處<sup>27,36)</sup>, 以翎羽掃上瘡<sup>36)</sup> 등이라 하여 藥物을 散劑로 만들어 직접 齒牙나 牙床에 바르는 方法이 있으며, 吹之<sup>8,36)</sup>, 吹患處<sup>38)</sup>라 하여 藥物을 患處에 불어 넣는 方法이 있고, 敷齒根下<sup>14,36)</sup>, 以濕紙上搽藥 於患處貼之<sup>14)</sup>, 塗貼患處<sup>36)</sup>, 塗敷患處<sup>41)</sup>라 하여 藥物을 濕紙 등으로 싸서 患處에 붙이는 方法이 있다. 또

한 “右研爛 爲細末 綿裹 左齒痛 納之左耳 右齒痛 納之右”<sup>35)</sup>라 하여 藥物을 싸서 귀에 넣어두는 方法도 있다. 以上을 살펴볼 때 治療에 使用된 投藥方法은 內服法, 含漱法, 外用法의 세 가지로 나눌 수 있다.

本論에 收錄된 34種의 文獻에 나타난 總 治方數는 231方이고 그 中 重複되지 않은 處方의 數는 107方이었다. 그 中에서 多用된 處方은 淸胃散 11회, 六味地黃丸 8회, 甘露飲 7회, 八味丸, 荊槐散 5회, 消風散, 鬱金散, 綠袍散, 小安腎丸, 調胃承氣湯, 犀角地黃湯 4회, 四物湯, 玉女煎, 必勝散 3회였다 (表1 참조). 治方을 投藥方法에 따라 살펴보면, 內服法에는 93회, 含漱法에는 49회, 外用法에는 89회가 사용되었다. 內服法에는 주로 淸胃瀉火를 目的으로 하는 淸胃散, 甘露飲, 調胃承氣湯, 犀角地黃湯 등과 滋陰降火를 目的으로 하는 六味地黃丸, 八味丸, 小安腎丸 등의 治方이 使用되었다. 含漱法에는 驅毒飲, 地黃湯, 莽草散 등의 治方이 使用되었으며, 外用法에는 必勝散, 綠袍散, 荊槐散, 水玉散, 麝香散, 鬱金散, 龍腦散 등의 治方이 使用되었다.

齒齲에 使用된 治方의 構成藥物을 살펴보면, 主로 淸熱藥, 補益藥, 解表藥, 止血藥, 開竅藥, 收澁藥 등이 言及되었는데, 淸熱藥에서는 鮮地黃 31회, 牡丹皮 20회, 黃連 18회, 黃芩 15회, 梔子 13회, 地骨皮 10회가 言及되었고, 補益藥에서는 甘草 31회, 當歸 23회, 熟地黃 20회, 白芍藥 10회, 人蔘 10회가 言及되었으며, 解表藥에서는 細辛 18회, 升麻 18회, 荊芥 14회, 防風 11회가 言及되었고, 止血藥에서는 側柏葉 6회, 槐花 5회, 蒲黃 5회가 言及되었으며, 開竅藥에서는 麝香 13회, 冰片 9회가 言及되었고, 收澁藥에서는 白礬 17회, 山茱萸 9회가 言及되었다. 또한 利水滲濕藥에서는 茯苓 15회, 澤瀉 10회가 言及되었고, 安神藥에서는 朱砂 6회, 龍骨 5회가 言及되었으며, 活血祛瘀藥에서 川芎 11회, 瀉下藥에서 大黃 10회, 外用藥에서 輕粉 8회, 理氣藥에서 香附子 7회, 其他에서 鹽 17회가 言及되었다 (表2 참조). 以上으로 볼 때 病因이 胃熱인 경우에는 淸熱藥이 많이 使用되었고, 腎虛인 경우에는 補益藥이 많이 使用되었음을 알 수 있다.

使用된 藥物을 投藥方法에 따라 살펴보면, 內服法에서는 甘草 22회, 熟地黃 19회, 鮮地黃 18회, 牡丹皮 18회, 黃芩 15회, 茯苓 14회, 黃連 13회, 當歸 13회, 荊芥 11회, 梔子 11회, 芍藥 10회, 山茱萸 9회, 澤瀉 9회가 言及되었고, 含漱法에서는 當歸 6회, 鹽 6회, 白礬 5회, 甘草 5회, 鮮地黃 5회, 竹茹 5회가 言及되었으며, 外用法에서는 白礬 11회, 麝香 11회, 鹽 10회, 細辛 10회, 鮮地黃 8회, 輕粉 7회, 升麻 7회, 冰片 7회, 朱砂 5회, 龍骨 5회, 寒水石 4회, 川烏頭 4회, 皂角子 4회가 言及되었다. 以上으로 볼 때 內服法에는 주로 六味之劑의 藥物과 清熱하는 藥物들이 多用되었고, 含漱法과 外用法에서는 涼血, 收斂하여 止血을 目的으로 하는 藥物들이 多用되었다. 특히 外用法에서는 藥物을 불에 代워서 사용하는 炒炭法이 많이 言及되었는데 이는 止血의 效果를 높이기 위한 것으로 보인다.

總括해보면, 齒衄의 病因은 크게 實證의 胃熱과 虛證의 腎虛로 나눌 수 있고, 治法은 胃熱일 때는 清胃瀉火를, 腎虛일 때는 滋陰降火를 爲主로 하였으며, 모두 涼血止血의 治法을 같이 사용하였다. 齒衄의 治療에 使用된 投藥方法으로는 湯藥이나 散劑를 服用하는 內服法과 藥物을 煎湯하여 口に 代워서 사용하는 含漱法, 그리고 기타 여러 가지 外用法이 使用되었다. 齒衄의 治療에 使用된 治方을 投藥方法에 따라 살펴보면, 內服法에는 주로 清胃瀉火를 目的으로 하는 清胃散, 甘露飲, 調胃承氣湯, 犀角地黃湯 등과 滋陰降火를 目的으로 하는 六味地黃丸, 八味丸, 小安腎丸 등의 治方이 使用되었고, 含漱法에는 驅毒飲, 地黃湯, 莽草散 등의 治方이 使用되었으며, 外用法에는 必勝散, 綠袍散, 荊槐散, 冰玉散, 麝香散, 鬱金散, 龍腦散 등의 治方이 使用되었는데, 含漱法과 外用法에 使用된 治方들은 주로 涼血止血을 目的으로 하는 것들이다. 齒衄의 治方에 對한 構成藥物로는 清熱藥, 補益藥, 止血藥, 開竅藥, 收斂藥이 主로 使用되었는데, 清熱藥으로는 鮮地黃, 牡丹皮, 黃連, 黃芩, 補益藥으로는 甘草, 當歸, 熟地黃, 人蔘, 止血藥으로는 側柏葉, 槐花, 蒲黃, 開竅藥으로는 麝香, 冰片, 收斂藥으로는 白礬이 多用되었는데, 病

因이 胃熱인 경우에는 清熱藥이 많이 使用되었고, 腎虛인 경우에는 補益藥이 많이 使用되었다. 使用된 藥物을 投藥方法別로 살펴보면, 內服法에서는 甘草, 熟地黃, 鮮地黃, 牡丹皮, 黃芩이 多用되었고, 含漱法에서는 當歸, 鹽, 白礬, 竹茹가 多用되었으며, 外用法에서는 白礬, 麝香, 鹽, 細辛이 多用되었는데, 內服法에는 주로 六味之劑의 藥物과 清熱하는 藥物들이 多用되었고, 含漱法과 外用法에서는 清熱涼血, 收斂止血을 目的으로 하는 藥物들이 多用되었으며, 특히 外用法에서 藥物을 불에 代워서 사용하는 炒炭法이 많이 言及되었는데 이는 止血의 效果를 높이기 위함이다.

따라서 齒衄의 治療는 辨證을 통해 虛實을 鑑別하여 각각에 適切한 內服藥을 使用하고, 治療效果를 높이기 위하여 含漱法과 外用法을 兼하는 것이 有用하다고 할 수 있으며, 보다 나은 良質의 醫療를 위해서는 齒衄에 對한 持續的인 研究 및 治療方法의 開發이 必要하리라 思料된다.

&lt; 表 1 &gt; 文獻에 나타난 齒齲의 治方

文 獻	治 方 數		
	內服法	含漱法	外用法
千金要方	·	7	1
外臺秘要	·	6	1
濟生方	·	2	1
太平聖惠方	·	3	8
聖濟總錄	·	4	9
丹溪心法附餘	·	1	2
六科準繩	4	·	1
古今醫統大全	2	1	2
萬病回春	1	·	1
醫學入門	3	·	3
醫學正傳	1	·	·
東醫寶鑑	2	4	4
景岳全書	9	·	1
醫學綱目	·	·	1
症因脈治	7	·	·
壽世保元	5	·	1
赤水玄珠	1	3	4
醫方集解	3	·	·
血證論	5	1	1
類證治裁	8	·	3
證治彙補	·	·	1
辨證奇聞全書	1	·	·
張氏醫通	5	·	2
證脈·方藥合編	3	·	1
古今醫方	3	·	2
萬病治療大全	·	·	1
醫方類聚	1	1	7
金匱翼	2	1	·
普濟方	2	12	25
醫林撮要	·	·	4
中醫歷代名方集成	3	·	1
中醫症狀鑑別診斷學	6	·	·
肝系內科學	8	·	·
實用中醫內科學	8	3	1
合計	93	49	89

<表 2> 齒齟의 治方에 活用된 藥物의 分布

藥物分布		構成藥物 (頻度數)		
		內服法	含漱法	外用法
解表藥	發散風寒藥	荊芥(11) 防風(8) 細辛(4) 生薑(2) 白芷(1)	細辛(4) 藁本(3) 荊芥(2) 防風(1) 生薑(1)	細辛(10) 白芷(4) 藁本(3) 防風(2) 麻黃(1) 荊芥(1)
	發散風熱藥	升麻(9) 葛根(3) 蟬蛻(3) 柴胡(2) 薄荷(2)	升麻(2) 薄荷(1)	升麻(7) 薄荷(3) 蔓荊子(1)
清熱藥	清熱瀉火藥	梔子(11) 知母(7) 石膏(6)	竹葉(4) 鴨跖草(1) 槐角(1)	寒水石(4) 石膏(2) 梔子(2)
	清熱燥濕藥	黃芩(15) 黃連(13) 黃柏(7)	黃連(2) 黃柏(1)	黃連(3) 黃柏(3)
	清熱涼血藥	鮮地黃(18) 牡丹皮(18) 犀角(5) 赤芍藥(3)	鮮地黃(5)	鮮地黃(8) 牡丹皮(2) 赤芍藥(1)
	清熱解毒藥	連翹(3) 牛黃(1)	青皮(1) 蚤休(1)	青黛(3) 馬齒莧(2) 連翹(1) 牛黃(1)
	清虛熱藥	地骨皮(3)	地骨皮(4)	地骨皮(3) 青蒿(1)
瀉下藥	攻下藥	大黃(6) 芒硝(4)	芒硝(2) 大黃(1)	大黃(3) 芒硝(1)
	峻下逐水藥	.	.	巴豆(1)
祛風濕藥	祛風濕 止痛藥	.	.	草烏(2) 威靈仙(1) 防己(1)
	舒筋活絡藥	.	.	桑枝(1)
芳香化濕藥	廣藿香(5) 厚朴(3) 蒼朮(2) 砂仁(1)	廣藿香(1) 砂仁(1)	草豆蔻(1)	
利水滲濕藥	利水退腫藥	茯苓(14) 澤瀉(9)	.	茯苓(1) 澤瀉(1) 螻蛄(1)
	利尿通淋藥	木通(1)	.	.
	利濕退黃藥	茵陳蒿(5)	.	.
溫裏藥	肉桂(3) 附子(1) 蜀椒(1) 川烏頭(1) 小茴香(1)	肉桂(2) 川烏頭(1) 乾薑(1)	川烏頭(4) 乾薑(1) 蜀椒(1) 蕪澄茄(1) 高良薑(1)	
理氣藥	陳皮(5) 枳殼(5) 香附子(3) 青皮(2) 枳實(2) 木香(1) 川楝子(1)	木香(2) 香附子(1) 甘松香(1)	香附子(3) 甘松香(1)	
消食藥	萊菔子(2) 山楂(1) 麥芽(1)	.	.	
驅蟲藥	貫衆(1)	鶴虱(1)	鶴虱(1)	
止血藥	收斂止血藥	仙鶴草(1) 藕節(1)	.	.
	涼血止血藥	側柏葉(5) 地榆(3) 槐花(2) 白茅根(1)	.	小蘗(3) 槐花(2) 大蘗(1) 側柏葉(1) 白茅根(1)
	化瘀止血藥	蒲黃(3) 茜草根(1)	茜草根(1)	蒲黃(2) 茜草根(1)
活血祛瘀藥	川芎(9) 牛膝(6) 乳香(1) 沒藥(1) 鬱金(1) 莪朮(1) 三棱(1) 益母草(1) 自然銅(1) 血竭(1)	五靈脂(1) 凌霄花(1) 皂角子(1)	皂角子(4) 川芎(3) 乳香(1) 鬱金(1) 牛膝(1) 自然銅(1)	
安神藥	朱砂(1) 酸棗仁(1) 遠志(1)	.	朱砂(5) 龍骨(5)	
平肝藥	平肝息風藥	白殭蠶(3)	.	蚯蚓(2) 白殭蠶(1)
	平肝潛陽藥	.	.	珍珠(1) 白蒺藜(1)
開竅藥	麝香(2) 冰片(2) 蟾酥(1)	石菖蒲(1)	麝香(11) 冰片(7) 蟾酥(2) 樟腦(2)	

補益藥	補氣藥	甘草(22) 人蔘(8) 山藥(7) 白朮(4) 黃芪(3) 蜂蜜(3)	甘草(5)	甘草(4) 人蔘(2) 山藥(1)
	補陽藥	骨碎補(3) 鹿角膠(1) 菟絲子(1)	.	益智仁(1) 菟絲子(1)
	補血藥	熟地黃(19) 當歸(13) 白芍藥(10) 阿膠(1) 龍眼肉(1)	當歸(6)	當歸(4) 熟地黃(1) 何首烏(1)
	補陰藥	麥門冬(7) 天門冬(5) 石斛(4) 枸杞子(3) 旱蓮草(1) 女貞子(1) 龜板(1)	麥門冬(1)	麥門冬(1)
收澀藥	止瀉藥	.	烏梅(1)	石榴皮(1)
	澀精 縮尿 止帶藥	山茱萸(9) 五味子(2) 白礬(1)	白礬(5)	白礬(11)
外用藥	雄黃(2) 輕粉(1) 鉛丹(1)	.	輕粉(7) 硼砂(2) 露蜂房(2) 鉛丹(1)	
其他	茶(2) 鹽(1) 童便(1) 豨根(1)	鹽(6) 柳枝(3) 黑豆(3) 童便(1) 槐白皮(1) 屋遊(1) 胡桐淚(1) 三奈(1) 茺草葉(1) 牛角(1) 西洋參(1)	鹽(10) 百草霜(2) 槐枝(2) 胡桐淚(2) 人中白(2) 柳枝(1) 槐白皮(1) 屋遊(1) 茶(1) 蚌蛻膽(1) 金墨(1) 羊脛骨(1) 血餘炭(1) 壁鐵(1) 象牙屑(1) 人指甲(1)	

#### IV. 結論

齒齟의 治療에 對하여 文獻的으로 考察한 結果 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 齒齟의 病因은 實證의 胃熱과 虛證의 腎虛로 나누어지고, 治法은 胃熱일 때는 清胃瀉火를, 腎虛일 때는 滋陰降火를 爲主로 하였으며, 모두 涼血止血의 治法을 같이 사용하였다.

2. 投藥方法으로는 湯藥이나 散劑를 服用하는 內服法과 藥物을 煎湯하여 口に 머금고 있다가 다시 뱉어내는 含漱法, 그리고 기타 여러 가지 外用法이 使用되었다.

3. 投藥方法에 따른 治方을 살펴보면, 內服法에는 清胃散 甘露飲 調胃承氣湯 犀角地黃湯 六味地黃丸 八味丸 小安腎丸 등, 含漱法에는 驅毒飲 地黃湯 莽草散 등, 外用法에는 必勝散 綠袍散 荊槐散 冰玉散 麝香散 鬱金散 龍腦散 등의 治方이 使用되었다.

4. 治方의 構成藥物로는 清熱藥, 補益藥, 止血藥, 開竅藥, 收澀藥이 主로 使用되었는데, 清熱藥에는 鮮地黃 牧丹皮 黃連 黃芩, 補益藥에는 甘草 當歸 熟地黃 人蔘, 止血藥에는 側柏葉 槐花 蒲黃, 開竅藥에는 麝香 冰片, 收澀藥에는 白礬이 多用되었다.

5. 使用된 藥物을 投藥方法에 따라 살펴보면, 內服法에는 甘草 熟地黃 鮮地黃 牧丹皮 黃芩, 含漱法에는 當歸 鹽 白礬 竹茹, 外用法에는 白礬 麝香 鹽 細辛이 多用되었는데, 內服法에는 主로 六味之劑의 藥物과 清熱하는 藥物들이, 含漱法과 外用法에서는 清熱涼血, 收斂止血을 目的으로 하는 藥物들이 多用되었으며, 특히 外用法에서 藥物을 불에 태워서 사용하는 炒炭法이 多用되었다.

#### 參考文獻

1. 姜允喆 : 出血證에 對한 文獻의 考察, 서울, 大韓韓醫學會誌 第9卷 第2號, pp.45-50, 1987.
2. 李京燮 외 : 東醫心系內科學, 서울, 書苑堂, pp.307-311, 1995.
3. 張伯臾 : 中醫內科學, 北京, 人民衛生出版社, pp.171-174, 1988.
4. 王 琦 외 : 素問今釋, 貴州, 貴州人民出版社, p.42, 192, 216, 351, 372, 434, 1981.
5. 河北醫學院 : 靈樞經校釋, 北京, 人民衛生出版社, p.93, 96, 423(上), 172, 246(下), 1982.
6. 李正來 : 東醫要論眞詮(三), 서울, 泰昌出版社, p.1386, pp.1502-1512, 1992.

7. 巢元方：諸病源候論校釋，北京，人民衛生出版社，p.807, 1990.
8. 張介賓：景岳全書，上海，上海科學技術出版社，p.524, 997, 1216, 1984.
9. 秦景明：症因脈治，北京，施風出版社，p.197-200, 1993.
10. 尤怡：金匱翼，北京，中國中醫藥出版社，p.50, 1996.
11. 李景榮 외：備急千金要方校釋，北京，人民衛生出版社，p.238, 1997.
12. 王燾：外臺秘要(下卷)，서울，成輔社，p.587, 1975.
13. 嚴用和：重訂嚴氏濟生方，北京，人民衛生出版社，pp.127-128, 1980.
14. 陳昭遇·王懷隱：太平聖惠方 V2, 서울，翰成社，pp.1017-1018, 1979.
15. 趙佶：聖濟總錄，北京，人民衛生出版社，pp.1415-1416, 1995.
16. 方廣：丹溪心法附餘，서울，大星文化社，pp.491-492, p.496, 1993.
17. 王肯堂：六科準繩，台北，新文豐出版公司，p.197, 1985.
18. 徐春甫：古今醫統大全(下卷)，北京，人民衛生出版社，p.304, 306, 1996.
19. 龔廷賢：萬病回春，北京，人民衛生出版社，pp.277-278, 1987.
20. 李梴：編註醫學入門，서울，大星文化社，pp.418-419, 1992.
21. 虞搏：醫學正傳，서울，成輔社，pp.244-245, 1986.
22. 許浚：東醫寶鑑，서울，南山堂，p.112, 1994.
23. 樓英：醫學綱目，北京，中國中醫藥出版社，p.661, 1996.
24. 龔廷賢：壽世保元，北京，人民衛生出版社，pp.438-444, 1994.
25. 孫一奎：赤水玄珠，北京，人民衛生出版社，pp.397-398, 1986.
26. 汪詒庵：醫方集解，台北，文光圖書有限公司，pp.291-292, 1995.
27. 唐宗海：血證論，台北，力行書局有限公司，pp.67-68, p.192, 202, 233, 1989.
28. 林珮琴：類證治裁，北京，人民衛生出版社，pp.123-126, 1996.
29. 李用粹：證治彙補，台北，旋風出版社，p.254, 258, 1995.
30. 錢鏡湖：辨證奇聞全書，台北，甘地出版社，p.195, 1989.
31. 張璐：張氏醫通，上海，上海科學技術出版社，p.212, 782, 1995.
32. 黃度淵：證脈·方藥合編，서울，南山堂，p.86, 127, 167, 183, 273, 1996.
33. 閔仁植：古今醫方，서울，創美社，pp.136-139, 1978.
34. 蘇修德：萬病治療大全，內版，臺南新世紀出版社，pp.57-58, 1978.
35. 金蒙禮：醫方類聚，北京，浙江城中醫研究所·湖州中醫院，pp.239-243, 1981.
36. 周定王·朱橚：普濟方，서울，翰成社，pp.536-540, 1981.
37. 金世坤：醫林撮要，서울，黑潮社，pp.345-346, 1978.
38. 裘沛然：中醫歷代名方集成，上海，上海辭書出版社，p.100, 274, 1028, 1113, 1994.
39. 趙金鐸 외：中醫症狀鑑別診斷學，北京，人民衛生出版社，pp.167-168, 1987.
40. 金秉雲 외：肝系內科學，서울，東洋醫學研究院出版部，pp.131-132, 1992.
41. 黃文東 외：實用中醫內科學，上海，上海科學技術出版社，pp.547-548, 1988.
42. Kurt J. Isselbacher：HARRISON'S 내과학，서울，정담，p.219, 1997.
43. 陳士鐸：石室秘錄，北京，中國中醫藥出版社，pp.234-235, 1991.
44. 金定濟：東洋醫學診療要鑑，서울，동양의학연구원，pp.236-240, 1983.