

大韓外官科學會誌：第13卷 第1號
The Journal of Oriental Medical Surgery,
Ophthalmology & Otolaryngology
Vol. 13, No 1, February 2000.

外科正宗에 收錄된 外用藥에 對한 文獻的 考察

李貞鏞* · 盧石善*

* 大田大學校 韓醫科大學 外官科學校室

I. 緒 論

韓方外用藥이란 局所的 或은 全身의 治療를 目的으로 身體 外部에 直接使用하는 藥物을 말하는 것으로¹⁾ 本草를 適當하게 加工 製藥하여 體外에 敷 貼 搽 擦 吹 點 熏 洗 等等의 方法으로 人體를 刺戟하여 內部 組織機能 및 局所 組織機能을 圓滑하게 하여 各種 疾病을 治療하거나 豫防하고자 하는 一種의 治療方法이라 할 수 있다²⁾.

康³⁾은 聖濟經의 “治內者 自內達外 湯醴丸散丹之類 見於服飲者是也 治外者 由外以通內 膏炭蒸浴粉之類 借於氣達者是也” 라는 句節을 引用하여 하여 外用藥에 대한 機轉을 說明하였다.

外用藥은 人體의 外部에 使用하기 때문에 內服藥과 같이 單純한 劑型이나 服用 方法과는 달리 藥物을 使用하는 身體 部位나 症狀의 類型에 따라 適當한 劑型法과 使用法이 選擇되어야 하는데 劑型을 만드는 데 長時間의 時間과 거추장스럽고 손이 많이 가는 불편함이 있어 利用이 忌避되었으나 臨床적으로 매우 良好한 效果를 보여주고 있다⁴⁾.

外用藥은 劑型을 오래 보관 할 수가 있고 經濟的이며 使用이 簡便하고 副作用이 적고 服藥을 꺼리는 患者에게 利用 可能한 長點이 있으나 現在까지 外用藥에 對한 研究가 未及한 狀況이다²⁾.

이에 著者는 疾病 治療의 效果를 增大하기 爲해 外用藥을 좀 더 多樣한 方法으로 臨床的 活用に 應用해보고자 外科文獻의 主要書籍인 外科正宗에 收錄된 外用藥의 施術方法 劑型 使用法 等を 爲主로 考察하여 若干의 知見을 얻었기에 報告하는 바이다.

II. 調查資料 및 研究方法

1. 調查資料

調查資料는 外科學의 主要書籍인 外科正宗을 基本으로 하여 外用藥에 關聯된 書籍을 參考 하였다.

- (1) 陳實功：外科正宗
- (2) 金定濟：韓醫學大辭典
- (3) 大韓皮膚科學會：皮膚科學
- (4) 金光호：韓方外用藥
- (5) 金中鎬：大韓外官科學會誌
- (6) 吳師機：理淪駢文
- (7) 新文豐出版公司：新編中藥大辭典
- (8) 沈相龍：韓方食療解典
- (9) 康舜洙：方劑學
- (10) 李尙仁：本草學
- (11) 黃忠淵：大韓外官科學會誌

2. 研究方法

- (1) 外科正宗의 次例에 따라 外用藥을 拔取하였다.
- (2) 施術 方法에 따라 外用藥을 分類하였다.
- (3) 藥物의 劑型에 따라 外用藥을 分類하였다.
- (4) 藥物의 副形劑에 따라 外用藥을 分類하였다.
- (5) 內服과 外用을 兼한 것도 外用藥의 範疇로 넣었다.

III. 本 論

○ 腫瘍主治方

內消散

治癰疽 發背 對口 疔瘡 乳病百種 無名腫毒 一切

疔瘡。此藥能令內消

化毒爲黑水從小便而出 勢大者 雖未全愈 亦可轉重就輕 移深居淺。

金銀花 知母 貝母 天花粉 白芨 半夏 川山甲 皂角針 乳香 各一錢

水酒各一碗 煎八分 隨病上下食前後服之。留藥渣搗爛加秋芙蓉葉細末一兩白蜜五匙 同渣調敷瘡上 一宿自消 重者再用一服 忌口效。

○ 薰發背奇方

治發背初起 七日前後 未成者自消 已成者自潰 不起發者即發 不潰腐者即腐 誠爲良法也。卽神灯照法。

雄黃 朱砂 血竭 沒藥 各二錢 麝香 四分

上五味 研爲細末 每用三分 綿紙裹藥爲燃 長約尺許 以真麻油潤透灼火 離瘡半寸許 自外而內 周圍徐徐照之 火頭向上 藥氣入內 瘡毒隨火解散 自不內侵臟腑。初用三條 漸加至四五條 候瘡勢漸漸減 熏後隨用敷藥 如已潰大膿發泄時 不必用此照敷 只宜用膏藥蓋貼。

○ 敷藥方

車前草(連根葉) 豨薟草 五龍草 金銀花 各等分

四味 鮮草藥一處搗爛 加三年陳米粉 卽常用糝衣者 初起仍加飛鹽末二三分 共打爲稠糊 徧敷瘡上 中留一頂 以膏蓋貼避風 自然拔出膿毒。若冬月草無鮮者 預采蓄下陰乾爲末 用陳米醋調敷 亦如前法并效。今恐前敷藥內用五龍草 隨地或有缺少 不便合用 予常熏後頂以膏蓋周圍腫上 以如意金黃散代敷亦效。

如意金黃散

治癰疽 發背 諸般疔腫 跌扑損傷 濕痰流毒 大頭時腫 漆瘡 火丹 風熱天泡 肌膚赤腫 乾濕脚氣 婦女乳癰 小兒丹毒 凡外科一切諸般頑惡腫毒 隨手用之 無不應效 誠爲瘡家良便方也

天花粉(上白) 十斤 黃柏(色重者) 大黃 薑黃 各五斤 白芷 五斤 紫厚朴 陳皮 甘草 蒼朮 天南星 各二斤

以上共爲咀片 晒極乾燥 用大驢磨連磨三次 方用密絹羅廚篩出 磁器收貯 勿令泄氣。凡遇紅赤腫痛發熱未成膿者 及夏月火令時 俱用茶湯同蜜調敷 如微熱微腫及大瘡已成 欲作膿者 俱用葱湯同蜜調敷 如漫腫無頭 皮色不變 濕痰流毒 附骨癰疽 鶴膝風等症 俱用葱酒煎調 如風熱惡毒所生 患必皮膚亢熱 紅色光亮 形狀游走不定者 俱用蜜水調敷 如天泡 火丹 赤游丹 黃水漆瘡 惡血攻注等症 俱用大蘭根葉搗汁調敷 加蜜亦可 湯潑火燒 皮膚破爛 麻油調敷。俱此諸引理取寒熱溫涼制之。又在臨用之際 順合天時 洞窺病勢 使引爲當也。

四虎散

治癰疽腫硬 厚如牛領子皮 不作膿腐者宜用。

南星 草烏 半夏 狼毒 各等分

上爲細末 用豬腦同搗 徧敷瘡上 留正頂出氣

回陽玉龍膏

治背疽陰病 不腫高 不熾痛 不發熱 不作膿及寒濕流注 鼓風久損 冷痛痺風 諸濕脚氣 手足頑麻 筋骨疼痛 及一切皮色不變 漫腫無頭 鶴膝風等 但無皮紅肌熱者 一概用之 俱有功效

草烏(炒) 三兩 軍姜(煨) 三兩 赤芍(炒) 白芷 南星(煨) 各一兩 肉桂 五錢

上制畢 共爲細末 熱酒調敷 此藥有軍姜 肉桂 熱血生血 既生既熱 恐不能散而爲害 故有草烏 南星可以破惡氣 祛風毒 活死肌 除骨痛 消結塊 回陽氣 又有赤芍 白芷 足以散滯血 住痛苦 加以酒行藥性 攻通氣血 雖十分冷症 未有不愈者。誠爲寒灰之焰 枯木之春 大抵病冷則肌肉陰爛 不知痛痒 其有痛者 又多附骨之痛 設若不除 則寒根透髓 尋常之藥固莫能及矣。

冲和膏

治癰疽 發背 陰陽不和 冷熱不明者 宜用此藥。

紫荊皮(炒) 五兩 獨活(炒) 三兩 赤芍(炒) 二兩
白芷 一兩 石菖蒲 一兩半

上為細末 葱湯 熱酒可調敷。藥中紫荊皮乃木之精能破氣 逐血 消腫 獨活土之精 動蕩凝滯血脈 散骨中冷痛 去麻痺濕 石菖蒲水之精 善破堅硬 生血止痛 破風消腫 白芷金之精 能去風生肌定痛 赤芍藥火之精 能生血活血 散瘀除痛 蓋血生則肌肉不死 血動則經絡流通。故肌活不致爛痛 經通不致壅腫 此為散風行氣 活血消腫 祛冷軟堅之良藥也。其中五行相配用者 再無不效之理 又流毒 骨疽冷症尤效。

鐵桶膏

治發背將潰已潰時 根脚走散不收束者用此。

銅綠 五錢 明礬 四錢 膽礬 三錢 五倍子(微炒)
一兩 白芨 五錢 輕粉 鬱金 各二錢 麝香 三分

上為極細末 用陳米醋一碗 杓內慢火熬至一小杯候起金色黃泡為度。待溫用上藥一錢攪入膏內 每用頓溫 用新筆涂膏瘡根上 以綿紙蓋其瘡根 自生皺紋漸收漸緊 再不開大為效。

○ 煮拔筒方

治發背已成將潰時 膿毒不得外發 必致內攻 乃生煩躁 重如負石 非此法拔提毒氣難出也。

羌活 獨活 紫蘇 蘄艾 鮮菖蒲 甘草 白芷 各五錢
連鬚葱 二兩

豫用徑口一寸二三分新鮮嫩竹一段 長七寸 一頭留節 用力劃去外青 留內白一半 約厚一分許 靠節鉗一小孔 以杉木條塞緊 將前藥收入筒內 筒口用葱塞之 將筒橫放鍋內 以物壓勿得浮起。用清水十大碗滄筒煮數滾 約內藥濃熟為度候用。再用披鍼于瘡頂上一寸內品字放開三孔 深入淺寸 約筒圈內 將藥筒連湯用大磁鉢盛貯患者榻前 將筒藥倒出 急用筒口乘熱對

瘡合上 以手捺緊其筒 自然吸住 藥待片時 藥筒已溫 拔出塞孔木條 其筒自脫 將器倒出筒中物色看其何樣 如有膿血相粘 鮮明紅黃之色 亦有一二杯許 其病乃是活瘡 治必終愈。如拔出物色純是敗血氣穢 紫黑稀水 而無膿意相粘者 其病氣血內敗 肌肉不活 必是死瘡 強治亦無功矣。此法家傳 屢經有驗 如陽瘡易潰 易膿之症 不必用此以傷氣血 此法陰瘡用之 要在十五日前後 堅硬不潰 不膿者行之最當 此法的有回天之效 醫家不可缺也。

猪蹄湯

治癰疽 諸毒已潰流膿時用此湯洗 消毒氣 去惡肉 回死肌 潤瘡口 又能散風消腫 腐盡則已。

羌活 甘草 赤芍 黃芩 白芷 當歸 蜂房 各等分

上為粗末 看疽瘡大小用藥多少。先將猪前蹄一只 用白水六碗 煮蹄軟為度 將汁如清 吹去汁上油花 用藥一兩投于汁中 再用微火煎十數沸 密絹濾去藥渣 候湯半熱 將軟絹蘸淋于瘡上 輕手搥去瘀膿腐肉 其惡物隨湯而下。洗訖 以絹帛搥于 照前總論次第如式用藥。

又：洗藥方

當歸 獨活 白芷 甘草 各二錢 葱頭 五个

用水三碗 煎至藥爛 濾清以絹帛蘸湯搥淨瘡上 隨搥貼紅黑二膏蓋之 洗時切忌風寒為要。常治背瘡輕易者 以此代猪蹄湯用 其功亦效。

加味太乙膏

治發背 癰疽及一切惡瘡 跌撲傷損 濕痰流注 風濕風熱 遍身筋骨走注作痛 內傷風鬱 心腹胸背攻刺作痛 腿脚酸軟 腰膝無力 湯潑火燒 刀傷 棒毒 五損內癰 七傷外症俱貼患處。又男子遺精 婦人白帶俱貼臍下。臟毒腸癰亦可丸服。諸般瘡癩 血氣癩痒 諸藥不止痛痒者并效。

肉桂 白芷 當歸 元蓼 赤芍 生地 大黃 土木鱉 各二兩 真阿魏 二錢 輕粉 四錢 槐枝 柳枝 各一百段

血餘 一兩 東丹 四十兩 乳香末 五錢 沒藥(末) 三錢

上十味 并槐柳枝 用眞麻油足稱五斤 將藥浸入油內 春五 夏三 秋七 冬十 候日數已畢 入潔淨大鍋內 慢火熬至藥枯浮起爲度 住火片時 用布袋濾淨藥渣 將油稱准足數 將鍋展淨 復用細舊揖將油又濾入鍋內 要清潔爲美 將血餘投下 慢火熬至血餘浮起 以柳棒挑看似膏溶化之象 方算熬熟 淨油一斤 將飛過黃丹 六兩五錢徐徐投入 火加大些 夏秋充熱 每油一斤加丹五錢 不住手攪 候鍋內先發青烟 後至白烟疊疊旋起 氣味香馥者 其膏已成 即便住火 將膏滴入水中 試軟硬得中 如老加熟油 若稀亦加炒丹每各少許 漸漸加火 務要冬夏老嫩得所爲佳 候烟盡 端下鍋來 方下阿魏 切成薄片 散于膏面上化盡 次下乳沒 輕粉 攪均傾入水內 以柳棍攪成一塊 再換冷水沈片時 乘溫每膏半斤址撥百轉成塊 又換冷水投沈 隨用時每取一塊銅勺內復化 隨便攤至妙。

生肌玉紅膏

此膏專治癰疽 發背 諸般潰爛 棒毒等瘡 用在已潰流膿時 先用甘草湯 甚者用猪蹄湯淋洗患上 軟絹淨用抵脚挑膏于掌中擦 遍搽腐肉上 外以太乙膏蓋之 大瘡早晚洗換二次 內兼服大補脾胃暖藥 其腐肉易脫 新肉即生 瘡口自斂 此乃外科收斂藥中之神藥也。

白芷 五錢 甘草 一兩二錢 當歸 二兩 瓜兒血竭 輕粉 各四錢 白占 二兩 紫草 二錢 麻油 一斤

先用當歸 甘草 紫草 白芷四味 入油內浸三日 大杓內慢火熬藥微枯色 細絹濾清 將油復入杓內 煎滾下整血竭化盡 次下白占 微火亦化 先用茶鐘四枚 預頓水中 將膏分作四處 傾入鐘內 候片時方下研極細輕粉 每鐘內投和一錢攪勻 候至一伏時取起 不得加減 致取不效。

化腐紫霞膏

治發背已成 瘀肉不腐及不作膿者 又諸瘡內有膿

而外不穿潰者 俱用此膏 不腐爛者自腐 不穿潰者自破 其功甚于烏金膏及碧霞錠子。

輕粉 蓖麻仁(研) 各三錢 血竭 二錢 巴豆(研 白仁) 五錢 朝腦 一錢 金頂砒 五分 螺螄肉(用肉晒乾爲末) 二介

上各爲末 共碾 一處 磁罐收貯 臨用時旋用麻油調搽頑硬肉上 以綿紙蓋上或膏貼俱可 至頑者不過兩次即軟 腐爛爲膿 點諸瘡頂亦破。

○ 潰瘍主治方

獨參湯

治潰瘍膿水出多 氣血虛極 或惡寒 或發熱 或自汗 冷汗 或手足指甲清冷 或身涼脈細并宜。

人參(切片) 二兩

作一劑 水二鍾 棗十枚 煎一鍾 徐徐服之 若煎至稠厚 卽爲膏矣 作三次 用好溫酒化服亦可。

○ 疔瘡主治方

立馬回疔丹

治疔瘡初期 已用鍼刺後又或誤灸失治 以致瘡毒走散不住 乃疔走黃險惡症也 急用此挿。

蟾酥(酒化) 礞砂 輕粉 白丁香 各一錢 蜈蚣 一條(炙) 雄黃 朱砂 各二錢 乳香 六分 麝香 一字 金頂砒 五分(注末卷)

共爲細末 糊成麥子大 凡遇疔瘡 針破用此一粒挿入孔內膏蓋之 次後追出膿血疔根爲效。

鉛粉散

治冷疔生于脚上 初起紫白疱 疼痛徹骨 漸至腐爛 深孔紫黑血水氣穢 經久不瘥 用此大效。

黑鉛(四兩 鐵杓化開傾入水中 取起再化 如此百遍 以鉛盡爲度 去水澄下者) 三錢 松脂 一錢 黃丹(飛炒) 五分 輕粉 五分 麝香 一分

共研 先用蔥湯洗淨 麻油調塗瘡口 油紙蓋外。

太乙紫金丹

解諸毒 療諸瘡 利關節 通治百病。此藥真能起死回生 制之濟人奇效不可盡述。凡居家出入 興大工動大兵 及閩 廣 雲 貴仕宦者 不可無之。

山慈菇(洗去毛皮淨焙) 二兩 川文蛤(一名五倍子槌破淨焙) 二兩 麝香(揀淨毛皮 乾者研淨) 三錢 千金子(一名 續隨子 仁白者去油) 一兩 紅芽大戟(杭州紫大戟爲上 江南土大戟次之 北方綿大戟色白者性烈峻利 反傷元氣 弱人服之 有致吐血 慎之勿用 取杭州之上品者 去蘆 根洗淨 焙乾爲末) 一兩五錢 整 朱砂(有神氣者 研極細末) 三錢 雄黃(鮮紅大塊者 研細末) 三錢

以上之藥 各擇精品于淨室中制華。候端午 七夕重陽或天月德天醫黃道上吉之辰 凡入室合藥之人 三日前俱宜齊沐 更換新潔衣帽 臨日方入室中 淨手熏香 預立藥王牌位 主人率衆焚香拜褥 事華各將前藥七味復等稱准入于大乳鉢 內 再研數百轉 方入細石臼中 漸加糯米濃飲調和 軟硬得中 方用杵搗 千余下 極至光潤爲度。每錠一錢 每服一錠 病勢重者 連服二錠 以取通利 後用溫粥補之。修合時除合藥潔淨之人 余諸忌見 此藥惟在精誠潔淨爲效。

治一切飲食藥毒 蠱毒 瘴氣 惡菌 河豚中毒 自死牛 馬 豬 羊六畜類之肉 人誤食之 必昏亂卒倒 或生異形之症 并用水磨灌服 或吐或瀉 其人必葉。

南方山巒瘴氣 烟霧癘疫 最能傷人 感之才覺意思不快 惡寒惡熱 欲嘔不嘔 卽磨一錠 服之得吐利便愈。

癰疽 發背 對口 疔瘡 天蛇 無名腫毒 蛙節 紅絲等疔 及楊梅瘡 諸風癩疹 新久痔瘡 并用無灰淡酒磨服 外用水磨塗搽瘡上 日夜數次 覺痒而消。

陰陽二毒 傷寒心悶 狂言亂語 胸膈塞滯 邪毒未出 瘧疫煩亂 發狂 喉閉 喉風 俱用薄荷湯待冷磨服。

赤白痢疾 肚腹瀉泄急痛 霍亂絞腸痧及諸痰喘 并

用薑湯磨服。

男子婦人急中顛邪 渴叫奔走 鬼交 鬼胎 鬼氣 鬼齏 失心狂亂 羊兒 豬顛等風 俱用石菖蒲煎湯磨服。

中風 中氣 口眼喎斜 牙關緊急 言語蹇澁 筋脈攣急 骨節風腫 遍身冬痛 行步艱辛 諸風諸癩 并用酒磨頓熱服下。

自縊 溺死 驚死 壓死 鬼魅迷死 但心頭微溫未冷者 俱用生薑 續斷酒煎磨服。一切惡蛇 風犬 毒蝎 溪澗諸惡等蟲傷人 隨卽發腫 攻注遍身 甚者毒氣入裏 昏悶向叫 命在須臾 俱用酒磨灌下 再吃葱湯一碗 被蓋出汗立蘇。

新舊瘧疾 臨發時東流水煎桃柳枝湯磨服。

小兒急慢驚風 五疳 五疔 脾病黃腫 癩疹 瘡類 牙關緊閉 并用薄荷浸水磨濃加蜜服之 仍搽腫上。年歲幼者 每錠分作數服 牙痛酒磨塗痛上 仍含少許 良久咽下。

小我父母遺毒 生下百日內皮塌爛斑 谷道 眼眶損爛者 俱用清水磨塗。

打撲傷損 松節無灰酒研服。毒氣攻注 腦門作脹者 俱用葱酒研服一錠 仍磨塗太陽穴上。

婦女經水不通 紅花湯下。

凡遇天行疫症 延街及巷相傳傳染者 用桃根湯磨濃 格入鼻孔 次服少許 任入病家再不傳染。

又治傳尸勞瘵 諸藥不能禁忌 一方土指家服此 每早磨服一錠 至三次後逐下惡物 尸蟲 異形怪類 後得脫利 以次相傳 活人不計其數。

一女子久患勞瘵 爲尸蟲所噬 磨服一錠 片時吐下小蟲十如條 後服蘇合香丸 其病頓失 調理月餘而愈。眞濟世衛生之寶藥也。

○ 瘰癧主治方

水蠟散

治瘰癧日久 堅核不消 急服消藥不效者 用此點落

癰核 如馬刀根大面小及失榮等症忌用。

大田癰 五枚(去殼 日中線穿晒乾) 白砒 一錢二分
(面裹煨熟) 冰片 一分 礪砂 二分

用晒乾蠟肉切片 同煨熟 白砒礪爲細末 加礪片再碾 小罐密收。凡用時先用艾炷灸核上七壯 此後灸疤起 泡 以小針挑破 將前藥一二厘津唾調成餅 貼灸頂上 用綿紙以厚糊封貼核上 勿動泄氣 七日後四邊裂縫 再七日其核自落 換搽玉紅膏 內服補藥兼助完口。此藥又治癰腫患大蒂小及諸般高突 異形難狀者并效。

紫霞膏

治療癰初期 未成者貼之自消 已成未潰者貼之自潰 已潰核存者貼之自脫 及治諸色頑瘡 臙瘡 濕痰 濕氣 新久棒瘡 疼痛不已者并用之。

明淨松香(淨末) 一斤 銅綠(淨末) 二兩

用麻油四兩 銅鍋內先熬數滾 滴水不散 方下松香熬化 次下銅綠 熬至白烟將盡 其膏已成 候片時傾入磁罐。凡用時湯內頓化 旋攤旋貼。

琥珀膏

治療癰及腋下初如梅子 結腫硬強 漸若連珠 不消不潰 或潰膿水不絕 經久不瘳 漸成漏症。

琥珀 一兩 木通 桂心 當歸 白芷 防風 松脂 朱砂 木鼈(肉) 蓖麻(肉) 各五錢 丁香 木香 各三錢 摩油 二斤二兩 黃丹(飛炒) 十四兩

先用琥珀 丁香 桂心 朱砂 木香爲細末 其餘切片 浸油內七日 入鍋內慢火熬至群藥焦黃爲度 絹濾淨油 徐下黃丹 以柳枝手攪 候至膏成 滴入水中 軟硬得中 攝下鍋來 以盆頓穩 攪至烟盡 方下群藥攪勻 磁器盛之 臨取少許攤貼。

大紅膏

治療癰 痰核 結壞不分新久 但未穿破者并效。

南星 二兩 銀朱 血竭 硝石 朝腦 各三錢 輕粉 乳香 各二錢 貓頭骨 一具(煨) 石灰 一兩(用大黃二錢 切片同炒 石灰紅色去大黃)

上共爲細末 陳米醋熬稠 調藥敷核 三日一換。敷後皮嫩微損者 別換紫霞膏貼之 其核自消。

三品一條槍

上品錠子去十八種痔 中品錠子去五漏 翻花 癰瘡 氣核 下品錠子治療癰 疔瘡 發背 腦疽等症。此爲古之三品錠子 但藥同而兩不同 治病故有分別。今注一條槍 本方三品以下之症 并皆用之 俱各相應 況又藥品簡易而不繁 是曰三品一條槍之說也。凡同志者隨試而用之。

明礬 二兩 白砒 一兩五錢 雄黃 二錢四分 乳香 一錢二分

砒 礬二味 共爲細末 入小罐內 加炭火煨紅 青烟已盡 旋起白烟 片時約上下紅徹往火 取罐頓地上一宿 取出約有砒 礬淨末一兩 加前雄黃二錢四分 乳香一錢二分 共研極細 厚糊調稠 搓成如線條陰乾。凡遇前症有孔者 插入孔內 無孔者 先用針放孔竅 早慢插藥二次 插至三日後 孔大者每插十餘條 插至七日 患孔藥條滿足方住。以後所患四邊自然裂開大縫 共至十四日前後 其疔核 癰癧 痔漏諸管自然落下 隨用湯洗 搽上玉紅膏 虛者兼服健脾之藥。

○ 咽喉主治方

金鎖匙

治喉閉 纏喉風 痰涎壅塞 口禁不開 湯水不下。

焰硝 一兩五錢 硼砂 五錢 片腦 一字 白僵蠶 一錢 雄黃 三錢

各別研爲末 和勻 以竹筒吹患處 痰涎即出。如痰雖出 腫痛仍不消 急針患處 去惡血 服前藥。

桐油錢

治喉風 喉閉 其症先兩日胸膈氣急 呼吸短促 募然咽喉腫痛 手足厥冷 氣閉不通 頃刻不治。先用溫湯半碗 加入桐油三四匙攪勻 用硬鷄翎蘸油探入喉中 連探四五次其痰壅出 再探再吐 以人蘇醒聲高爲度。

後服清咽利膈之藥。

神效吹喉散

治纏喉風閉塞 急乳蛾 喉痺 重舌 木舌等症效。

薄荷 僵蠶 青黛 朴硝 白礬 火硝 黃連 硼砂 各五分

上藥各為細末 腊月初一日取雄豬膽七八个 倒出膽汁 用小半和上藥拌勻 復罐膽殼 以線撮頭 膽外用青缸紙包裹 將地掘一孔 闊深一尺 上用竹筒窓空橫弔 上用板鋪用泥密蓋 候至立春日取出 珪風處陰乾 去膽皮 青紙 磁罐密收。每藥一兩 加冰片三分同研極細 吹患上神效。

歌曰 此法端的通神聖 萬兩黃金方不傳。

冰硼散

治咽喉 口齒新久腫痛 及久嗽痰火咽啞作痛。

冰片 五分 朱砂 六分 元明粉(法注末卷) 硼砂 各五錢

共研極細末 吹搽患上 甚者日搽五六次最效。

○ 時毒主治方

通氣散

治時毒焮腫疼痛 咽喉不利 語言不爽者用之。

延胡索 一錢五分 川芎 牙皂角 各五分 藜蘆 三分 羊躑躅花 二錢五分

為細末 用紙捻醮藥少許 紮于鼻內取嚏為效。

○ 瘰癧主治方

枯癩方

治癩初起成形未破者 及根蒂小而散者用。

白砒 硃砂 黃丹 輕粉 雄黃 乳香 沒藥 硼砂 各一錢 斑蝥 二十个 田螺 三枚(大者 去殼 晒乾切片)

共研極細 糯米粥調安 捏作小碁子樣 暴乾先炙癩頂三柱 以藥餅貼之 上用黃栢末水調 蓋敷藥餅 候十日外 其癩自然枯落 此用斂口藥。

秘傳斂癩膏

治癩癧枯藥落後 用此搽貼 自然生肌完口。

血竭 輕粉 龍骨 海螵蛸 象皮 乳香 各一錢 鷄蛋十五枚(煮熟用黃 熬油一小鍾)

以上各等細末 共再研 和入鷄蛋油內攪勻 每日早慢甘草湯洗淨患上 鷄翎醮塗 膏藥蓋貼。

○ 流注主治方

香附餅

治風寒流注襲于經絡 結成腫痛。用香附為末 酒和量瘡大小 做餅復患處 熱熨斗熨藥上 未成者自消 已成者自潰 風寒濕毒宜薑汁作餅。

琥珀膏

治一切皮色不變 漫腫無頭 氣血凝滯 結成流毒 母論身體上下 年月新久 但未成膿者并效。

大黃 二兩 鬱金 南星 白芷 各一兩

為細末 用大蒜頭去殼搗爛 入上藥再搗稠 入酒一二匙調勻 遍敷腫上 紙蓋 隨即熱痛 于有不痛 俱待藥乾便效。次日又有起泡 又有不起泡者 如有泡起 挑去泡中黃水 膏貼之自效。

○ 乳癰主治方

治乳癰使用方

治乳癰初起腫痛未成膿者

用蒲公英春秋間開黃花似菊 取連根蒂葉二兩搗爛 用好酒半斤同錢數沸 存數腫上 用酒熱服 被蓋睡一時許 再用連須葱白湯一茶鍾催之 得微汗而散。此方鄉村偏僻無藥之所用之極妙 亦且簡便。

○ 附骨疽主治方

雷火神針

治風寒濕毒襲于經絡為患 漫腫無頭 皮色不變 筋骨疼痛 起坐艱難 不得安臥者 用此針之。

蕪艾 三錢 丁香 五分 麝香 二分

藥與蕪艾揉和 先將夾紙作筒如指粗大 用艾藥疊實收用。臨用以肖山紙七層平放患上 將針点着一頭對患向紙捺實 待不痛方起針 病甚者再復一次 七日後火瘡大發 自取功效矣。

追風逐濕膏

治風寒暑濕相傷 以致骨節疼痛 筋攣不能步履 或麻木濕痺等症病效。

豨薟草 麻黃 川烏 草烏 風藤 半夏 南星 羌活 蓖麻子(打碎) 桂枝 各三兩 獨活 細辛 當歸 白芷 蒼朮 大黃 各二兩

以上藥各切咀片 用葱汁 薑汁各二碗拌藥先浸一宿。次日用香油半斤 同藥入鍋內慢火煎至葱 薑二汁將乾 不服時 油方與藥相煎 渣枯爲度 細絹濾清 每油一斤 下飛過炒丹十兩爲准配用 再將前油入鍋內煎滾 以油滴水成珠不散方下黃丹 徐徐攪入 其膏已成 再下碾淨松香末一斤四兩 再同熬化 取下鍋來 以盆頓穩 再下乳香 木香 胡椒 輕粉各末二兩 白芥子細末四兩 漸入攪勻 傾入體內盛貯 漸用熱湯頓化 綾緞攤貼。七日後 諸病可痊 百發百中。

○ 臟毒主治方

珍珠散(見下疳門)

肛門腫泛如籬 紅紫急脹 堅硬痛極。本方加冰片研極細 豬脊髓調塗患上 早晚日用二次。

○ 痔瘡主治方

洗痔地殼湯

治痔瘡腫痛 肛門下墮 毋論新久 洗之腫自消。

地殼 二兩 鰾蝦蟆草(一名荔枝草 四季常有 面青背白 麻紋參參者是) 二兩

河水三瓢 同上二味煎數滾 先熏後洗 良久湯留再熱熏洗 甚者三次即消。洗淨當搽後藥。

五倍子散

治諸痔學發 堅硬疼痛難忍 或臟毒 肛門泛出腫硬不收亦效。

五倍子大者 敲一小孔 用陰乾鰾蝦蟆草揉碎填塞五倍子內 用紙塞孔 濕紙包煨 片時許取出待冷 去紙碾爲細末 每一錢加輕粉三錢 冰片五厘 共研極細 待煎湯洗後 用此乾搽痔上。即睡勿動 其腫痛即際。凡外治用二方搽洗 亦可除根 永不再發 極效極效。

田螺水

治痔瘡堅硬作痛 急脫肛腫泛不收者并用之。

以大田螺一枚 用大冰片五厘研末 用尖刀挑起螺蓋 將冰片入內 平放片時 待螺滲出漿水 用鷄翎搽患上 勤勤搦之 其腫痛自然消散。

喚痔散

凡醫內痔不得出 用此藥填入肛門 其痔即出。

草烏(生用) 一錢 刺猬皮(一錢 燒存性) 枯礬 五錢 食鹽(炒) 三錢 麝香 五分 冰片 二分

上碾細末 先用溫湯洗淨肛門 隨用真唾調藥三錢 進入肛門 片時痔即當出 去藥上搽痔膏。

搗痔膏

用喚痔散痔出之後 先用此藥爲搗四邊好肉。

白芨 石膏 黃連 各三錢 冰片 麝香 各二分 共碾細末 鷄蛋清調成膏 搗住四邊好肉 方上枯痔散

枯痔散

凡痔瘡泛出 即用此藥塗之。年淺者五七日 年甚者八九日 待痔乾黑後 不用此藥 每日用落治湯洗之。

白礬 二兩 蟾酥 二錢 輕粉 四錢 砒霜 一兩 天靈蓋 四錢(用清泉水浸 以天靈蓋煨紅水內浸煨七次)

共研極細末 入小新鎖鍋內 上用粗磁碗密蓋 鹽泥封固 炭火煨至二炷京香 待冷取開 將藥研末搽痔上 每日辰 午 申三時用溫湯洗淨 上藥三次 上至七八日 其痔枯黑堅硬 住藥裂鋒 待其自落 換洗起痔湯。

起痔湯

治諸痔上枯藥之後 黑色堅硬裂鋒 宜此藥洗。

黃連 黃柏 黃芩 大黃 防風 荊芥 梔子 槐角 苦參 甘草 各一兩 朴硝 五錢已上藥分作三次 用水煎洗 待痔落之後換搽生肌散。

生肌散

治痔上枯藥之後脫落 孔竅不收者 宜用此散。

乳香 沒藥 各一兩 海螵蛸(水煮) 五錢 黃丹(飛炒) 四錢 赤石脂(煨) 七錢 龍骨(煨) 四錢 血竭 三錢 熊膽 四錢 輕粉 五錢 冰片 一錢 麝香 八分 珍珠(煨) 二錢

共研極細末 磁罐收貯 早晚日搽二次 蓋膏漸斂而平。

○ 洗痔腫痛方

魚腥草 苦楝根 朴硝 馬齒莧 瓦楞花 各一兩 水十碗 煎七八碗 先熏後洗 諸痔腫痛可消。

人中白散(見口疳門)

治諸痔腫痛堅硬 墮重脫肛等症。先用溫湯洗淨 隨後搽藥患上 卽臥勿動 其腫痛漸減 此藥常有便于痔故附錄而用之。

三品一條槍(見瘰癧門)

治十八種痔漏。凡用藥線插入痔孔內 早晚二次 初時每次插藥三條 四日後每次插藥五六條 上至七八日 藥力滿足 痔變紫黑 方住插藥 候痔四邊裂縫流膿 至十四日期滿痔落 用甘草湯洗淨 換搽鳳雛膏或玉紅膏 俱可生肌收斂。 虛弱者兼服養血建碑之藥最為穩當。 大抵醫人能取痔者 皆此方也 不可輕其藥而棄之。

生肌鳳雛膏

用鷄蛋煮熟 去白用黃 十餘個銅勺內熬油 傾入盞內 約油三錢加輕粉細末一錢 乳香 血竭 龍骨各末五分 共入油內和勻 每日早, 午, 晚鷄翎蘸塗患孔內 膏蓋避風 深者半月 可以完口。

○ 煮線方

治諸痔時五癭六瘤 凡蒂小而頭面大者 宜用此線系其患根自效。

芫花 五錢 壁錢 二錢

用白色細扣線三錢 同上二味用水一碗盛貯小磁罐內 慢火煮至湯乾爲度 取線陰乾 凡遇前患 用線一斤 患大者二斤 雙扣系于根蒂 兩頭留線 日漸緊之 其患自然紫黑 冰冷不熱爲度。 輕者七日 重者十五日後必枯落 後用珍珠散收口至妙。

○ 下疳主治方

銀粉散

治下疳母論新久 但腐爛作痛及楊梅瘡熏後結毒 玉莖腐爛 或陽物半傷半全者 并宜用之。

好錫六錢化開 下朱砂末二錢攪炒 砂枯去砂 留錫再化開 絞水銀一兩 和勻傾出篩用 杭粉一兩研細 鋪夾紙平山上 卷成一條一頭点火 煨至紙盡爲度 吹去灰用粉 同前末錫加眞輕粉一兩 共成一家研細。 凡遇前患 先用甘草湯淋洗 挹乾隨用此藥搽上 止痛生肌 收斂極妙。

珍珠散

治下疳皮損腐爛 痛極難忍 及諸瘡新肉已滿 不能生皮。 又湯潑火燒 皮損肉爛 疼痛不止者。

缸花 五分(如無 用頭刀靛花輕虛色翠者代之 終不及缸花爲妙) 眞珠 一錢(不論大小以新白爲上 入豆腐內煮數滾 研爲極細無聲方用) 眞輕粉 一兩

上三味 共研千轉 細如飛面 方入罐收。 凡下疳初起皮損 搽之卽愈。 腐爛疼痛者 甘草湯洗淨。 豬脊髓調搽 如諸瘡不生皮者 用此乾搽卽可生皮。 又婦人陰蝕瘡或新嫁內傷痛甚者 亦可此搽極效。 湯潑火燒痛甚者 用玉紅膏調搽之。

○ 疔瘡簡便方

油透焙舊帽沿燒灰 杭粉瓦上煨黃色各等分 共研極細 磁罐收貯。先用紅棗十五個 甘草三錢 煎湯溫洗患上 搥乾搽藥即效。

太乙膏(見腫瘍門)

治玉莖皮損疼痛不止者 用此貼之 其疼即止。

○ 魚口便毒主治方

火鍼法

治魚口 便毒 橫痃等症 用行藥不得內消者。

粗線鍼二條 將竹筋一頭劈開 將鍼離分半許夾在筋頭內 以扎扎緊 用桐油燈盞內貯之 燈草五根 排入油內 點着用鍼塗油燒紅 向患頂重手刺入五六分 隨出或血或膿 以膏蓋貼 即得輕便 以後漸愈。虛者兼服十全大補湯完口。

○ 囊癰主治方

灸偏墮法

候取天晴 不犯人神日 患者平身仰臥 取木腎子根下硬根盡處 以黑漸記 用安豆大艾炷 三年之內灸七壯 年久者灸九壯 十一壯爲止。內服木香補腎丸 戒食生冷 兼忌房事百日爲妙。

如意金黃散(見腫瘍門)

治囊癰初期 紅赤腫痛 發熱墮重者 用葱湯同蜜調敷。夏月濕熱紅甚者 溫茶湯同蜜調敷妙。

○ 楊梅瘡主治方

翠云散

治楊梅瘡已服內藥 根脚不紅 瘡勢已退者用。
銅綠 膽礬 各五錢 輕粉 石膏(煨) 各一兩
共研極細 磁罐收貯。濕瘡乾搽 乾瘡公豬膽汁調
點 三日點三次 其瘡自乾而愈

又：點藥方

杏仁 四十九粒(去皮 尖) 雄黃 一錢 輕粉 三錢

先將杏仁搗細 加雄黃 輕粉細末再研勻 豬膽調點。

鵝黃散

治楊梅瘡潰爛成片 膿穢多而疼甚者宜用之。

石膏(煨) 輕粉 黃栢(炒)

以上各等分爲極細末 乾搽 爛上 即可生疤 再爛再搽 毒盡乃愈。此解毒 止痛 收乾之效藥也。

○ 結毒主治方

熏洗結毒方

蒼朮一兩 點紅川椒三錢 水五碗 煎至四碗 入罐內 將患上對罐口以熱氣熏之 半熱傾藥盆內淋洗患上 以潔淨布搥乾 搽後解毒紫金膏。

解毒紫金膏

治楊梅結毒 腐爛作臭 膿水淋漓 諸藥不效者。細挾礬紅 明淨松香各一斤 共碾極細末 麻油調稠 先將患上用前湯熏洗潔淨 搽上此藥 油紙蓋上 以軟布條札至緊 毋令血行 三日一換。如無煎湯熏洗 只煎葱艾 甘草等湯 俱可洗換。又治諸毒頑腫等瘡神效 愈後忌發物煎炒

神仙碧玉膏

治結毒潰爛臭穢 疼痛不斂 及風 腫等瘡俱效。

輕粉 一兩 杭粉 二兩 白占 五錢 乳香 沒藥 各三錢 章冰 二錢

用公豬淨熟油五兩 同白占熬化傾入碗內 入上藥和勻 水內頓一時取起 臨用抵脚挑膏手心中搽化 攤油紙上 用葱湯洗淨瘡 對患貼之。

○ 結毒靈藥方

治楊梅結毒 腐爛作臭 或咽喉 唇 鼻腐坏日甚者并效。

水銀 一兩 朱砂 雄黃 硫黃 各三錢

共研細 入陽城罐內 泥固鐵蓋梁兜固緊封口 點三香爲度 用水擦盞內 火燻 次日取出盞底靈藥 約有一

兩五六錢。治尋常腐爛之症 靈藥五錢 輕粉五錢 和
勻碾細 小罐盛貯 紗封罐口 臨用甘草湯洗淨患上 將
罐倒懸 紗眼內篩藥患上 用後單油膏藥蓋之 一日一
換自效。男子 婦人咽爛者 靈藥一錢加入中白二分研
細吹之 日用三次 內服不二散 其疼即止 隨可飲食。

單油膏

貼結毒搽藥上

用麻油二斤熬 滴水成珠 續下抗粉十三兩 攪勻成
膏 傾水內 片時取起攤用。

碧云散

治結毒入于顛頂 以致頭疼脹痛如破者吹之。

鵝不食草 一兩 川芎 一兩 青黛 一錢

共為細末 患者口嚙涼水 以蘆筒吹藥疼之左右鼻內
取噴為效。

○ 多骨疽主治方

生肌散

治腐骨脫出 肌肉生遲 不能收斂者 用此搽之。

石膏 輕粉 赤石脂 各一兩 黃丹(飛) 二錢 龍骨
血竭 乳香 朝腦 各三錢

上為細末 先用甘草 當歸 白芷 各一錢 煎湯洗淨
患上 用此乾搽 軟油紙蓋札 二日一洗一患。

○ 陰瘡主治方

銀杏散

治婦人濕熱下注 陰中作痒 及內外生瘡并用。

杏仁(去皮尖 研) 輕粉 水銀(鉛制) 雄黃 各一錢

上各為細末 共和一處 每用五分 棗肉一枚和丸 用
絲綿布裹 留一綿條粘線在外 用塌痒湯煎洗 藥棗安
入陰中 留線在外 恐小便 取出再入 一日一換 重者
只四五枚痊愈。仍兼服前藥。

塌痒湯

治症同上 以此熏洗之。

苦參 威靈仙 蛇床子 當歸尾 狼毒 各五錢 鶴虱草

一兩

用河水十碗煎水滾 濾清貯盆內 乘熱先熏 待溫後
洗 臨洗和入公豬膽汁二三枚同洗更妙。

雄黃藜蘆散

治婦人陰中突出如蛇 或似鷄冠 菌樣者并治。

雄黃 一錢 葱管藜蘆 二錢(碾細如面) 輕粉 蟹頭
(焙黃色)各一錢 冰片二分

以上各研極細末 和勻再研 磁罐收貯。先用芎歸湯
煎洗 隨後搽藥 早晚二次 其患漸收。

芎歸湯

治症同上 以此洗之。

川芎 當歸 白芷 甘草 膽草

上各等分 每用五錢 煎湯浴洗患上 隨後搽藥。

○ 大麻風

雄硫散

治大麻風眉毛 鬚 發脫落作痒者 宜此藥擦之。

雄黃 硫黃 鳳凰皮(即雛鷄殼 燒黃存性) 各五錢
穿山甲 十片(炒黃) 滑石 一兩

上各為歲末 用半油核桃肉一兩搗爛 同公豬膽汁一
個同前藥和勻 用青紗包藥擦之。日用三次 其發漸生
如舊。

又擦麻風病面生紫塊疙瘩。方用 穿山甲灰炒 川椒
為末各二錢 生薑汁 土大黃根二汁調稠 絹包擦患上
如久藥乾 加水調擦亦效。忌動風 發物等件。

○ 鼻痔

硃砂散

治鼻生瘻肉 初如榴子 漸大下垂 名為鼻痔也。

硃砂 一錢 輕粉 三分 冰片 五厘 雄黃 三分

上共為末 先用茴香草散連吹二次 此用細筒筋二筋
筋頭銛一小孔 用絲線穿孔內 二筋相離五分許 以二
筋頭直入鼻痔筋上 將筋線絞緊 向下一拔 其痔自然

拔落 置水中觀其大小。預用胎發燒灰同象牙末等分吹鼻內 其血自止。戒口不發。

茴香草散

茴香草 高良薑晒乾等分爲末 用此先吹鼻痔上二次片時許 隨後方行取法 其痔自然易脫。

○ 紫白癩風

雌雄四黃散

治紫白癩風皮膚作痒 日漸開大 宜用此吐之。

石黃 雄黃 硫黃 白附子 雌黃 川槿皮 各等分

上爲細末 紫蠟醋調 用緊槿木毛頭蘸藥擦患上 白癩用蓋切開蘸藥擦之 擦後三日 忌下湯水。戒食鷄鵝羊肉 煎炒 海星 火酒等物 不復發。

肥皂方

皂角 甘松 山柰 白芷 各二錢 密陀僧 白附子 朝腦 各一錢 楮實子 綠豆粉 各三錢

上爲細末 用去淨皮弦肥皂一斤 搥勻 洗擦患上 日久自效。

○ 齒病

畢撥散

治風濕蟲牙作腫疼痛 如陽明內熱作疼勿用。

畢撥 眞阿魏 各二錢 冰片 麝香 各一分

上爲細末 每用半豆許 擦放牙根痛縫中 吐去熱涎 溫湯漱之 再搽即愈。內有阿魏 恐防作吐。

又：牙疼方

畢撥 一錢 蟾酥 二分 川椒 五分 飛鹽 三分

上共爲末 用草桔咬毛蘸藥搽點痛牙根上妙。

○ 破傷風

玉眞散

治破傷風牙關緊急 角弓反張 甚則咬牙縮舌。

南星 防風 白芷 天麻 羌活 白附子 各等分

上爲末 每服二錢 熱酒一鍾調服 更敷傷處。若牙關緊急 腰背反張者 每服三錢 用熱童便調服 雖內有瘀血亦愈。至于昏死 心腹常溫者 連進二服 亦可保全。若治瘋犬咬傷 更用嗽口水洗淨 吐傷處亦效。

○ 跌撲

玉紅膏

治跌撲損傷或金瘡斷損筋骨 已經穴止 疼痛作膿 宜用此膏。葱湯洗淨 日搽傷處 黑膏蓋之。

○ 金瘡

如聖金刀散

治刀刀所傷 皮破筋斷 飛血不止者。

用松香淨末七兩 枯礬 生礬各一兩五錢 共爲極細末 罐密收 搽傷處 紙蓋絹撮 止後三四日 後必焮痛 作膿 換搽生肌散 三日三次 其疼即止 以後日用葱湯洗之 換搽玉紅膏長肉生肌 避風爲要。

桃花散

治金瘡出血不止。

用石灰半升同大黃一兩五錢切片同炒 石灰變紅色爲度 去大黃 篩細搽損上 紙蓋絹撮 止血後用葱湯洗淨 換搽玉紅膏長肌收斂 兼戒口味 房事爲要。

○ 梅瘡

散瘀玷痛膏

治杖後皮肉損破 紅紫青斑 焮腫疼痛重墮者。

用腫瘍門如意金黃散一兩 加瘡水三錢碾勻 以百石灰一升 用水二碗和勻 候一時許 用灰上面清水傾入碗內 加麻油對分和勻 以竹筋攪百轉 自成稠膏 調前藥稀稠得所聽用 杖後帶血 不用湯洗 將藥通便敷之 紙蓋布撮。夏月一日 冬月二日 方用葱湯淋洗乾淨 仍再敷之 痛止腫消 青紫即退。傷重者 別搽玉紅膏完口。

○ 湯潑火燒

罌粟膏

治湯潑火燒 皮肉損爛 疼苦熾熱 起泡流水者。

麻油四兩 罌粟花十五條 無花以殼代之 浸油內 煎膏濾清 將油再入勺內 下百占三錢 熬化傾入罐內 待四邊將凝時 下真輕粉末二錢勻 水內頓冷取起。臨用將泡挑破 用抵脚挑膏手心中捺化捺患上 連綿紙蓋撮 日換二次 其疼即止。次日將軟帛搥淨腐皮 再捺之自愈。

珍珠散(見下疳門)

治湯潑火燒 腐皮已盡 疼痛已止 用此摻即愈。前杖瘡門中石灰水調麻油成膏 即清涼膏也 搽湯潑火燒亦效。

○ 痞癬

乾坤一氣膏

此膏專治痞疾 毋論新久立效。又治諸風癱瘓 濕痰流注 各樣惡瘡 百般怪症 男子夜夢遺精 婦人赤白帶下 又男女精寒血冷 久無嗣息者并貼之。

當歸 白附子 赤芍 白芍 白芷 生地 熟地 穿山甲 木髓肉 巴豆仁 蓖麻仁 三稜 蓬朮 五靈脂 續斷 肉桂 元蔘 各一兩 乳香 沒藥 各一兩二錢 麝香 三錢 真阿魏 二兩(切薄片聽用)

上咀片 用香油五斤 存下四味 餘皆入油浸 春三夏五 秋七 冬十期華 桑柴火熬至藥枯 細絹濾清 每淨油一斤 入飛丹十二兩 將油入鍋內 下丹 槐枝攪摻 其姑候成 端下鍋來 用木盆作穩 漸下阿魏片 泛化已盡 方下乳 沒 麝香 再攪勻 乘熱傾入磁罐內 分三處盛之。臨用湯中頓化 痞病紅疔攤貼 餘病綾絹俱可攤之 有腫者對患貼之。男子遺精 婦人白帶 俱貼丹田 諸風癱瘓 貼腎俞穴并效。

○ 鼻出血

紫土散

治鼻中無辜出血不止。用傾銀紫土新罐碾細 以火酒調敷額門上 其血自止 此從治之法也。

○ 鵝掌風

二礬湯

治鵝掌風皮膚枯厚 破裂作痛 宜用此湯熏洗 輕則不宜 越重越效。

白礬 皂礬 各四兩 孩兒茶 五錢 柏葉 半斤

用水十碗 同上藥四味煎數滾候用。先用桐油搽抹患上 以桐油蘸紙沾点着 以烟焰向患上熏之 片時方將前湯乘滾貯淨桶內 手架上用布蓋 以湯氣熏之 勿令泄氣 待微熱傾入盆內 熏良久 一次可愈。七日忌下湯水 永不再發。

○ 腎囊風

蛇床子湯

治腎囊風濕熱為患 疙搭作痒 搔之作疼宜洗。

蛇床子 當歸尾 威靈仙 苦參 各五錢

水五碗 煎數滾入盆內 先熏 待溫浸洗二次愈。

狼毒膏

治症同前

狼毒 檳榔 硫黃 五倍子 川椒 楓子肉 蛇床子 各三錢

上為末 用香油一大槐 煎滾入皮硝三錢 再煎滾 次下松猪膽汁一个 和勻調前藥搽擦患上 此藥諸痒瘡用之并效。

○ 疥瘡

綉球丸

治一切乾濕疥瘡及膿窠爛瘡 瘙癢無度者效。

獐水 輕粉 川椒 枯礬 水銀 雄黃 各二錢 楓子肉 一百枚(別碾)

以上共爲細末 同大楓子肉再碾和勻 加柏油一兩化開 和藥攪勻 作丸圓眼大 于瘡上擦之。

諸瘡一掃光

此藥凡治痒瘡 不論新久及身上下 或乾或濕 異類殊形 但多痒少痛者 并宜用之 俱各有效。

苦參 黃栢 各一斤 連翹 一升 水蠶肉 蛇床子 點紅椒 明礬 枯礬 硫黃 楓子肉 獐水 水銀 輕粉 各二兩 白砒 五錢

共爲細末 熟猪油二斤四兩 化開入藥攪勻 作丸龍眼大 磁瓶收貯。用時搽擦患上 二次即愈。

○ 洗痒瘡方

苦參半斤切片 用河水三四瓢煎藥數滾 摻水二瓢住火片時 濾去渣。臨洗和公猪膽汁四五枚攪勻淋洗痒上 三日一洗 三次亦可痊愈矣。

○ 癩瘡

三香膏

治癩瘡初期多疼少痒 未經受風紫黑者宜用。

乳香 松香 輕粉 各等分

上爲細末 香油調稠 用夾紙一面 以鍼密刺細孔 將藥夾搽紙內 先以葱湯洗淨 將紙有孔一面對瘡貼之 三日一換自效。忌房事，煎炒等件。

乳香法紙

治癩瘡作痛不愈。

先用乳香碾細末一兩听用。以呈文油紙四張 每紙一張攤平 篩乳香末二錢五分勻篩紙上 雙折卷一村闊 將卷紙復作三折 兩頭以線札之 用甘草一兩二錢 水三碗 將卷過藥紙浸入甘草湯內 上用重物壓之 煮數困 取起紙來 解去札線 將紙攤開桌上 每將用輕粉三錢摻乳香 上用棕糊刷排刷相勻 提起藥紙 帶濕以無藥一面對板壁上貼之 陰乾收用。臨時隨患大小引紙多少 先用溫湯洗瘡 隨將紙有藥一面對瘡貼之 絹札

三日一換 自然止痛生肌。如貼後內無水出 不必換貼自愈。

蜈蚣錢

治癩瘡多年 黑腐臭爛作疼 諸藥不效者。

用桐油二兩 獨活 白芷 甘草 蜈蚣各一錢 入油內煎滾 先將癩瘡洗淨 用白面水調作圈 圍在瘡之四邊 毋令泄氣走油。將脚放平 以茶匙挑油漸漸趁熱加滿 待油溫取去 以後腐肉 風毒自然脫下 用解毒紫金膏搽上 紙蓋絹札 三日一換。

○ 血風瘡

解毒雄黃散

治風濕流注腿脚 致生血風頑瘡 紫黑搔痒者。

雄黃 四兩 硫黃 八兩

上二味 共碾細末 柏油調搽 紙蓋之 三日一換。

如意金黃散(見腫瘍門)

治症同前。

用公猪膽汁調稠敷患上 油紙蓋托勿動 待其自脫 脫後色紅再敷之 以色白爲度。

神灯照法(見腫瘍)

治年久紫黑血風頑瘡 流水作痒不絕。

先用葱湯洗淨患上 点火以灯焰熏之 每熏二帖爲度。

○ 頑癬

土大黃膏

治乾濕頑癬 不論新久 但皮膚頑厚 患走不定 惟痒不痛者。

硫黃 八兩 生礬 四兩 點紅川椒 二兩

上各爲末 用土大黃根搗汁 和前藥調成膏碗貯 新癬搗擦之 多年頑癬加醋和擦 如日久藥乾 以醋調搽 牛皮癬用穿山甲搗擦之妙。

頑癬必效方

治多年頑癬 諸藥熏擦搽洗不效者 用之即愈。

川槿皮 四兩 輕粉 雄黃 各四錢 百藥煎 四餅 斑蝥(全用) 一錢 巴豆(去油) 一錢五分 大黃 二兩 海桐皮 二兩

上為極細末 用陰陽水調 搗損敷藥 必待自落。

○ 膿窠瘡

蛇床子散

治膿窠瘡生于手足遍身 根硬作脹 痒痛非常。

蛇床子 大楓子(肉) 松香 枯礬 各一兩 黃丹 大黃 各五錢 輕粉 三錢

上為細末 麻油調搽 濕爛者乾搽之。

○ 凍風

獨勝膏

治凍風凍根 凍耳 每逢冬寒則發。

六月初六 十六 二十六日 用獨蒜搗膏 日中晒熱 在于遇冬所發之處擦之 忌下湯水 一日共擦三次不發。又每常凍風用茄根同葱湯浸洗 再不重發。

○ 火丹

柏葉散

治三焦火甚致生火丹 作痒或作痛 延及遍身。

側柏葉(炒黃為末) 五錢 蚯蚓糞(韭菜田內者佳) 黃柏 大黃 各五錢 赤豆 輕粉 各三錢

上為細末 新汲水調搽。

纏腰火丹 方用寶鈔一張 燒化存性 研為細末 用米醋調稀 鷄翎蘸塗患上 一日三次即愈。忌食發物。

如意金黃散(見腫瘍門)

治火丹不論新久痒痛 用新汲水調敷 靛汁亦好。

○ 天泡

胡椒粉

治天泡紅腫發熱 急脹疼痛 用鍼挑破搽此藥。

杭粉 一兩 輕粉 石膏(煨) 蛤粉 各三錢 共研極細 搗乾患上 用此搽之。或用絲瓜葉搗汁調搽亦好。如冬月無此 用染布青缸汁調搽。

石珍散

治天泡日久作爛 疼痛不已 膿水淋漓者宜用。

石膏(煨) 輕粉 各一兩 青黛 黃柏末 各三錢

上共研細 甘草湯洗淨 以此藥搽之 其疼即止。

○ 肺風粉刺酒皰鼻

眞君妙貼散(見腫瘍門)

治肺風 粉刺 皰鼻紅赤紫腫 早晚用涼水調敷。

○ 雀斑

玉容丸

治男婦雀斑 酒刺 及身體皮膚粗糙 并用此洗。

甘松 山柰 細辛 白芷 白藜 白芨 防風 荊芥 姜蠶 山梔 藁本 天麻 羌活 獨活 陀僧 枯礬 檀香 川椒 菊花 各一錢 紅棗肉 七枚

以上共為細末 用去淨弦膜肥皂一斤 同辛作丸 如秋冬加生蜜五錢 如皮膚粗槁加牛骨髓三錢 早晚洗之 肌膚自然榮潔如玉 溫潤細膩。

玉肌散

一切風濕 雀斑 酒刺 白屑風皮膚作痒者并效

綠豆 半升 滑石 白芷 白附子 各二錢

共為細末 每用三匙 早晚洗面時湯調洗患上。

○ 油風

海艾湯

治油風血虛風熱所致 皮膚光亮 眉髮脫落者。

海艾 菊花 薄荷 防風 藁本 藿香 甘松 蔓荊子 荊芥穗 各二錢

用水五六碗 同藥煎數滾 連渣共入敞口鉢內 先將熱氣熏面 候湯溫蘸洗之 留藥照前再洗

○ 耳病

紅綿散

治耳內流膿 腫痛已消 膿尚不止 方用此摻之。
枯礬(上白) 三錢 乾烟脂 二錢 麝香 一分五厘
共研極細末 磁罐收貯 先用綿裘絞盡耳內膿濕 綿
裘滾藥送入耳底自愈。

○ 漆瘡

三白散

杭粉 一兩 石膏 三錢 輕粉 五錢
各爲末 蕪菜汁調敷 紙蓋 如無菜汁 涼水調敷。

○ 竹木刺

花蕊石散(見跌扑門)

治竹木刺傷 腫痛流膿 以葱湯洗淨 用此摻之。

○ 瘰癧瘡

苦參湯

治瘰癧瘡作痒 抓之又疼 坐如芒刺 難以安睡。
用苦參四兩 大菖蒲二兩 河水五瓢 同煎數滾 添水
二瓢 盖片時 臨洗和入公猪膽汁四 五枚淋洗患上 不
二三次痊愈。愈後避風 忌食發物。

鷄黃散

治瘰癧瘡作痒 抓之皮損 隨後又疼 用此扑之。
錄豆粉 一兩 滑石 五錢 黃柏 三錢 輕粉 二錢
上爲細末 以軟絹帛蘸藥扑于患上 止痛收乾。

○ 咬傷

蔥白甘草湯

治咬傷焮腫疼痛 膿血淋漓 臭穢腐爛者。
用蔥白二兩 粉草五錢 水三碗 煎至二碗 每日洗淨
傷處瘀腐膿血 方用玉紅膏搽之 黑膏蓋漸愈。

追風如聖散

治瘋犬咬傷 隨用敷之 其毒可拔出。

細辛 防風 川烏 薄荷 草烏 川芎 白芷 蒼朮 各一
兩 雄黃 四錢

共爲末 溫酒調敷傷處 以紙盖扎 早晚換二次。

○ 紐扣風

冰硫散

硫黃 一兩 獐冰 川椒 生礬 各二錢
共爲末 先用白蘿卜一介 搗空其內 將藥填滿 復將
原皮盖之 濕紙包三四層 灰火內煨半時許 待冷取開
用藥同熟猪油調稠 搽患上自愈。

○ 婦人脚丫作痒

枯礬散

枯礬 五錢 石膏(煨) 輕粉 黃丹 各三錢
上爲末 溫湯洗淨 搽藥即愈。

○ 黑子

灰米膏

用成塊火灰蘸水調稠 將白川米插入灰內 留半米在
外 片時許 候米熟用米点痣上 可落矣。

○ 眼胞菌毒

翠云散

治眼胞菌毒 用針割後涂之。杭粉五兩 銅綠末一兩
輕粉一錢 共研極細。用黃連一兩同川米百粒 水一碗
煎一半 再熬折去二分 和藥作錠陰乾 臨用清水少許
淨硯上磨濃 鷄翎蘸患上。又治爛弦風眼或暴赤腫痛
者 篦搽更效。

○ 体氣

五香散

沈香 檀香 木香 零零香 各三錢 麝香 三分

共爲細末 每用五厘 津調搽兩腋下 三日一次 或用香末二錢 絹袋盛貯掛于腋下亦效。

○ 白禿瘡

麥錢散(見頭風瘡門)

治禿瘡頭毛脫落 白斑如癬 瘡痂壘壘 壘起痒甚 猶若蟲行。葱湯洗淨瘡痂潔淨 用麻油調搽 以毘帽戴之 隨後作疼發腫 忍之三日 後其痂漸漸而脫。愈之後不復作 其發亦生 戒諸發物。

諸瘡一 疔光(見疥瘡門)

治禿瘡髮脫作痒。本藥一錢加倒挂塵二分 加灯窩宿油調搽自愈。

潤肌膏

治禿瘡乾枯白斑 作痒髮脫。

用麻油四兩 當歸五錢 紫草一錢同熬 藥枯濾清 將油再熬 加黃蜡五錢化盡傾入碗內 頓冷搽患上漸愈矣。

○ 奶癬

文蛤散

文蛤 四兩 点紅川椒 二兩 輕粉 五錢

先將文蛤打成細塊 鍋內炒黃色 次下川椒同炒 黑色烟起爲度 入罐內封口存性 次日入輕粉 碾爲細末 罐收貯。香油調搽 奶母戒口爲妙。

○ 蟾拱頭

敗銅散

活蟾拱頭已破後 膿水不乾 愈之又發 久不收口。用化銅旧罐爲末 洗淨患上 香油調搽。忌口。

○ 小兒遺毒爛斑

眞君妙貼散(見腫瘍門)

治小兒胎毒 皮肉腐爛 疼痛不安 用此敷即效。

○ 小兒頭瘡

麥錢散

治小兒痘風作痒 壘壘成片 甚則頑麻不知痛。

用小麥一升炒枯黃色 乘熱入鉢內和硫黃四兩 白砒一兩 細末攪勻 待冷取起 加烟膠半斤 川椒三兩 生枯礬各二兩共碾細末 臨用葱湯洗淨 用麻油調搽 油紙盖扎 三日一換 三次愈。

○ 走馬疳

人中白散

治小兒口疳 走馬疳及牙齦腐爛黑臭者極效。

人中白(溺壺者佳 煨紅) 二兩 孩兒茶 一兩 黃柏 薄荷 青黛(各末) 六錢 冰片 五分

共再研極細 先用溫湯漱淨 吹藥疳上 日用六七次 吹藥涎從外流爲吉 內收涎毒入里爲凶。

○ 大人口破

柳花散

黃柏(淨末) 一兩 青黛 三錢 肉桂 一錢 冰片 二分

各爲細末 共再研 磁罐收貯 每用少許吹之。

赴筵散

黃連 黃柏 黃芩 梔子 乾薑 細辛 各等分 爲末吹患上。

○ 陰虱

銀杏無憂散

水銀(鉛制) 杏仁(去皮 搗膏) 輕粉 雄黃 狼毒 蘆薈 各一錢 麝香 一分

除水銀 杏仁膏 餘藥共碾篩細 入上二味再研勻 先用土葛蒲煎湯洗之 用針挑去虱孔 隨用津唾調搽 使藥氣入內 愈不復生。切忌牛 犬 鯨肉。

○ 唇風

銅粉丸

銅青 五錢 官粉 三錢 明礬 一錢五分 輕粉 一錢五分 麝香 一分五厘 冰片 一分二厘 黃連 二兩(切片煎稠膏)

上共爲細末 黃連膏丸如芡實大 每用一丸 湯泡紙蓋 每洗頓熱上面清水勤洗之 其患自愈.

○ 補遺方

汗斑方:密陀僧散

石黃 一錢 輕粉 五分 硫黃 雄黃 蛇床子 各二錢 密陀僧 一錢 爲末,醋調搽患上.

III. 總括 및 考察

外治法은 治療方法에 있어 內治法의 相對인 方法으로 그 內用에 있어 疾病을 診斷하여 方藥을 運用한다는 側面에서는 同一하며 治療對策에 따라 全身의 治療와 局所의 治療로 大別 할 수 있으며¹⁾, 外用藥은 主로 外治法의 治療方法에 依해 施術되는 것으로 機械的 物理的 方法에 依한 藥物 施術 方法으로 體表나 九竅 等에 使用하여 臨床各科의 疾病을 治療하는 것을 말한다⁴⁾.

藥物의 外用法에 對해 신²⁾은 本草를 體外에 適當하게 加工 製藥하여 敷 貼 搽 擦 吹 點 熏 洗 等等的 方法으로 人體를 刺戟하여 人體 內部組織 機能 및 局所 組織機能을 圓滑하게 하여 各種 疾病을 治療하거나 豫防하고자 하는 一種의 治療 方法이라 할 수 있다.

康³⁾은 聖濟經에 “治內者 自內達外 湯醴丸散丹之

類 見於服飲者是也 治外者 由外以通內 膏熨蒸浴粉之類 借於氣達者是也” 라는 句節을 引用하여 氣에 바탕을 둔 機轉으로 膏 熨 蒸 浴 粉 等의 方法을 使用하는 外用藥의 根據를 提示 해주고 있다.

신²⁾은 <內經>의 “天食人以五氣 地食人以五味” 라는 句節을 引用하여 五氣는 五官이나 皮膚를 通하여 取할 수 있으며 本草가 가지는 氣運은 人體의 皮膚나 九竅를 通하여 取할 수 있으며 그리고 消化器를 通하여 人體 內의 氣運에 影響을 미칠 수 있다는 것이 本草 外用에 가장 基本的인 理論의 根據라 할 수 있다고 하였으며, 吳⁶⁾는 “外治之理即內治之理 外治之藥 亦即內治之藥 所異者法耳” 라 하여 外治法은 內治法과 治療法과 方藥의 原則은 같지만 다만 方法이 다를 뿐이라고 하여 外用藥의 根據를 提示 해주고 있다.

外用藥은 人體의 外部에 使用하기 때문에 內服藥과 같이 單純한 劑型이나 服藥 方法과는 달리 藥物을 使用하는 身體部位나 症狀의 類型에 따라 適當한 劑型法과 使用法이 選擇되었으나 劑型을 만드는 데 長時間의 時間과 만드는 過程이 어렵고 손이 많이 가는 不便함이 있어 利用이 忌避되었으나 臨床의으로 良好한 效果를 보여주고 있다⁴⁾.

外用藥은 劑型을 오래 保管 할 수가 있고 經濟的이며 使用이 簡便하고 副作用이 적고 服藥을 꺼리는 患者에게 利用 可能한 長點이 있으나 現在까지 外用藥에 對한 研究가 未及한 狀況이다²⁾.

一般的으로 常用하는 外用藥의 施術 方法에는 敷 罨 熨 熏蒸 吸入 熱烘 浸浴 漬 發泡 膏 點眼 吹 漱滌 薄粉 導 塞 貼 등이 있으며 劑型으로는 洗 坐 敷 貼 舌下含劑 烟熏 外塗 吹鼻 吹喉劑 등이 있으며 物理的 作用으로는 乾燥 濕潤 冷却 加溫 및 保溫作用 等이 있어 病變이 빠르게 原狀으로 되돌아 가도록 도움을 주며 症狀을 輕減시키는 作用을

한다¹⁾.

外科正宗은 明代 陳實功의 著書로 1617년에 刊行되었으며 全書가 157篇이며 卷1은 癰疽門 卷2는 上部疽毒門 卷3은 下部癰毒門 卷4는 雜瘡門으로 構成되어 있는 外科書籍⁷⁾으로 外用藥이 應用된 疾病 分布를 살펴보면 癰疽門에 14例 上部疽毒門에 16例 下部癰毒門에 35例 雜瘡門에 65例의 外用藥 處方이 收錄되어⁸⁾ 下部癰毒門이나 雜瘡門에 外用藥이 多用 되었다.

外科正宗에 收錄된 外用藥의 施術 方法을 보면 藥物을 粉末하여 陣米 飴糖 醋 酒 水 蜜 等を 섞어서 配合하여 厚糊狀으로 만든 다음 患部에 붙이는 敷法이 18例, 비단이나 모시 종이 등에 발라 이것을 患部에 붙이는 貼法이 4例, 藥物을 달이고 찌꺼기를 除去 한 뒤에 黃丹 白蜡등을 넣어 膏藥을 만든 膏法이 16例, 藥物을 煎湯하여 洗滌하는 洗法이 24例, 直接藥物을 태운 煙氣 或은 藥을 달인 熱氣를 患處에 쏘이는 熏蒸法이 7例, 藥物을 煎湯하거나 膏로 만들어 患部에 칠하는 塗法이 3例, 藥劑를 微細하게 粉末하여 바르는 搽法이 21例, 藥劑를 微細하게 가루를 내어 뿌리는 摻法이 7例, 藥物을 가루로 내어 鼻腔이나 咽喉 部位에 붙여 넣는 吹法이 9例, 藥物로 局所를 摩擦하는 擦法이 7例, 藥物을 뜨겁게 하여 患部에 문지르는 熨法이 1例, 藥粉末을 漿液과 개어 棒을 만들어 瘡口에 插入하는 錠法이 1例, 작은 棒에 藥物을 묻혀 바르거나 直接 患部에 點滴하는 點法이 1例, 藥物을 細末하여 藥을 軟한 비단에 묻혀 患部를 두드리는 扑法이 1例 等 總 120例 中에 洗法이 24例(20%) 搽法이 21例(17.5%) 敷法이 18例(15%) 膏法이 16例(13%) 吹法이 9例(7.5%) 熏蒸法이 7例(5.8%) 摻法이 7例(5.8%) 等の 順으로 頻用되었다.

藥物의 劑型은 藥物을 製造하는 形式을 指稱하는 것으로 種類로는 湯 散 膏 丹 錠 片 露 霜 膠 茶 曲 餅 條³⁾ 등이 있는데 이들 劑型들은 各各 그 治療 特徵이 있고 臨床에서도 實用되고 있다. 外科正宗에는 湯 散 膏 丸 丹 飲 汁 末 餞 等の 劑型이 있는데 外用藥에 主로 使用된 散 膏 湯 丸 丹 等の 劑型을 爲主로 살펴보면 다음과 같다.

散劑는 內服과 外用의 두 가지가 있으며 內服用散劑는 藥物을 부드러운 가루로 만들어 茶湯 米飲 또는 酒를 使用하여 服用³⁾하며 外用散劑는 藥物을 부드러운 가루로 細末하여 患部에 뿌리거나 바르는 것으로 外科正宗에 收錄된 外用藥은 內消散 如意金黃散 鉛粉散 冰蠶散 神效吹喉散 冰硼散 通氣散 珍珠散 五倍子散 喚痔散 枯痔散 生肌散 人中白散 銀粉散 翠雲散 鵝黃散 碧雲散 銀杏散 雄黃藜蘆散 雄硫散 硃砂散 茴香草散 雌雄四黃散 畢撥散 玉眞散 如聖金刀散 紫土散 解毒雄黃散 蛇床子散 柏葉散 胡粉散 石珍散 玉肌散 紅綿散 三白散 鷄黃散 追風如聖散 冰硫散 枯礬散 翠雲錠 麥錢散 五香散 文蛤散 眞君妙貼散 柳花散 赴筵散 銀杏無憂散 密陀僧散 等 48個의 散劑가 收錄되어 있어 癰疽 發背 疔瘡 癩癧 喉風 時毒癩腫疼痛 臟毒 痔瘡 下疳 楊梅瘡 陰瘡 大麻風 鼻痔 紫白癩風 齒病 破傷風 金瘡 血風瘡 膿窠瘡 天泡 瘰癧瘡 瘋犬傷 紐扣風 小兒痘瘡 陰虱 等の 疾病에 散劑의 頻用度가 相當히 높았으며 그 應用範圍가 넓은 疾患이나 藥物의 塗布가 어려운 九竅의 瘡瘍에 많이 應用되었다.

膏劑는 內服과 外用 두 가지가 있는데 內服用膏劑는 煎 藥을 다시 달여 찌꺼기를 除去하고 은근한 불에 다시 달여 冰糖이나 蜜을 넣어 膏藥을 만든 것이며 外用膏劑는 油類를 가지고 藥物을 달이고 찌꺼기를 除去 한뒤 다시 黃丹이나 白蜡

等を 넣고 만든 것³⁾으로 外科正宗에 收錄된 膏劑는 回陽玉龍膏 冲和膏 鐵桶膏 加味太乙膏 生肌玉紅膏 化腐紫霞膏 紫霞膏 琥珀膏 大紅膏 秘傳斂瘡膏 追風逐濕膏 搗痔膏 生肌鳳雛膏 結毒靈藥方 太乙膏 神仙碧玉膏 單油膏 玉紅膏 散瘀疔痛膏 罌粟膏 乾坤一氣膏 狼毒膏 三香膏 土大黃膏 獨勝膏 灰米膏 潤肌膏 等27個가 收錄되어 腫瘍 癰癤 瘰癧 附骨疽 痔瘡 楊梅瘡 跌撲 腎囊風 臍瘡 頑癬 凍風 黑子 等の 疾病에 散劑 다음으로 多用되었다.

湯劑는 主로 內服에 쓰이나 外用으로서는 藥을 다려서 뜨겁게 熏하거나 洗하는 것으로 外科正宗에는 猪蹄湯 洗痔枳殼湯 起痔湯 洗痔腫痛方 塌痒湯 芎歸湯 二礬湯 蜈蚣錢 海艾湯 苦蔘湯 葱白甘草湯 等11例가 收錄 되었으며 癰疽 潰瘍 痔瘡 陰瘡 腎囊風 座癬瘡 等の 疾病에 利用되었다.

丸劑는 藥物을 갈아 細末로 하여 蜜 水糊 等으로 반죽하여 球形으로 크기에 따라 黍米大 綠豆大 梧桐子大 綠豆大 兔屎大 龍眼大 等³⁾이 있으며 外科正宗에서는 綉球丸 玉容丸 銅粉丸 等3個가 收錄되어 疥瘡 雀斑 屑風等에 利用되었다.

丹劑는 內服用과 外用 두 가지가 있으며 藥物을 부드러운 가루로 만들어 糊나 粘性藥汁으로 各種模樣을 만들어 內服하거나 外用하는 것으로 外科正宗에서는 立馬回疔丹 太乙紫金丹 等2例가 收錄되어 疔瘡에 使用되었으며 外用藥의 施術 方法에서 散劑 膏劑 湯劑에 비해 丸劑나 丹劑는 많이 應用되지 않았음을 알 수 있었다.

藥物에 使用된 副形劑로는 熏發背奇方 加味太乙膏 生肌玉紅膏 化腐紫霞膏 鉛粉散 紫霞膏 琥珀膏 追風逐濕膏 生肌鳳雛膏 解毒紫金膏 結毒靈藥方 罌粟膏 蛇床子散 麥錢散 潤肌膏에는 麻油, 內消散 敷藥方 如意金黃散에는 蜜, 回陽玉龍膏 冲和膏 太乙紫金丹 治乳使用方 追風如聖散에는 酒, 敷藥方

鐵桶膏 大紅膏에는 陣米, 立馬回疔丹에는 糊, 秘傳斂瘡膏 搗治膏에는 鷄蛋油, 火鍼法 蜈蚣錢에는 桐油, 乾坤一氣膏 狼毒膏 三香膏 文蛤散 敗銅散에는 香油, 土大黃膏 密陀僧散에는 醋, 冰硫散에는 猪油 등이 使用되었는데 麻油 香油 蜜 酒 陣米 桐油 鷄蛋油 醋 猪油 糊 等の 順序로 使用되었다.

外科正宗에서 外用藥으로 使用된 藥物로는 總 127 處方 중에서 總 藥物 565種類가 使用되었고 그 中 主藥으로는 輕粉이 30回, 白芷는 19回, 雄黃이 18回, 麝香이 14回, 乳香이 12回, 當歸가 11回, 川椒가 10回, 黃柏 硫黃等이 9回, 大黃이 8回, 甘草 血竭 石膏 等이 7回, 天南星 白附子 冰片 松香 等이 6回, 肉桂 獨活 明礬 羌活 沒藥 青黛 黃連 水銀 枯礬 白砒 黃丹 防風 等이 5回, 白芨 蒼朮 草烏 赤芍藥 銅綠 硃砂 細辛 川芎 蛇床子 杭粉 苦蔘 等이 4回, 穿山甲 獐冰 五倍子 蓖麻子 黃芩 木髓 朝腦 蟾酥 白礬 丁香 田螺 紫草 薄荷 朴硝 巴豆 梔子 苦蔘 生礬 狼毒 密陀僧 等이 3回, 天花粉 半夏 蕪艾 金頂砒 朱砂 木香 白殭蠶 硼砂 鬱金 華撥 海螵蛸 焰硝 人中白 鷄蛋 杏仁 荊芥 珍珠 綠豆 楓子肉 元蔘 生地黃 赤石脂 滑石 川槿皮 等이 2回, 金銀花 知母 貝母 車前子 薑黃 厚朴 陳皮 軍姜 紫荊皮 膽礬 紫蘇 連鬚葱 蜂房 阿魏 槐枝 柳枝 白占 人蔘 蜈蚣 黑鉛 山慈姑 千金子 大戟 琥珀 木通 銀朱 硝石 貓頭骨 硼砂 片腦 明粉 玄胡索 羊躑躅 龍骨 象皮 蒲公英 豨簽 麻黃 風藤 桂枝 枳殼 癩蝦蟆草 猬皮 食鹽 槐花 龍骨 熊膽 魚腥草 苦楝皮 馬齒 瓦楞花 堯花 壁錢 青缸花 鵝不食草 龍骨 威靈仙 鶴虱草 膽草 鳳凰皮 滑石 小茴香 楮實子 阿魏 天麻 赤芍 白芍 熟地 蓖麻仁 三稜 蓬朮 五靈脂 續斷 阿魏 皂礬 孩兒茶 柏葉 威靈仙 檳榔 黃栢 連翹 水獐肉 點紅椒 楓子肉 斑蝥 海桐皮 大楓子 枯礬 側柏葉 蚯蚓糞 赤豆 蛤粉 甘松 山柰 白薇 姜

蠶 藥本 天麻 檀香 菊花 紅棗肉 乾烟脂 花蕊石 蔥
白 粉草 川烏 沈香 檀香 零零香 黃蜡 文蛤 点紅
孩兒茶 乾薑 蘆薈 銅粉 銅青 官粉 石黃 등이 1회
使用되었는데 그 中 가장 많은 것으로는 輕粉이
30회 白芷는 19회 雄黃이 18회以上 使用되었다.
總 藥物 565種類 가운데 4 회以上 使用된 藥物의
藥性を 살펴보면 아래의<표1>과 같다.

肌止痛 通開竅 等の 效能을 가진 藥物이 外科正
宗에서는 多用 되었음을 알 수 있었다.

以上에서 外科正宗에 收錄된 外用藥은 局所의
疾患뿐만이 아니라 全身의 疾患에 多様な 方法으
로 應用되었고 施術 方法과 藥物의 副形劑도 多様
하여 現在의 局所의 皮膚 疾患이나 膏藥 爲主의
治療法에서 벗어나 좀더 多様な 方法으로 臨床에
實質的으로 活用 될 수 있는 外用藥에 對한 研究

藥物의 效能을 <표1>에서 考察하면 清熱解毒
活血祛瘀 祛風濕 散寒止痛 燥濕止痒 殺蟲解毒 生

가 좀 더 要望된다.

<표1> 外科正宗에 多用된 外用藥의 藥性

藥 物	效 能
輕 粉 ⁹⁾	寒有毒 味辛 外用 殺蟲 攻毒 斂瘡
白 芷	溫無毒 味辛 散風除濕 通竅止痒 消腫排膿
雄 黃	溫無毒 味辛 祛風濕 殺蟲解毒
麝 香	溫無毒 味辛 開經絡 諸通竅 透肌骨
乳 香	微溫無毒 味苦辛 通行12經 祛風伸筋 生肌止痛 調氣活血
當 歸	溫無毒 味甘辛苦 和血 散內寒 助心散寒 排膿止痛
川 椒	熱無毒 味辛 祛邪蟲 祛冷溫
黃 柏	寒無毒 味苦 清熱燥濕 瀉火解毒 退虛熱
硫 黃	熱有毒 除疥瘡 逐冷寒邪
大 黃	寒無毒 味苦 瀉熱通腸 涼血解毒 逐瘀經痛
甘 草	平無毒 味甘 和中緩急 調和諸藥 癰疽瘡瘍 解毒
血 竭	平無毒 甘鹹 散瘀生新 專除血痛 金瘡折跌
石 膏	大寒無毒 味辛苦 解肌清熱 生肌斂瘡 癰疽瘡瘍
天南星	溫有毒苦辛 治風痰 散堅結
白附子	溫有毒 味辛溫 治面病 血痺 風瘡 中風
冰 片 ¹¹⁾	涼無毒 味辛苦 開竅醒神 清熱止痛
肉 桂	大熱無毒 味辛苦 溫中平肝 疏通百脈 沈寒痼冷
獨 活	溫無毒 味辛苦 肩脾止痛 散腎經伏風
明 礬	寒無毒 味酸澁 解毒殺蟲 燥濕止痒
羌 活	溫無毒 味辛苦 瀉肝氣 搜肝風 散肌表風邪

藥 物	效 能
沒 藥	平無毒 味辛苦 通12經 散結氣 惡瘡痔漏消腫
青 黛	寒無毒 味寒 清熱解毒 涼血散腫
黃 連	寒無毒 味苦 瀉心火 鎮肝涼血 燥濕開鬱
水 銀	寒大毒 治疥證 殺蟲 絕胎孕
白 砒 ⁹⁾	緩有毒 治風痰 瘡疾 消沈痼
黃 丹	微寒 消積瘡 止痛 生肌 消痰蟲
防 風	微溫無毒 味辛苦 祛風濕 止汗 散頭目瘡瘍
白 芨 ¹⁰⁾	味寒無毒 味辛苦 逐瘀生新 清肺治咳
蒼 朮	溫無毒 味辛苦 調胃強脾 發汗除濕 逐痰水
草 烏	溫有大毒 味辛 搜風勝濕 開頑痰 治頑瘡
赤芍藥	平無毒 味苦 瀉肝火 散惡血 利小腸
銅 綠 ⁹⁾	平有毒 酸澀 退翳 去腐 斂瘡 殺蟲
硃 砂	性緩 味辛 喉腫 消痰 止嗽 癥結
細 辛	性溫味辛 通開竅 祛風濕痺
川 芎	溫無毒 味辛苦 諸開鬱 氣鬱血鬱 頭痛 癰疽瘡瘍
蛇床子	溫有小毒 味辛苦 補腎強壯 散寒祛風 燥濕殺蟲
杭 粉 ⁹⁾	微甘無毒 味淡 祛風益氣 瘡瘍出血 解酒毒
苦 參	寒無毒 味苦 諸熱毒風 生瘡 傷風下血

IV. 結 論

外科正宗에 收錄된 外用藥에 對한 文獻的 考察을 通하여 다음과 같은 結論을 얻었다.

1. 外用藥이 應用된 疾病 分布를 살펴보면 癰疽門에 14例 上部疽毒門에 16例 下部癰毒門에 35例 雜瘡門에 65例 等の 外用藥 處方이 收

錄 되었는데 그 中에 下部癰毒門과 雜瘡門에 多用 되었다.

2. 外用藥의 施術 方法으로는 總120 例 中에 洗法이 24例(20%) 搽法이 21例(17.5%) 敷法이 18例(15%) 膏法이 16例(13%) 吹法이 9例(7.5%) 薰蒸法이 7例(5.8%) 搨法이 7例(5.8%) 等の 順으로 頻用 되었다.
3. 外用藥에 使用된 劑型에는 主로 散 膏 湯 丸 丹 等の 劑型의 順序로 使用 되었는데

- 그 中에 散劑 膏劑가 많은 比重을 차지하였다
4. 藥物에 使用된 副形劑로는 麻油 香油 蜜 酒 陣米 桐油 鷄蛋油 醋 猪油 糊 等의 順序로 使用되었는데 그 中에 麻油 香油 蜜이 多用되었다
 5. 外用藥으로 使用된 藥物로는 總127 處方 中에서 總 藥物 565種類가 使用되었고 그 中 가장 많은 것으로는 輕粉이 30回 白芷는 19回 雄黃이 18回 以上 使用 되었다.
 6. 藥物의 效能으로는 清熱解毒 活血祛瘀 祛風 濕 散寒止痛 燥濕止痒 殺蟲解毒 生肌止痛 通開竅 等의 藥性を 가진 藥物이 多用되었다.

1983.

9. 新文豐出版公司：新編中藥大辭典，臺北，新文豐出版公司，1983.
10. 李尙仁：本草學，서울，修書院，p152，1981.
11. 金中鎬：大韓外官科學會誌，서울，누리문화사，p239，1997.

參考文獻

1. 大韓皮膚科學會：皮膚科學，서울，여문각，pp456-464，1990.
2. 辛광호：韓方外用藥，서울，열린책들，1994.
3. 康舜洙：方劑學，서울，癸丑文化社，pp27-31，1987.
4. 黃忠淵：大韓外官科學會誌，서울，누리문화사，1998.
5. 沈相龍：韓方食療解典，서울，創造社，pp222，1976.
6. 吳師機：理淪駢文，北京，人民衛生出版社，pp4-5，1984.
7. 金定濟：韓醫學大辭典，서울，東洋醫學研究院出版部，p122，1985.
8. 陳實功：外科正宗，北京，人民衛生出版社，