

암! 조기발견하면 예방할 수 있습니다

암 조기 발견 사례

- ◎ 폐 암…인천에 거주하는 문○○씨(남/62)는 한국건강관리협회 인천지부에서 폐암 유소견 판정 후 인하대병원에서 폐암 확진 받고 치료 중에 있다.
- ◎ 간 암…성남에 거주하는 강○○씨(여/46세)는 한국건강관리협회 중앙검진센터에서 간암 유소견 판정 후 여의도 성모병원에서 간암 확진을 받았다.
- ◎ 위 암…서울에 거주하는 김○○씨(남/67)는 한국건강관리협회 서울지부에서 위암 유소견 판정 후 여의도 성모병원에서 위암 확진 받고 수술 후 치료 중에 있다.
- ◎ 유방암…대구에 거주하는 임○○씨(여/43)는 한국건강관리협회 경북지부에서 유방암 유소견 판정 후 칠곡삼성병원에서 유방암 확진 받고 계명대 동산병원에서 수술 후 치료 중에 있다.
- ◎ 자궁암…광주에 거주하는 박○○씨(여/37)는 한국건강관리협회 광주·전남지부에서 자궁암 유소견 판정 후 전남대병원에서 자궁암 확진 받고 수술 후 치료 중에 있다.

한국건강관리협회 시·도지부
5대 암 검진 현황
(2001년 8월 현재)

팔호 안은 암 확진자(단위: 명)

지부	계	폐암 의심자	간암 의심자	위암 의심자	유방암 의심자	자궁암 의심자	비 고
서 울	11(4)	1(0)	3(1)	2(1)	0(0)	5(2)	
중 앙	16(4)	1(0)	3(1)	4(1)	7(2)	1(0)	
부 산	8(4)	0(0)	3(3)	2(1)	0(0)	3(0)	
대 구	26(2)	4(0)	7(1)	1(0)	0(0)	14(1)	
인 천	597(1)	61(1)	182(0)	320(0)	32(0)	2(0)	
울 산	37(0)	2(0)	13(0)	9(0)	13(0)	0(0)	
경 기	11(1)	1(1)	5(0)	3(0)	1(0)	1(0)	
강 원	7(0)	3(0)	3(0)	0(0)	0(0)	1(0)	
충 북	5(1)	0(0)	0(0)	2(0)	0(0)	3(1)	
충 남	18(2)	1(0)	3(0)	4(0)	1(1)	9(1)	
전 북	4(0)	0(0)	1(0)	2(0)	0(0)	1(0)	
전 남	22(4)	8(0)	4(1)	3(0)	4(2)	3(1)	
경 북	28(10)	2(0)	9(3)	9(5)	6(2)	2(0)	
경 남	8(3)	0(0)	1(0)	5(2)	1(0)	1(1)	
제 주	5(0)	0(0)	1(0)	3(0)	1(0)	0(0)	
총 계	803(36)	84(2)	238(10)	369(10)	66(7)	46(7)	
전월계	2,602(196)	310(13)	643(37)	954(53)	342(35)	353(58)	
누 계	3,405(232)	394(15)	881(47)	1,323(63)	408(42)	399(65)	

* 총 검사인원
618,906명

* 8월 검사인원
: 86,846명

* 확진자 : 0.04%

* 의심자 : 0.92 %

* 자궁경부암 확
진은 Class IV
이상

◎ 폐암이란

폐암은 비정상적인 세포가 암세포로 무질제하게 빠른 속도로 증식함으로써 발생한다. 폐암은 주로 한쪽 폐로부터

시작하여 임파절, 그리고 폐내의 다른 조직들로 전이되고, 결국은 양폐 모두로 확산되는데, 임파절이나 혈액을 통하여 몸 전체로도 확산될 수 있다. 폐암이 잘 전이되는 장기로는 뼈, 뇌, 간, 부신, 신장, 심장 등이 있다.

◎ 폐암의 원인

폐암의 95%가 들이마시는 공기 속의 발암물질에 의한 것이다.

폐암은 어느 암보다도 그 발생이유가 가장 분명하다. 즉, 대부분의 폐암 환자들은 흡연자이다. 그러나 모든 흡연자가 암에 걸리는 것은 아니며, 반대로 전혀 담배를 피우

지 않는 폐암환자들도 많이 있다. 하지만 담배는 여전히 폐암의 중요한 발암물질중의 하나이며, 폐암 판정을 받은 흡연자라면 담배를 반드시 끊어야 한다.



◎ 폐암의 증상

전형적인 폐암환자의 모습은 50~60대의 도시 주민으로 담배를 많이 피운 사람이다. 하지만, 30대 이하의 젊은 남자와, 흡연력이 전혀 없는 여성에게서 발견되기도 한다.

폐암은 증상이 전혀 없는 경우도 5%에 달하지만 일반적으로는 폐암의 자각증상으로 우선 식욕이 감소하고 체중이 줄며 권태와 피로, 호흡곤란 등을 느끼게 된다.

폐암의 초기에는 아래의 여러 가지 증상들이 나타난다.

● 기관지 폐 증상

잦은 기침과 가래가 많아 졌으며 피를 토하는 객혈을 한다. 잦은 호흡곤란과 호흡기 질환을 가져오며 가슴, 어깨 등의 통증을 수반한다.



● 폐장 외 흉곽내 증상

쉰 목소리가 나며 우상폐암의 폐암이 가장 큰 원인이다. 상대정맥의 압박으로 머리, 목 또는 상지에 부종이 생기고

(붓고), 그밖에 청색증, 두통, 의식 혼란 등이 오며 폐암이 흉벽으로 직접 침범할 경우 주로 흉벽의 통증이 생기고 팔을 따라 통증이 전달된다.

● 흉곽 외 전이 증상

신경증상과 뼈의 통증 또는 골절이 있다. 신경증상은 뇌전이 때문에 생기고, 반신마비, 간질, 성격변화, 의식혼란, 언어장애, 두통 등의 형태로 나타나며 뼈에는 골전이 생기고, 관절이 붓거나 통증이 있다.

● 기타의 증상들

부신생물증후군으로 폐암세포에서 만들어지는 성분들에 의해 빈뇨, 혼미, 혼수, 저혈당, 관절통, 저나트륨증 등이 나타난다.

◎ 폐암의 치료

폐암은 비소세포암과 소세포암으로 나눈다.

● 비소폐암의 치료

조기에 발견하여 절제 수술을 시행해야 한다. 그러나 대부분 진단 시기가 늦어 제 3기에 해당되기 때문에 절제가 가능한 경우는 수술 대상자 중 약 절반 정도이다. 3기 이후에는 화학요법과 방사선치료를 병행하여 치료해야 한다.

● 소폐암의 치료

대부분 항암제 치료를 시행한다. 국소적인 경우에는 외과적 절제를 시행할 수도 있으며 방사선 치료를 병행한다. 항암제 치료에 반응을 잘하지만 재발과 전이가 비소세포암보다 잘 나타난다.