

암! "조기발견하면 살 수 있습니다"


암 조기 발견 사례

- 폐 암...용인에 거주하는 양○○씨(남,51)는 한국건강관리협회 경기도지부에서 CT촬영과 객담검사후 폐암 유소견 판정을 받고 아주대병원에서 검사 결과 폐암 확진을 받아 치료를 받고 있다.
- 간 암...부산에 거주하는 최○○씨(남,53)는 한국건강관리협회 부산광역시지부 건강증진센터에서 간암 유소견 판정을 받고 고신대학병원 정밀검사결과 간암판정, 입원 치료를 받고 있다.
- 위 암...대전에 거주하는 남○○씨(남,36)는 한국건강관리협회 대전·충남지부에서 건강검사 결과 위암 의심 판정을 받고 충남대병원에서 위암으로 확진 수술 받을 예정이다.
- 유방암...대구에 거주하는 박○○씨(여,33)는 한국건강관리협회 대구광역시지부에서 건강검사결과 유방암 의심판정을 받고 경북대병원에서 유방암으로 확진 수술 받을 예정이다.
- 자궁암...광주에 거주하는 김○○씨(여,48)는 한국건강관리협회 광주·전남지부에서 자궁암 확진(calss IV) 판정후 전남대병원 진료중에 있다.

한국건강관리협회 시·도지부 5대 암 검진 현황(2000년 11월 현재)

괄호 안은 암 확진자
(단위: 명)

| 지부 | 계 | 폐암 의심자 | 간암 의심자 | 위암 의심자 | 유방암 의심자 | 자궁암 의심자 | 비고 |
|----|------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------------------------|
| 서울 | 7(1) | 1(-) | 1(-) | 1(1) | -(-) | 4(-) | * 총 검사인원: 270,437명 |
| 부산 | 36(4) | 2(-) | 2(1) | 9(1) | 5(-) | 18(2) | |
| 대구 | 21(4) | -(-) | 2(1) | 9(1) | 3(-) | 7(2) | *11월검사인원 26,861명 |
| 인천 | 2(1) | -(-) | -(-) | 1(1) | -(-) | 1(-) | *확진자:0.096% |
| 울산 | 13(-) | -(-) | -(-) | -(-) | -(-) | 13(-) | *의심자:0.605% |
| 경기 | 13(5) | 1(1) | 3(1) | 3(3) | 4(-) | 2(-) | *자궁경부암 확진은 Class IV 이상 |
| 강원 | 9(1) | 2(-) | 2(-) | 2(-) | 2(-) | 1(1) | |
| 충북 | 10(3) | 2(-) | 2(1) | 3(1) | 2(-) | 1(1) | |
| 충남 | 11(1) | 1(-) | -(-) | 1(1) | 2(-) | 7(-) | |
| 전북 | 9(-) | 2(-) | 1(-) | -(-) | 4(-) | 2(-) | |
| 전남 | 10(6) | 1(1) | -(-) | -(-) | -(-) | 9(5) | |
| 경북 | 8(-) | 4(-) | 1(-) | 2(-) | -(-) | 1(-) | |
| 경남 | 5(1) | -(-) | 3(1) | 2(-) | -(-) | -(-) | |
| 제주 | 3(1) | -(-) | -(-) | -(-) | 2(-) | 1(1) | |
| 총계 | 157(28) | 16(2) | 17(5) | 33(9) | 24(-) | 67(12) | |
| 누계 | 1,635(261) | 227(20) | 258(39) | 513(92) | 202(37) | 435(73) | |




폐암은 비정상적인 세포가 암세포로 무절제하게 빠른 속도의 증식으로 인해 발생한다. 폐암은 주로 한쪽 폐로부터 시작하여 임파절, 그리고 폐내의 다른 조직들로 전이되고, 결국은 양 폐 모두

로 확산되는데, 임파절이나 혈액을 통하여 몸 전체로도 확산될 수 있다.

폐암이 잘 전이되는 장기로는 뼈, 뇌, 간, 부산, 신장, 심장 등이 있다.

◎ 폐암의 원인



폐암의 95%가 들
이마시는 공기 속
의 발암물질에 의한
것이다.

폐암은 어느 암보다도 그
발생 이유가 가장 분명하다. 즉,
대부분의 폐암 환자들은 흡연자이
다. 그러나 모든 흡연자가 암에
걸리는 것은 아니며, 반대로
전혀 담배를 피지 않는 폐
암 환자들도 많이 있다.
하지만 담배는 여전히 폐
암의 중요한 발암물질중의
하나이며, 폐암 판정을 받은

흡연자라면 담배를 반드시 끊어야 한다.

◎ 폐암의 증상

전형적인 폐암환자의 모습은 50~60대의 도시
주인으로 담배를 많이 피운 사람이다. 하지
만, 30대 이하의 젊은 남자와, 흡연력이
전혀 없는 여성에게서 발견되기도 한다.

폐암은 증상이 전혀 없는 경우도
5%에 달하지만 일반적으로 폐암의
자각증상은 우선 식욕이 감소하고
체중이 줄며 권태와 피로, 호흡
곤란 등을 느끼게 된다.

폐암의 초기에는 아래의
여러 가지 증상들이 나타난
다.

● 기관지 폐 증상

짙은 기침과 가래가 많지며 피를 토
하는 객혈을 한다. 짙은 호흡곤란과 호흡기 질환
을 가져오며 가슴, 어깨 등의 통증을 수반한다.

● 폐장 외 흉곽내 증상

쉬운 목소리가 나며 위상폐염의 폐암이 가장 큰
원인이다. 상대정맥의 압박으로 머리, 목 또는 상
지에 부종이 생기고(붓고), 그밖에 청색증, 두통,
의식 혼란 등이 오며 폐암이 흉벽으로 직접 침범
할 경우 주로 흉벽의 통증이 생기고 팔을 따라 통
증이 전달된다.

● 흉곽 외 전이 증상

신경증상과 뼈의 통증 또는 골절이 있다. 신경
증상은 뇌전이 때문에 생기고, 반신마비, 간질, 성
격변화, 의식혼란, 언어장애, 두통 등의 형태로 나
타나며 뼈에는 골전이 생기고, 관절이 붓거나 통
증이 있다.

● 기타의 증상들

부신생물증후군으로 폐암세포에서 만들어지는
성분들에 의해 빈뇨, 혼미, 혼수, 저혈당, 관절통,
저나트륨증 등이 나타난다.

◎ 폐암의 치료

폐암은 비소세포암과 소세포암으로
나뉜다.

● 비소세포암의 치료

조기에 발견하여 절제 수술을 시행
해야 한다. 그러나 대부분 진단 시기가
늦어 제 3기에 해당되기 때문에 절
제가 가능한 경우는 수술 대상자
중 약 절반 정도이다. 3기 이후
에는 화학요법과 방사선치료를 병
행하여 치료해야 한다.

● 소세포암의 치료

대부분 항암제 치료를 시행한다. 국소적인 경우
에는 외과적 절제를 시행할 수도 있으며 방사선 치
료를 병행한다. 항암제 치료에 반응을 잘하지만 재
발과 전이가 비소세포암보다 잘 나타난다. 72

