



1. , [], []
[] [] . []
(G+C) C , ,
C . ,
(20 1,551) 99%가 C .
[] 가 ,
56% C
가 40% C 가 [C],
가 12 [] , ,
가 . [] , ,
가 . [] C, , L-
[] ,] ,
C, E, ,
가 , ,
hyaluronic acid , ()
[(G+C)[] , 가
[C[B[]

2.

2-2.

丸善製藥

[月桃葉

L-

가

C

乾燥

F][蓮胚芽

MF][紫玄米乾

燥

F]

3

皮膚纖維

芽

가

[月桃葉乾燥

F]

皮膚纖維芽

가

日本油脂가

[

].

2-1.

50%

興人

[

가

YH]

가

(

0.6% 가 ,

1/2). 一丸

가

[

5] (

lipofuscin

)

IL-1 ,

가

, [5]

가

興人

torulopsis

8%

15%

3.

3-1,

底 , , 有棘 , 基 3-2.

(hyaluronic acid)

가
40 50%

가

가

가

鷄冠

日本油脂 [N-]

가 , 가

가 []

가

가 22
6

(240mg/day)

가

粉

日本製

HA-F]

[

紀文

[S]

[

가

[

FCH]

RP]

S

6%

4%

RP

가

[

6%

FCH-A]

가

整腸

가,

[] 鷄冠 가

(5%) .

, 鷄冠 가 3-4.

가 補給

3-3.

가 가

硫酸, 가 가

[M] 가

가

伊藤

[]

甲陽 ()

가

[C-LAP]

가 . 32 , ,

1,500mg/day 6 가

가 , pH

《 》 36, 8, 18-21(2001)

