

子宮筋腫

宋 鍾錫

한약방 개업 17年동안 수많은 환자와 임상치료의 실패와 성공을 거듭해 왔습니다.

그중에 유독 子宮筋腫에 대하여 보잘 것 없는 실력이지만 그동안 임상경험을 토대로 의견을 정리하였습니다.

자궁근종의 연령층은 약20세에서 55세에 이르기까지 다양한 연령층에서 발생하며 간혹 10대에서도 발견됩니다

(1) 증상

無帶下(성교통), 不感症, 不妊, 生理血腫, 不定期的出血, 生理痛, 生理不順(月2回生理), 赤帶下症, 腰痛(朝), 下腹滿感, 특히 生理痛은 매달 더욱 심해지며 출산통보다도 더 痛症이 심함

모든 증상은 閉經後에 完和되거나 消失된다

(2) 원인

子宫흘몬(분비물 배출 부족) : 성관계나 출산시에 흘몬 분비물이 배출되어야 하는데 產兒제한(1~2名)으로 인하여 흘몬분비가 적으며 또한 규칙적인 성생활시 흘몬 분비가 되어야 하는데 오랜 금욕생활로 인하여 흘몬이 자궁벽에서 자라는 것이 子宮筋腫으로 특히 수녀와 비구니승려들은 자궁근종이 많이 발병한다 이에 반하여 규칙적인 성생활을 하더라도 不感症(분비물이 배출 안됨) 환자의 대다수는 자궁근종이 발병된다고 본다 (근종은 여성의 몸에서 자라지만 원인은 남성에게 있는 경우가 50%가 넘는다 특히 소양인 남성의 부인에게 특히 많다)

(3) 치료

근종치료는 여러 방법이 있지만 양방에서는 자궁절제 수술이 보편적으로 행하여

■ 子宮筋腫

지는데 이는 근본적인 치료가 않되고 2~3년 내로 다시 발병된다.

나는 증상치료와 원인치료 2가지를 하고 있다

증상치료는 下記 처방과 같이 破血, 通經 치료로 많은 자의 근종을 2차로 자궁 흘 몬분비 촉진제, 즉 불감증치료(일부)를 목적으로 자궁내 분비물을 많이 생성시켜 밖으로 분비되도록 하는 항법으로 원인치료를 하였습니다 즉 불감증 치료도 되고 자궁근종도 치료가되는 동시에 발생도 않는다.(또한 규칙적인 성 생활을 권한다.)

특히 위와 같은 방법을 이용하여 不妊症환자를 자신 있게 치료 하고 있다 不妊症에 대하여는 다음 기회에 발표를 하겠습니다.

(4) 처방

① 1方

別甲醋炒 香附子醋炒 各6g 黃芪 白朮 百茯苓 當歸尾 川芎 白芍 白芷 杜沖 厚朴 肉桂 乾姜 阿膠 小茴香 益母草 玄胡索 炙甘草 烏藥 牛膝 金銀花 牡丹皮 各4g 三棱 蓬朮 紅花 陳皮 工砂仁 木香 各2g 生干 三 大棗 二

② 2方

熟地黃 當歸身酒洗 柏子仁酒洗 杜沖 淤羊藿 各8g 牛膝酒洗 百合首烏 各6g 人蔘 白朮 黃精 肉桂 遠志 炙甘草 各4g

(香林堂韓藥房)