

東醫寶鑑 中 黃芩을 主藥으로 한 方劑의 치료영역, 病証, 主治, 病理 및 構成內容 調査

김형률 · 이장천¹

원광대학교 한의과대학 방제학교실, ¹상지대학교 한의과대학 본초방제학교실

Study on Therapeutic range, Symptom, Pathology, and composition of Radix Scutellariae-main blended Prescriptions from Donguibogam

Kim Hyoung Ryool, Lee jang cheon¹

Department of Oriental Medical Prescription Wonkwang University

¹Department of Oriental Medical Prescription Sangji University

There are total 403 prescriptions containing Radix Scutellariae in Donguibogam and among them, 106 prescriptions treat Radix Scutellariae as a principal medicine.

This report describes the study on therapeutic range, symptom, pathology and composition of 106 Radix Scutellariae-main blended Prescriptions from Donguibogam

The frequency and percentage of Radix Scutellariae-main blended prescriptions for the therapeutic range are as follows : cold symptom-complex is the most frequent(11 prescriptions, 10.37%) and gynecology is second(10 prescriptions, 9.43%).

The symptoms that Radix Scutellariae-main blended prescriptions are made out for are 70 prescriptions of 28 therapeutic ranges, for example, minor Eum physical appearance, fire of triple burners jaundice, etc.

The main pathologies that Radix Scutellariae-main blended prescriptions are being affected by cold, fire triple burners, dampness and heat, wind and heat, heat of heart and lung, heat of liver, heat of spleen, etc.

Through the research into the composition of Radix Scutellariae-main blended prescriptions, the kind of medicines and certain rules of compounding medicines centering on Radix Scutellariae are deduced as follows : The main combinations of herbal medicines are Radix Scutellariae and Fructus Gardeniae, Radix Scutellariae and Rhizoma Rhei, and Radix Scutellariae, Rhizoma cotidis and Fructus Gardeniae.

The main combinations of prescriptions are Yihwanghwan(Radix Scutellariae, Rhizoma Cotidis, Radix Glycyrrhizae), Boanbaekchulsan(Radix Scutellariae, Rhizoma Atractylodis macrocephalae), Sambohwan(Radix Scutellariae, Rhizoma Cotidis, Cortex Phellodendri), Samhwangwon(Radix Scutellariae, Rhizoma Cotidis, Rhizoma Rhei), Hwangryeonhaedoktang(Radix Scutellariae, Cortex Phellodendri, Rhizoma Cotidis, Fructus Gardeniae), Daegumhwahwan(Radix Scutellariae, Rhizoma Cotidis, Cortex Phellodendri, Rhizoma Rhei), Sanyeolumja(Radix Scutellariae, Rhizoma Cotidis, Radix Osterici koreani, Radix Ledebouriellae), etc.

Key word : Radix Scutellariae, Radix Scutellariae-main blended prescription, Donguibogam

교신저자: 이장천

상지대학교 한의과대학 본초방제학교실

Tel : 051-552-2501

접수 : 2002/5/12 수정 : 2002/6/1 채택 : 2002/6/20

I. 緒 論

黃芩은 脣形科(꿀풀과 ; Labiatae)에 속하는 다년생 草本인 黃芩(속썩은풀 ; *Scutellaria baikalensis* GEORGI) 및 同屬 近緣植物의 根을 말하며, 味는 苦하고 性은 寒無毒하며, 歸經은 肺·脾·胃·肝·大腸·小腸·膀胱·膽·三焦에 속하는 藥물이다.¹⁾²⁾

黃芩의 效能은 淸熱 瀉火 解毒 燥濕 安胎 止血하는 作用이 있어서 發熱, 口渴, 肺熱咳嗽, 瘡瘍癰腫, 泄瀉痢疾, 小便短赤, 黃疸, 熱淋, 胎動不安, 吐血, 衄血, 咳血, 便血, 血崩등을 治療하며 그밖에도 嘔吐·胸中逆氣·膈上熱痰·喘急·心下痞滿·目赤·齒痛·發斑·濕熱黃疸·傷寒·動脈硬化症·高血壓·急性傳染病·痘疹·乳腫·瘡毒등과 大便閉結·小便淋濁·少腹急脹·血熱·崩漏·胎動·譫語狂言등의 症狀과 여러 가지 급성 염증질환에 널리 활용되어 왔다.¹⁾³⁾

한편 黃芩의 藥理作用으로는 解熱·消炎·항알레르기 作用과 혈관을 확장시키고 血壓을 下降시키는 작용이 있다 하였으며 黃芩에 함유된 baicalin은 鎮靜作用을 하며 毛細血管의 透過性을 저하시키므로 止血하게 하고 Baicalin은 가수분해해서 baicalein 및 glucuronic acid가 되어 baicalein은 利尿作用을 하고, glucuronic acid는 解毒作用을 한다 하였다. 또 腸管에 대한 抑制作用을 나타내며 利膽과 血糖을 높이는 작용을 하며 광범위한 항균효과가 있어서 디프테리아균·포도구균·용혈성연쇄구균·페렴삼구균·수막염삼구균 및 티푸스균·적리균·백일해균에 대해 강한 抑制作用이 있다고 알려져 있다.⁴⁾

또한 黃芩은 配伍되는 藥物에 따라 그 효과가 다양한데, 黃芩이 白朮과 配伍되면 保安白朮散에서와 같이 安胎하고, 柴胡와 配伍되면 小柴胡湯에서와 같이 少陽經의 解熱作用이 있으며, 黃芩·黃連·梔子와 配伍되면 黃連解毒湯에서와 같이 解毒淸熱하는 作用이 있다. 또한 黃芩이 連翹·車前子와 配伍되면 淸心蓮子飲에서와 같이 淸熱利濕하는 作用이 있으며, 芍藥과 配伍되면 黃芩芍藥湯에서와 같이 治痢

作用이 있다. 이와 같이 黃芩은 配伍되는 藥物에 따라 효과가 다양하게 나타나며 이러한 配伍效果를 臨床에 多用하고 있다.⁵⁾⁶⁾

이에 저자는 東醫寶鑑에 收錄된 黃芩이 配伍된 方劑 403종 중에서 主藥으로 配伍된 106종을 조사하여, 黃芩이 主藥으로 사용된 方劑의 治療領域, 病證, 主治, 病理 및 方劑의 構成內容에 대한 조사를 통하여 황금의 임상활용에 대한 근거를 확립하고자 몇 가지 知見을 얻었기에 보고합니다.

II. 本 論

1. 黃芩이 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域에 관한 調査

(표 1-1)

病門	處 方	빈도수	백분율
寒	葛根解肌湯, 三黃熱艾湯, 黃芩湯, 麻黃杏仁飲, 陽毒升麻湯, 陶氏沖和湯, 附子瀉心湯, 芎蘇散, 陶氏導赤各半湯, 柴胡連翹湯, 黃連解毒湯	11	10.37%
	金匱當歸散, 芎連半夏湯, 黃芩湯, 白朮湯, 保安白朮散, 梔子大青湯, 茯神黃芪湯, 柴胡破瘀湯, 縮胎丸, 當歸散		
婦人	洗明散, 散熱飲子, 洗肝明目湯, 速效散, 羚羊角散, 車前散, 大明復光散, 石膏羌活散	8	7.54
眼	黃芩湯, 既濟淸神散, 加味金花丸, 大金花丸, 防風通聖散, 三補丸, 三黃元, 柴胡飲子	8	7.54
火	消風敗毒散, 涼血飲, 連翹飲, 綠雲膏, 散腫潰堅湯, 四黃散, 三黃散	7	6.60
諸瘡	芎連消毒飲, 既濟解毒湯, 普濟消毒飲子, 牛蒡芎連湯, 二黃湯, 五瘟丹, 人中黃丸	7	6.60
溫疫	淸肺湯, 河間生地黃散, 陶氏生地芎連湯, 麻黃升麻湯, 淸經湯, 解鬱湯	6	5.00
血	加減甘露飲, 升麻黃連丸, 三黃湯, 益膿湯, 葛黃飲子	5	4.71
口舌	加減龍薈丸, 荊芥連翹湯, 龍膽湯, 荊芥連翹湯	4	3.77
耳	三黃枳朮丸, 二黃丸, 九味牽連丸, 化痰淸化湯	4	"
內傷	淸熱導痰湯, 黃芩利膈丸, 竹瀝達痰丸, 滾痰丸	4	"
痰飲	內消升麻湯, 軟丹皮湯, 白芷升麻湯, 當歸羌活湯	4	"
癰疽	安神補心湯, 丑寶丸, 淸心滾痰丸, 黃連瀉心湯	4	"
神	桂枝芍藥湯, 淸脾飲, 人參載瘡飲	3	2.83
痰癰	茵陳大黃湯, 退黃散, 黃連散	3	"
黃疸	四物解肌湯, 通心飲	2	1.88
小兒	萬病元, 加味柴平湯	2	"
積聚			

病門	處方	빈도수	백분율
足	當歸拈痛湯, 神秘左經湯	2	1.88
皮	葛根橘皮湯, 梔子大青湯	2	"
諸傷	五黃散, 活血散	2	"
風	疎風順氣湯	1	0.94
胸	黃連消痞丸	1	"
小便	增味導赤散	1	"
嘔吐	神奇散	1	"
齒牙	當歸連翹飲	1	"
後陰	解毒湯	1	"
前陰	加味通心飲	1	"
聲音	柴胡升麻湯	1	"
합계		106	100%

(표 2-2)

病門	病 症	處 方	비고
諸瘡	有名無名諸惡瘡	涼血飲, 連翹飲	2
	癩癧	綠雲膏, 散腫潰堅湯	2
	天疱瘡	消風敗毒散	
	凍瘡	四黃散	
	疥癬	三黃散	
溫疫	大頭瘟	芩連消毒飲, 既濟解毒湯, 普濟消毒飲子, 牛蒡芩連湯, 二黃湯	5
	瘟疫	五瘟丹, 人中黃丸	2
血	衄血	陶氏生地芩連湯, 麻黃升麻湯, 清衄湯, 解鬱湯	4
	咳血嗽血唾血咯血	清肺湯, 河間生地黃散	
口舌	口臭	加減甘露飲, 升麻黃連丸	2
	口鹹	三黃湯, 益髓湯	2
	唇燥	瀉黃飲子	
內傷	食傷消導	三黃枳朮丸, 二黃丸	2
	吞酸吐酸	九味茱萸丸	
痰飲	嗜雜	化痰清化湯	
	熱痰	清熱導痰湯, 黃芩利膈丸	2
癰疽	痰塊	竹瀝連痰丸	
	痰飲通治	滾痰丸	
	附骨疽	內消升麻湯	
	肺癰	牡丹皮湯	
	臂癰	白芷升麻湯	
神	五發證癰疽	當歸羌活湯	
	癲癩	丑寶丸, 清心滾痰丸	
	怔忡	安神補心湯	
耳	癲狂	黃連瀉心湯	
	耳痛成膿耳	荊芥連翹湯	2
	耳鳴	加減龍蒼丸	
痰癰	耳聾	龍膽湯	
	六經癰	桂枝芍藥湯	
	痰癰	清脾飲	
	截癰	人參截癰飲	

2. 黃芩이 主藥으로 活用된 方劑의 病 症 調査

(표 2-1)

病門	病 症	處 方	비고
寒	少陰形證	三黃熟艾湯, 黃芩湯	2
	傷寒譫語鄭聲	柴胡連翹湯, 黃連解毒湯	2
	陽明形證	葛根解肌湯	
	傷寒表證	麻黃杏仁飲	
	傷寒陽毒	陽毒升麻湯	
	兩感傷寒	陶氏沖和湯	
	傷寒痞氣	附子瀉心湯	
	孕婦傷寒	芍藥散	
婦人	產後昏沈	陶氏導赤各半湯	
	感寒	保安白朮散, 梔子大青湯	2
	半產	金匱當歸散	
	惡阻	芩連半夏湯	
	胎漏胎動	黃芩湯	
	子痢	白朮湯	
	寡婦師尼	茯神黃芪湯	
	產後發熱	柴胡破癰湯	
眼	瘦胎令易產	縮胎丸	
	經斷復行	當歸散	
	外障	散熱飲子, 洗肝明目湯, 速效散, 羚羊角散, 車前散	5
	通治眼病	大明復光散, 石膏羌活散	2
熱	瞖膜	決明散	
	通治三焦火	加味金花丸, 大金花丸, 三補丸	3
	上焦熱	黃芩湯	
	中焦熱	既濟清神散	
	積熱	三黃元	
腎熱	柴胡飲子		

(丑 2-3)

病門	病 症	處 方	비고
黃疸	黃疸通治	茵陳大黃湯, 退黃散	2
	黃疸治法	黃連散	
小兒	發熱三朝	四物解肌湯	
	噤口撮口脾風證	通心飲	
積聚	積聚癥瘕痞癖痞塊通治	萬病元	
	痞塊證治	加味柴平湯	
足	脚氣	當歸拈痛湯, 神秘左經湯	2
皮	瘡疹	葛根橘皮湯, 梔子大青湯	2
諸瘡	杖傷	五黃散	
	金刀傷	活血散	
風	手足癱瘓	疎風順氣湯	
鼻	鼻淵	荊芥連翹湯	
胸	胸痞	黃連消痞丸	
小兒	血淋	增味導赤散	
嘔吐	嘔弱反胃	神奇散	
齒牙	蟲蝕痛	當歸連翹飲	
後陰	腸風臟毒	解毒湯	
前陰	疝疝藥	加味通心飲	
聲音	聲嘶	柴胡升麻湯	

(丑 3-2)

病門	病 症	處 方	主 治
眼	外障	散熱飲子	眼暴 赤腫疼痛
		洗肝明目湯	一切風熱 眼目赤腫疼痛
		速效散	努肉紅絲 紅白翳障 及白珠上有死血 紅筋 或上臉胞腫如桃 日夜疼痛昏暗
		羚羊角散	兩臉腫硬如桃李 開目不得
		車前散	肝經熱毒逆順生翳血灌瞳 人羞明多淚
	通治眼病	大明復光散	一切眼疾 內外障
		石膏羌活散	遠近內外翳障 風熱昏暗 爛弦赤眼 倒睫拳毛 一切目疾
	腎膜	決明散	風熱毒氣上攻 兩目腫痛 或生腎膜 或赤脈努肉蓋痒昏花漸成內障
		加味金花丸	三焦火 止嗽化痰 清頭目
	熱	通治三焦火	大金花丸
		三補丸	去三焦積熱 瀉五藏火
上焦熱		黃芩湯	心肺積熱口瘡咽痛小便淋瀝
中焦熱		既濟清神散	中焦熱 清上實下
積熱		三黃元	三焦積熱
腎熱		柴胡飲子	肝熱

3. 黃芩이 主藥으로 使用된 方劑의 病 症別 主治 調査

(丑 3-1)

病門	病 症	處 方	主 治
寒	少陰形證	三黃熱艾湯	傷寒大下 熱利不止
		黃芩湯	少陽半表半裏裏證多者宜用此
	傷寒譫語鄭聲	柴胡連翹湯	傷寒發熱 譫語呻吟 睡臥不得
		黃連解毒湯	傷寒 大熱 煩躁 不得眠 或差後 飲酒復劇者 及一切毒
	陽明形證	葛根解肌湯	陽明經病目疼鼻乾不得臥宜解肌
	傷寒表證	麻黃杏仁飲	傷寒 太陽經 發熱惡寒 頭痛 無汗 脈浮緊
	傷寒陽毒	陽毒升麻湯	傷寒陽毒 面赤 狂言 或見鬼 脈浮大數
	兩感傷寒	陶氏冲和湯	兩感傷寒 陰陽未分者 以此據之
	傷寒痞氣	附子瀉心湯	傷寒痞氣
	孕婦傷寒	芎蘇散	孕婦傷寒頭痛寒熱咳嗽
差後昏沈	陶氏導赤 各半湯	差後昏沈	
婦人	感寒	保安白朮散	孕婦傷寒 安胎
		梔子大青湯	妊婦熱病發癩
	半產	金匱當歸散	孕婦 宜常服養血清熱 素慣半產者 宜服 以清其源而無後患也
	惡阻	芩連半夏湯	惡阻病 胸背滿痛
	胎漏胎動	黃芩湯	胎動不安
	子痢	白朮湯	孕婦 下痢膿血
	寡婦節尼	茯神黃芪湯	寡婦節尼之病異乎妻妾
	產後發熱	柴胡破瘀湯	產後 因傷寒 熱病 熱入血室 或惡露不下者
	瘦胎令易產	縮胎丸	孕婦八九箇月用之 縮胎易產
	經斷復行	當歸散	婦人天癸已過期 經脈不勻 或三四月不行 或一月再至 腰腹疼痛

(丑 3-3)

病門	病 症	處 方	主 治
諸瘡	有名無名	涼血飲	血熱 生瘡
	諸惡瘡	連翹飲	惡瘡遍身 痛痒及血風瘡
	瘰癧	綠雲膏	瘰癧
		散腫潰堅湯	瘰癧 及馬刀瘡 堅而不潰 或潰出膿水
	天疱瘡	消風敗毒散	天疱楊梅瘡初起
凍瘡	四黃散	湯火熱油 所傷皮爛肉痛	
疥癬	三黃散	膿疱疥瘡 治熱爲主	
溫疫	大頭瘟治	芩連消毒飲	天行大頭病 咽喉腫痛
		既濟解毒湯	天行大頭 瘟頭 面赤腫而痛
		普濟消毒散	天行大頭瘟
	瘧疫治法	牛蒡芩連湯	大頭瘟 兼治啞痺
		二黃湯	大頭瘟初起
五溫丹	流行溫疫 及傷寒熱病熱瘧		
人中黃丸	四時疫癘		
血	衄血	陶氏生地芩連湯	鼻衄成流不止 失血過多 譫語 失神 閉目 撮空 不省人事
		麻黃升麻湯	傷寒 表未解 熱鬱作衄 俗呼謂紅汗
		清衄湯	衄血
	咳血嗽血 唾血咯血	解鬱湯	衄血
		清肺湯	痰後血是積熱也
河間生地黃散	鬱熱 吐咯唾血		
口臭	加減甘露飲	胃熱 口臭 口瘡牙	
	升麻黃連丸	口臭 穢惡 人不得近	
	三黃湯	脾熱 口甘	
口鹹	益髓湯	誤虛不決 髓虛 氣上益 口苦	
	瀉黃飲子	風熱 蘊於脾經 脾燥滲裂色	

(丑 3-4)

病門	病 症	處 方	主 治
內傷	食傷消導	三黃枳朮丸	傷肉食濕 麪厚味之物 悶亂不快
		二黃丸	傷熱 食痞悶不安
	吞酸吐酸	九味柴連丸	鬱積吞酸
	嘈雜	化痰清化湯	雜
痰飲	熱痰	清熱導痰湯	憎寒壯熱 頭目昏沈 氣上喘急 口出涎沫
		黃芩利膈丸	除胸中熱利膈上痰
	痰塊	竹瀝連痰丸	能運痰從大便出不損元氣妙
	痰飲通治	滾痰丸	濕熱痰積 變生百病
癰疽	附骨疽	內消升麻湯	附骨疽疎下後服此
	肺癰	牧丹皮湯	肺癰 胸乳間皆痛 嘔吐 膿血 氣作 腥臭
	臂癰	白芷升麻湯	臂癰
	五發證癰疽	當歸羌活湯	五發癰疽 膏梁熱鬱者最宜
神	癲癩	丑寶丸	一切癲癩 怔忡抽搐 難狀之疾
		清心滾痰丸	癲癩驚狂一切怪證專治痰火
	怔忡	安神補心湯	怔忡 驚悸
	癲狂	黃連瀉心湯	狂疾
耳	耳痛成膿耳	荊芥連翹湯	兩耳腫痛由腎經 有風熱
	耳鳴	加減龍蒼丸	痰火上升 耳鳴
	耳聾	龍膽湯	忿怒動膽火 致左耳聾

(丑 3-5)

病門	病 症	處 方	主 治
瘧瘧	六經瘧	桂枝芍藥湯	瘧 寒熱大作 此太陽陽明合病也 謂之大爭 寒熱作則必戰動 發熱則必汗泄
	瘧瘧	清脾飲	食瘧
	截瘧法	人參截瘧飲	虛人截瘧 宜用一切瘧並可截
黃疸	黃疸通治	茵陳大黃湯	傷寒大熱 發黃疸
		退黃散	黃疸 身面女金 小便如黃柏汁
	黃疸治法	黃連散	黃疸壅熱二便秘澀
小兒	發熱三朝	四物解肌湯	發熱
	噤口撮口臍風證	通心飲	旋蠟 風亦腫 而 痛甚 清心火 通小便 退潮熱
積聚	積聚瘕瘕瘵癰	萬病元	瘵七種癰塊 八種痞病
	痞塊通治藥	加味柴平湯	積塊有熱
足	腳氣治法	當歸拈痛湯	濕熱脚氣腫痛
		神秘左經湯	風寒暑 濕 流注足三陽經 脚膝拘攣 腫痛
皮	癩疹	葛根橘皮湯	冬溫發癩
		梔子大青湯	孕婦傷寒發癩變黑
諸傷	杖傷	五黃散	杖瘡止痛
	金刃傷	活血散	刀傷腹裂腸出者黃
風	手足攣攣	破風順氣湯	中風 半身不遂 或全體不能舉動
鼻	鼻淵	荊芥連翹湯	鼻淵

(丑 3-6)

病門	病 症	處 方	主 治
胸	胸痞	黃連消痞丸	心下痞久不愈
小便	血淋	增味導赤散	血淋澀痛
嘔吐	噎膈反胃	神奇散	噎膈反胃 血虛有火 三陽枯竭
齒牙	蟲蝕痛	當歸連翹飲	齒痛呬風痛甚開口臭穢
後陰	腸風膿毒	解毒湯	臟毒
前陰	癩疔藥	加味通心飲	小腸疝氣熱痛 小便不通
聲音	聲嘶	柴胡升麻湯	傷寒咳嗽聲嘶 或咽痛

4. 黃芩이 主藥으로 使用된 方劑의 病 理 調査

(丑 4-1)

病門	子 症	證 別 病 理	症 狀	處 方
寒	陽明形證	陽明經病	目疼鼻乾不得臥宜解肌	葛根解肌湯
	少陰形證	傷寒大下	熱利不止	三黃煎艾湯
		少陽半表半裏	裏證多者宜用此	黃芩湯
	傷寒表證	傷寒 太陽經	發熱惡寒 頭痛 無汗 脉浮緊	麻黃杏仁飲
	傷寒陽毒	傷寒陽毒	面赤 狂言 或見鬼 脉浮大數	陽毒升麻湯
	兩感傷寒	兩感傷寒	陰陽未分者 以此攘之	陶氏沖和湯
	傷寒痞氣	傷寒	痞氣	附子瀉心湯
	孕婦傷寒	孕婦傷寒	頭痛寒熱咳嗽	芎藭散
	傷寒	傷寒發熱	譫語呻吟 睡臥不得	柴胡連翹湯
		譫語鄭聲	傷寒 大熱	煩躁 不得眠 或差後 飲酒復劇者 及一切熱毒
火	上焦熱	心肺蘊熱	口瘡咽痛小便淋濁	黃芩湯
	中焦熱	中焦熱	清上實下	既濟清神散
		三焦火	止嗽化痰 清頭目	加味金花丸
	通治三焦火	三焦火	熱	大金花丸
		三焦積熱	瀉五藏火	三補丸
	通治火熱	熱風燥	諸風熱證	防風通聖散
	積熱	三焦積熱		三黃元
	腎熱	肝熱		柴胡飲子

(표 4-2)

病門	구분	관계病理	症狀	處方
血	咳血嗽血	積熱	先痰後血	清肺湯
	吐血咯血	鬱熱	吐咯唾血	河間生地黃散
	衄血	失血過多	鼻衄成流不止 語謬失神	陶氏生地芍蓮湯
傷寒表未解		熱鬱作衄 俗呼謂紅汗	麻黃升麻湯	
痰飲	熱痰	因內傷七情 以致痰迷心竅	憎寒壯熱 頭目昏沈 氣上喘急 口出涎沫	清熱導痰湯
		胸中熱	利膈上痰	黃芩利膈丸
	痰飲通治	濕熱痰積	變生百病	滾痰丸
口舌	口臭	胃熱	口臭 口瘡牙	加減甘露飲
	口鹹	脾熱	口甘	三黃湯
		謀慮不決 膽虛氣上溢	口苦	益膽湯
唇燥	風熱 蘊於脾經	唇燥裂無色	瀉黃飲子	
內傷	食傷消導	傷肉食濕 麪厚味之物	悶亂不快	三黃枳朮丸
		傷熱食	痞悶不安	二黃丸
	吞酸吐酸	鬱積	吞酸	九味棗蓮丸
眼病	瞽膜	風熱毒氣上攻	兩目腫痛 或生瞽膜	決明散
	外障	一切風熱	眼目赤腫疼痛	洗肝明目湯
		肝經熱毒	逆順生翳 血灌瞳人 羞明多淚	車前散

(표 4-3)

病門	구분	관계病理	症狀	處方
耳	耳鳴	痰火上升	耳鳴	加減龍薈丸
	耳痛成膿耳	腎經 有風熱	兩耳腫痛	荊芥連翹湯
	耳聾	忿怒動膽火	左耳聾	龍膽湯
諸瘡	諸惡瘡	血熱	生瘡	涼血飲
	凍瘡	湯火熱油	皮爛肉痛	四黃散
黃疸	黃疸通治	傷寒大熱	發黃疸	茵陳大黃湯
婦人	產後發熱	產後傷寒 熱入血室	熱病 惡露不下	柴胡破瘀湯
神	癲癩	痰火	癲癩驚狂一切怪證	清心滾痰丸
嘔吐	喧膈反胃	血虛有火 三陽枯竭	喧膈反胃	神奇散
足	脚氣	風寒暑濕 流注足三陽經	脚膝拘攣腫痛	神祕左經湯
後陰	腸風臟毒	臟毒		解毒湯
皮	斑疹	孕婦傷寒	發癩變黑	梔子大青湯
積聚	痞塊證治	積塊	有熱	加味柴平湯
孩疳	六經疳	太陽陽明合病	疳寒熱大作	桂枝芍藥湯
中風	手足癱瘓	因元氣虛弱 兼酒色之過 而更挾外邪也	中風 半身不遂 或全體不能舉動	疏風順氣湯

5. 黃芩이 主藥으로 使用된 方劑의 處方構成 內容調査

(표 5-1)

門	病症	處方	構 成	비 고
寒	少陰形證	三黃熱艾湯	黃芩 黃連 黃柏 熱艾 各一錢半	三補丸
		黃芩湯	黃芩 白芍藥各二錢 甘草一錢	黃芩芍藥湯
	傷寒 語謬鄭聲	柴胡連翹湯	柴胡 黃芩 枳殼 赤芍藥 桔梗 瓜蒌仁 梔子仁 連翹 黃連 黃 柏 甘草各八分	桔梗枳殼湯 黃連解毒湯
		黃連解毒湯	黃連 黃芩 黃柏 梔子 各一錢 二分半	三補丸
		葛根解肌湯	葛根 柴胡 黃芩 芍藥 羌活 石膏 升麻 白芷 桔梗 各一錢 甘草五分	黃芩芍藥湯 升麻葛根湯
	傷寒表證	麻黃杏仁飲	麻黃 桔梗 前胡 黃芩 陳皮 半夏製 各一錢 杏仁 細辛 各 八分 防風七分 甘草四分	三拗湯 二陳湯 甘桔湯
		陽毒升麻湯	黃芩二錢 升麻 射干 人參 各 一錢 犀角一錢半 甘草七分	
	兩感傷寒	陶氏沖和湯	羌活 蒼朮 防風 川芎 生地黃 黃芩 柴胡 乾葛 白芷 石膏 各一錢 細辛 甘草 各三分	九味羌活湯
	傷寒痞氣	附子瀉心湯	大黃 黃連 黃芩各二錢 剉附 子炮二錢 別煮作汁	三黃元
	孕婦傷寒	芍藥散	黃芩 前胡 麥門冬 各一錢 川芎 陳皮 白芍藥 白朮 各 八分 紫蘇葉 六分 乾葛 五 分 甘草 三分	古芍朮湯 香蘇散
	差後昏沈	陶氏導赤各半湯	黃芩 黃連 梔子 知母 麥門冬 茯苓 犀角 人參 滑石 各一錢 甘草五分	二黃湯 六一散

(표 5-2)

門	病症	處方	構 成	비 고
寒		保安白朮散	白朮 黃芩 各等分到新瓦上同 炒香	
		梔子大青湯	黃芩 升麻 梔子 各二錢 大青 杏仁 各五分	
半產	金匱當歸散	黃芩 白朮 當歸 川芎 白芍藥 各一兩	保安白朮散 四物湯類	
婦人 惡阻	考連半夏湯	黃芩一錢二分半 白朮 半夏 各一錢 赤茯苓七分半 黃連 陳皮 當歸 梔子 枳殼 香附 人參 蒼朮 縮砂 甘草 各五分	六君子湯 古芍朮湯 二黃湯	
		黃芩湯	黃芩 白朮 縮砂 當歸各一 錢半	保安白朮散
	子病	白朮湯	白朮 當歸 黃芩 各三錢	保安白朮散
寡婦節尼	茯神黃芪湯	茯神 羌活 蔓荊子 防風 薏苡 仁 黃芪 五味子 麥門冬 石菖 蒲 黃芩 各一錢 甘草 五分		

門	病症	處方	構成	비고
婦人	産後發熱	柴胡破瘀湯	柴胡 黃芩 半夏 甘草 赤芍藥 當歸 生地黃各一錢 桃仁 五 蠶脂各五分	柴胡四物湯
	瘦胎令 易産	縮胎丸	黃芩(夏一兩 春秋七錢 冬五 錢炒) 赤茯苓 七錢半 白朮 二兩 陳皮 三兩	保安白朮散
	經斷復行	當歸散	當歸 川芎 白芍藥炒條 黃芩 炒 各一兩 白朮 五錢	保安白朮散

(丑 5-3)

門	病症	處方	構成	비고
眼	外障	散熱飲子	防風 羌活 黃芩 黃連 各等分	
		洗肝明目湯	當歸尾 川芎 赤芍藥 生地黃 黃 連 黃芩 梔子 石膏 連翹 防風 荊芥 薄荷 羌活蔓荊子 甘菊 白 蒺藜 草決明 桔梗 甘草 各五分	二黃湯 黃芩芍藥湯 散熱飲子 生料四物湯
		速效散	黃連 黃芩 黃柏 梔子 連翹 薄 荷 荊芥 柴胡 當歸 生地黃 地 骨皮 天花粉 蔓荊子 甘菊 惡實 白蒺藜 草決明 石決明 枳殼 甘 草 各五分	三補丸 二黃湯 黃連解毒湯
		羚羊角散	羚羊角屑 防風 羌活 人參 赤茯 苓 升麻 大黃 車前子 玄參 黃 芩 各七分 梔子 細辛 各三分	
		車前散	密蒙花 甘菊 白蒺藜 羌活 草決 明 車前子 黃芩 草龍膽 甘草 各等分	
	通治 眼病	大明復光散	當歸尾酒洗 生乾地黃酒浸 黃柏 酒炒 黃連酒炒 黃芩酒炒 柴胡 白朮 枳殼 羌活 防風 荊芥 石 膏 甘菊 蟬退 車前子炒 密蒙花 白藜炒 木賊 青箱子炒 石決明 羚羊角屑 甘草 各五分	三補丸 車前散類 散熱飲子
		石膏羌活散	石膏 羌活 黃芩 礬花 密蒙花 木賊 白芷 羅葶子 細辛 廣仁 川芎 蒼朮 甘菊 荊芥 甘草 各 等分	
	瞖膜	決明散	石決明 草決明 黃芩 甘菊 木賊 石膏 赤芍藥 川芎 羌活 蔓荊子 甘草 各七分	黃芩芍藥湯

(丑 5-4)

門	病症	處方	構成	비고
火	通治 三焦火	加味金花丸	黃連 黃柏 黃芩 並酒炒梔 子 各一兩 大黃 煨人參 半 夏 桔梗 各五錢	黃連解毒湯 大金花丸
		大金花丸	黃連 黃柏 黃芩 大黃 各 等分	三補丸 三黃元
		三補丸	黃芩 黃連 黃柏 各等分	
	上焦熱	黃芩湯	澤瀉 梔子 黃芩 麥門冬 木 通 生地黃 黃連 甘草	二黃湯 導赤散
	中焦熱	既濟清神散	桔梗 黃芩 赤茯苓 川芎 梔 子 當歸 羌活 白朮 各一錢 知母 薄荷 甘草 各五分	
	積熱	三補丸	大黃煨 黃芩 黃連 各等分	三黃元
腎熱	柴胡飲子	柴胡 黃芩 人參 當歸 赤芍 藥 大黃 甘草各一錢	小柴胡湯類	
諸瘡	有名無名 諸惡瘡	涼血飲	赤芍藥 黃芩 川芎 荊芥 生 苳 麥門冬 天花粉 甘草 各 一錢	黃芩芍藥湯 理血湯
		連翹飲	連翹 赤芍藥 當歸 荊芥 防 風 惡實 川芎 梔子 黃芩 瞿麥 木通 生乾地黃 瓜麩 根 麥門冬 甘草各七分	生料四物湯
	瘰癧	綠雲膏	黃連 大黃 黃芩 玄參 黃柏 木鱉子肉 各一錢	三補丸 大金花丸
		散腫潰堅湯	黃芩一錢酒洗 半生半炒 草 龍膽 酒洗六錢 瓜麩根酒洗 黃柏酒炒 知母酒炒 桔梗 昆布 海藻 各七分 柴胡 六分炙 甘草 三稜酒 洗 蓬朮酒炒 連翹 各五分 葛根 白芍藥 當歸梢 各四分 黃連 酒洗 升麻 各三分	三補丸 升麻葛根湯

(丑 5-5)

門	病症	處方	構成	비고
諸 瘡	天癩瘡	消風散 毒散	當歸尾 川芎 赤芍藥 升麻 乾葛 黃芩 生地黃 各一錢 黃連 黃柏 連翹 防風 各八 分 羌活 金銀花 甘草 各五 分 蟬殼 二箇 初服加 大黃 二錢 芒硝 一錢半	三補丸 生料四物湯 類 金銀花散 升麻葛根湯
			凍瘡	四黃散
	疥癬	三黃散	黃芩 黃連 大黃 各三錢 蛇 床子 寒水石 各二錢 白礬 一錢 黃丹 五分 輕分 無名 異 白芷 木香 各三分	三黃元

門	病症	處方	構 成	비고
溫 疫	大頭瘟	芩連消毒飲	黃連 黃芩 柴胡 桔梗 川芎 荊芥 防風 羌活 枳殼 連翹 射干 白芷 甘草 各七分	二黃湯 散熱飲子
		既濟解毒湯	大黃酒儂 黃芩 黃連 並酒炒 桔梗 甘草 各一錢 升麻 柴胡 連翹 當歸身 各五分	三黃元 二黃湯
		普濟消毒飲子	黃芩 黃連 並酒炒 各五錢 人參 三錢 陳皮 桔梗 玄參 柴胡 甘草 各二錢 鼠粘子 馬勃 板藍根 (無卽用青黛) 連翹 各一錢 升麻 白殭蠶 各五分	二黃湯 小柴胡湯類
		牛蒡芩連湯	黃芩酒洗 二錢 黃連薑汁炒 桔梗 大黃酒蒸 石膏 各一錢 連翹 惡實 玄參 甘草 各一錢 荊芥 防風 羌活 各五分	三黃元 二黃湯 散熱飲子
		二黃湯	黃芩 黃連 並酒炒 甘草 各一錢	
	瘟疫治法	五瘟丹	黃連 黃芩 黃芩 甘草 各一分 香附 紫蘇葉	三補丸 二黃湯
人中黃丸		大黃 黃連 黃芩 人參 桔梗 蒼朮 防風 滑石 香附子 人中黃 各等分	三黃元	

(註 5-6)

門	病症	處方	構 成	비고
血	衄血	陶氏生地芩連湯	生地黃 黃芩 黃連 梔子 川芎 赤芍藥 柴胡 桔梗 犀角鎊 甘草 各一錢	四物湯類 甘桔湯
		麻黃升麻湯	麻黃 升麻 赤芍藥 黃芩 石膏 赤茯苓 甘草 各一錢	黃芩芍藥湯
		清衄湯	當歸 赤芍藥 生地黃 香附子 黃芩 梔子 側柏葉各一錢 黃連七分 赤茯苓 桔梗各五分 生甘草三分 藕節五箇	二黃湯 甘桔湯
	咳血嗽血 唾血咯血	解鬱湯	柴胡 黃連 黃芩 黃芪 地骨皮 生地黃 熟地黃 白芍藥各一錢	
		清肺湯	赤茯苓 陳皮 當歸 生地黃 赤芍藥 天門冬 麥門冬 黃芩 梔子 紫菀 阿膠珠 桑白皮 各七分 甘草 三分	黃芩芍藥湯
		河間生地黃散	枸杞子 柴胡 黃連 地骨皮 天門冬 白芍藥 黃芩 黃芪 生地黃 熟地黃 甘草各七分	二黃湯

門	病症	處方	構 成	비고
口臭	口臭	加減甘露飲	熟地黃 生地黃 天門冬 黃芩 枇杷葉 茵陳 枳殼 石斛 甘草 各一兩 犀角 三錢	
		升麻黃連丸	黃芩酒洗 二兩 黃連 一兩 生薑(取汁) 蓮花 青皮 升麻 各五錢 生甘草 三錢 白檀香 二錢	二黃湯
	口鹹	三黃湯	黃連 黃芩 梔子 石膏 芍藥 桔梗 陳皮 茯苓 各八分 白朮 甘草 各三分	甘桔湯 二黃湯 黃芩芍藥湯
		益鹽湯	黃芩 人參 甘草 各一錢 遠志 七分 官桂 五分 苦參 茯苓 各三分	
脣燥	瀉黃飲子	升麻 白芷 枳殼 黃芩 防風 半夏 石斛 各一錢 甘草 五分		

(註 5-7)

門	病症	處方	構 成	비고
內傷	食傷消導	三黃枳朮丸	黃芩 二兩 黃連酒炒 大黃煨 神麴炒 白朮 陳皮 各一兩 枳實 麩炒 五錢	枳朮丸 三黃元
		二黃丸	黃芩 二兩 黃連 一兩 升麻 柴胡 各三錢 枳實 五錢 甘草 二錢	二黃湯
	吞酸吐酸	九味茶連丸	蒼朮 黃連 黃芩三味並土炒 吳茱萸 陳皮 桔梗 茯苓 半夏 各一兩	茶連丸 二陳湯
痰飲	嗜雜	化痰清化湯	南星 半夏 陳皮 蒼朮 白朮 白芍藥 黃連 黃芩 梔子 知母 石膏各七分 甘草三分	白虎湯類 二黃湯 二陳湯類
		清熱導痰湯	黃連 黃芩 瓜蘆仁 南星炮 半夏製 陳皮 赤茯苓 桔梗 白朮 人參 各七分 枳實 甘草 各五分	二黃湯 六君子湯 瓜薑實丸類
	熱痰	黃芩利膈丸	生黃芩 炒黃芩各一兩 半夏製 黃連 澤瀉各五錢 南星炮 枳殼 陳皮各三錢 白朮二錢 白礬一錢今加蘿蔔子炒五錢 皂角一錢	導痰湯類 二陳湯類
痰飲	痰塊	竹瀝連痰丸	半夏薑製 陳皮去白 白朮微炒 白茯苓 大黃酒浸蒸晒乾 黃芩 各二兩 人參甘草灸 各一兩半 青礬石碎 二兩 煅硝 一兩同火煨如金色 沈香五錢	六君子湯 調胃升氣湯 滾痰丸
		痰飲通治	滾痰丸	大黃酒蒸 黃芩去朽 各八兩 青礬石 一兩同煅硝一兩入罐內蓋定 礬泥固濟晒乾 火煨紅 候冷取出 以礬石如金色爲度 沈香 五錢

(丑 5-8)

門	病症	處方	構 成	비고
癰疽	附骨疽	內消升麻湯	大黃 升麻 當歸 黃芩 赤芍藥 枳實 各一錢半 甘草一錢	
	肺癰	牡丹皮湯	牡丹皮 升麻 桔梗 薏苡仁 地榆 黃芩 赤芍藥 甘草生 各一錢三分	
	腎癰	白芷升麻湯	黃芪 酒黃芩各四錢 生黃芩三錢 白芷一錢半 升麻 桔梗 連翹各一錢 酒紅花 甘草各五分	
	癰疽五發	當歸羌活湯	當歸 黃芩 黃連 並酒製 各一錢半 酒黃芩 連翹 防風 羌活 梔子 甘草 各七分 獨活 藥本 五分 澤瀉 三分	二黃湯 黃連解毒湯 散熱飲子
神	癲癩	丑寶丸	大黃酒拌九蒸九晒 黃芩炒 各二兩 膽星石菖蒲 各一兩 白檀露薑汁炒 七錢 辰砂 六錢 爲衣 青礬石煨 天麻 薑汁炒 歸殼 各五錢 沈香 犀角 各一錢半 琥珀 雄黃 各一錢 牛黃 五分 猪心血二箇	
		清心滾痰丸	大黃酒蒸 黃芩 各四兩 青礬石同煨硝煨如金色 犀角 皂角 朱砂 水飛 各五錢 沈香二錢 半麝香五分	
	怔忡	安神補心湯	當歸 生地黃 茯神 黃芩 各一錢二分 麥門冬二錢 白芍藥 白朮 各一錢 遠志 酸棗仁炒 各八分 川芎七分 玄參五分 甘草三分	四物湯
	癲狂	黃連瀉心湯	黃芩二兩 黃連 生地黃 知母各一兩 甘草五錢	二黃湯

(丑 5-9)

門	病症	處方	構 成	비고
耳	耳痛成膿耳	荊芥連翹湯	荊芥 連翹 防風 當歸 川芎 芍藥 柴胡 枳殼 黃芩 梔子 白芷 桔梗 各七分 甘草五分	桔梗枳殼湯 生料四物湯類 四逆散類
	耳鳴	加減龍膏丸	草龍膽酒洗 當歸酒洗 梔子炒 黃芩 青皮 各一兩 大黃酒蒸 青黛 柴胡 各五錢 蘆薈 牛膽南星 各三錢 木香 二錢半 麝香五分	
	耳聾	龍膽湯	黃連 黃芩 梔子 當歸 陳皮 牛膽南星各一錢 草龍膽 香附子 各八分 玄參七分 青黛 木香各五分 乾薑炒黑三分	
痰	六經癰	桂枝芍藥湯	桂枝 一錢 赤芍藥 知母 石膏 黃芩 各二錢	白虎湯類
	痰痞	清脾飲	柴胡 半夏 黃芩 草果 白朮 赤茯苓 厚朴 青皮各一錢 甘草五分	柴平湯
癰	截癰法	人參截癰飲	人參 白朮 白茯苓 當歸 青皮 厚朴 柴胡 黃芩 知母 常山酒浸 草果 鱉甲醋炙 各八分 桂枝 甘草 各三分	四君子湯 小柴胡湯 清脾飲
	黃疸通治	茵陳大黃湯	茵陳 梔子 柴胡 黃芩 升麻 大黃 各一錢 草龍膽五分	茵陳蒿湯
黃疸	黃疸治法	退黃散	柴胡 升麻 草龍膽 茵陳 黃連 黃芩 梔子 黃柏 木通 滑石 各一錢 甘草 五分	茵陳蒿湯類 六一散 黃連解毒湯
	黃疸治法	黃連散	大黃醋炒一兩 黃芩 黃連 甘草各一兩	三黃元 二黃湯

(丑 5-10)

門	病症	處方	構 成	비고
小兒	發熱三朝	四物解肌湯	升麻葛根湯 去甘草 代黃芩也	
	噤口撮口 脾風證	通心飲	連翹 木通 瞿麥 梔子仁 黃芩 甘草 各四分	
積聚	積聚癥瘕 痰癖痞塊 通治	萬病元	芍藥 川椒 肉桂 芎藭 乾薑 防風 巴豆霜 當歸 犀角鎊 桔梗 芫花 醋炒 赤茯苓 人參 黃芩 黃連 桑白皮 蒲黃 前胡 大戟 葶藶子 炒 麝香 細辛 雄黃 朱砂 紫菀 禹餘糧醋 泔研水飛 甘遂 牛黃 各一兩	
	痞塊證治	加味柴平湯	柴胡 黃芩 半夏 蒼朮 厚朴 陳皮 山楂肉 青皮 枳殼 神麴 三稜 蓬朮 各七分 甘草五分	柴平湯類
足	脚氣	當歸拈痛湯	羌活 茵陳 酒炒 黃芩酒炒 甘草炙 各一錢 知母 澤瀉 赤茯苓 猪苓 白朮 防己 各六分 人參 苦參 升麻 乾葛 當歸 蒼朮 各四分	君苓湯
		神祕左經湯	麻黃 桂心 黃芩 枳殼 柴胡 赤茯苓 半夏 羌活 防風 厚朴 白薑 小草 防己 麥門冬 乾葛 細辛 甘草 各五分	小柴胡湯類
皮	斑疹	葛根橘皮湯	葛根 橘皮 杏仁 知母 黃芩 麻黃 甘草 各一錢	三拗湯
		梔子大青湯	梔子 大青 黃芩 各一錢半 升麻 一錢 杏仁 八分	

(丑 5-11)

病門	病症	處方	構 成	비고
諸傷	杖傷	五黃散	黃丹 黃連 黃芩 黃柏 大黃 乳香 各等分	大金花丸
	金刃傷	活血散	當歸 川芎 白芷 續斷 赤芍藥 鹿茸 黃芩 細辛 乾薑 附子炮 各等分	芎藭湯
風	手足癱瘓	疏風順氣湯	人參 防風 麻黃 羌活 升麻 桔梗 石膏 黃芩 荊芥穗 天麻 南星 薄荷 葛根 芍藥 杏仁 當歸 川芎 白朮 細辛 皂角 各五分	升麻葛根湯
		黃連消痞丸	黃芩 黃連炒 各六錢 枳實 炒 五錢 半夏製 四錢 薑黃 白朮 澤瀉 各三錢 人參 陳皮 厚朴 各二錢 猪苓 一錢半 縮砂 乾薑 神麴 甘草 各一錢	二黃湯 六君子湯 枳朮丸 平胃散
小便	血淋	增味導赤散	生乾地黄 木通 黃芩 車前子 梔子仁 川芎 赤芍藥 甘草 各一錢	導赤散

病門	病症	處方	構 成	비 고
嘔吐	噎膈反胃	神奇散	當歸 川芎 白芍藥 生地黃並酒炒 陳皮 縮砂半夏 白茯苓 白朮土炒 香附子 枳實 烏梅肉 藿香 赤茯苓 檳榔 木通 猪苓 黃芩炒 黃栢 人乳炒 知母人乳炒 赤芍藥 天門冬 麥門冬 甘草各五分	知柏四物湯 二陳湯 枳朮丸
齒牙	蟲蝕痛	當歸連翹飲	當歸 生地黃 川芎 連翹 防風 荆芥 白芷 羌活 黃芩 梔子 枳殼 甘草 各七分 細辛 三分	生料四物湯類
後陰	腸風臟毒	解毒湯	黃連 黃芩 黃栢 梔子 連翹 槐花炒 各一錢 細辛 甘草各五分	黃連解毒湯
前陰	橫痃藥	加味通心飲	瞿麥 木通 梔子 黃芩 連翹 枳殼 川棟子 甘草 各一錢	通心飲
聲音	聲嘶	柴胡升麻湯	柴胡 黃芩 半夏 升麻 乾葛 枳實 桔梗 知母 貝母 玄參 桑白皮 甘草各七分	小柴胡湯類 升麻葛根湯

Ⅲ. 考 察

1. 黃芩이 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域에 대한 調査

黃芩이 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域에 대한 處方頻度數와 百分率을 조사해보면, 寒門 11(10.37%), 婦人門 10(9.43%), 眼門 8(7.54%), 火門 8(7.54%), 諸瘡門 7(6.60%), 溫疫門7(6.60%), 血門 6(5.00%), 口舌門 5(4.71%)이 內傷門, 痰飲門, 癰疽門, 神門이 각각 4(3.77%), 痲痺門, 黃疸門 이 각각 3(2.83%), 小兒門, 積聚門, 足門, 皮門, 諸傷門이 각각 2(1.88%), 風門, 胸門, 小便門, 嘔吐門, 齒牙門, 前陰門, 後陰門, 聲音門이 각각 1(0.94%)의 順으로 조사되었다.

이중 頻度數 85%이상을 차지하는 順은 小兒門까지이며, 76%이상을 차지하는 順은 神門까지이다. 따라서 處方引用頻度數 3종이상 까지를 종합하여 고찰하면 黃芩이 主藥으로 活用된 方劑의 病症, 主治, 病理 등의 活用に 대한 主流을 이룰것으로 생각된다. (표1-1, 1-2)

한편 治療領域을 疾患別로 分類해보면 內傷, 諸瘡,

溫疫, 癰疽, 痲痺, 猪疾, 黃疸, 積聚, 諸傷, 嘔吐 등이 있고, 原因別로 分類해보면 寒, 火, 痰飲, 風 등이 있으며, 人體部位別로 分類해보면 眼, 口舌, 足, 皮, 胸, 齒牙, 前陰, 後陰 등이 있고, 性別과 老少別로 分類해보면 婦人, 小兒가 있고, 生理機能作用別로 分類해보면 神, 血, 小便, 聲音 등으로 구분할 수 있다.

2. 黃芩이 主藥으로 配伍된 方劑의 病症 調査

寒門의 黃芩이 主藥으로 使用된 處方に 관계되는 病症을 열거하면 少陰形證, 傷寒譫語鄭聲, 陽明形證, 傷寒表證, 傷寒陽毒, 兩感傷寒, 傷寒痞氣, 孕婦傷寒, 差後昏沈 등으로 조사되었으며, 少陰形證, 傷寒譫語鄭聲에 사용한 處方이 각각 2개로써 가장 많은 頻度數를 나타내었다.

婦人門에서는 感寒, 半產, 惡阻, 胎漏胎動, 子痢, 寡婦師尼, 產後發熱, 瘦胎令易產, 經斷復行 등의 症狀이 조사되었으며, 感寒에 사용한 處方이 2개로써 가장 많은 頻度數를 나타내었다.

眼門에서는 外障, 通治眼病, 瞽膜 등이 조사되었으며, 外障에 5종, 通治眼病에 2종의 黃芩連系方이 사용되고 있다.

火門에서는 通治三焦火, 上焦熱, 中焦熱, 積熱, 腎熱 등의 病症이 조사되었으며, 이중 通治三焦火의 處方引用頻도가 3종으로 나타났다.(표2-1)

諸瘡門에서는 惡瘡, 癰癤, 天疱瘡, 凍瘡, 疥癬 등의 病症이 조사되었고, 溫疫門에서는 大頭瘟는 5종, 瘟疫에는 2종의 處方이 活用되는 것으로 조사되었고, 血門에서는 衄血에 4종, 咳嗽, 咯唾血 2종의 處方이 조사되었다.

口舌門에서는 口臭, 口鹹, 脣燥증이, 內傷門에서는 食傷消導, 吞酸吐酸, 嘈雜 증이, 痰飲에는 熱痰, 痰塊, 癰疽門에서는 附骨疽, 肺癰, 腎癰, 五發症이, 神門에서는 癰癩, 怔忡, 癡狂, 耳門에서는 耳痛, 耳鳴, 耳聾이, 痲痺門에서는 六經痛, 痲痺 등이, 그밖에도 黃疸, 發熱, 噤口撮口臍風, 積聚, 痲癖, 痞塊, 脚氣,

瘰癧, 杖傷, 金刃傷, 手足癱瘓, 鼻淵, 胸痞, 血淋, 噎膈反胃, 蟲蝕痛, 腸風臟毒, 瘡疔, 聲嘶 등이 조사되었다.(표2-2, 2-3)

따라서 黃芩이 主藥으로 配伍된 方劑의 病症은 少陰形證, 傷寒譫語鄭聲, 陽明形證, 傷寒表證, 傷寒陽毒, 兩感傷寒, 傷寒痞氣, 孕婦傷寒, 差後昏沈, 經斷復行, 半產, 惡阻, 胎漏胎動, 子痢, 寡婦師尼, 產後發熱, 瘦胎令易產, 外障, 腎膜, 三焦火, 上焦熱, 中焦熱, 積熱, 腎熱, 諸惡瘡, 瘰癧, 天庖瘡, 凍瘡, 疥癬, 大頭瘟, 瘟疫, 衄血, 咳血嗽血唾血咯血, 口臭, 口鹹, 脣燥, 舌酸吐酸, 嘈雜, 熱痰, 痰塊, 痰飲, 附骨疽, 肺癰, 腎癰, 癰疽五發證, 癩癧, 怔忡, 癲狂, 耳痛成膿耳, 耳鳴, 耳聾, 痰痛, 黃疸, 發熱三朝, 噤口瘡口臍風證, 積聚癥瘕痞痞痞塊, 脚氣, 癩疹, 杖傷, 金刃傷, 手足癱瘓, 鼻淵, 胸痞, 血淋, 噎膈反胃, 蟲蝕痛, 腸風臟毒, 瘡疔, 聲嘶 등 70개 症狀이 조사되었다.

3. 黃芩이 主藥으로 配伍된 方劑의 病症에 대한 主治調査

傷寒門에서는 熱利, 譫語, 煩躁, 鼻乾, 發熱惡寒, 狂言, 痞氣, 寒熱咳嗽, 差後昏沈이 대표적 主治症이며, 婦人門에서는 孕婦傷寒, 半產, 惡阻, 胎動, 子痢, 熱入血室, 縮胎易產, 調經에 관한 症狀들이 調査되었다(표3-1)

眼病에서는 目赤疼痛, 努肉紅絲, 紅白腎障, 兩臉硬腫, 昏暗 등의 主治症狀이, 火門에서는 口瘡咽痛小便淋瀝, 清頭目, 止嗽化痰을 비롯한 三焦積熱 症狀이 조사되었다.(표3-2)

諸瘡門에서는 生瘡, 遍身痛痒, 瘰癧, 堅而不潰, 潰出膿水, 皮爛肉痛, 膿疱疥瘡, 溫病에서는 大頭瘟증상인 咽喉腫痛, 面赤腫痛, 啞痺이, 血門에서는 鼻衄血, 吐咯唾血, 口舌門에서는 口臭, 口瘡, 口甘, 脣熱 등의 主治症狀이 조사되었다.(표3-3)

內傷에서는 食痞, 舌酸, 嘈雜 등이, 痰飲에서는 憎寒壯熱, 頭目昏沈, 氣上喘急, 口出涎沫, 利隔上痰 등이, 肺癰에서는 胸乳間痛, 嘔吐, 膿血, 氣作腥臭 主治

症이, 神門에서는 怔忡搖擗, 癩癧驚狂 등이, 耳門에서는 兩耳腫痛, 耳鳴, 耳聾 症狀이 조사되었다(표3-4)

그밖에도 瘧疾, 黃疸, 瘡, 發熱, 噤口, 發斑, 積塊, 濕熱, 脚氣, 腫痛, 脚膝, 拘攣, 心下痞, 血淋, 澀痛, 噎膈反胃, 齒痛, 疝氣, 聲嘶咽痛 등의 主治症狀이 조사되었다.(표3-5, 3-6)

4. 黃芩이 主藥으로 配伍된 方劑의 病理調査

寒門에서 사용된 病理는 傷寒에 관계된 것으로 太陽, 陽明, 少陽, 表, 陽毒, 兩感, 孕婦, 傷寒痞, 傷寒熱 등이 조사되었고, 火門에서는 中焦熱, 三焦火, 三焦積熱, 心肺蘊熱, 肝熱 등의 病理가 조사되었다.(표4-1)

血門에서는 積熱, 鬱熱, 失血과 傷寒表未解, 痰飲에서는 內傷七情으로 인한 痰迷心竅, 胸中熱, 濕熱痰積, 口舌門에서는 胃熱, 脾熱, 謀慮不決 膽虛 氣上溢, 風熱 蘊於脾經의 病理가 조사되었으며, 內傷에서는 傷肉食濕 麪厚味之物, 傷熱食, 鬱積 病理가, 眼病에서는 風熱 및 肝經熱毒 病理가, 耳病에서는 痰火上升, 腎經 有風熱, 膽火의 病理가, 諸瘡에서는 血熱, 湯火熱油의 病理가, 그밖에도 黃疸에서는 傷寒大熱, 產後發熱은 熱入血室, 癩癧은 痰火, 噎膈反胃는 血虛有火, 脚氣는 風寒暑濕流注足三陽經, 腸風臟毒인 臟毒, 斑疹인 孕婦傷寒, 痞塊인 積塊, 六經瘡인 太陽陽明合病, 中風手足癱瘓인 元氣虛弱 酒色之過 挾外邪의 病理가 조사되었다.(표4-2)

종합해보면 太陽, 陽明, 少陽의 傷寒病理와 三焦火 및 積熱 五臟熱 風熱 痰火 등이 主가 된 病理에 黃芩이 君藥으로 配伍된 處方이 多用되는 것으로 조사되었다.

5. 黃芩이 主藥으로 使用된 方劑의 處方構成 內容調査

寒門에서 傷寒表證에 사용한 麻黃杏仁飲은 二陳湯과 甘桔湯, 三拗湯은 基本方으로 前胡, 細辛, 防風을 配伍한 것으로 볼 수 있으며, 兩感傷寒에 사용한 陶氏沖和湯은 九味羌活湯에 柴胡, 乾葛, 石膏로 配伍한 것이며, 陽明證에 사용한 葛根解肌湯은 升麻葛根湯과 黃芩芍藥湯을 合方하고, 柴胡, 羌活, 石膏, 白芷, 桔梗 등을 配伍한 것으로 볼 수 있다.

少陰證裏症에 사용한 三黃熟艾湯은 三補丸에 (黃芩, 黃連, 黃芩) 艾葉을 加味한 것이며, 傷寒 諸語에 柴胡連翹湯을 使用하고 있는데, 이는 桔梗枳殼湯과 黃連解毒湯을 合方하고, 赤芍藥, 瓜蒌仁, 柴胡, 連翹를 加味한 것으로 볼 수 있다. 傷寒痞症의 附子瀉心湯은 三黃元(大黃, 黃連, 黃芩)에 附子를 配伍한 것이며, 孕婦傷寒의 芎藭散은 古芎朮湯(保安白朮散)에 香蘇散을 合하고, 前胡, 麥門冬, 川芎, 白芍藥, 葛根을 加味한 것으로 볼 수 있다. 差後昏沈에 使用한 陶氏導赤各半湯은 二黃湯과 六一散에 知母, 麥門冬, 茯神, 犀角, 人參을 加味한 것으로 볼 수 있다. (표 5-1)

이와 같이 傷寒에서 使用한 方劑들에서 黃芩은 주로 清熱解毒作用을 할 수 있는 二黃湯, 三補丸, 黃連解毒湯, 黃芩芍藥湯 등의 基本方을 中心으로 合方을 하여 使用하고 있음을 알 수 있다.

婦人門의 임신질환에서는 安胎가 가장 重要하므로 黃芩과 白朮이 配伍된 古芎朮湯, 保安白朮散을 基本方으로 使用하고 있으며, 그밖에 血症의 基本方인 四物湯을 病症에 따라 配伍하기도 하였다. (표 5-2)

眼病에서는 肝經에 風熱이 盛하여 각종 眼疾이 발생하므로 眼暴赤疼痛 基本方인 散熱飲子(防風, 羌活, 黃芩, 黃連), 清熱瀉火하는 二黃湯(黃芩, 黃連, 甘草) 黃連解毒湯, 肝經을 補益하는 四物湯類 等に 眼部에 引經藥인 甘菊, 白蒺藜, 草決明, 石決明 등을 配伍하여 使用하고 있다. 또한 羚羊角, 密蒙花, 木賊 등을 活用하고 있는 것도 특이할 만하다.(표5-3)

火門의 三焦火, 上焦熱, 中焦熱, 積熱症에 使用한 二黃湯, 三補丸, 黃連解毒湯, 大金花丸등은 모두 黃芩의 清熱瀉火作用을 이용한 方劑이기 때문에, 構成藥物도 모두 黃芩, 黃連, 黃芩, 梔子, 大黃 등을 基本으로 하고 있으며, 黃芩을 제외한 나머지 藥物들도 黃芩의 作用을 보좌하는 것으로 볼 수 있다. 腎熱에 使用한 柴胡飲子에서는 黃芩에 柴胡를 配伍한 小柴胡湯類를 活用하기도 하였다.

惡瘡에 使用한 涼血飲과 連翹飲은 黃芩에 和血 涼血하는 四物湯 혹은 生料四物湯을 配合하였고, 瘰癧에 使用한 綠雲膏와 散腫潰堅湯은 黃芩에 三補丸과 升麻葛根湯을 基本方으로 配合하고, 木鱉子, 昆布, 海藻, 草龍膽, 知母 등을 配伍하고 있다. (표5-4)

天疱瘡에 使用한 消風敗毒散은 黃芩과 더불어 生料四物湯, 升麻葛根湯 君臣藥으로 하고, 三補丸, 金銀花散을 佐使藥으로 하고, 瘡家の 聖藥인 連翹, 蟬退 등을 加味한 方劑로 볼 수 있다. 凍瘡에 使用한 四黃散은 大金花丸에 白芷를 加味하였고, 疥癬에 使用한 三黃散은 三黃元(大黃, 黃芩, 黃連)을 君으로 하고, 蛇床子, 寒水石을 臣으로 한 다음 白礬, 黃丹, 輕分을 佐使로 한 것이다. 大頭瘡과 溫疫에 使用한 芩連消毒飲, 既濟解毒湯, 普濟消毒飲子, 牛蒡芩連湯, 五瘟丹, 人中黃丸 등에서 모두 二黃湯, 三黃元등, 三補丸 등이 公同으로 使用되고 있는 것으로 보아, 黃芩의 解毒瀉火作用을 응용한 것으로 생각된다. (표 5-5)

衄血은 鼻가 陽明熱에 해당되므로 주로 清血하거나 陽明熱을 瀉하고 止血하는 藥物들을 加味한 方劑로 使用하고 있는데, 清血에서는 四物湯과 黃芩, 黃連, 犀角, 麥門冬, 天門冬, 地骨皮를, 陽明熱을 瀉할 경우에는 升麻葛根湯, 石膏芍藥湯, 熱毒을 解할 경우에는 二黃湯을 使用하며, 止血藥으로는 側柏, 阿膠珠, 藕節 등은 使用하였고, 藥效를 上部로 引經하기 위하여 桔梗을 많이 使用하였고, 止咳藥으로는 紫菀, 桑白皮, 桔梗 등을 많이 使用하고 있음을 알 수 있

다. 따라서 黃芩의 涼血和血하는 작용을 응용한 것으로 볼 수 있다.

口舌門에서는 黃芩에 生地黃, 熟地黃, 麥門冬을 使用하는 경우와 梔子, 石膏, 黃連을 使用하는 경우, 人參, 甘草를 使用하는 경우, 升麻, 白芷, 石斛, 半夏, 防風을 使用하는 경우로 나누어 調査할 수 있었다. (표5-6)

內傷門의 消導에서는 三黃湯에 枳朮丸, 吞酸吐酸에는 二陳湯, 牽連丸, 嘈雜에는 二黃湯에 白虎湯, 二陳湯類를 配合한 것을 使用하는 것으로 보아, 黃芩이 黃連, 蒼朮, 半夏 등과 더불어 脾胃에 濕熱이나 痰火를 除去하는 것을 응용한 것이라고 생각 할 수 있다.

痰飲門에서는 二黃湯에 六君子湯, 導痰湯, 滾痰丸 등을 合方한 方劑를 使用하고 있는 것으로 調査되었다. (표5-7) 이는 黃芩의 痰火를 瀉하는 作用을 이용한 것으로 생각된다.

癰疽에 使用한 內消升麻湯, 牡丹皮湯, 白芷升麻湯에서는 黃芩에 解肌하는 升麻, 生肌하는 黃芪, 消瘀하는 牡丹皮, 上部로 引經하는 桔梗등을 配伍하고 있다. 따라서 黃芩이 升麻, 黃芪, 牡丹皮, 桔梗, 등과 配伍되면 生肌, 消瘀作用에도 일정한 역할을 하는 것으로 보여진다.

癩癩에서는 大黃, 黃芩을 配伍하여 大消熱, 瀉火祛痰, 鎮痙, 鎮靜하는 作用을 活用하였고, 怔忡엔 黃芩에 安神補血하는 藥物을 加味한 安神補血湯을 使用하고 있다 (표5-8)

耳痛, 耳鳴, 耳聾에서는 生料四物湯, 桔梗枳殼湯에 黃芩, 荊芥, 連翹, 柴胡, 白芷, 防風 加味한 荊芥連翹湯과 黃芩, 黃連, 梔子에 當歸, 草龍膽, 南星, 靑皮 등을 君臣으로 配伍한 加減龍膏丸, 龍膽湯을 使用하고 있다. 瘧疾에서는 小柴胡湯, 平胃散, 二陳湯, 四君子湯을 基本으로 하고, 草果, 常山, 鱉甲等도 配伍한 清脾飲, 人參截瘧飲과 黃芩에 石膏, 知母, 芍藥, 桂枝를 配伍한 桂枝芍藥湯을 使用하는 것으로 調査되었다. 그러므로 黃芩이 瘧狀發熱에도 응용되고 있

음을 보여준다.

黃疸에는 茵陳蒿湯과 三黃元을 基本方으로 하고, 柴胡, 升麻를 加味한 方劑를 使用하고 있는 것으로 調査되어, 黃芩이 大黃, 草龍膽, 茵陳, 梔子, 升麻, 柴胡 등과 더불어 肝經에 濕熱을 治療하는 것으로 보여진다. (표5-9)

小兒病의 發熱에 使用한 四物解肌湯은 陽明經의 肌部熱을 解하는 基本方인 升麻葛根湯에서 甘草 대신 黃芩을 配伍한 것이며, 臍風에 사용한 通心飲은 黃芩에 梔子, 連翹를 配伍하여 清熱케 하고, 木通, 甘草로 移熱케 하는 方劑이다.

瘧塊에 사용한 加味柴平湯에서 黃芩은 小柴胡湯의 일부로써 少陽經의 瘧症을 治하는 역할을 하는 것이며, 脚氣에 사용한 當歸掃痛湯은 茵陳, 黃芩으로 濕熱을 瀉하고, 君苓湯과 防己로 利水를 통하여 濕熱을 배출하도록 構成된 方劑로 볼 수 있으며, 神秘左經湯에서 黃芩은 小柴胡湯의 일부로 少陽經의 熱을 解하는 것으로 보여지며, 斑疹에 사용한 葛根橘皮湯과 黃芩은 麻黃, 知母, 葛根과 더불어 發散 解肌 清熱하거나, 梔子大靑湯에서 黃芩은 梔子, 大靑, 升麻와 더불어 清熱解肌하는 것으로 볼 수 있다. (표5-10)

杖傷에 사용한 五黃散에 黃芩은 大金花丸의 構成 藥物으로써 三焦熱을 瀉하는 作用을 하며, 金刃傷에 使用한 活血散에서 黃芩은 상처의 炎症을 제거하는 역할을 하는 것으로 보여진다.

中風의 手足癱瘓에 사용한 疏風順氣散에서는 黃芩은 石膏, 羌活, 防風, 荊芥와 더불어 風熱을 瀉하는 作用을 하고, 胸痞에 사용한 黃連消痞丸에서 黃芩은 枳朮丸, 平胃散, 二陳湯과 더불어 脾胃의 太過한 濕痰을 除去하는 역할을 하는 것으로 볼 수 있다.

血淋에 사용한 增味導赤散에서 黃芩은 導赤散과 더불어 小腸熱을 小便을 통하여 배출하게 하고, 噎膈反胃에 사용한 神奇散에서 黃芩은 知柏四物湯, 二陳湯과 더불어 血虛有火나 濕痰熱을 瀉하게 한다.

그밖에도 蟲蝕痛에 使用한 當歸連翹飲에서는 黃芩은 血熱을 瀉하고, 腸風臟毒에 使用한 解毒湯에서는 熱毒을 除去하고, 聲嘶에 使用한 柴胡升麻湯에서는 柴胡, 桔梗, 知母, 貝母, 玄蔘과 더불어 咽喉部의 實熱을 瀉하는 作用을 하는 것으로 보여진다. (표 5-11)

IV. 총괄 및 요약

東醫寶鑑에 收錄된 黃芩이 配伍된 方劑 총 403방 중 黃芩이 主藥으로 된 106방에 대한 治療領域, 病症, 病理, 處方 構成內容調查를 통하여 얻은 결론은 다음과 같다.

1. 黃芩이 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域에 대한 處方頻度數와 百分率을 조사한 결과 寒門 11 (10.37%), 婦人門 10 (9.43%), 眼門 8 (7.54%), 火門 8 (7.54%), 諸瘡門 7 (6.60%), 溫疫門 7 (6.60%), 血門 6 (5.00%), 口舌門 5 (4.71%)이 內傷門, 痰飲門, 癰疽門, 神門이 각각 4 (3.77%), 疥瘡門, 黃疸門 이 각각 3 (2.83%), 小兒門, 積聚門, 足門, 皮門, 諸傷門 이 각각 2(1.88%), 風門, 胸門, 小便門, 嘔吐門, 齒牙門, 前陰門, 後陰門, 聲音門이 각각 1(0.94%)의 順으로 조사되었다. 이 중 頻度數 85%이상을 차지하는 順은 小兒門까지이며, 76%이상을 차지하는 順은 神門까지이다.

2. 黃芩이 君藥으로 使用된 方劑의 病症은 少陰形證, 傷寒語謔鄭聲, 陽明形證, 傷寒表證, 傷寒陽毒, 兩感傷寒, 傷寒痞氣, 孕婦傷寒, 差後昏沈, 經斷復行, 半產, 惡阻, 胎漏胎動, 子痢, 寡婦師尼, 產後發熱, 瘦胎令易產, 外障, 腎膜, 三焦火, 上焦熱, 中焦熱, 積熱, 腎熱, 諸惡瘡, 癰癤, 天疱瘡, 凍瘡, 疥癬, 大頭瘟, 瘟疫, 衄血, 咳血嗽血唾血咯血, 口臭, 口鹹, 脣燥, 舌酸吐酸, 嘈雜, 熱痰, 痰塊, 痰飲, 附骨疽, 肺癰, 腎癰, 癰

疽五發證, 癰癧, 怔忡, 癲狂, 耳痛成膿耳, 耳鳴, 耳聾, 疥瘡, 黃疸, 發熱三朝, 噤口撮口臍風證, 積聚癰疽疔瘡, 脚氣, 癩疹, 杖傷, 金刃傷, 手足癱瘓, 鼻淵, 胸痞, 血淋, 噎膈反胃, 蟲蝕痛, 腸風臟毒, 瘡疔, 聲嘶 등 총 28門의 70개로 조사되었다.

3. 黃芩이 主藥으로 使用된 方劑의 文獻에 收錄된 病理는 傷寒, 三焦火, 積熱, 濕熱, 風熱, 血熱, 痰火, 血虛有火, 臟毒, 心肺熱, 肝熱, 胃熱, 脾熱, 肝經熱毒, 腎經風熱, 熱入血室 등이 主를 이루고 있었다.

4. 黃芩이 主藥으로 使用된 方劑의 處方 構成 內容 調查를 통하여 黃芩을 중심으로 한 藥物 및 處方 의 配合의 일정한 方式을 알 수 있었다.

즉 藥物의 配伍는 黃芩·梔子, 黃芩·大黃, 黃芩·黃連·梔子 등이 있으며, 處方의 配合은 二黃丸 (黃芩, 黃連, 甘草), 保安白朮散 (黃芩, 白朮), 三補丸 (黃芩, 黃連, 黃柏) 三黃元 (黃芩, 黃連, 大黃), 黃連解毒湯 (黃芩, 黃連, 黃柏, 梔子), 大金花丸(黃芩, 黃連, 黃柏, 大黃), 散熱飲子(黃芩, 黃連, 羌活, 防風), 四物湯, 升麻葛根湯, 小柴胡湯, 二陳湯 등의 基本方을 使用하고 있었다.

參 考 文 獻

1. 辛民教, 臨床本草學, 서울, 永林社, p.308~309, 1994.
2. 申佶求, 申氏本草學各論, 서울, 壽文社, p.649~653, 1998.
3. 康秉秀 外, 臨床配合本草學, 서울, 永林社, p.287~290, 1994.
4. 鄭晉燮 外, 鄉約(生藥)大辭典, 서울, 永林社, p.864~865, 1990.
5. 黃孟君, 中藥方劑便覽, 北京, 中國中醫藥出版社, p.214~215, 1998.

6. 楊濟 外, 臨證藥用配伍指南, 北京, 中國醫藥科技
術出版社, p.120~125, 1996.
7. 許浚, 對譯東醫寶鑑, 서울, 法人文化社, p.113
147 188 194 196 198 221 249 279 280 287
292 376 413 522 544 545 566 576 579 583
602 603 605 620 675 729 730 779 780 812
838 964 998 1007 1014 1018 1028 1040 1043
1053 1067 1101 1104 1105 1106 1107 1133
1151 1153 1217 1282 1295 1347 1353 1354
1364 1369 1377 1386 1388 1389 1423 1440
1443 1478 1480 1492 1504 1508 1514 1527
1597 1600 1602 1607 1619 1621 1622 1629
1642 1669 1726 1731, 1999.
8. 龔信, 古今醫鑑, 北京, 中國中醫藥出版社, p.72
76 114 158 281, 1997
9. 朱肱, 國譯 活人書, 서울, 아티진, p.329 364
368, 1998.
10. 李梴, 國譯 醫學入門, 서울, 南山堂, III권 p.285
292 296 340 348 354 382 386 394 395 396, IV
권 p.691 774 807 823, V권 p.592, VI권 p.197
237 380, 1985.
11. 龔信, 萬病回春, 北京, 東洋綜合通信教育院出版
部, 下卷 p.18 1985.
12. 朱震亨, 丹溪心法附餘, 五州出版社, p.381 384,
광서25년.
13. 危亦林, 得效方, 서울, 醫聖堂, p.314 478, 1990.
14. 樓英, 醫學綱目, 서울, 一中社, p.1463 1624,
1984.
15. 王好古, 國譯 醫壘元戎, 서울, 醫聖堂, p.80,
1999.
16. 尹用甲, 東醫方劑와 處方解說, 서울, 醫聖堂,
p.146 171 192 245 533 536 538 539 541 543
551 556 579 634, 1998.