

# 봉침요법강좌

## 脾仙軟膏(비선연고)에 蜂針治療(봉침치료)를 결합하여 陰道炎症(음도염증, 질염) 135예를 치료한 효과에 대한 총결

代乾(中國四川渠縣蜜蜂醫療所)

본문은 治療組(치료조)와 對照組(대조조) 모두 185예로 病原學檢査(병원학검사)로 滴?性(적충성) 혹은 念珠菌(염주균, moniliformis균)성 음도염을 확진한 자를 제외하고 16세이하는 幼女性(유녀성) 음도염, 48세이상은 老年性(노년성) 음도염이었다. (부표)

組別	例數	滴虫性		念珠菌性		老年性		結核性	
		陰道炎	陰道炎	陰道炎	陰道炎	腹膜炎	腹膜炎		
治療組	135	50	55	25	5				
對照組	50	16	20	10	4				

仙脾軟膏(비선연고)와 봉침치법 : 老巢脾(노소비) 250g, 食用植物油(식용식물유) 500g을 취하여 약한 불로 20분간 다려서 찌꺼기를 버리고 여과한 후 가라앉혀 膏狀(고상)으로 만든다. 다음 중(中)약 仙鶴草細粉(선학초 세분)(100目채를 통과한 것)을 10% 비례로 넣고 균일하게 혼합하여 軟膏(연고)를 만든다. 다시 연고 5g을 소독한 醫用(의용) 가제로 사서 길이 5cm, 원형직경 2cm되는 帶線軟膏栓(대선연고전)을 만들어 음도에 넣는다. 매일 1회, 8시간 후 취출, 7일을 한개 치료주기로 한다. 蜂針取穴(봉침취혈) : 關元(관원), 中極(중극), 曲泉(곡천), 太衝(태충), 陰陵泉(음능천), 三陰交(삼음교), 腎俞(신유)에는 直刺(직자), 散刺(산자), 埋針治療(매침치료)를 하고, 關元(관원), 中極(중극)은 補法(보법)으로 刺하고 腎俞(신유), 陰陵泉(음능천)은 補(보)하고 三陰交(삼음교)는 사한다. 본방으로 음도염환자 135예(예)를 치료하여 治愈(치유)된 환자가 130예, 증상이 소실된 最短(최단)시간은 7일, 最長(최장)시간은 28일. 치료하여 낮은 후 白帶檢査(백대검사)에서 炎性細菌(염성세균), ?菌(대균)과 滴?性(적충)은 轉陰(전음)이었다. 對照組(대조조) 50예는 서약자성격소, 滅滴靈(Miediling)등을 채용하였다. 治療組(치료조)의 療程(요정)과 시간은 對照組(대조조)에 비하여 뚜렷이 앞당겼다. 28일을 걸쳐 治療組(치료조) 치유율은 80%. 治療組(치료조)의 무효 5예는 주요하게 치료를 중단한 때문이었고 對照組(대조조)의 무효 10예는 약물 독부작용 때문에 치료를 접수할 수 없었기 때문이었다. (부표)

治癒日數 治癒 組別 例數	7		14		21		28		無效	
	例數	百分比	例數	百分比	例數	百分比	例數	百分比	例數	百分比
治療組	135	15(11.2%)	35(25.9%)	45(33.3%)	35(25.9%)	5(3.7%)				
對照組	50	2(4%)	5(10%)	10(20%)	23(46%)	10(20%)				

## 蜂針(봉침)으로 腎虛(신허) 336예를 치료한 療效歡察(요효관찰)

何應龍(馬來西亞 伊甸殘障服務中心蜂療部)  
DANIEL HO ENG LEONG

(Aphitherapy Department, Eden Handicap Service Centre Berhad, Malasia)

본부는 1999년 이내, 蜂針療法(봉침요법)으로 각종 類型(유형)의 腎虛(신허)환자 336예(예)를 접수하여 진찰치료 하였다. 그중 여성 60예, 연령 19—68세사이 病程(병정) 1개월에서 15년으로 모두 만족한 치료 효과를 얻어 現效가 231예로 68.75%를 점했고 有效는 87예로 25.89%, 무효는 18례로 5.35%를 점했다. 辨證治法(변증치법)은 아래와 같다.

**腎陰虛(신음허) :** 주요 표현은 허리가 시큰하고 아프며 추위가 두렵고 下肢(하지)와 생식기가 冷(냉)하며 동시에 머리가 어지럽고 생기가 없으며 얼굴색이 하얗게 된다. 남성은 性功能(성공능)이 감퇴되고 여성은 자궁이 冷(냉)하면서 임신이 되지 않는다.

蜂針療法(봉침요법)으로 腎陰虛(신음허)환자 68예를 치료하였는데 병정은 2개월에서 9년이였다. 曲骨(곡골), 中級(중급), 會陰(회음), 腎俞(신유)를 취혈하여 처음에는 2—3 마리 별로 點刺(점자)하고 점차적으로 5—6마리로 증가한다. 隔日(격일) 1회, 15회를 한개 치료주기로 하였다. 1—3개 치료주기를 거친 결과 顯效(현효, 현저한 효과) 46예로 67.64%를 점했고 有效(유효) 20예로 29.41% 無效(무효) 2예로 2.94%를 점했다.

**腎精不足(신정부족) :** 많이는 선천적으로 부족하거나 후천적인 營養失調(영양실조) 때문인데 房事(방사)가 과도하거나 少年自慰(수음)가 과도한 때문일 수도 있다. 주요하게 일찍 노쇠 하고 머리칼이 이빨 빠진듯하며 귀가 매거나 소리가 나고 健忘失眠(건망실면, 건망증, 불면증), 四肢無力(사지무력) 등으로 표현된다. 또 남성은 精少不育(정자불육, 정자가 적어지고 잘 자라지 않음) 여성은 經閉不孕(경폐불임, 폐경, 불임)으로도 나타난다. 蜂針療法(봉침요법)으로 腎精不足(신정부족) 환자 76예를 치료하였는데 그중 여성 16예로 병정은 2개월에서 10년 이였다.

취혈: 衝門(충문), 氣海(기해), 陽關(양관), 關元(관원), 처음에는 2—3 마리 별로 點刺(점자)하고 점차 증가하여 5—6 마리 별로 點刺(점자)한다. 隔日(격일) 1회, 15회가 한개 치료주기, 1—5개 치료주기를



거친 결과 顯效(현효) 58례로 76.31%, 有效(유효) 14례로 18.42%, 무효가 4례로 5.26%를 점했다.

**腎精不固(신정불고)** : 많이는 年齡(연령)이 많아 腎氣虧損(신기휴손, 신장기능이 이저리지고 손상됨)하거나 연소시 腎氣不足(신기보족)인데다 房事(방사)가 과도하거나 병으로 신을 상하여 얻어진 것이다. 그 주요표현은 精神不振(정신부진) 腰膝酸軟(요슬산연, 허리와 무릎이 시고 약해짐) 小便頻繁(소변빈번) 혹은 夜間尿床(야간노상), 小便失禁(소변실금)이다. 남성은 滑精早泄(활정조설)하고 여성은 월경이 淋瀝不斷(임력부단)하다. (질벽하고 끊기지 않는다.) 蜂針療法(봉침요법)으로 腎精不固(신정불고) 환자 78례를 치료하였는데 그중 여성 12례, 병정은 1개월에서 15年. 취혈은 誌室(지실) 關元(관원), 曲骨(곡골), 會陰(회음), 橫骨(횡골), 처음에는 1-3마리 별로 點刺(점자)하고 점차 증가하여 5-8 마리 별로 點刺(점자)한다. 隔日(격일) 1회, 15회가 한개 치료주기, 1-5개 치료주기를 거친 결과 顯效(현효) 59례로 75.64%를 점하고 有效(유효) 14례로 17.94%, 무효 8례로 6.41%를 점했다.

**腎不納氣(신불납기)** : 많이는 오래된 咳喘病(해천병)으로 肺虛(폐허)하여 신을 상한 것인데 주요하게는 活動後(활동후) 숨이 턱에 닿거나 땀을 많이 흘리며, 힘이 없고 피곤하고 허리가 시글고 다리가 나른하고 무력한것으로 나타난다. 엄중한 자는 안색이 靑黃(청황)하고 식은 땀이 즐벽하다. 蜂針療法(봉침요법)으로 腎不納氣(신불납기) 환자 48례를 치료하였는데 그중 女性 18례, 병정은 1개월에서 8年. 취혈은 天突(천돌), 大推(대추) 肩井(견정), 腎俞(신유), 처음에는 1-3 마리 별로 點刺(점자)하고 점차 5-8마리 별로 증가한다. 隔日(격일) 1회, 15회를 한개 치료주기로 1-4개 치료주기를 거친 결과 顯效(현효) 26례로 54.16%를 점하고 유효 18례로 37.5%, 무효 4례로 8.33%였다.

## 蜂針(봉침)에 蜂寶(봉보)열찜질주머니를 배합하여 하지정맥곡장(下肢靜脈曲張) 138례를 치료한 보고

薛國圉 薛國印 (中國河南開封蜂療醫院)

필자는 1991년부터 봉침에 봉보열찜질주머니를 배합하여 하지정맥곡장 138례를 치료하였다. 그중 남성 99례로 77.7%, 여성이 39례로 28.3%를 점했다. 연령은 28~39세가 35례로 25.3%; 40~69세가 103례로 74.6%; 병정은 2년보다 작은 者가 39례, 3~8년이 92례, 9년이상이 7례였다. 병변부위는 다수가 하지로서 소퇴천표정맥확장(小腿淺表靜脈擴張), 융기만곡(隆起彎曲)을 볼수 있었고 잠입상태에

서 더욱 똑똑히 볼 수 있었다. 하지가 무겁고 긴장하며 쉽게 피로해 지고 일부 환자들은 소퇴곡장부위에 습진성피염 혹은 病理潰瘍이 있었다. 치료방법 : 상규(常規)소독을 거친후 活蜂으로 곡장정맥육기의 간격부위에 석자하였다. 매 5에 침을 하나씩 놓고 석자후에는 봉침을 뽑아 그 주위를 산자(散刺)하였다. 약 30%의 환자가 紅腫(紅腫)이 출현하고 2日좌우하여 부은 것이 소실되었다. 약 70%의 환자는 봉침 24시간 후에 부당한 정도의 국부중창(腫脹)이 출현하고 3~4일이 되어 부은 것이 없어 졌다. 국부 중창(腫脹)이 완전히 없어진 후 두 번째로 되는 봉침치료를 진행하였다. 일반적으로 3~4일에 1회씩 침을 놓고 5회를 한 개 치료주기로 하였다. 그리고 곡장(曲張)된 환부 조금 위편으로 해서 프로로리스를 함유한 약물깎개와 열원재료가 배합된 봉보(蜂寶)열찜질주머니를 사용하여 그 지속성이 정상적인 활동에 영향을 주지않는 상태에서 열찜질을 하였다. 치료효과 : 138례 가운데서 치유 46례로 곡장용기된 정맥이 소실되었으며 하지가 무겁고, 부어나고 시글고 시달리던 증상이 소실되고 일년까지 복발되지 않은 자가 33.3%; 호전 85례로 곡장표면이 평해지고 무겁고, 부어나고, 시글고 시달리던 증상이 뚜렷이 호전된 者가 61.6%; 무효가 7례. 이방법으로 하지정맥곡장을 치료한 총유효율은 94.9%였다. 치료가운데서 병정이 짧을수록, 연령이 작을수록 치료효과가 더 좋다는 것이 관찰되었다. 필자는 아래와 같이 인정한다. 봉침이 어체(瘀滯)혈액의 점조도(粘稠度)를 낮출수 있으며 점조도가 낮을수록 혈액의 유속이 더욱 빨라진다. 봉침액은 친신경(親神經)특성을 갖고 있어 곡장혈관벽 신경흥분성을 회복하고 혈액의 回流를 촉진한다. 봉침은 미순환(微循環)을 확장하는 작용이 있어 조직세포로 하여금 통투성(通透性)을 증강하여 수종(水腫)을 출현하게 하며 주위 조직 긴장성을 증가 할 수 있고 곡장된 혈관을 억압 수축하게 하며 정맥의 공능을 회복할 수 있다. 봉보열찜질주머니를 배합하여 사용하면 활혈화어(活血化瘀)와 기계압박 및 열찜질작용이 있어 熱迫血行(열이 피를 억압하여 흐르게 한다)하고 血行則通(피가 흐르면 곧 통한다)하는 목적에 도달할 수 있다.

## 봉침으로 면신경마비 57례를 치료한 임상치료효과

盧玉子 崔建守 (中國青島蜂療醫院籌委會)

우리는 면신경마비환자 57례에 대하여 봉침치료를 채용하였는데 그중 가장 높은 연령이 50세, 가장 어린 연령이 18세, 평균 연령은 35세였다. 병정이 가장 긴 것이 10년, 가장 짧은 것이 1개월. 手足陽明經



(수족양명경)을 위주로, 手足少陰經(수족소음경)을 보조로 하고 국부近取(근취)와 循經遠取(순경원취)를 서로 결합하는 방법으로 소풍산한(疏風散寒), 청열(淸熱)의 작용에 도달하게 하였다. 혈위는 風池(풍지), ?風(의풍), 頰車(협차), 地倉(지창), 合谷(합곡), 太?(태충)을 썼다. 본병은 많이는 風寒(풍한)이 面部陽明(면부양명), 少陽脈絡(소양낙맥)을 침습한 것이기 때문에 風池(풍지), 의풍를 取하면 소산풍사(疏散風邪)의 효과가 있는데 그중 의풍은 거풍지통(?風止痛)할 수 있어 처음으로 걸린 귀뒤의 乳突痛(유돌통)에 적용된다. 頰車(협차), 地倉(지창)은 모두 陽明(양명)에 속하므로 봉침산자와 직자를 서로 결합하여 經氣(경기)를 추동한다. 合谷(합곡), 태충은 循經遠取法(순경원취법)으로 合谷(합곡)은 얼굴의 여러 가지 질병을 잘 치료 할 수 있고 太?(태충)은 瀉法(사법)을 써서 입이 빠들어 지는 병을 치료하는데 가장 유효하다. 자료가 완전한 57례 환자 가운데서 치유가 46례로 80.70% ; 현저한 효과가 6례로 10.53%를 점하였는데 총유효율은 96.49%였다. 발병시간이 짧을수록, 기타치료방법을 채용한 것이 적을수록, 직접 봉침을 채용한 것이 빠를수록, 환자의 치유율은 더 높았다. 발병시간이 길수록, 기타 치료방법을 많이 채용한 者일수록, 치유율은 더 낮았다.

**전형병례 :** 진XX, 남, 20세, 대학생, 탐험에 참가하여 산속에서 노숙하고 찬바람을 맞아 입귀가 우측으로 비뚤어 지고 좌측 입은 완전히 닫을 수가 없어 때로 침이 흘러 나왔다. 왼쪽눈은 잘 감지 못하고 露睛(노정, 눈알이 튀어 나오는 것)이 있고 임증이 평평해지고 혀의 감각이 감퇴 되었다. 환자는 진찰오기 전에 민간약처방으로 한달넘어 치료했으나 효과가 없었다. 시침은 음성이어서 봉침으로 좌측에서 風池(풍지), 의풍, 頰車(협차)에 침을 놓았다. 左合谷(좌합곡)을 직자하고 태충은 사법은 우선 혈위에서 中指로 역시침 방향에 따라 아홉돌개를 안마한다. 경한데로부터 중하게 중복하여 6회를 한다)을 썼다. 이를 건너 復診(복진)하였는데, 환자의 우측으로 기울어 졌던 입귀가 이미 뚜렷한 개선이 있었고 좌측은 기본상 완전히 입을 닫을 수 있었으며 침이 흘러 나오지 않았다. 임중, 이마주름, 미각이 기본상 회복되고 왼쪽눈이 기본상 감아 지었으며 조금 露睛(노정)되어 있었다. 제2회 치료는 좌측 風池(풍지), 頰車(협차), 迎香(영향)을 산자하고 왼쪽 地倉(지창)을 직자하고 우측 合谷(합곡), 太沖(태충)은 직자, 瀉法(사법)을 썼다. 3일을 건너 복진 하였는데 면부의 증상이 완전히 회복되었다.

### “최고급 소상을 저렴한 가격으로”

완전건조된(함수율12%미만) 스키목을 자동화된 설비로 직접 가공하여 판매하고 있습니다  
 목재전문가공업체로서 요철식, 기계식집성으로 절대 갈라짐이 없도록 100% 보완 제작하여 2002년 양봉농가에 공급하고자 하오니 많은 성원 부탁드립니다.

수종	스기목 18mm	오 동 16mm
품목		
소 상	10, 12매단상, 10매계상	
조립소초광	국내산으로 최고급	

### 해 원 목 재

경기도 포천군 군내면 유교리 산1번지  
 대표 박 원 철  
 전 화 : 031) 536-8520, 9001  
 팩 스 : 031) 536-8521  
 핸드폰 : 017-233-7176



프로폴리스병과 로얄제리병을 개발하여 양봉원과 양봉농가에 공급하겠습니다

	소비자가(1개)	주문단위
프로폴리스병 50ml	1,000원	100개
프로폴리스병 100ml	1,000원	100개
로얄제리병 50g	150원	1,000개

### 마 창 양 봉 원

대 표 : 이 인 규  
 경남 마산시 진북면 이목리 364  
 전화 : 055)271-1792, 1793  
 온라인-농협 : 821120-52-055815 이인규