

方藥合編 皮膚外科 處方에 대한 分析

박민철 · 최인화*

Analysis on the Dermatological Prescriptions in BangYakHapPyun(方藥合編)

Min-chul Park · In-hwa Choi*

Subjects : We tried to analysis dermatological prescriptions including 477 WonBang(元方) prescriptions for SangJungHaTong(上中下統) introduced by HwangDoYeon(黃度淵).

Methods : Prescriptions in BangYakHapPyun(方藥合編) is generally categorized into SangTong(上統), JungTong(中統), HaTong(下統) which are called PoJe(補劑), HwaJe(和劑), KongJe(功劑) respectively. This study classified and analyzed major diseases and symptoms appeared in dermatological prescription and composition of medicine, as well as in BangYakHapPyun(方藥合編).

Results and conclusions : The results of examining dermatological prescriptions in WonBang(元方) of SangJungHaTong(上中下統) in BangYakHapPyun(方藥合編) are as follows;

1. The proportion of dermatological prescriptions was SangTong(上統) 10/126(7.9%), JungTong(中統) 22/181(12.1%), and HaTong(下統) 16/163(9.8%), which means that JungTong(中統)(HwaJe和劑) takes up relatively the largest portion.
2. As for SangTong(上統), upper level herbs used in medicine are Glycyrrhiza uralensis(甘草), Paeonia japonica(白芍藥), Angelica gigas(當歸), Astragalus membranaceus(黃芪), Ginseng(人蔘), Poria cocos(茯苓), Atractylodis macrocephalae rhizoma(白朮), Cinnamon(肉桂), Rehmaninae radix preparat(熟地黃). And these herbs are the components of Sipjundaebo-tang(十全大補湯), one of the most well-known medicine for weak energy and blood(補氣血).
3. As for JungTong(中統), in addition to medicine for weak energy and blood, Ledebouriella seseloides(防風) that removes ill elements on skin surface and Pung(風) called "wind", Limonium tetragonum(桔梗) that eliminates discharges and sputum, Angelica dahurica(白芷) that removes discharge and suppress tumor are applied. Other herbs are Ostericum koreanum(羌

* 동국대학교 한의과대학 안이비인후피부과교실

· 교신저자 : 박민철, 동국대학교 한의학과 대학원 안이비인후피부과교실
(Tel. 031-376-9102, E-mail : apexapex@hanmail.net)

- 活), Skullcap(黃芩), Schizonepeta tenuifolia(荊芥), Aurantii fructus(地殼), Cimicifuga heracleifolia(升麻), Bupleurum falcatum(柴胡), Lonicerae flos(金銀花). These herbs are more effective for wind-calming treatment, cooling down fever, clearing skin irritation, detoxication, removal of tumor and discharge than replenishing energy and blood.
4. As for HaTong(下統), Angelica gigas(當歸) and Ledebouriella seseloides(防風), the two major herbs for SangTong(上統) and JungTong(中統), are mostly used. In addition, Skullcap(黃芩), Gardenia jasminoides(梔子), Eisenia bicyclis(大黃) are other major components and their key efficacy is to lower fever and KongHa(功下).
 5. Herbs applied for SangTong(上統), JungTong(中統), and HaTong(下統) in large quantity are Glycyrrhiza uralensis(甘草) that harmoniously combine different herbal elements and Poria cocos(茯苓) that discharges humidity and watery elements out of body, removes humid and hot elements, and strengthen gastrointestinal system. Based on this, it is inferred that prescriptions for this study focus largely on treatment of humid and hot elements. In the composition of this prescription, Angelica gigas(當歸), Paeonia japonica(白芍藥), and Cnidium officinale(川芎) are taking up relatively large proportion, which are basic herbs for Samul-tang(四物湯). Therefore, it is incurred here that the concept of "replenishing blood" bears importance in dermatosurgical treatment.
 6. As for herb medicines used for more than two types of prescriptions of SangTong(上統), JungTong(中統), and HaTong(下統), most of them are simultaneously used for SangTong(上統) and JungTong(中統), or for JungTong(中統), and HaTong(下統) except for Atractylodis macrocephalae rhizoma(白朮) and Gleditsia sinensis(皂角刺). This finding implies that prescription or treatment that are simultaneously applied are replenishing and harmonizing, or harmonizing and attacking while replenishing and attacking never go together.

서론

方藥合編은 1869년에 黃度淵 先生이 완성한 《醫方活套》 1권을 기반으로 하여 그의 아들이자 高宗時代의 韓方系의 一人者였던 黃泌秀가 아버지의 유지를 받들어 著述하고 또한 黃度淵의 首弟子로 사료되는 玄公廉이라는 사람의 增補를 합하여 현재 우리가 보고있는 《證脈 方藥合編》을 완성한 것이다. 方藥合編은 上統 中統 下統으로 나뉘어져 있으며 上統에는 原方 百二十三 附方 三十二 諸傷方八 解毒方二 雜方十四 製造法二十六으로 構成되어 있으며 中統은 原方 百八十一 附方 三十三, 下統은 原方 一百六十三 附方 三十八 附諸種禁忌 五件으로 構成되어있다. 그리고 上統은 補劑,

中統은 和劑, 下統은 功劑로 構成되어 있다¹⁾

皮膚外科의 處方을 整理하는 데 方藥合編을 擇하게 된 것은 方藥合編이 東醫寶鑑 이후 발간된 국내서적 중 현재 가장 많이 사용되는 臨床書이면서 또한 여러 文獻에서 수집한 臨床頻用處方을 수재하고 있으므로²⁾ 이에 方藥合編의 皮膚外科 處方의 主治疾患과 藥物의 構成을 살펴보는 것도 의의가 있는 일로 사료되어 이를 분석해 보았다. 方藥合編에 대한 연구는 활발히 이루어지고 있는데 최근 연구 동향을 살펴보면 方藥合編에 대한 연구^{3,4)}, 한 가지 藥物을 포함하는 方藥合編 處方에 대한 考察 연구^{5,6)} 등이 보고되었다.

그 중에서도 方藥合編의 主治 疾患과 藥物의 頻度에 대한 연구를 살펴보면 강 등⁷⁾은 수

록된全體 藥物의 頻度를 알아보았으며 이 등⁸⁾은 痺症 질환에 대한 處方에 대한 연구를 하였으며 윤⁹⁾은 方藥合編에 수록된 處方의 主治를 계통 분류하였지만 皮膚外科 處方만을 구분하여 분석한 보고는 없었다. 또 皮膚外科 疾患에 대한 처방 연구¹⁰⁻¹²⁾는 이루어져왔으나 方藥合編만을 연구한 예는 없었기에 方藥合編에 나오는 皮膚外科 處方들의 主治疾患과 構成藥物의 頻度를 알아보고 皮膚外科 處方의 理解를 돕고자 본 연구를 시행하였다.

조사자료 및 방법

1. 조사자료

1990년 南山堂에서 출간한 《對譯證脈 方藥合編》을 기본으로 하였고 方藥合編에서 玄公廉이 덧붙인 增補方을 제외한 黃度淵의 上中下統의 元方 四百七十七個의 處方中에서 活套를 포함하여 皮膚外科 處方을 選別하여 이를 대상으로 삼았다.

2. 조사방법

方藥合編의 處方을 上 中 下統을 구분하여 補劑라고 말하는 上統, 和劑라고 말하는 中統, 功劑라고 말하는 下統에서 각각 皮膚外科處方의 主治 疾患과 藥物의 構成 比率을 分類하였으며 이를 統合하여 전체 方藥合編에서 皮膚外科處方의 主治疾患別 分類와 藥物의 構成 比率을 살펴보았다.

본론

1. 方藥合編에서의 皮膚處方

1) 上統

上統 二十四 凝神散

人蔘 白朮 白茯苓 山藥 白扁豆 粳米 知母 生地黃 甘草 地骨皮 麥門冬 竹葉

· 內傷熱中을 다스리며 胃氣를 收斂하고, 肌表를 淸涼하게 한다.

[活套] 食慾不振에는 砂仁과 白豆蔻를 加한다.

上統 三十三 十全大補湯

人蔘 白朮 白茯苓 甘草 熟地黃 白芍藥 川芎 當歸 黃芪 肉桂

· 氣와 血이 다 虛한 것을 다스린다.

[活套] 一切의 虛損에는 모든 증세에 따라 加減할 수 있다. 대개 癰疽의 病邪가 아직도 깨끗하지 않으면 金銀花, 皂角刺, 穿山甲 따위를 加하고, 혹은 膿流淸水하거나 오래도록 收斂되지 않으면 人蔘, 肉桂, 黃芪를 倍로 하고 生薑, 附子, 蓮肉 따위를 加한다.

上統 六十八 四物湯

熟地黃 白芍藥 川芎 當歸

· 血病을 治療한다. ① 脚痛 血熱에는 知柏과 牛膝을 加한다. ② 虛痺에는 黃芩을 加하여 浮萍草末로 調服한다. ③ 봄에는 川芎을 배로 하고, 여름에는 芍藥을 배로 하고 가을에는 地黃을 배로 하고, 겨울에는 當歸를 배로 한다. ④ 봄에는 防風을 加하고 여름에는 黃芩을 加하고, 가을에는 天門冬을 가하고, 겨울에는 桂枝를 加한다.

[活套] ⑤ 血虛로 經水가 不調하면 香附子, 益母草, 吳茱萸, 肉桂, 人蔘 따위를 加한다.

上統 九十三 托裏消毒飲

金銀花 陳皮 黃芪 天花粉 防風 當歸 川芎

白芷 桔梗 厚朴 穿山甲 皂角刺

·癰疽를 다스리는데, 未成된 癰疽는 消盡시키고, 已成의 것은 潰滅시킨다. ① 술과 물을 반반씩으로 달여 먹는데, 病이 下焦에 있으면 물로만 달인다.

[活套] 차차 化膿하면서 氣가 虛하면 人蔘 3~5錢을 加한다. ② 虛冷하면 肉桂를 또 加한다.

上統 九十四 加味十全大補湯

十全大補湯 加 陳皮 烏藥 五味子

·癰疽를 다스려서 터진 후에 氣血을 補하고 膿을 排除하고 살이 나게 한다.

上統 九十五 滋腎保元湯

八物湯 加 牡丹皮 黃芪 山茱萸 杜沖 肉桂 附子

·癰疽가 터진 후 더디 아무는 증세를 다스린다.

上統 九十六 國老膏

大甘草

·懸癰(肛門과 陰部 사이에 나는 헌데)을 다스린다.

[用法] 大甘草 자른 것을 山間의 長流水 一椀에 담겼다가 아침부터 낮까지 文武火로 천천히 구워서 마르거든 앞서 담갔던 때와 같은 물에 침했다가 다시 굵되 물이 다 없어질 만큼 되거든 잘게 썰어서 好酒 삼 되로 일 되가 되게 달여서 내키는 대로 二~三回 空心에 飲服하면 걱정될 것이 없을 것이고 이십일 후에는 반드시 소진될 것이다.

上統 百二十一 保元湯

人蔘 黃芪 甘草

·痘疹이 2~3일 되어, 根窠는 비록 둥글되 頂陷한 것을 다스린다. 氣가 虛하고 血이

弱해서 잘 모이지 못하면 川芎과 官桂를 가한다. ① 痘疹이 4~5일 되어, 根窠는 비록 돌기했어도 색은 광택이 나지 않으며, 氣가 弱하고 血이 盛하면 白芍藥, 官桂, 糯米를 加한다. ② 5~6일 되어 氣가 차고 血이 弱하고 색이 흐린 紅紫色이면 木香, 當歸, 川芎을 加한다. ③ 6~7일이 되어 成漿이 되지 못하고 氣血이 적어서 寒을 제어할 수 없으면 官桂와 糯米를 加한다. ④ 7~8일이 되어 毒이 漿으로 되면서도 충만하지 못하면 官桂와 糯米를 加한다. ⑤ 8~9일이 되어도 漿이 불충만하면 糯米를 加한다. ⑥ 11~12일이 되어 濕潤하고 아물지 않으며 內虛하면 白朮과 白茯苓을 加한다. ⑦ 13~15일이 되어 독은 비록 다 풀렸으나 혹 雜症이 있으면 이 약만으로 증세에 따라 가감해 쓸 것이며, 大寒, 大熱의 藥劑를 써서는 안 된다.

上統 百二十二 九味神功散

黃芪 人蔘 白芍藥 生地黃 紫草茸 紅花 鼠黏子 前胡 甘草

·痘(마마)가 나오고 독기가 성하여 血紅(紅紫色 血痘)이 전신에 퍼지거나 失血 혹은 吐瀉하기 7일전의 諸症에 服用해서 解毒하는데 좋다.

上統 百二十三 安胎飲

人蔘 陳皮 大腹皮 白朮 當歸 川芎 白芍藥 使香附 砂仁 蘇葉 赤茯苓 甘草

·孕婦의 痘疹을 다스린다.

2) 中統

中統 九 犀角升麻湯

犀角 升麻 羌活 防風 川芎 白附子 白芷 黃芩 甘草

·中風으로 코와 이마 사이가 아프고 입을 열지 못하고 왼쪽 이마와 볼 위가 헐고

마비되는 급증을 다스리는데, 이는 足陽明經이 風毒을 받아 피가 응체되기 때문이다. ① 또 內外風熱로 인한 齒齲腫痛도 다스린다.

[活套] ② 血虛火焰에는 熟地黃 四~五錢, 當歸 一錢을 加한다. ③ 熱實에는 石膏를 加한다. ④ 面腫과 丹毒을 아울러 다스릴 수 있다.

中統 十二 葛根解肌湯

葛根 柴胡 黃芩 赤芍藥 羌活 石膏 升麻 白芷 桔梗 甘草

·陽明經病으로 눈이 아프고 코가 건조하고 잠을 자지 못하는 것을 다스려 解肌하는데 좋다.

中統 十九 人參敗毒散

人參 柴胡 前胡 羌活 獨活 枳殼 桔梗 川芎 赤茯苓 甘草

·傷寒의 時氣(換節期 流注病)로 인한 發熱, 頭痛, 肢體痛 및 傷風의 咳嗽, 鼻塞, 聲重을 다스린다. ① 天麻, 地骨皮를 각각 조금씩 가한 것을 人參羌活散이라 하며, 小兒의 傷風寒, 發熱을 다스린다. ② 荊芥, 防風을 가한 것은 荊防敗毒散이라고 하며, 瘡疫 및 大頭瘟을 다스린다. ③ 荊防敗毒散에 連翹, 金銀花를 가한 것을 連翹敗毒散이라고 하며 癰疽의 初發에 寒熱이 심하여 傷寒같이 보이는 것을 다스린다. ④ 香薷 二錢 黃連 一錢을 加한 것을 消暑敗毒散이라고 한다.

[活套] 斑疹腫毒에는 荊防, 玄參, 黃芩, 黃連, 惡實(牛蒡子), 山查, 金銀花를 증세에 따라 적당히 加한다.

中統 二十二 升麻葛根湯

葛根 白芍藥 升麻 甘草

·溫病 및 時令(季節性) 感冒를 다스린다.
[活套] 胃風과 面腫에는 消風散을 合方한다.

① 癰疹, 風毒에는 山查肉, 樺皮, 金銀花, 玄參, 牛蒡子, 犀角, 荊防 따위를 加하거나, 혹은 四物湯을 加한다. ② 傷寒인지 痘疹인지 半信半疑면 먼저 이 處方으로 加減하되 挾滯하면 山查, 秦皮, 神麴 따위를 加하고, 挾感이면 蘇葉, 忍冬 따위를 가한다. ③ 寒熱에는 柴胡를 가하고, 熱이 심하면 黃芩을 加한다. ④ 麻疹 초기에는 葱白, 蘇葉 따위를 加한다.

中統 三十九 生血潤膚飲

天門冬 生地黃 熟地黃 麥門冬 當歸 黃芪 片芩 瓜蒌仁 桃仁 升麻 酒紅花

·燥症으로 인해 피부가 가늘가늘해지고 피가 나는 것을 다스린다.

[活套] 消渴에는 天花粉을 加한다.

中統 百十二 消風散

荊芥 甘草 人參 白茯苓 白殭蠶 川芎 防風 藿香 蟬退 羌活 陳皮 厚朴

·모든 風이 위로 공격하여 머리가 어지럽고 눈이 흐리고 코가 막히고 귀가 울리고 머리가 가려운 증과 婦人이 血風으로 인해 머리가 가려운 증을 다스린다.

[活套] 眼赤, 腫痛, 生翳에는 四物湯을 合方하고, 沙參을 人參 대신 넣고, 枸杞子, 甘菊, 青箱子, 木賊 따위를 加한다. 頭風에는 天麻와 藁本을 加한다. 耳痛에는 蔓荊子, 菖蒲, 細辛을 加한다.

[用法] 혹 粉末로 하여 二錢씩을 清茶로 服用한다.

中統 百二十四 清上防風湯

防風 白芷 連翹 桔梗 片芩 川芎 荊芥 梔子 黃連 枳殼 薄荷 甘草

·上焦의 火를 맑게 하고 머리와 얼굴에 瘡癩이 생기는 것과 風熱毒을 다스린다.

中統 百三十八 神効瓜蒌散

黃瓜蒌* 甘草 當歸 乳香 沒藥

· 乳癰(즉 乳腫)과 내암(즉 乳癌)을 다스린다.

[用法] 위의 藥味들을 作末하여 술 3되로 반이 되게 달여서 3분하여 식후에 服用한다. 혹은 술과 물을 반씩(같은 분량)으로 달여서 服用한다.

* 黃瓜蒌는 큰 것 한 개를 거피하고 불에 쪄어 가루를 만든다. 씨가 많은 것일수록 약효가 더 있다.

中統 百三十九 加味芷貝散

· 白芷 貝母 天花粉 金銀花 皂角刺 穿山甲 當歸尾 瓜蒌仁 甘草節

· 乳癰으로 젖이 땀땀하게 붓고 아픈 증을 다스린다. 酒水 各 半으로 煎服한다.

中統 百四十 十六味流氣散

蘇葉 人蔘 黃芪 當歸 川芎 官桂 厚朴 白芷 防風 烏藥 檳榔 白芍藥 枳殼 木香 甘草 桔梗

· 내암(즉 乳癌)을 다스린다. 靑皮 一錢을 가해서 달여 먹는다.

中統 百四十一 清肝解鬱湯

當歸 白朮 貝母 赤茯苓 白芍藥 熟地黃 山梔 人蔘 柴胡 牡丹皮 陳皮 川芎 甘草

· 간장의鬱火로 유방에 멍울이 맺힌 것을 다스린다.

中統 百四十二 芷貝散

白芷 貝母

· 유방의 결핵(멍울진 것)을 푼다. 결핵(멍울)에는 이 약을 主藥으로 하고 芎歸와 升麻를 加한다.

[用法] 위의 藥味들을 作末하여 一錢씩 술에 調合해서 자주 服用한다. 혹은 달여 먹기도 한다.

中統 百四十九 清肌散

荊防敗毒散 加 天麻 薄荷 蟬退

· 癰疹(두드러기)이 붉거나 회면서 가려운 증을 다스린다.

中統 百五十三 桔梗湯

桔梗 貝母 瓜蒌仁 薏苡仁 當歸 桑白皮 枳殼 黃芪 防風 杏仁 百合 甘草

· 肺癰을 다스린다.

中統 百五十四 通順散

赤芍藥 木通 白芷 何首烏 枳殼 茴香 烏藥 當歸 甘草

· 榮衛返魂湯, 追風通氣散, 何首烏散이라고도 한다. ① 痰飲으로 인해 병이 된 것을 모두 다스리는데, 주로 痰腫을 다스린다. ② 忍冬을 加하면 效力이 매우 좋다. ③ 虛하면 附子를 加한다. ④ 實하면 大黃을 加한다. ⑤ 痰에는 南星과 半夏를 加한다. ⑥ 腫硬에는 川芎, 麻黃, 葱白, 全蝎, 穿山甲을 加한다. ⑦ 流注에는 獨活을 加한다.

[用法] 酒水 各 半으로 煎服한다.

[活套] 氣虛에는 人蔘을 加한다. ⑧ 痰結에는 白芥子를 加한다. ⑨ 冷에는 生薑과 附子를 加한다.

中統 百五十五 夏枯草散

夏枯草 甘草

· 瘰癧를 잘 다스리며 厥陰을 補養하는 效能이 있다. 또 一兩을 水煎해서 服用하는데, 虛한 사람은 많이 먹을수록 좋다. 十全大補湯에 香附子, 遠志, 貝母를 가하여 兼服하면 瘰癧과 馬刀(脇下硬癰)의 寒熱에 聖藥이 된다.

中統 百七十 生料四物湯

生地黃 赤芍藥 川芎 當歸 防風 黃芩 薄荷

· 모든 瘡病을 다스린다.

[活套] 熱毒에는 惡實과 金銀花를 加한다.

中統 百七十一 牛黃解毒丹

甘草 金銀花 紫草茸 牛黃

· 小兒의 胎瘡(胎毒)의 諸熱을 다스린다.

[用法] 위의 藥味들을 作末해서 梧子大로 蜜丸을 짓는다. 服用量은 아이의 大小에 다르되 薄荷湯이나 蟬退湯에 타서 服用한다. 또 한 處方은 蟬退를 加한다.

中統 百七十二 柴歸飲

當歸 白芍藥 柴胡 荊芥 甘草

· 痘疹이 생기기 시작할 때 쓴다. 이 處方은 平和하게 養營하는 藥이다.

中統 百七十四 消毒保嬰丹

纏豆藤* 赤豆 黑豆 山查肉 牛蒡子 生地黃 辰砂 升麻 連翹 荊芥 防風 獨活 甘草 當歸 赤芍藥 黃連 桔梗 絲瓜

· 매년 春分과 秋分때 20丸씩 服用하면 痘毒이 점차 사라진다.

[用法] 위의 藥味들을 미리 作末해 두었다가, 春分이나 秋分을 지나 혹 上元이나 칠월 망일에 婦人과 고양이, 개를 忌하고 設糖과 버무려 오얏씨만하게 丸을 지어 甘草湯에 타서 먹는다.

* 纏豆藤은 즉 모두의 경상을 휘감는 가는 紅藤인데 팔월에 채취해서 陰乾해 쓴다.

中統 百七十八 五福化毒丹

玄參 桔梗 人蔘 赤茯苓 馬牙硝 青黛 甘草 麝香 金箔 銀箔

· 熱疔으로 인해 瘡癤이 많이 나고 痘瘡의 여독으로 인해 입에서 침이 흐르고 잇몸에서는 냄새나는 피가 나오는 것과 夜盲症을 다스린다.

[用法] 위의 藥味들을 作末하여 一兩으로

열 두개의 蜜丸을 지어 金銀箔을 입힌다. 一歲 아기는 一丸을 四回에 걸쳐 薄荷湯에 타서 먹인다. 夜盲症에는 묵은 좁쌀 뜨물에 타서 먹인다.

中統 百八十一 麥湯散

地骨皮 甘草 滑石 麻黃 人蔘 熟地黃 知母 葶藶 羌活 小麥

· 水痘를 다스린다.

3) 下統

下統 四 防風通聖散

滑石 甘草 石膏 黃芩 桔梗 防風 川芎 當歸 赤芍藥 大黃 麻黃 薄荷 連翹 芒硝 荊芥 白朮 梔子

· 諸風熱, 瘡疹黑陷, 風熱瘡疥, 頭生白屑, 面鼻紫赤, 肺風瘡, 大風癩疾 혹은 熱結로 인한 大小便 不通을 다스린다. 아울러 酒毒을 푼다.

[活套] 滑石과 芒硝를 빼고 나머지를 아울러 酒炒한 것을 酒製通聖散이라고 한다. 癩疹瘡痒에는 金銀花, 玄蔘, 蟬退를 加한다.

下統 十二 黃連解毒湯

黃連 黃芩 黃柏 梔子

· 傷寒의 大熱로 煩躁하고 잠을 자지 못하는 것을 다스리며 나온 후의 飲酒毒 및 一切의 熱毒을 푼다. 腸風에 脈이 洪大하면 四物湯과 合方해서 쓴다.

[活套] 癩疹, 丹毒 內外實熱에는 升麻葛根湯과 合方한 후 玄蔘, 荊防, 蟬退 따위를 加한다.

下統 四十二 赤小豆湯

赤小豆 猪苓 桑白皮 防己 連翹 澤瀉 當歸 商陸 赤芍藥

·年少者가 氣血이 뜨거워 生瘡했다가 腫滿으로 변한 것을 다스린다.

下統 五十七 龍腦安神丸

白茯苓* 人蔘 地骨皮 麥門冬 甘草 桑白皮 犀角 牛黃 龍腦 麝香 朱砂 馬牙硝 金箔

·新久 遠近을 불문하고 다섯 가지의 癩癧을 다스린다.

[活套] 痘後의 餘熱로 인한 여러 가지 증세에도 좋다.

[用法] 위의 藥味들을 作末하여 彈子大의 蜜丸을 지어 金箔을 입혀서 一丸씩 겨울에는 溫水에 여름에는 冷水에 타서 먹는다.

* 白茯苓 대신 白茯苓神을 쓰는 處方도 있다.

下統 百六 瀉清丸

當歸 草龍膽 川芎 梔子 大黃 羌活 防風

·肝의 實熱을 다스린다. ① 痘毒의 驚搖을 다스리고, 心肝의 熱을 瀉하고, 肝風이 스스로 사라지게 하는 데는 이 瀉清丸이 좋고 小便을 通利하게하여 熱이 나지 못하게 하는 데는 導赤散이 좋다. ② 痘後의 餘毒이 눈으로 들어가 호리하게 하는 증세에 效力이 크며 설탕을 탄 竹葉煎湯으로 삼킨다.

[用法] 위의 藥末들을 芡實大의 蜜丸으로 지어 쓴다.

[活套] 少陽의 風痞에는 三~五丸을 생강차에 타서 먹으면 新效를 본다. ③ 봄에 傷風된 것이 여름에 이르러 暴瀉를 하면 三~五丸을 藥本煎湯에 타서 먹는다.

下統 百三十 犀角消毒飲

牛蒡子 荊芥 防風 甘草 犀角

·丹毒과 斑疹 및 癩疹을 다스린다.

[活套] 敗毒散과 合方해도 좋다.

[用法] 물을 넣어 갈아 服用한다.

下統 百三十七 龍膽瀉肝湯

草龍膽 柴胡 澤瀉 木通 車前子

地黃 當歸 山梔 黃芩 甘草

·肝臟의 濕氣로 인한 남자의 陰挺과 여자의 陰의 痒癢을 다스린다. 空心에 服用한다.

下統 百四十一 秦芫蒼朮湯

秦芫 皂角仁 桃仁 蒼朮 防風 黃柏 當歸稍 澤瀉 檳榔 大黃

·熱, 濕, 風, 痰이 합해서 痔가 된 것을 다스린다. 腸頭に 덩어리지는 것은 濕과 熱이 합쳐진 것이요, 便秘되는 것은 燥이다.

[用法] 위의 藥味 중에서 檳榔, 桃仁, 皂角仁 三味를 제외한 나머지 七味를 水煎해서 건더기를 버리고 앞서 제외했던 三味를 넣고 다시 달여서 空心에 뜨겁게 해서 먹는다. 좋은 반찬을 먹어서 內服한 약을 누르는 것이 좋다.

下統 百四十四 三仁膏

草麻子仁 麻子仁 杏仁

·癰疽가 처음 생기는 데 쓰면 神效를 본다.

[用法] 위의 3가지의 仁을 作末하여 白淸으로 고루 調合해서 붙인다.

[活套] ① 밀가루와 麵末을 加하면 더욱 좋다. ② 毒이 심하면 蒼耳子, 木鱉子, 白僵蠶, 木綿子仁을 加한다. ③ 挾痰했으면 南星과 半夏를 加한다. ④ 熱腫에는 大黃을 加한다. ⑤ 瘡口를 터뜨리려면 紫金錠과 白丁香을 加한다. ⑥ 화농을 觸診하려면 桂心을 加한다. ⑦ 經絡을 통하게 하려면 草烏를 加한다.

下統 百四十五 神聖餅

當歸 白芷 爐甘石 乳香 沒藥 石雄黃 熊膽* 硼砂 海螵蛸 輕粉 巴豆霜 麝香 朱砂 胡桐淚

Table 1. The Frequency of Prescription in BangYakHapPyun(方藥合編)

	Frequency
上統	10 (7.9%)
中統	22 (12.1%)
下統	16 (9.8%)

·瘡口に 삼입하면 나쁜 것을 제거하고 새살을 나게 한다.

[用法] 위의 藥味들을 作末하여 白芨餅에 이겨서 바늘처럼 가늘게 만들어 瘡口에 꽂는다.

* 熊膽은 물에 떨어뜨려서 줄이 되면서 흘러가지 않는 것이어야 진짜다.

下統 百四十六 仙遺糧湯

土茯苓 防風 木瓜 木通 薏苡仁 白鮮皮 金銀花 皂角刺

·楊梅風瘡에 輕粉을 잘못 服用하여 살이 헐고 뼈가 상한 것을 다스린다. 一日 三回 服用한다.

下統 百四十七 丹粉丸

輕粉 黃丹 石雄黃 鐘乳粉 琥珀 乳香 枯白礬

·楊梅瘡를 다스린다.

[活套] ① 腦後가 먼저 傷렸으면 荊芥湯에 藥本 一錢을 가해서 服用한다. ② 이마가 傷렸으면 이 丹粉丸에 獨活을 가해서 쓴다. ③ 足心이 傷렸으면 桂皮를 加한다. ④ 陰處가 傷하면 靑皮를 加한다. ⑤ 肢節이 傷하면 穿山甲을 加한다. ⑥ 유방밑이 傷하면 柴胡를 加한다. ⑦ 口과 코가 傷하면 枳殼을 加한다. ⑧ 用藥 후에 咽喉症이 생기면 仙遺糧湯 三十貼을 쓴다.

[用法] 위의 藥末을 糯米糊로 梧子大의 丸

을 지어 空心에 荊芥, 雀舌 煎湯으로 十丸 내지 十五丸을 삼킨다. ⑨ 鱈魚湯으로 삼키면 더욱 좋다. 麝香二分을 加하면 아프지 않고 가렵지 않고 咽喉症도 나지 않는다.

下統 百四十八 梔子清肝湯

柴胡 梔子 牡丹皮 赤茯苓 川芎 赤芍藥 當歸 牛蒡子 靑皮 甘草

·肝, 痰에 火가 盛해서 귀 뒤, 목, 가슴, 유방 등에 멍울이 생기는 것을 다스린다.

下統 百四十九 酒歸欬

酒當歸 白朮 酒片苓 酒芍藥 川芎 陳皮 酒天麻 蒼朮 蒼耳子 酒黃芩 酒甘草 防風

·痘瘡를 다스린다. 一日 三回 服用하며 服用후에는 잠시 포근히 자는 것이 좋다.

下統 百五十 活血驅風湯

蒼朮 杜冲 肉桂 天麻 薏苡仁 橘紅 檳榔 厚朴 枳殼 當歸 川芎 白芷 細辛 白蒺藜 桃仁 白芍藥 半夏 五靈脂 甘草

·腎臟風瘡의 瘙癢과 痛症을 다스린다. 이는 肝腎이 虛하여 風濕이 侵入하기 때문이다.

[用法] 乳香末을 조금 넣어서 空心에 服用한다.

2. 方藥合編에서의 皮膚處方의 수

上統 10/126(7.9%), 中統 22/181(12.1%), 下統 16/163(9.8%)로서 상대적으로 中統(和劑)에 가장 많았다(Table 1).

고찰

1. 上統에서의 皮膚外科處方의 分析

上統處方	藥物構成	效能
上統24 凝神散	人蔘 白朮 白茯苓 山藥 白扁豆 粳米 知母 生地黃 甘草 地骨皮 麥門冬 竹葉	肌表를 清涼
上統 33 十全大補湯	人蔘 白朮 白茯苓 甘草 熟地黃 白芍藥 川芎 當歸 黃芪 肉桂 加 金銀花 皂角刺 穿山甲(1) 倍 人蔘 肉桂 黃芪 加 生薑 附子 蓮肉(2)	(1)癰疽의 病邪가 아직도 깨끗하지 않을 때 (2)膿流清水하거나 오래도록 收斂되지 않을 때
上統 68 四物湯	熟地黃 白芍藥 川芎 當歸 加 黃芩하여 浮萍草末로 調服한다.	虛痒
上統 93 托裏消毒飲	金銀花 陳皮 黃芪 天花粉 防風 當歸 川芎 白芷 桔梗 厚朴 穿山甲 皂角刺 化膿하면서 氣가 虛하면 人蔘 三~五錢을 加 虛冷하면 肉桂를 또 加한다.	癰疽를 다스리는데, 未成된 癰 疽는 消盡시키고, 已成의 것은 潰滅시킨다
上統 94 加味十全 大補湯	十全大補湯 加 陳皮 烏藥 五味子	癰疽를 다스려서, 터진 후에 氣血을 補하고 膿을 排除하고 살이 나게 한다
上統 95 滋腎保元湯	八物湯 加 牧丹皮 黃芪 山茱萸 杜沖 肉桂 附子	癰疽가 터진 후 더디 아무는 증세를 다스린다
上統 96 國老膏	大甘草	懸癰
上統 121 保元湯	人蔘 黃芪 甘草 氣가 虛하고 血이 弱해서 잘 모이지 못하면 川芎과 官桂를 가한다 (1) 痘疹이 4~5일 되어, 根窠는 비록 돌기했어도 색은 광택이 나지 않으며, 氣가 弱하고 血이 盛하면 白芍藥, 官桂, 糯米를 加한다 (2) 5~6일 되어 氣 가 차고 血이 弱하고 色이 흐린 紅紫色이면 木香, 當歸, 川芎을 加한다 (3) 6~7일이 되어 成漿이 되 지 못하고 氣血이 적어서 寒을 제어할 수 없으면 官 桂와 糯米를 加한다 (4) 7~8일이 되어 毒이 漿으 로 되면서도 충만하지 못하면 官桂와 糯米를 加한다 (5) 8~9일이 되어도 漿이 불충만하면 糯米를 加한 다 (6) 11~12일이 되어 濕潤하고 아물지 않으며 內虛하면 白朮과 白茯苓을 加한다.	痘疹이 2~3일 되어, 根窠는 비록 등글되 頂陷한 것을 다스 린다
上統 122 九味神功散	黃芪 人蔘 白芍藥 生地黃 紫草茸 紅花 鼠黏子 前胡 甘草	痘(마마)가 나오고 독기가 성 하여 血紅(紅紫色 血痘)이 전 신에 퍼지거나 失血 혹은 吐瀉 하기 7일전의 諸症에 服用해서 解毒하는데 좋다
上統 123 安胎飲	人蔘 陳皮 大腹皮 白朮 當歸 川芎 白芍藥 便香附 砂仁 蘇葉 赤茯苓 甘草	孕婦의 痘疹을 다스린다

1) 上統에서의 疾患別 處方 分類

疾患名	處方名
肌表清涼	凝神散
虛痒	四物湯加味
癰疽	十全大補湯加味 托裏消毒飲 加味十全大補湯 滋腎保元湯
懸癰	國老膏
痘疹	保元湯 九味神功散 安胎飲

2) 上統에서의 處方藥物 構成 횟수

횟수	藥物名
8회	甘草 人蔘
7회	芍藥 川芎 當歸
6회	茯苓 白朮 黃芪
5회	肉桂
4회	熟地黃
3회	陳皮
2회	生地黃 金銀花 皂角刺 穿山甲 附子
1회	山藥 白篇豆 粳米 知母 地骨皮 麥門冬 竹茹 生薑 蓮肉 黃芩 浮萍 天花芬 防風 白芷 桔梗 厚朴 烏藥 五味子 牡丹皮 山茱萸 杜冲 木香 紫草茸 紅花 鼠黏子 前胡 大腹皮 香附子 砂仁 蘇葉 糯米

이상 살펴본 바 上統에서는 藥物構成의 上位藥들이 甘草 白芍藥 當歸 黃芪 人蔘 白(赤)茯苓 白朮 肉桂 熟地黃등 補氣血¹³⁾에 해당하는 十全大補湯 構成 藥物들이 대부분을 차지하고 있었다.

전체 方藥合編의 上統에 많이 활용된 약물은 甘草, 人蔘, 當歸, 白朮, 白茯苓, 熟地黃, 白芍藥, 陳皮, 黃芪 순인 것⁷⁾과 비교해 볼 때 皮膚外科 處方에서도 특별한 차이는 없었다. 또 주치질환별 처방을 살펴보았을 때 癰疽에 관한 處方이 가장 많았으며 다음으로는 痘疹에 관한 處方의 구성비율이 높음을 알 수 있었다.

2. 中統에서의 皮膚外科處方の 分析

中統處方	藥物構成	效能
中統 141 清肝解鬱湯	當歸 白朮 貝母 赤茯苓 白芍藥 熟地黃 山梔 人蔘 柴胡 牡丹皮 陳皮 川芎 甘草	간장의鬱火로 유방에 멍을이 맺힌 것을 다스린다
中統 142 芷貝散	白芷 貝母	유방의 결핵(멍울진 것)을 푼 다. ① 결핵(멍울)에는 이 약 을 主藥으로 하고 芎歸와 升 麻를 加한다
中統 149 清肌散	荊防敗毒散 加 天麻 薄荷 蟬退	癩疹(두드러기)이 붉거나 희 면서 가려운 증을 다스린다
中統 153 桔梗湯	桔梗 貝母 瓜蒌仁 薏苡仁 當歸 桑白皮 枳殼 黃芪 防風 杏仁 百合 甘草	肺癰
中統 154 通順散	赤芍藥 木通 白芷 何首烏 枳殼 茴香 烏藥 當歸 甘草	痰腫
中統 155 夏枯草散	夏枯草 甘草	瘰癧
中統 170 生料四物湯	生地黃 赤芍藥 川芎 當歸 防風 黃芩 薄荷	모든 瘡病을 다스린다
中統 171 牛黃解毒丹	甘草 金銀花 紫草茸 牛黃	小兒의 胎瘡(胎毒)의 諸熱을 다스린다
中統 172 柴歸飲	當歸 白芍藥 柴胡 荊芥 甘草	痘疹이 생기기 시작할 때 쓴 다
中統 174 消毒保嬰丹	纏豆藤 赤豆 黑豆 山楂肉 牛蒡子 生地黃 辰砂 升麻 連翹 荊芥 防風 獨活 甘草 當歸 赤芍藥 黃連 桔梗 絲瓜	매년 春分과 秋分때 20丸씩 服用하면 痘毒이 점차 사라진 다
中統 178 五福化毒丹	玄參 桔梗 人蔘 赤茯苓 馬牙硝 青黛 甘草 麝香 金箔 銀箔	熱疔으로 인해 瘡癤이 많이 나고 痘瘡의 여독으로 인해 입에서 침이 흐르고 잇몸에서 는 냄새 나는 피가 나오는 것 과 夜盲症을 다스린다
中統 181 麥湯散	地骨皮 甘草 滑石 麻黃 人蔘 熟地黃 知母 苧蘆 羌活 小麥	水痘

1) 中統에서의 疾患別 處方 分類

疾患名	處方名
丹毒	犀角升麻湯
解肌	葛根解肌湯
癰疽	人蔘(荊防)敗毒散 加味
瘡疫 大頭瘡 斑疹腫毒	上同
隱疹(風毒)	升麻葛根湯 清肌散
麻疹	升麻葛根湯
皮膚屑起 血出 (燥證)	生血潤膚飲
頭痒 (婦人 血風)	消風散
頭面生瘡癩	清上防風湯
乳癰	神效瓜蒌散 加味芷敗散 十六味流氣飲 清肝解鬱湯 芷敗散
肺癰	桔梗湯
痰腫	通順散
癩癧	夏枯草散
瘡(+胎瘡)	生料四物湯 牛黃解毒丹
痘疹	柴歸飲 消毒保嬰丹 五福化毒丹
瘡癩 (疖으로인한)	五福化毒丹
水痘	麥湯散

2) 中統에서의 處方藥物 構成 횟수

횟 수	藥 物 名
19회	甘草
11회	當歸
10회	防風
9회	川芎 芍藥
8회	桔梗 白芷
7회	荊芥
6회	羌活 黃芩 人蔘 枳殼
5회	升麻 柴胡 茯苓 金銀花
4회	熟地黃 貝母
3회	獨活 連翹 玄蔘 黃蓮 牛蒡子 山楂 生地黃 黃芪 瓜蒌仁 薄荷
2회	葛根 前胡 犀角 蘇葉 蟬退 陳皮 厚朴 梔子 烏藥
1회	白附子 石膏 樺皮 蔥白 天門冬 麥門冬 桃仁 紅花 白殭蠶 藿香 天麻 薏苡仁 桑白皮 杏仁 百合 木通 何首烏 少茴香 夏古草 紫草茸 牛黃 纏豆藤 赤豆 黑豆 牡丹皮 白朮 檳榔 肉桂 穿山甲 皂角刺 乳香 沒藥 天花粉 木香 辰砂 絲瓜 馬牙草 小麥 葶藶子 知母 麻黃 滑石 地骨皮 青黛 麝香 黃瓜萹

中統에서는 藥物構成이 上統에 많은 當歸, 川芎, 芍藥, 人蔘 이외에 解表祛風하는 防風과 祛痰排膿하는 桔梗, 散風除濕 消腫排膿하는 白芷, 羌活, 黃芩, 荊芥, 枳殼, 升麻, 柴胡, 金銀花 등 補氣血藥보다는 祛風 清熱 透疹 和解 解毒 消腫 排膿하는 藥物들의 構成이 높았다.

전체 方藥合編의 中統에 많이 활용된 약물은 甘草, 陳皮, 當歸, 人蔘, 川芎, 半夏, 白芍藥, 白朮, 柴胡, 赤茯苓 순인 것으로 보면⁷⁾ 피

부의과질환을 치료하는 처방에서는 防風과 桔梗, 白芷, 荊芥, 羌活, 黃芩, 枳殼, 升麻, 金銀花 등이 構成比率이 높았으므로 藥物構成에 있어서 일반처방과 피부외과 질환을 치료하는 처방 구성이 많은 차이가 있음을 알 수 있었다. 즉 祛風, 解表, 排膿, 清熱등의 效能을 가진 藥物들이 皮膚外科 處方에 많이 쓰여짐을 알 수 있었다. 또 주치 질환별 처방빈도를 살펴보면 乳癰과 痘疹에 관한 처방이 가장 많이 구성되어 있었다.

3. 下統에서의 皮膚外科處方 分析

下統處方	藥物構成	效能
下統 4 防風通聖散	滑石 甘草 石膏 黃芩 桔梗 防風 川芎 當歸 赤芍藥 大黃 麻黃 薄荷 連翹 芒硝 荊芥 白朮 梔子 (1)金銀花, 玄蔘, 蟬退를 加한다.	諸風熱, 瘡疹黑陷, 風熱瘡 疥, 頭生白屑, 面鼻紫赤, 肺 風瘡, 大風癩疾 (1)癩疹瘙癢
下統 12 黃連解毒湯	黃連 黃芩 黃柏 梔子, 升麻葛根湯과 合方 한 데다가 玄蔘, 荊防, 蟬退 따위를 加한다.	癩疹, 丹毒 內外實熱
下統 42 赤小豆湯	赤小豆 豬苓 桑白皮 防己 連翹 澤瀉 當歸 商陸 赤芍藥	年少者가 氣血이 뜨거워 生 瘡했다가 腫滿으로 變換한 것
下統 57 龍腦安神丸	白茯苓 人蔘 地骨皮 麥門冬 甘草 桑白皮 犀角 牛黃 龍腦 麝香 朱砂 馬牙硝 金箔	痘後의 餘熱로 인한 여러 가지의 증세
下統 106 瀉清丸	當歸 草龍膽 川芎 梔子 大黃 羌活 防風	痘毒의 驚搖 痘後의 餘毒이 눈으로 들어 가 호리하게 하는 증세에 效力이 크며, 설탕을 탄 竹 葉煎湯으로 삼킨다
下統 130 犀角消毒飲	牛蒡子 荊芥 防風 甘草 犀角	丹毒과 斑疹 및 癩疹
下統 137 龍膽瀉肝湯	草龍膽 柴胡 澤瀉 木通 車前子 赤茯苓 生地黄 當歸 山梔 黃芩 甘草	肝臟의 濕氣로 인한 남자의 陰挺과 여자의 陰의 痒瘡
下統 141 秦艽蒼朮湯	秦艽 皂角仁 桃仁 蒼朮 防風 黃柏 當歸稍 澤瀉 檳榔 大黃	熱, 濕, 風, 痰이 합해서 痔 가 된것
下統 144 三仁膏	苧麻子仁 麻子仁 杏仁 (1)밀가루와 麵末을 加하면 더욱 좋다 (2)毒이 심하면 蒼耳子, 木鱉子, 白殭蠶, 木綿子仁을 加한다 (3)挾痰했으면 南星과 半夏를 加한다 (4)熱腫에는 大黃을 加한다 (5)瘡口를 터뜨리려면 紫金錠과 白丁香을 加한다 (6)화농을 觸診하려면 桂心을 加한다 (7)經絡을 통하게 하려면 草烏를 加한다	癩瘡가 처음 생기는 데 쓰 면 神效
下統 145 神聖餅	當歸 白芷 爐甘石 乳香 沒藥 石雄黃 熊膽 硼砂 海蝶蛸 輕粉 巴豆霜 麝香 朱砂 胡桐淚	瘡口에 삽입하면 나쁜 것을 제거하고 새 살을 나게 한다

下統處方	藥物構成	效能
下統 146 仙遺糧湯	土茯苓 防風 木瓜 木通 薏苡仁 白鮮皮 金銀花 皂角刺	楊梅風瘡에 輕粉을 잘못 服用하여 살이 헐고 뼈가 상한것을 다스린다
下統 147 丹粉丸	輕粉 黃丹 石雄黃 鐘乳粉 琥珀 乳香 枯白礬 (1)腦後가 먼저 傷하면 荊芥湯에 藥本 一錢을 加 (2)이마가 傷했으면 이 丹粉丸에 獨活을 加 (3)足心이 傷했으면 桂皮를 加 (4)陰處가 傷하면 靑皮를 加 (5)肢節이 傷하면 穿山甲을 加 (6)유방밑이 傷하면 柴胡를 加 (7)입과 코가 傷하면 枳殼을 加 (8)用藥 후에 咽喉症이 생기면 仙遺糧湯 三十貼을 쓴다	楊梅瘡 〔用法〕 위의 藥末을 糯米糊로 梧子大의 丸을 지어 空心에 荊芥, 雀舌 煎湯으로 十丸 내지 十五丸을 삼킨다. 鱈魚湯으로 삼키면 더욱 좋다. 麝香 二分을 加하면 아프지 않고 가렵지 않고 咽喉症도 나지 않는다
下統 148 梔子清肝湯	柴胡 梔子 牡丹皮 赤茯苓 川芎 赤芍藥 當歸 牛蒡子 靑皮 甘草	肝, 痰에 火가 盛해서 귀뒤, 목, 가슴, 유방 등에 멍을이 생기는 것
下統 149 酒歸飲	酒當歸 白朮 酒片苓 酒芍藥 川芎 陳皮· 酒天麻 蒼朮 蒼耳子 酒黃芩 酒甘草 防風	痘瘡
下統 150 活血驅風湯	蒼朮 杜冲 肉桂 天麻 薏苡仁 橘紅 檳榔 厚朴 枳殼 當歸 川芎 白芷 細辛 白蒺藜 桃仁 白芍藥 半夏 五靈脂 甘草 乳香末을 조금 넣어서 空心에 服用	腎臟風瘡의 瘙痒과 痛症을 다스린다. 이는 肝腎이 虛하여 風濕이 侵入하기 때문

1) 下統에서의 疾患別 處方 分類

疾患名	處方名
隱疹 瘙痒	防風通聖散 黃連解毒湯 犀角消毒飲
瘡疹黑陷 風熱瘡疥 頭生白屑 肺風瘡 大風癩疾	防風通聖散
丹毒	黃連解毒湯(+升麻葛根湯 中22) 犀角消毒飲
生瘡	赤小豆湯 酒歸飲
痘	龍腦安神丸 瀉清丸
斑疹	犀角消毒飲
陰痒瘡	龍膽瀉肝湯 活血驅風湯
痔	秦艽蒼朮湯
外用	神聖餅 三仁膏
楊梅風瘡	仙遺糧湯 丹粉丸
結核	梔子清肝湯

2) 下統에서의 處方藥物 構成 횟수

횟수	藥物名
9회	當歸
7회	防風
6회	甘草
5회	黃芩 梔子 芍藥 川芎
4회	大黃 茯苓 荊芥
3회	蒼朮 澤瀉 柴胡
2회	白朮 金銀花 黃柏 麝香 朱砂 龍膽草 牛蒡子 木通 皂角仁(子) 桃仁 檳榔 半夏 蒼耳子 白芷 乳香 雄黃 輕粉 薏苡仁 天麻 玄蔘 蟬退 桑白皮 連翹 青皮 枳殼
1회	滑石 石膏 桔梗 麻黃 芒硝 黃連 人蔘 地骨皮 麥門冬 犀角 牛黃 龍腦 馬牙草 羌活 五靈脂 白蒺藜 細辛 厚朴 橘紅 陳皮 牡丹皮 竹葉 車前子 生地黄 秦艽 麻子仁 杏仁 生薑 南星 木鱉子 白殭蠶 木線子仁 爐甘石 沒藥 熊膽 礞砂 海蝶草 巴豆霜 胡桐淚 木果 白鮮皮 黃丹 紫金錠 商陵 白丁香 桂心 草烏 鐘乳粉 琥珀 枯白礬 杜沖 肉桂 赤小豆 豬苓 防己 穿山甲 桂皮 獨活

下統에서는 上統 中統에 포함된 當歸, 防風 등이 주축을 이루었으나 이에 더하여 黃芩, 梔子, 大黃 등과 같은 清熱 功下 하는 藥物의 構成이 높았다.

전체 方藥合編의 下統에 많이 활용된 藥物은 甘草, 陳皮, 當歸, 赤茯苓, 黃芩, 蒼朮, 白

朮순인 것으로 볼 때⁷⁾ 梔子, 大黃 등과 같은 清熱하는 藥物이 皮膚外科 處方에 더 많이 쓰인 것을 알 수 있었다. 또한 祛風解表하는 防風의 比率이 상당히 높은 것을 볼 수 있었다. 또 主治 질환별 처방 빈도를 살펴보면 癩疹瘙痒과 丹毒에 관한 處方の 구성이 가장 많았다.

4. 上中下統에서의 疾患別 處方

效能	處方名
肌表清冷 解肌	凝神散 葛根解肌湯
結核	梔子清肝湯
癰癤	夏古草散
丹毒	犀角升麻湯 黃連解毒湯(+犀角升麻湯) 犀角消毒飲
痰腫	通順散
痘疹	保元湯 九味神功散 安胎飲 柴歸飲 消毒保嬰丹 五福化毒丹 瀉清丸 龍腦安神丸 酒歸飲
麻疹	升麻葛根湯
斑疹	犀角消毒飲 人蔘(荊防)敗毒散加味
水痘	麥湯散
癰疽	十全大補湯加味 托裏消毒飲 加味十全大補湯 滋腎保元湯 消風散 人蔘(荊防)敗毒散加味
隱疹(瘙)痒	升麻葛根湯 清肌散 防風通聖散 黃連解毒湯 犀角消毒飲 四物湯加味 消風散
陰痒瘡 腎臟風瘡	龍膽瀉肝湯 活血驅風湯
乳癰	神效瓜蒌散 加味芷敗散 十六味流氣飲 清肝解鬱湯 芷敗散
楊梅風瘡	仙遺糧湯 丹粉丸
瘡	生料四物湯 牛黃解毒丹 赤小豆湯 酒歸飲
瘡癤	清上防風湯 五福化毒丹
痔	秦艽蒼朮湯
瘡疹黑陷 風熱瘡疥 頭生白屑 肺風瘡 大風癩疾	防風通聖散
瘡疫 大頭癰 斑疹腫毒	人蔘(荊防)敗毒散加味
皮膚屑起 血出	生血潤膚飲
肺癰	桔梗湯
懸癰	國老膏
外用	神聖餅 三仁膏

5. 上中下統에서의 處方藥物 構成 횟수

1) 上中下統에서 構成藥物중에서 각 2회이상 나온 藥物들 중 합계가 6회 이상인 藥物(Table 13)

2) 上中下統에서 각 2회 이상 나온 藥物중 두 계열 이상에서 쓰였던 藥物(Table 14)

전체 方藥合編의 上中下統에 많이 활용된 약물은 甘草, 當歸 陳皮, 人蔘, 白朮, 川芎, 白芍藥, 半夏 순인 것으로 볼 때⁷⁾ 皮膚外科 上中下統 처방에 공통적으로 분포되어 있으면서 많은 수를 차지하고 있는 藥物중 當歸, 川芎,

芍藥, 甘草 등은 역시 일반 처방에서도 많은 부분을 차지하고 있으며 이와 함께 利水滲濕 利濕熱 補脾胃하는 茯苓이 많은 비율을 차지하고 있는데 이는 皮膚外科 處方이 濕과 濕熱을 없애는데¹³⁾ 많은 중점을 두고 있다는 것을 알 수 있었다. 공통으로 많은 구성비율을 차지하는 甘草는 調和諸藥하는 藥物로서 공통적으로 많이 분포되어있는 것으로 보이고 當歸, 川芎, 芍藥 역시 構成이 많이 되어 있는데 이는 四物湯의 其本藥物들로서 대부분의 皮膚病에 補血 理血에 해당하는 藥物들이 基本이 된다고 볼 수 있다¹⁴⁾. 그리고 上中下 3곳에 골고루 분포 되어있지는 않으나 일반처방의 구성과 비교하

횟수	藥物名
33회	甘草
27회	當歸
21회	川芎 芍藥
17회	防風
15회	茯苓
14회	人蔘
11회	黃芩 荊芥
10회	白芷
9회	金銀花 黃芪
8회	白朮 熟地黃 桔梗 柴胡 枳殼
7회	梔子
6회	羌活

	藥物
(上 : 中 : 下)	甘草(8:19:6) 芍藥(7:9:5) 川芎(7:9:5) 當歸(7:11:9) 茯苓(6:5:4) 金銀花(2:5:2)
(上 : 中 : 下)	黃芪(6:3:0) 人蔘(8:6:0) 白朮(6:0:2) 防風(0:10:7) 白芷(0:7:4) 黃芩(0:6:5) 荊芥(0:7:4) 熟地黃(4:4:0) 連翹(0:3:2) 玄蔘(0:3:2) 蟬退(0:2:2) 牛蒡子(0:3:2) 梔子(0:2:5) 枳殼(0:6:2) 柴胡(0:5:3) 生地黃(2:3:0) 皂角刺(2:0:2)

* 편의상 2회 이상 나오지 않은 곳은 0번나온 것으로 처리

여서 피부외과 치료 처방에서 防風이 많은 비율을 차지하고 있었다. 이는 防風의 解表祛風하고 勝濕하는 효능이¹⁴⁾ 피부외과 질환을 치료하는데 중요한 역할을 하고 있다는 것을 보여 주는 것이라 할 수 있다.

결론

이상 方藥合編 上中下統의 原方에서 皮膚處方을 살펴본 결과 다음과 같은 結論을 얻을 수 있었다.

1. 皮膚處方の 比率은 上統 10/126(7.9%), 中統 22/181(12.1%), 下統 16/163(9.8%)로써 상대적으로 中統(和劑)에서 比率이 가장 높았다.

2. 上統에서는 藥物構成의 上位藥들이 甘草, 白芍藥, 當歸, 黃芪, 人蔘, 茯苓, 白朮, 肉桂, 熟地黃 등 補氣血에 해당하는 十全大補湯 構成 藥物들이 대부분을 차지하고 있었다.

3. 中統에서는 藥物構成의 上位藥에 있는 當歸, 川芎, 芍藥, 人蔘 이외에 解表祛風하는 防風과 祛痰排膿하는 桔梗 散風除濕 消腫排膿하는 白芷 그리고 羌活, 黃芩, 荊芥, 枳殼, 升麻, 柴胡, 金銀花 등 補氣血藥보다는 祛風, 清熱, 透疹, 和解, 解毒, 消腫, 排膿하는 藥物들의 構成이 높았다.

4. 下統에서는 上統 中統에 포함된 當歸 防風등이 주축을 이루었으나 이에 더하여 黃芩, 梔子, 大黃 등과 같은 清熱 功下 하는 藥物의 構成이 높았다.

5. 上中下統에 공통적으로 분포되어 있으면서 많은 수를 차지하고 있는 藥物은 調和諸藥하는 甘草를 제외하고는 利水滲濕 利濕熱 補脾胃하는 茯苓이 구성되어 있었다. 그리고 當歸 川芎 芍藥 등이 많은 構成을 차지하고 있었고 防風이 上中下統에 골고루는 아니지만 많은 구성을 차지하고 있었다.

6. 두 곳 이상 藥物構成數가 2회 이상인 藥物중 白朮과 兪角刺를 제외하고는 대부분의 藥物들이 上中統에 中下統과 같이 上統과 中統에 동시에 中統과 下統에 동시에 쓰이는 藥物들이 많았다.

7. 전체 方藥合編의 藥物構成 비율과 비교할 때 中統의 藥物 구성에 큰 차이를 보였으며 防風 荊芥 白芷 黃芩 등이 많은 비율을 차지하고 있음을 알 수 있었다.

8. 疾患은 痘疹에 해당하는 處方이 가장 많았으며 다음으로 癩疹 瘙癢 癰疽에 관한 처방들이 많은 비율을 차지하고 있다.

참고문헌

1. 黃度淵 : 對譯 證脈 方藥合編 辨證增補版, 서울, 南山堂, 1-284, 1995.
2. 곽금화 : 방약합편 부인과 관련처방에 대한 연구, 동국대학교 대학원 한의학과 석사학위논문, 2001.
3. 김형태 윤창열 : 방약합편에 대한 연구, 원전의사학회지 5(1):151-199, 1992.
4. 이선아, 이시형 : 황도연의 방약합편에 대한 연구, 원광대논문집 11(1):101-109, 2001.
5. 이훈영, 이상민, 안덕균 : 방약합편상의 당귀 배합처방에 대한 통계적 연구, 동서의학 2(1):59-68, 1977.
6. 송인선, 오민석, 송태원 : 부자를 포함하는 방약 합편처방에 대한 고찰, 대전대 논문집 10(1):323-336, 2001.
7. 강성용, 최민호, 변재영, 한중현 : 방약합편에 수록된 약물의 빈도조사, 원광대 논문집 1(1):19-31, 1991.
8. 이중휘, 송태원, 오민석 : 방약합편에 수록된 비증처방에 대한 연구, 대전대 논문

- 집 10(1):375-383, 2001.
9. 윤용감 : 방약합편에 수록된 처방의 주
치별 계통분류와 인용문헌에 대한 고찰,
방재학회지 1(1):28-60, 1990.
 10. 장승순, 강정수 : 피부병에 관한 한,중,
일 삼국의 다용처방에 대한 비교 연구,
동의생리병리학회지 15(2):205-221,
2001.
 11. 장승순, 강정수 : 은병적 관점으로 본
피부질환 처방에 관한 고찰, 대전대논
문집 9(1):113-120, 2000.
 12. 신상문, 오석선 : 외과질환에 상용하는
처방내용에 대한 고찰, 외관과학회지
7(1):95-122, 1994.
 13. 全國韓醫科大學 本草學教授 共著 : 本
草學, 서울, 永林社, 127,128,131,
149,151,167,178,198,242,320,351,
460, 1992.
 14. 康秉秀 金永坂 共著 : 臨床配合本草學,
서울, 永林社, p.95 153 409 540,
1994.