

董氏鍼의 穴位에 관한 고찰 (I)

- 手指部에 있는 穴 -

이준무¹·김택률²

상지대학교 한의과대학 ¹경혈학교실, ²침구학교실

The Study on the Acupuncture point(穴位) of Dongshi-Acupuncture(董氏鍼)

Joon-Moo Lee¹, Taek-Ryul Kim²

Dept. of ¹Meridian & Acupoint, ²Acupuncture & Moxibustion, College of Oriental Medicine, Sang-Ji University

Abstract

Objective : The purpose of this study is to find out differences of the points locations of Dongshi-Acupuncture described in some related books.

Methods : This study was carried out by means of comparing the different locational descriptions on the same acupoint in those books : Dong Shi Ji Xue Zhen Jiu Xue(董氏奇穴鍼灸學), Shi Yong Dong Shi Zhen Jiu Ji Xue Quan Ji(實用董氏鍼灸奇穴全集), Dong Shi Zhen Jiu Ji Xue Jing Yan Lu(董氏鍼灸奇穴經驗錄), Dong Shi Leng Zhen Cheng Xue Xue(董氏稜鍼激穴學), Dong Shi Ji Xue Tu Pu Zhi Liao Xue(董氏奇穴圖譜治療學), Tai Wan Dong Shi Zhen Jiu Jing Xue Xue (台灣董氏鍼灸經穴學).

Results : There are disagreement on the number, locations, cuns of acupuncture points among the books: the numbers of 11 kinds of points, locations of 2 points and cun of 15 points.

Conclusions : The authors can be grouped by the opinions on the acupuncture points. One group consists of Yang Wei Jie(楊維傑), Lai Jin Xiong(賴金雄) and Hu Bing Quan(胡丙權) and Hu Wen Zhi(胡文智), Liu Jian Zhong(陸建中) and Li Guo Zheng(李國政) form the other.

Key words : Dong-Shi-Zhen(董氏鍼), position(穴位), location

I. 서 론

董氏鍼法이 한국에 소개된 것은 2004년을 기준으로 불과 30년 이내의 일이다. 짧은 역사를 가지고 있음에도 불구하고 현재 임상에서는 활발하게 쓰이고 있다. 이것은 그 효과가 正經穴을 응용하는 鍼法에 비하여 뒤지지 않기 때문으로 생각된다. 그런데 어떤 이유에선지 주로 效能이

나 主治症 위주로 소개가 되어왔고 이론적인 면은 상대적으로 등한시 되어왔다고 보인다. 특히 穴位에 관하여는 심도 있는 고찰이 거의 없었다.

董氏鍼 穴位에 관하여는 董氏 관련 서적의 저자들 간에 이견들이 있어 董氏鍼法을 접하는 사람들에게 혼란을 주고 있다. 여러 저자들을 유형별로 분류하면 楊維傑의 견해를 따른 쪽과, 胡文智의 견해를 따른 쪽으로 대별할 수 있는데, 楊維傑은 董氏穴과 일반 奇穴을 구분하면서 董景昌선생이 그의 저서명을 董氏經外奇穴로 하지 않고 董氏正經奇穴로 한 것은 董氏穴이 14正經

• 교신저자: 이준무, 강원도 원주시 우산동 660 상지대학교 한의과대학 경혈학교실, Tel. 033-730-0662, Fax. 033-743-9051, E-mail : jmlee@mail.ac.kr

• 접수 : 2004/05/31 · 수정 : 2004/06/15 · 채택 : 2004/09/17

穴과 유관하기 때문이라고 하였다.¹⁾ 즉 “這些穴位的分布，在效用方面和十二經穴亦有一定的聯繫，…²⁾”라 하였듯이 董氏穴과 正經穴을 연관 지으려는 경향이 있다. 반면에 胡文智는 “作者跟隨董師十餘年，確知董氏經穴七百四十穴中，並無一穴與十四經同…³⁾”라 하였듯이 董氏穴과 正經穴을 엄밀하게 구분하려는 경향이 있다.

이런 시각 차이 때문인지 手指部 穴位 또한 상당히 이견이 많다. 그것은 몇 가지로 나눌 수 있는데, 첫째 分寸數가 다른 경우, 둘째 董氏穴은 하나의 穴名에 穴位는 두 개 이상인 것들이 많은데, 그 穴의 개수가 다른 경우, 셋째 전혀 다른 곳을 지칭하는 경우 등이다.

이에 저자는 董氏鍼 관련 서적들에 나타나는 穴位를 비교, 분석하여 보고한다.

II. 자료 및 연구방법

1. 주요 연구자료

(1) [董氏奇穴鍼灸學] : 楊維傑 著. 1980년에 초판되었는데, 본 연구에 쓰인 것은 1999년 全修第4版 본이다.

(2) [實用董氏鍼灸奇穴全集] : 胡文智 著. 胡文智 自費로 1987년 소량 출판된 책이고, 현재는 절판되었다. 연구에 쓰인 것은 영인한 것으로 출판사는 알 수 없다.

2. 연구방법

(1) 비교 서적 : [董氏奇穴鍼灸學]과 [實用董氏鍼灸奇穴全集]·[董氏鍼灸奇穴經驗錄]·[董氏稜鍼激穴學]·[董氏奇穴圖譜治療學]·[台灣董氏鍼灸經

穴學]에 기술된 穴位를 비교하였다.

이후 [董氏奇穴鍼灸學]은 [奇穴]로, [實用董氏鍼灸奇穴全集]은 [實用]로, [董氏鍼灸奇穴經驗錄]은 [經驗]으로, [董氏稜鍼激穴學]은 [稜鍼]으로, [董氏奇穴圖譜治療學]은 [圖譜]로, [台灣董氏鍼灸經穴學]은 [經穴]로 약칭하였다.

(2) 穴의 순서 : 편의상 [奇穴]의 순서로 하였다.

3. 한자의 표기

書名과 著者は 한자로 표기하였고, 그 외에는 한글 표기를 원칙으로 하였다.

(1) 인용서중 간자나, 약자·속자로 되어있는 것은 정자로 바꾸었다.

(2) 針은 鍼으로, 並은 竝으로 통일하였다.

(3) 기타 동의어들은 현재 일반적으로 쓰이고 있는 한자를 위주로 사용하였다.

(4) 인용문구의 끝에는 아라비아숫자로 반 괄호 안에 넣어 표시하되 말미의 참고문헌 일련번호와 일치시켜야 하는 것이 원칙이나, 본론의

(2. 혈위의 비교) 부분은 일일이 인용문구에 표기를 하면 너무 번잡하게 되므로 부득이하게 이 규정을 지키지 않았다.

(5) 인용서명은 [] 안에 넣었다.

III. 본 론

1. 董氏鍼 관련 주요서적

董氏鍼은 董氏 가문에서 수백 년 전⁴⁾부터 내려오던 鍼法이다. 이병국의 [董氏鍼灸奇穴과 奇方] 서문에는 ‘數千年傳來’라고 했는데 근거를

1) 楊維傑. 楊維傑全集1. 서울 : 대성의학사. 2003 : 72.

2) 楊維傑. 董氏奇穴鍼灸學. 台灣 : 志遠書局. 1999 : 2.

3) 胡文智. 實用董氏鍼灸奇穴全集 上冊. 台灣 : 1987 : 121.

4) 楊維傑. 양유결전집2. 서울 : 대성의학사. 2003 : 51.

찾을 수 없다.

董氏鍼과 관련된 최초의 서적은 董景昌 선생의 저서가 아니라 영동하게도 莊育民의 [鍼灸別傳寄穴傳]이다. 이 책은 董景昌 선생의 [董氏鍼灸正經奇穴學]보다 1년 먼저 출판이 되는데, 그 내용 중에는 '浮關·外關·大關·中關·小關·還巢' 등 董氏鍼의 穴들로 보이는 것들이 다수 수록되어 있다. 그러나 이 穴들은 董景昌 선생의 제자들이 지은 책에서의 穴들과 穴名, 穴位, 主治 등이 상당부분 다르게 되어있어 董氏穴과는 많은 차이가 있다. 따라서 본 논문에서는 莊育民의 [鍼灸別傳寄穴傳]은 논외로 할 것이다.

진정한 의미의 董氏鍼 관련 최초의 서적은 1973년 董景昌 선생의 [董氏鍼灸正經奇穴學]이다. 이 책은 [董氏正經奇穴學]으로 간칭된다.

董景昌 선생은 中國 山東省 平度懸에서 1916년에 出生하였다. 40년간의 임상에서 약 40만 명에 이르는 환자를 진료하였고, 특히 高棉(크메르)의 롱노르 대통령의 반신불수를 치료하여 장개석총통으로부터 중화민국 한의계에서 처음으로 훈장을 받았다.⁵⁾

董景昌 선생은 이 책을 지은 후 4년 뒤인 1977년 사망하게 된다. 이후에 董氏鍼과 관련된 서적들이 董景昌 선생의 제자들로부터 저술되게 되는데 주요 서적을 연도별로 정리하면 다음과 같다.

1973. : 董景昌 [董氏鍼灸正經奇穴學]
 1975. : 楊維傑 [鍼灸經緯]
 1980. 11 : 楊維傑 [董氏奇穴鍼灸學]
 1986. 07 : 이병국 [董氏鍼灸奇穴과 奇方]
 1986. : 胡丙權 [董氏鍼灸臨床精要秘錄]
 1987. 05 : 賴金雄 [董氏鍼灸奇穴經驗錄]

1987. 10 : 胡文智 [最新實用董氏鍼灸奇穴全集]
 1988. 07 : 陸建中 [董氏稜鍼微穴學]
 1988. 08 : 胡丙權 [董氏奇穴圖譜治療學]
 1991. : 胡丙權 [董氏五行刺絡鍼法]
 1992. : 李國政 [台灣董氏鍼灸手鍼療法]
 1994. 06 : 李國政 [台灣董氏鍼灸經穴學]
 1994. : 李國政 [台灣董氏鍼灸診斷學]
 1996. : 대전대 졸준위 [鍼灸經緯解釋]
 1996. : 李國政 [台灣董氏鍼灸基礎講義]
 1996. : 李國政 [台灣董氏鍼灸處方學]
 1996. : 李國政 [台灣董氏特效手足對應鍼法]
 1996. : 李國政 [台灣董氏校園疾病鍼刺療法]
 1996. : 李國政 [台灣董氏奇穴婦科鍼刺療法]
 1996. : 李國政 [台灣董氏特效治痛鍼法]
 1997. : 李國政 [台灣董氏鍼灸美容與減肥]
 1997. 07 : 최무환 [동씨침구학]
 1998. : 胡丙權 [董氏鍼灸全集驗證]
 1999. : 李國政 [董氏鍼灸放血療法]
 1999. : 李國政 [台灣董氏鍼灸倒馬鍼刺療法]
 2001. : 김광호 [김씨일침요법 하]
 2002. : 김광호 [김씨일침요법 상]
 2003. : 楊維傑 [楊維傑全集1]
 2003. : 楊維傑 [楊維傑全集2]

그 외에 강의집 형태로 김동식의 [동씨침 강의정리집]이 나와 있다.

2. 穴位의 비교

大間

[奇穴 p.6] 食指第一節正中央偏向大指外開三分.

[經驗 p.7] 食指第一節正中央偏橈側外開三分.

[實用 p.3] 食指掌面第一節正中央偏外側三分處..

5) 楊維傑. 양유걸전집1. 서울 : 대성의학사. 2003 : 39.

[稜鍼 p.4] 掌心向上, 當食指第一節正中央偏外側三分處是穴.

[圖譜 p.1] 食指第一節正中央橈側外開三分.

[經穴 p.9] 手掌食指第一節正中央偏外側三分.

小間

[奇穴 p.7] 食指第一節外上方, 距大間穴高二分.

[經驗 p.8] 食指第一節外上方, 距大間穴高二分.

[實用 p.5] 掌面食指第一節正中央外側三分上二分半處. 即大間穴上二分半處.

[稜鍼 p.5] 掌心向上, 取食指第一節外上方, 大間穴直上二分半是穴.

[圖譜 p.2] 食指第一節外上方, 距大間穴高二分.

[經穴 p.11] 手掌面食指第一節正中央外側三分之二分半處. 大間穴上二分半處.

浮間

[奇穴 p.8] 食指第二節中央外開二分.

[經驗 p.8] 食指第二節中央外開二分, 距第三節橫紋三分三.

[實用 p.11] 掌面食指第二節中央外開三分上一分半處是穴.

[稜鍼 p.5] 掌心向上, 當食指第二節中央外側三分上一分半處是穴.

[圖譜 p.3] 食指第二節中央外開二分, 距第三節橫紋三分三.

[經穴 p.14] 手掌面食指第二節中央外開三分上一分半處.

外間

[奇穴 p.8] 食指第二節正中線外開二分, 距第三節橫紋六分六.

[經驗 p.9] 食指第二節正中線外開二分, 距第三

節橫紋六分六.

[實用 p.11] 掌面食指第二節中央偏外側三分下一分半處, 即浮間穴下三分處.

[稜鍼 p.5] 掌心向上, 當浮間穴下三分處是穴.

[圖譜 p.4] 食指第二節正中線外開二分, 距第三節橫紋六分六.

[經穴 p.15] 手掌面食指第二節中央偏外側三分下一分半處, 即浮間穴下三分處.

中間

[奇穴 p.9] 食指第一節正中央.

[經驗 p.9] 食指第一節正中央.

[實用 p.6] 食指掌面第一節正中央.

[稜鍼] 悤음.

[圖譜 p.5] 食指第一節正中央.

[經穴 p.12] 手掌食指第一節正中央.

木穴

[奇穴 p.10] 在掌面食指之內側. 計有二穴點.

[經驗 p.18] 在掌面食指之內側.

[實用 p.12-13]

木二穴 : 掌面食指第一節正中央內側三分處. 即中間穴內側三分處.

木一穴 : 掌面食指第一節正中央內側三分下二分半處.

木三穴 : 掌面食指第一節正中央內側三分上二分半處.

[稜鍼 p.5] 掌心向上, 當食指第一節正中央(即中間穴)內側三分(四分法).

[圖譜 p.17] 在掌面食指之內側.

[經穴 p.16-18]

木二穴 : 手掌面食指第一節正中央內側三分處. 即中間穴內側三分處.

木一穴 : 手掌面食指第一節正中央內側三分下二分半處.

木三穴 : 手掌面食指第一節正中央內側三分

上二分半處.

脾腫

[奇穴 p.11] 在掌面中指第二節中央線上.

[經驗 p.19] 在掌面中指第二節中央線上.

[實用 p.20]

脾腫一穴：掌面中指第二節中央下二分半處.

即火星下穴下二分半處

脾腫二穴：掌面中指第二節中央上二分半處.

即火星下穴上二分半處

[稜鍼] 없음.

[圖譜 p.18] 在掌面中指第二節中央線上.

[經穴 p.24-25]

脾腫一穴：手掌面中指第二節中央下二分半處. 即火星下穴下二分半處

脾腫二穴：手掌面中指第二節中央上二分半處. 即火星下穴上二分半處

心常

[奇穴 p.12] 在掌面中指第一節之中線外開二分處.

[經驗 p.19] 在掌面中指第一節之中線外開二分處.

[實用 p.14-15]

心常一穴：掌面中指第一節正中央內側三分下二分半處

心常二穴：掌面中指第一節正中央內側三分處

心常三穴：掌面中指第一節正中央內側三分上二分半處

[稜鍼 p.6] 掌心向上, 當中指第一節中央內側計三穴.

[圖譜 p.19] 在掌面中指第一節之中線外開二分處.

[經穴 p.19-21]

心常一穴：手掌面中指第一節正中央內側三

分下二分半處.

心常二穴：手掌面中指第一節正中央內側三分處.

心常三穴：手掌面中指第一節正中央內側三分上二分半處.

三眼

[奇穴 p.13] 在掌面無名指之內側.

[經驗 p.21] 在掌面無名指第一節之內側.

[實用 p.57] 在掌面無名指第一節之外側三分線上.

[稜鍼] 없음.

[圖譜 p.21] 在掌面無名指第一節之內側.

[手鍼 p.308] 在掌面無名指第一節之外側三分線上.

復原

[奇穴 p.13] 在掌面無名指之中線外開二分處.

[經驗 p.21] 在掌面無名指第一節之中線外開二分處.

[實用 p.24-26]

復原一穴：掌面無名指第一節正中央內側三分, 下二分半處

復原二穴：掌面無名指第一節正中央內側三分處

復原三穴：掌面無名指第一節正中央內側三分上二分半處即復原二穴上二分半處

[稜鍼 p.6] (計三穴) 掌心向上, 當無名指第一節中央偏內側三分上二分半處是穴, 下二分半處一穴, 下五分處一穴.

[圖譜 p.22] 在掌面無名指第一節之中線外開二分處.

[經穴 p.27-29]

復原一穴：手掌面無名指第一節正中央內側三分, 下二分半處.

復原二穴：手掌面無名指第一節正中央內側

三分處.

復原三穴 : 手掌面無名指第一節正中央內側三分上二分半處即復原二穴上二分半處.

木炎

[奇穴 p.14] 在掌面無名指第二節中央外開二分處.

[經驗 p.20] 在掌面無名指第二節中央線外開二分處.

[實用 p.28-29]

木炎一穴 : 掌面無名指第二節正中央偏內三分下二分半處.

木炎二穴 : 掌面無名指第二節正中央偏內側三分處.

木炎三穴 : 掌面無名指第二節正中央偏內側三分上二分半處. 即木炎二穴上二分半處.

[稜鍼] 없음.

[圖譜 p.20] 在掌面無名指第二節中央線外開二分處.

[經穴 p.31-33]

木炎一穴 : 手掌面無名指第二節正中央偏內三分下二分半處.

木炎二穴 : 手掌面無名指第二節正中央偏內側三分處.

木炎三穴 : 手掌面無名指第二節正中央偏內側三分上二分半處. 即木炎二穴上二分半處.

還巢

[奇穴 p.15] 在無名指中節外側(靠近小指之側)正中央.

[經驗 p.10] 在無名指中節外側(靠近小指之側)正中央.

[實用 p.24] 掌面無名指第二節正中央偏外側五分.

[稜鍼] 없음.

[圖譜 p.6] 在無名指中節外側(靠近小指之側)正中央.

[經穴 p.26] 手掌面無名指第二節正中央偏外側五分處.

眼黃

[奇穴 p.15] 在掌面小指第二節之中央點.

[經驗 p.22] 在掌面小指第二節之中央點.

[實用 p.30]

太陽一穴 : 掌面小指第一節正中央處.

太陽二穴 : 掌面小指第二節正中央處.

[稜鍼 p.7] (計二穴)掌心向上, 當小指第一節正中央處一穴, 第二節正中央處一穴.

[圖譜 p.23] 在掌面小指第二節之中央點.

[經穴 p.34-35]

太陽一穴 : 手掌面小指第一節正中央處.

太陽二穴 : 手掌面小指第二節正中央處.

火膝

[奇穴 p.16] 在小指甲外側角後二分.

[經驗 p.17] 在小指甲外側角後二分.

[實用 p.59] 手背於小指第二, 三節橫紋內側端.

[稜鍼] 없음.

[圖譜 p.16] 在小指甲外側角後二分.

[經穴 p.55] 手背於小指第二, 三節橫紋內側端.

指腎

[奇穴 p.17] 在無名指背第一節之外側.

[經驗 p.16] 在無名指背第一節之外側.

[實用 p.51-52]

指腎一穴 : 手背, 無名指第一節正中央外開三分下二分半處.

指腎二穴 : 手背, 無名指第二⁶⁾節正中央外開

6) 二 : '一'의 誤記로 보인다.

三分.

指腎三穴：手背，指腎二穴上二分半處.

[稜鍼 p.11]

指腎一穴：手背，無名指第一節正中央外開三分下二分半處.

指腎二穴：手背，無名指第二節正中央外開三分.

指腎三穴：手背，指腎二穴上二分半處.

[圖譜 p.15] 在無名指背第一節之外側.

[經穴 p.50]

指腎一穴：手背，無名指第一節正中央外開三分下二分半處.

指腎二穴：手背，無名指第一節正中央外開三分.

指腎三穴：手背，指腎二穴上二分半處.

指三重

[奇穴 p.17] 在無名指中節之外側.

[經驗 p.16] 在無名指中節之外側.

[實用 p.54]

指三重二穴：手背無名指第二節正中央外側三分.

指三重一穴：在指三重二穴下二分半處.

指三重三穴：在指三重二穴詳二分半處.

[稜鍼] 없음.

[圖譜 p.14] 在無名指中節之外側.

[經穴 p.51]

指三重二穴：手背無名指第二節正中央外側三分.

指三重一穴：在指三重二穴下二分半處.

指三重三穴：在指三重二穴詳二分半處.

膽穴

[奇穴 p.18] 在中指第一節兩側中點.

[經驗 p.15] 在中指第一節兩側中點.

[實用 p.47]

膽一穴：手背中指第一節正中央內側五分處.

膽二穴：手背中指第一節正中央外側五分處.

[稜鍼] 없음.

[圖譜 p.13] 在中指第一節兩側中點.

[經穴 p.45]

膽一穴：手背中指第一節正中央內側五分處.

膽二穴：手背中指第一節正中央外側五分處.

二角明

[奇穴 p.19] 在中指背第一節中央線上.

[經驗 p.14] 在中指背第一節中央線上.

[實用 p.49] 手背中指第一節中央線上.

[稜鍼 p.10] 手背，當中指第一節中央線，距第二節橫紋三分三處一穴，六分六處一穴，計有兩穴.

[圖譜 p.12] 在中指背第一節中央線上.

[經穴 p.46] 手背中指第一節中央線上.

心膝

[奇穴 p.19] 在中指背第二節中央兩側.

[經驗 p.12] 在中指背第二節中央兩側.

[實用 p.49]

心膝一穴：手背中指第二節正中央偏內側五分處.

心膝二穴：手背中指第二節正中央偏外側五分處.

[稜鍼] 없음.

[圖譜 p.9] 在中指背第二節中央兩側.

[經穴 p.47]

心膝一穴：手背中指第二節正中央偏內側五分處.

心膝二穴：手背中指第二節正中央偏外側五分處.

肺心

[奇穴 p.20] 在中指背第二節中央線上.

[經驗 p.14] 在中指背第二節中央線上.

[實用 p.50]

肺心一穴：中指背第二節正中央下二分半處.

肺心二穴：中指背第二節正中央處.

肺心三穴：肺心二穴上二分半處.

[稜鍼] 없음.

[圖譜 p.11] 在中指背第二節中央線上.

[經穴 p.48]

肺心一穴：中指背第二節正中央下二分半處.

肺心二穴：中指背第二節正中央處.

肺心三穴：肺心二穴上二分半處.

木火

[奇穴 p.21] 在中指背 第三節橫紋中央.

[經驗 p.13] 在中指背 第三節橫紋中央.

[實用 p.38]

木火一穴：手背食指第二節·三節間橫紋正中央處.

木火二穴：手背中指第二節·三節間橫紋正中央處.

木火三穴：手背無名指第二節·三節間橫紋正中央處.

木火四穴：手背小指第二節·三節間橫紋正中央處.

[稜鍼 p.9] (計四穴)手背食指·中指·無名指·小指第二·三節間橫紋正中央處各一穴.

[圖譜 p.10] 在中指背 第三節橫紋中央向上一分.

[經穴 p.40]

木火一穴：手背食指第二節·三節間橫紋正中央處.

木火二穴：手背中指第二節·三節間橫紋正中央處.

木火三穴：手背無名指第二節·三節間橫紋正中央處.

木火四穴：手背小指第二節·三節間橫紋正中央處.

指五金·指千金

[奇穴 p.21] 食指背第一節中央外開二分直線上.

[經驗 p.12] 食指背第一節中央外開二分直線上.

[實用 p.44]

指五經穴：手背·食指第一節中央偏外側三分，下二分半處.

指千金一穴：手背·食指第一節中央偏外三分處.

指千金二穴：指千金一穴上二分半處.

[稜鍼] 없음.

[圖譜 p. 8] 食指背第一節中央外開二分直線上.

[經穴 p.43]

指五金穴：手背·食指第一節中央偏外側三分，下二分半處.

指千金一穴：手背·食指第一節中央偏外三分處.

指千金二穴：指千金一穴上二分半處.

指駟馬

[奇穴 p.22] 食指背第二節外側，中央線外開二分之直線上.

[經驗 p.11] 食指背第二節外側，中央線外開二分之直線上.

[實用 p.46]

駟馬二穴：手背，食指第二節正中央外開三分處.

駟馬一穴：駟馬二穴下二分半處.

駟馬三穴：駟馬二穴上二分半處.

[稜鍼] 없음.

[圖譜 p.7] 食指背第二節外側，中央線外開二分之直線上.

[經穴 p.44]

駟馬二穴：手背，食指第二節正中央外開三

分處.

駟馬一穴：駟馬二穴下二分半處.

駟馬三穴：駟馬二穴上二分半處.

婦科

[奇穴 p.23] 在大指第一節之外側.

[經驗 p.22] 在大指第一節之外側，赤白肉際.

[實用 p.37] 手背大姆指第一節外側，從掌指橫紋起，每上二分一穴，合計五穴.

[稜鍼 p.8] (計五穴)手背·當大姆指第一節外側，距中央二分半處，從掌指橫紋起，每上二分一穴·至第二節橫紋上，合計五穴.

[圖譜 p.24] 在大指第一節之外側.

[經穴 p.39] 手背大姆指第一節外側，從掌指橫紋起，每上二分一穴，合計五穴.

制汚

[奇穴 p.24] 在大指背第一節中央線上.

[經驗 p.23] 在大指背第一節中央線上.

[實用 p.43]

制汚一穴：手背大姆指第一節正中央下二分半處.

制汚二穴：手背 大姆指第一節正中央處.

制汚三穴：手背 大姆指第一節正中央上二分半處.

[稜鍼 p.10] (計三穴)手背大姆指第一節正中央下二分半處·正中央處·正中央上二分半處各一穴.

[圖譜 p.26] 在大指背第一節中央線上.

[經穴 p.42]

制汚一穴：手背大姆指第一節正中央下二分半處.

制汚二穴：手背 大姆指第一節正中央處.

制汚三穴：手背 大姆指第一節正中央上二分半處.

止涎

[奇穴 p.24] 大指第一節之橈側.

[經驗] 없음.

[實用 p.43] 手背大姆指第一節中央偏內側五分，從掌指橫紋起，每上二分一穴，計有五穴.

[稜鍼 p.10] 手背當大姆指第一節中央線偏內側五分，從掌指橫紋起，每上二分一穴，計有五穴.

[圖譜 p.25] 大指第一節之內側.

[經穴 p.41] 手背大姆指第一節中央偏內側五分，從掌指橫紋起，每上二分一穴，計有五穴.

五虎

[奇穴 p.25] 在大指掌面第一節之橈側.

[經驗 p.24] 在手大指掌骨第一節外側緣.

[實用 p.33] 掌面姆指第一節中央外側五分，從掌指橫紋起，每上二分一穴，計有五穴.

[稜鍼 p.7] 掌心向上，當大姆指第一節中線外側五分，從掌指橫紋起，每上二分一穴至第二節橫紋止，計有五穴，故名五虎穴.

[圖譜 p.27] 在手大指掌骨第一節之外側.

[經穴 p.37] 手掌面姆指第一節中央外側五分，從掌指橫紋起，每上二分一穴，計有五穴.

IV. 고 찰

楊維傑은 수지부의 穴位를 설명할 때 內外를 혼용하여 쓰고 있다. 예를 들어 浮間의 穴位를 “食指第二節中央外開二分”이라 하였는데, 여기서 外開는 요측을 말하고 있다. 그런데 三眼의 取穴 부분에서는 “當掌面無名指中央線之內開二分,…”이라 하였고 여기서 內開는 요측을 말하고 있다. 즉 요측을 지칭하는데 있어서 內開와 外開를 원칙 없이 쓰고 있다. 반면에 胡文智는 손바닥에서는 엄지 쪽을 외측으로 손등에서는 엄지 쪽을 내측으로 분명하게 구분하여 쓰고 있다.

1. 寸尺의 수치가 다른 穴

(1) 小間

楊維傑·賴金雄·胡丙權은 大間 상 2푼이라 하였고, 胡文智·陸建中·李國政은 大間 상 2.5푼이라 하였다.

① 문제점 : 大間은 식지 장면 제1절 첩골선 요측 정중앙이다. 小間은 大間을 중심으로 두 주장 사이에 0.5푼 차이가 난다.

② 고찰 : 이런 경우 촌수차이는 큰 의미를 둘 수 없다고 보인다. 따라서 임상에서는 손가락의 길이에 따라 임의용지하면 된다고 생각된다.

* 여기서 첩골선이라 함은 X-ray 사진을 찍었을 때 뼈의 가장자리에 해당되는 가상의 선을 말한다. 이하 모두 같다.

(2) 浮間

楊維傑·賴金雄·胡丙權은 수장 식지 제2절 중앙에서 外開 2푼이라 하였고, 胡文智·陸建中·李國政은 3푼이라 하였다.

① 문제점 : 이하 浮間·外間·心常·三眼·復原·木炎·指五金·指千金 등의 혈들은 첩골선을 손가락뼈의 중앙에서 2푼으로 보느냐 3푼으로 보느냐에 따라 1푼의 차이가 난다.

② 고찰 : 저자들 간에 이견이 있는 것은 서로 손가락뼈의 중앙에서 첩골선까지를 얼마로 보는가의 견해차이로 보인다. 이 거리는 손가락뼈의 굵기에 따라 다를 수 있다. 따라서 임상에서는 촌수를 기준으로 하지 말고 첩골선을 기준으로 찾으면 된다고 생각한다.

(3) 外間

楊維傑·賴金雄·胡丙權은 수장 식지 제2절 중

양에서 外開 2푼이라 하였고, 胡文智·陸建中·李國政은 3푼이라 하였다.

* (2) 浮間 항 참고.

(4) 脾腫

楊維傑·賴金雄·胡丙權은 수장 중지 제2절 중앙선을 3등분하여 등분인 두 곳이라 하였고⁷⁾, 胡文智·李國政은 중앙 상 2.5푼 1穴, 하 2.5푼 1穴이라 하였다.

① 문제점 : 楊維傑 등의 주장은 董氏 취혈법인 分點法을 사용하여 취혈하라는 것이고, 胡文智 등의 주장은 다른 혈과 마찬가지로 기준점에서 상하 2.5푼을 취혈하라는 것이다. 기계적으로 계산할 수는 없지만 이해를 돕기 위해 손가락 1마디를 1촌으로 본다면, 楊維傑의 주장대는 1촌을 3등분하여 가운데 두 곳이므로 3.3푼에 하나, 6.6푼에 하나이다. 즉 중간에서 상하로 각각 1.7푼씩 떨어져 나타난다. 따라서 두 주장사이에는 0.8푼의 차이가 난다.

② 고찰 : 이런 경우 촌수차이는 보는 시각에 따라 의미를 둘 수도 있고, 무시할 수도 있다. 임상에서는 혈을 찾아서 사용하면 될 것으로 생각된다. 혈을 찾는 방법에 관한 것은 이 논문의 주제와는 방향이 다르므로 생략한다.

(5) 心常

楊維傑·賴金雄·胡丙權은 수장 중지 제1절 중앙에서 外開 2푼이라 하였고, 胡文智·李國政은 內側 3푼이라 하였다. 여기서 外開와 內側은 모두 척측을 말한다.

* (2) 浮間 항 참고.

(6) 三眼

楊維傑·賴金雄·胡丙權은 수장 무명지 제1절

7) 楊維傑. 董氏奇穴鍼灸學. 대만 : 지원서국. 1980 : 12.

중앙에서 內開 2푼이라 하였고, 胡文智·陸建中·李國政은 外側 3푼이라 하였다. 여기서 內開와 外側은 모두 요측을 말한다.

* (2) 浮間 항 참고.

(7) 復原

楊維傑·賴金雄·胡丙權은 수장 무명지 제1절 중앙에서 外開 2푼이라 하였고, 胡文智·陸建中·李國政은 內側 3푼이라 하였다. 여기서 外開와 內側은 모두 척측을 말한다.

* (2) 浮間 항 참고.

(8) 木炎

楊維傑·賴金雄·胡丙權은 수장 무명지 제2절 중앙에서 外開 2푼이라 하였고, 胡文智·李國政은 內側 3푼이라 하였다. 여기서 外開와 內側은 모두 척측을 말한다.

* (2) 浮間 항 참고.

(9) 指腎

楊維傑·賴金雄·胡丙權은 수배 무명지 제1절 중앙에서 外開 2푼 1穴, 상 3푼 1穴, 하 3푼 1穴이라 하였고⁸⁾, 胡文智·陸建中·李國政은 外開 3푼 1穴, 상 2.5푼 1穴, 하 2.5푼 1穴이라 하였다.

① 문제점 : 이하 指腎·指三重·指駟馬 등의 혈은 두 가지의 문제점이 있다. 하나는 중앙에서 2푼으로 보느냐 3푼으로 보느냐의 차이이고, 또 하나는 기준점에서 상하로 3푼으로 보느냐 2.5푼으로 보느냐이다.

② 고찰 : 첫 번째 문제점은 浮間의 경우와 마찬가지로 촌수를 기준으로 찾지 말고, 첩골선을 기준으로 찾으면 된다고 생각되고, 두 번째 문제

점은 小間의 경우처럼 손가락의 길이에 따라 임의용지하면 된다고 생각된다.

(10) 指三重

楊維傑·賴金雄·胡丙權은 수배 무명지 제2절 중앙에서 外開 2푼 1穴, 상 3푼 1穴, 하 3푼 1穴이라 하였고⁹⁾, 胡文智·李國政은 外側 3푼 1穴, 상 2.5푼 1穴, 하 2.5푼 1穴이라 하였다.

* (9) 指腎 항 참고.

(11) 指五金·指千金

楊維傑·賴金雄·胡丙權은 수배 식지 제1절 중앙 外開 2푼이라 했고¹⁰⁾, 胡文智·李國政은 外側 3푼이라 했다.

* (2) 浮間 항 참고.

(12) 指駟馬

楊維傑·賴金雄·胡丙權은 수배 식지 제2절 중앙에서 外開 2푼 1穴, 상 3푼 1穴, 하 3푼 1穴이라 하였고¹¹⁾, 胡文智·李國政은 外開 3푼 1穴, 상 2.5푼 1穴, 하 2.5푼 1穴이라 하였다.

* (9) 指腎 항 참고.

(13) 婦科

楊維傑·賴金雄·胡丙權은 수배 대지 제1절 중앙에서 外開 3푼이라 하였고, 胡文智·陸建中·李國政은 外側 2.5푼이라 하였다.¹²⁾

① 문제점 : 두 주장의 촌수 차이는 0.5푼이다. 楊維傑 등은 엄지가 다른 손가락보다 굵기 때문에 다른 穴들이 중앙에서 2푼 떨어져 있다고 보고 婦科는 3푼 떨어져 있다고 본 것 같다. 그러나 胡文智는 다른 손가락보다 오히려 0.5푼

8) 楊維傑. 董氏奇穴鍼灸學. 대만 : 지원서국. 1980 : 17.
9) 楊維傑. 董氏奇穴鍼灸學. 대만 : 지원서국. 1980 : 18.
10) 楊維傑. 董氏奇穴鍼灸學. 대만 : 지원서국. 1980 : 22.
11) 楊維傑. 董氏奇穴鍼灸學. 대만 : 지원서국. 1980 : 22.
12) 胡文智. 最新實用董氏鍼灸奇穴全集(上冊). 대만 : 1987 : 37

이 줄었다.

② 고찰 : 이 경우도 촌수에 얽메이는 것 보다는 침골선을 기준으로 취혈하는 것이 올바른 것이라고 생각된다.

(14) 止涎

楊維傑·胡丙權은 수배 대지 제1절 중앙에서 內開 2푼이라 하였고¹³⁾, 胡文智·陸建中·李國政은 內側 5푼이라 하였다.

① 문제점 : 두 의견 간에 무려 3푼의 차이가 있다.

② 고찰 : 楊維傑 등은 止涎을 중앙에서 2푼 떨어져 있다고 했는데, 이것은 浮間등과 같다. 하지만 婦科를 설명할 때는 중앙에서 3푼 떨어져 있다고 했는데, 이것은 엄지손가락뼈가 다른 손가락뼈에 비해 굵기 때문인 것으로 보인다. 지연도 엄지손가락에 있는 혈이므로 중앙에서 3푼 떨어져 있다고 해야 논리 전개상 올바를 것 같다. 그리고 胡文智 등은 중앙에서 5푼 떨어져 있다고 했는데, 이것은 잘못으로 보인다. 왜냐하면 손가락 한 마디의 굵기는 대개 1촌으로 보기 때문에 중앙에서 5푼이라고 한다면 이것은 적백육제에 해당하고 그 곳은 五虎일 가능성이 있다. 따라서 止涎은 楊維傑이나 胡文智의 견해로 풀기보다는 침골선을 기준으로 경우에 따라 취혈해야한다고 생각된다.

2. 穴의 개수가 다른 경우

(1) 木穴

楊維傑·賴金雄·胡丙權은 2穴이라 하였고, 胡文智·陸建中·李國政은 3穴이라 하였다. 즉 楊維傑 등은 수장 식지 제1절 척측 침골선을 3등분하여 등분점인 두 곳을 木穴로 보고 있고, 胡文

智 등은 4등분하여 등분점인 세 곳을 木穴로 보고 있다.

① 문제점 : 이하 心常·木炎·肺心·指五金·指千金 등은 3분점법으로 취혈하느냐 4분점법으로 취혈하느냐의 차이가 있다.

② 고찰 : 손가락 한 마디에서 침골에 나타나는 혈은 정확하게 등분하여 취혈한다면 차이가 있을 수 있지만, 손으로 만져서 혈을 찾아 취혈한다면 2혈이든 3혈이든 큰 의미가 있는 것은 아니다. 나타나는 곳에 취혈하라는 의미로 받아들이는 것이 올바른 것으로 보인다.

(2) 心常

楊維傑·賴金雄·胡丙權은 2穴이라 하였고, 胡文智·陸建中·李國政은 3穴이라 하였다. 즉 楊維傑 등은 수장 중지 제1절 척측 침골선을 3등분하여 등분점인 두 곳을 心常으로 보고 있고, 胡文智 등은 4등분하여 등분점인 세 곳을 心常으로 보고 있다.

* (1) 木穴 항 참고.

(3) 三眼

楊維傑·賴金雄·胡丙權은 1穴이라 하였고, 胡文智·李國政은 3穴이라 하였다. 즉 胡文智 등은 수장 무명지 제1절 요측 침골선을 4등분하여 등분점 3곳을 손 끝 쪽부터 차례로 三眼三·三眼二·三眼一이라고 했는데, 楊維傑 등의 三眼은 胡文智 등의 三眼三에 해당한다.

① 문제점 : 두 견해는 혈수가 많이 차이가 난다.

② 고찰 : 楊維傑 등은 1穴이라고 하고 있고 胡文智 등은 3穴이라고 하고 있는데, 이것은 일종의 倒馬鍼法으로 치료효과를 증가시키기 위함으로, 임상에서 두 견해의 의미를 찾는 것이 필

13) 楊維傑. 董氏奇穴鍼灸學. 대만 : 지원서국. 1980 : 24

요하다고 보인다. 다만 좁은 범위에서 (1촌정도) 3혈 모두를 취혈하기는 현실적으로 어렵다고 생각된다.

(4) 木炎

楊維傑·賴金雄·胡丙權은 2穴이라 하였고, 胡文智·李國政은 3穴이라 하였다. 즉 楊維傑 등은 수장 무명지 제2절 척측 침골선을 3등분하여 등분점인 두 곳을 木炎으로 보고 있고, 胡文智 등은 4등분하여 등분점인 세 곳을 木炎으로 보고 있다.

* (1) 木穴 항 참고.

(5) 眼黃

楊維傑·賴金雄·胡丙權은 1穴이라 하였고, 胡文智·陸建中·李國政은 2穴이라 하였다. 즉 楊維傑 등은 수장 소지 제2절 정중앙을 眼黃이라 보고 있고, 胡文智 등은 제1절 정중앙에 眼黃一이 있고, 제2절 정중앙에 眼黃二이 있다고 보고 있는데 楊維傑 등의 眼黃은 胡文智 등의 眼黃二에 해당한다.

① 문제점 : 眼黃을 1穴로 보느냐 2穴로 보느냐의 견해차이가 심하다.

② 고찰 : 이 경우는 임상에서 1穴을 쓸 경우와 2穴을 쓸 경우를 각각 효과면에서 검증하는 작업이 요구된다. 대학병원 등에서 다수의 환자를 대상으로 임상실험이 필요하다고 생각된다.

(6) 肺心

楊維傑·賴金雄·胡丙權은 2穴이라 하였고, 胡文智·李國政은 3穴이라 하였다. 즉 楊維傑 등은 수배 중지 제2절 중간선을 3등분하여 등분점인 두 곳을 肺心으로 보고 있고, 胡文智 등은 4등분하여 등분점인 세 곳을 肺心으로 보고 있다.

* (1) 木穴 항 참고.

(7) 木火

楊維傑·賴金雄·胡丙權은 1穴이라 하였고, 胡文智·陸建中·李國政은 4穴이라 하였다. 즉 楊維傑 등은 수배 중지 중절골과 말절골 사이 관절 중앙을 木火로 보고 있고, 胡文智 등은 수배 식지·중지·무명지·소지 중절골과 말절골 사이 관절 중앙에 각각 1개씩, 식지부터 차례로 木火一·木火二·木火三·木火四가 있어 모두 네 곳을 木火로 보고 있다.

① 문제점 : 두 견해 사이에 穴의 개수가 많이 차이가 난다.

② 고찰 : 이 경우는 임상에서 1穴을 쓸 경우와 4穴을 쓸 경우를 각각 효과면에서 검증하는 작업이 요구된다. 眼黃과 마찬가지로 대학병원 등에서 다수의 환자를 대상으로 임상실험이 필요하다고 생각된다.

(8) 指五金·指千金

楊維傑·賴金雄·胡丙權은 2穴이라 하였고, 胡文智·李國政은 3穴이라 하였다. 즉 楊維傑 등은 수배 식지 제1절 척측 침골선을 3등분하여 등분된 점을 손끝 쪽부터 차례로 指五金·指千金으로 보고 있고, 胡文智 등은 4등분하여 등분된 점을 손끝 쪽부터 차례로 指千金二·指千金一·指五金으로 보고 있다.

* (1) 木穴 항 참고.

(9) 婦科

楊維傑·賴金雄·胡丙權은 2穴이라 하였고, 胡文智·陸建中·李國政은 5穴이라 하였다. 즉 楊維傑 등은 수배 엄지 제1절 척측 침골선을 3등분하여 등분점인 두 곳을 婦科로 보고 있고, 胡文智 등은 6등분하여 등분점인 5곳을 婦科로 보고 있다.

① 문제점 : 아래 止涎과 함께 穴數의 차이가

3穴이다.

② 고찰 : 엄지손가락을 3분점법으로 하느냐 6분점법으로 하느냐에 따라 穴의 개수가 차이가 있는데, 이것은 일종의 倒馬鍼法으로 보인다. 따라서 임상에서는 손으로 만져서 나타나는 穴을 2-5곳 선택하여 취혈하면 될 것으로 보인다. 사실상 좁은 범위에서 5穴 모두를 취하는 것은 어렵다.

(10) 止涎

楊維傑·胡丙權은 2穴이라 하였고, 胡文智·陸建中·李國政은 5穴이라 하였다. 즉 楊維傑 등은 수배 엄지 제1절 요측 침골선을 3등분하여 등분점인 두 곳을 지연으로 보고 있고, 胡文智 등은 6등분하여 등분점인 5곳을 止涎으로 보고 있다.

* (9) 婦科 항 참고.

3. 위치가 다른 穴

(1) 還巢

楊維傑·賴金雄·胡丙權은 무명지 제2절 척측 중앙이라 하였고, 胡文智·李國政은 요측 중앙이라 하였다.

① 문제점 : 胡文智는 [實用 p.27]에서 偏肩의 穴位를 “掌面無名指第二節正中央偏內側五分, 靠近小指處.”라 하였는데, 楊維傑 등의 還巢에 해당한다. 그 주치도 견배통·오십견·경향통·수배의 측통·만성간염 등 還巢의 主治와 완전히 다르다. [董氏鍼灸臨床精要秘錄] p.106.108.의 도해에 보면 楊維傑의 還巢에 해당하는 곳의 主治症이 肩痛으로 되어있다.

② 고찰 : 두 곳은 엄연히 다른 곳을 지적하고 있다. 楊維傑 등의 還巢는 胡文智 등의 偏肩이므로 이론상으로는 胡文智 등의 還巢를 쓰는 것이 올바른 것으로 보이나, 실제 임상에서는 아직 더 많은 연구가 필요한 穴로 보인다.

(2) 火膝

楊維傑·賴金雄·胡丙權은 수배 소지 조갑각 후 2푼이라 했고, 胡文智·李國政은 수배 소지 제2·3절 횡문의 요측단이라 했다.

① 문제점 : 두 주장이 가리키는 곳이 서로 완전히 다르다.

② 고찰 : 李國政은 [經穴 p.55]에서 “根據經驗兩穴, 都是穴, 恐每一方都遺漏了一穴, 今就事實, 不妨改爲火膝一穴, 火膝二穴.”이라 하여 두 주장 모두 버릴 수 없다고 하였다. 임상에서도 두 곳 모두 일정한 치료효과가 있다. 따라서 火膝은 임상에서 더 많은 연구가 필요한 穴로 보인다.

4. 기타

楊維傑은 小間의 설명란에서 “大間·小間兩穴皆位於陰掌食指第一節B線上, 取穴採三分點法, 即以兩指節距離之 1/3處各取一穴, 在上者(靠指尖者)爲小間, 在下者(靠掌者)爲大間.”이라 하여 수장 식지 제1절 요측 침골선을 3등분하여 손끝 쪽부터 각각 小間·大間이라고 하고 있다.

① 문제점 : 이것은 다른 저자들과 대조가 된다. 즉 胡文智 등은 4등분하여 손끝 쪽부터 각각 小間·大間·側間이라고 하고 있다. [董氏五行刺絡鍼法] p.118에서는 大間을 ‘在手掌食指第一節正中央外開三分距第二節橫紋三分三.’이라 했고 小間은 ‘六分六’이라 했다. 이것 역시 3등분하여 두 穴을 구한 것이다.

② 고찰 : 이 경우 그 차이는 미미하므로, 취혈하는 의자의 임의용지가 필요하다고 생각된다.

V. 결 론

董氏鍼 관련 서적을 비교 분석한 결과 다음과 같은 결론을 얻었다.

1. 寸尺의 수치가 다른 것은 小間·浮間·外間·脾腫·心常·三眼·復原·木炎·指腎·指三重·指五金·指千金·指駟馬·婦科·止涎 등 15穴이었다.

2. 穴의 개수가 다른 것은 木穴·心常·三眼·木炎·眼黃·肺心·木火·指五金·指千金·婦科·止涎 등 11穴이었다.

3. 寸尺의 수치와 개수가 모두 다른 것은 心常·三眼·木炎·指五金·指千金·婦科·止涎 등 7穴이었다.

4. 穴位가 완전히 다른 것은 還巢·火膝 등 2穴이었다.

5. 기타 大間·小間 등 2穴이 이견이 있었다.

6. 이견이 없는 것은 中間·膈穴·二角明·心膝·制汚·五虎 등 6穴이었다.

7. 이렇게 서로 달리 기술되고 있는 穴은 그 효능이나 주치를 명확히 하기 위해 공신력 있는 기관이나 연구소에서 세밀한 연구가 진행되어야 할 것으로 보인다.

참 고 문 헌

1. 楊維傑. 楊維傑全集1. 서울 : 대성의학사. 2003 : 72.
2. 楊維傑. 董氏奇穴鍼灸學. 대만 : 지원서국. 1980 : 2. 6-26.
3. 胡文智. 最新實用董氏鍼灸奇穴全集(上冊). 대만 : 1987 : 3-73. 121.
4. 楊維傑. 楊維傑全集2. 서울 : 대성의학사. 2003 : 72.
5. 賴金雄. 董氏鍼灸奇穴經驗錄. 대만 : 지원서국. 1987 : 7-24.
6. 陸建中. 董氏稜鍼激穴學. 대만 : 지원서국. 1988 : 4-12.
7. 胡丙權. 董氏奇穴圖譜治療學. 대만 : 지원서국. 1988 : 1-27.
8. 李國政. 台灣董氏鍼灸經穴學. 대만 : 지원서국. 1994 : 9-55.
9. 이병국. 董氏鍼灸奇穴과 奇方 서울 : 1986. 07 : 1.
10. 莊育民. 鍼灸別傳寄穴傳. 대만 : 협림인서서관 유한공사. 1972 : 19-20.
11. 胡丙權. 董氏鍼灸臨床精要秘錄. 대만 : 한선문구인쇄유한공사. 1986 : 106. 108.
12. 胡丙權. 董氏五行刺絡鍼法. 대만 : 지원서국. 1991 : 118.