

한국산 흰구름버섯(*Trametes hirsuta* S1)으로부터 정제된 Laccase의 특성

임형선 · 윤경하*

순천향대학교 생명과학부

Characterization of Laccase Purified from Korean *Trametes hirsuta* S1

Hyung-Seon Lim and Kyung-Ha Yoon*

Division of Life Sciences, Soonchunhyang University, Asan 336-745, Korea

(Received July 7, 2004)

ABSTRACT: Laccase produced by *Trametes hirsuta* S1 isolated from Korea was partially purified and characterized using ultrafiltration, anion exchange chromatography and affinity chromatography. The laccase was produced as the predominant extracellular enzyme during primary metabolism. Neither lignin peroxidase nor veratryl alcohol oxidase (VAO) were detected in the culture fluid. Addition of 2,5-xylidine enhanced 4-fold laccase production. Purified laccase was a single polypeptide having a molecular mass of approximately 66 kDa, as determined by SDS-polyacrylamide gel electrophoresis, and carbohydrate content of 12%. K_m and V_{max} values for laccase with ABTS [2,2-azinobis (3-ethylbenzothiazoline 6-sulfonic acid)] as a substrate (Lineweaver-Burk plot) was determined to 51.2 μM and 56.8 μmole , respectively. The optimal pH for laccase activity was found to be 3.0. The enzyme was very stable for 1 hour at 50°C. Half-life ($t_{1/2}$) of the enzyme was about 20 min at 70°C. Spectroscopic analysis of purified enzyme indicated that the enzyme was typical of copper-containing protein. Substrate specificity and inhibitor studies for laccase also indicated to be a typical fungal laccase. The N-terminal amino acid sequence of the *T. hirsuta* S1 laccase showed 100% of homology to those of laccase from *C. hirsutus*.

KEYWORDS: Laccase, Manganese-dependent peroxidase, Phenoloxidase, *Trametes hirsuta*

리그닌(lignin)은 식물에서 coumaryl alcohol, coniferyl alcohol 및 sinapyl alcohol과 같은 phenylpropanoid 전구체들이 H_2O_2 의 존재하에서 peroxidase에 의하여 산화된 radical들이 무질서하게 짹반응을 하여 생성된 방향족의 중합체이다(Sarkanen, 1971). 이와같은 lignin은 목재와 유관속 식물조직의 20~30%를 차지하고 있는데 주로 세포벽에 존재한다. lignin을 구성하고 있는 단량체(monomer)의 결합과 단량체 사이의 결합은 가수분해가 될 수 없는 C-C와 C-O-C 결합으로 이루어져 있기 때문에 화학적으로나 생물학적으로 분해하기 어려운 난분해성 물질이다. 이와 같은 리그닌을 탈중합화하고 무기물질화 하는데는 주로 목재 백색부후균류(white rot fungi)가 생산하는 몇몇 세포외 산화환원효소와 저분자량의 대사산물 그리고 활성화된 산소종이 포함된 비특이적 산화계(nonspecific oxidation system)가 관여한다(Schoemaker, 1990). 리그닌을 분해하는 목재 백색부후균류가 다양한 방향족 오염물질을 분해하는 능력도 이러한 비특이적 산화계가 부분적으로 작용하기 때문이다(Barr and Aust, 1994; Paszczynski and Crawford, 1995). 리그닌과 방향족 인공화합물(xenobiotics)의 분해에 관여하는 목재 백색부후균류의 세포외 효소로

는 laccase(Thurston, 1994; Leontievsky et al., 1997), peroxidase(Tien and Kirk, 1983; Kirk and Farrell, 1987; Camarero et al., 1999)와 H_2O_2 을 생산하는 산화효소(Kersten and Kirk, 1987; Guillen et al., 1990; Volc et al., 1996) 등으로 알려져 있으나, 많은 균류들이 laccase를 생산하고 리그닌 분해 모델 균주로 사용되는 *Phanerochaete chrysosporium* 균주도 laccase를 생산한다는 것이 최근에 밝혀짐에 따라(Srinivasan et al., 1995) 리그닌의 분해와 난분해성 방향족 화합물의 분해 연구는 주로 laccase에 집중되고 있다.

Laccase(benzenediol : oxygen oxidoreductase, EC 1, 10, 3, 2)는 분자상의 산소를 전자수용체로 이용하는 phenoloxidase로써 폐놀성 리그닌 단위(phenolic lignin units)와 광범위한 폐놀성화합물과 방향족 아민(aromatic amine)을 직접적으로 산화하나(Field et al., 1993; Thurston, 1994) 비폐놀성 리그닌 단위(nonphenolic lignin units)는 산화하지 못한다(Eggert et al., 1996a). 그러나 laccase는 산화 환원 매개체로서 작용하는 인공기질이나 어떤 대사산물이 존재할 경우에 laccase는 비폐놀성 리그닌 단위 뿐만 아니라 몇몇 방향족 인공화합물과 지방족 인공화합물을 분해한다(Bourbonnais and Paice, 1990; Eggert et al., 1996b; Johannes and Majcherczyk, 2000; Niku-Paavola

*Corresponding author <E-mail: kyungha@sch.ac.kr>

and Viikari, 2000). 따라서 이러한 laccase-mediator system의 연구는 리그닌 분해기작의 규명은 물론 laccase의 생물공학적 응용에도 활기를 불어넣고 있다(Bourbonnais and Paice, 1992).

본 연구에서는 우리나라의 자연환경에서 채집한 백색부후균류(white rot fungi) 가운데서 리그닌 분해능이 우수한 균주로 선발된 흰구름버섯(*Trametes hirsuta* S1)을 액체배양하고 액체배양액으로부터 laccase를 분리, 정제하여 그의 특성을 조사하였다.

재료 및 방법

균주

본 연구에 사용된 흰구름버섯(*Trametes hirsuta* S1)은 2000년 7월부터 2002년 8월까지 식장산, 속리산, 관악산, 북한산, 광덕산, 동구릉 등지에서 채집한 백색 부후균류 가운데서 리그닌 분해능(Nishida *et al.*, 1988)이 우수한 균주로 선발된 균주이다. 균주의 보존은 potato dextrose agar(PDA, Difco, Lab.)배지에 균주를 접종하여 28°C에서 7일간 배양한 후 4°C에서 보존하였으며, 약 1개월마다 계대배양 하였다. 균주의 접종은 PDA 배지 중앙에 소량의 균사체를 접종하여 28°C에서 7일간 배양한 후 접락(colomy) 가장자리로부터 1 cm 떨어진 부위에서 직경 6 mm의 cork borer로 agar plug를 만들어 사용하였다.

배지 및 유도원 첨가

Laccase의 생산과 유도원의 영향을 조사하기 위하여 Collins(1996)의 배지(glucose 10 g; ammonium tartrate 4 g; KH₂PO₄ 1 g; NaH₂PO₄ 0.026 g; MgSO₄ · 7H₂O 0.5 g; CuSO₄ · 5H₂O 0.01 g; CaCl₂ · H₂O 0.0066 g; FeSO₄ · 7H₂O 0.005 g; ZnSO₄ · 7H₂O 0.0005 g; thiamine-HCl 0.00001 g; distilled water 1000 ml, pH 5.0)를 기본배지로 사용하였고, 유도원의 첨가는 용량 250 ml flask에 50 ml의 기본배지를 넣고 균주를 접종하여 2일간 배양한 후 2,5-xylidine은 0.2 mM, 그리고 ferulic acid, tannic acid, veratic acid, hydroquinone, protocatechuic acid, syring-aldehyde, vanillic acid, veratryl alcohol 등을 1 mM 이 되도록 각각 첨가하였다. 배양은 28°C에서 150 rpm (Operon-SI-130C)으로 진탕 배양하였다.

효소 활성 측정

Laccase 활성은 0.5 mM의 ABTS[2,2-azinobis(3-ethylbenzthiazoline 6-sulfonic acid)] 기질을 100 mM sodium tartrate 완충액(pH 3.0)으로 완충시키고 효소를 첨가하여 생성한 양이온 래디칼을 420 nm($\epsilon = 36,000 \text{ M}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$)에서 측정하였다(Niku-Paavola *et al.*, 1988). Lignin peroxidase(LiP)의 활성은 2 mM veratryl alcohol을 100 mM sodium tartrate 완충액(pH 3.0)으로 완충시키고 0.4 mM

H₂O₂를 가했을 때 효소에 의해 전환된 veratraldehyde($\epsilon = 9,300 \text{ M}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$)를 310 nm에서 측정하였다(Tien and Kirk, 1984). Manganese-dependent peroxidase(MnP)의 활성은 0.1 mM MnSO₄를 100 mM sodium tartrate 완충액(pH 5.0)로 완충시킨 후 0.1 mM H₂O₂ 존재 하에서 효소에 의하여 생성된 Mn⁴⁺-tartrate 복합체($\epsilon = 6,500 \text{ M}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$)를 238 nm에서 측정하였다(Paszczynski *et al.*, 1988). Veratryl alcohol oxidase(VAO)의 활성은 2.0 mM veratryl alcohol을 50 mM dimethylsuccinate 완충액(pH 4.5)으로 완충시키고 효소가 생성한 veratraldehyde($\epsilon = 9,300 \text{ M}^{-1} \cdot \text{cm}^{-1}$)의 양을 310 nm에서 측정하였다(Bourbonnais and Paice, 1988). 효소 활성의 단위는 기질로부터 1분간 생성된 1 μmole의 생성물을 1 unit(U)로 표시하였다.

Laccase 정제

Laccase를 정제하기 위하여 용량 5,000 ml flask에 기본배지 1,000 ml을 넣고 균주를 접종하여 2일간 전 배양한 후 laccase 생산 유도원으로 알려진 2,5-xylidine을 첨가하여 28°C에서 150 rpm으로 진탕배양하였다. 진탕배양 된 배양액을 4°C에서 8,000 rpm로 20분간 원심분리하고 상등액을 ultrafiltration(10,000 Da membrane, Amicon 8400)하여 6 ml로 농축하였다. 그 후 농축액을 중류수로 연속 투석하고, 50 mM potassium phosphate 완충액(KPB, pH 6.0)으로 2시간 동안 투석하였다. 그 후 투석액을 동일 완충액으로 평형화시킨 DEAE-cellulose column(1×15 cm)에 적재하고 50 mM과 100 mM KPB(pH 6.0)를 단계적으로 적용하여 0.4 ml/min로 용출 시킨 후 laccase의 활성을 나타내는 분획을 선택하여 4 ml로 농축하였다. 농축액은 0.02 mM KPB(pH 7.2)로 투석하여 같은 완충액으로 평형 시킨 hydroxyapatite column(2×10 cm)에 적재하고 0.02 mM KPB(pH 7.2)에 포함된 0.5 M(NH₄)₂SO₄ + 배를 적용하여 효소를 용출 시킨 후, 활성을 나타내는 분획을 모아 농축하여 정제된 효소로 사용하였다. 단백질량은 bovine serum albumin(BSA)을 표준 물질로 사용하여 Lowry(1951) 법으로 측정하였다.

효소활성의 특성

효소의 kinetics는 100 mM sodium tartrate 완충액(pH 3.0)과 0.05~10 mM의 ABTS를 기질로 사용하여 효소활성을 측정한 후 이중역수도시(double reciprocal plot)하여 결정하였다. 효소활성에 미치는 온도의 영향을 조사하기 위하여 정제된 효소를 100 mM sodium tartrate(pH 3.0) 완충액으로 완충시키고 30°C, 40°C, 50°C, 60°C, 70°C, 80°C에서 일정 시간 동안 전처리하고 10분마다 효소의 활성을 측정하여 열에 대한 효소의 안정성을 조사하였다. 효소 활성의 최적 pH를 조사하기 위하여 100 mM sodium tartrate(pH 2.5~4.5), 100 mM sodium acetate(pH 4.5~

6.0), 그리고 100 mM sodium phosphate(pH 6.0~7.0) 완충액을 사용하였다. Laccase의 기질특이성을 조사하기 위하여 laccase의 기질로 추정되는 몇몇 기질을 100 mM sodium tartrate 완충액(pH 3.0)에 각각 5 mM 씩을 넣고 일정량의 효소를 첨가하여 반응시킨 후 상온에서 효소의 활성을 측정하였다. 효소활성에 미치는 화학물질의 영향은 0.5 mM ABTS 기질과 100 mM sodium tartrate 완충액(pH 3.0)을 사용하여 조사하였다.

전기영동

정제된 효소의 분자량과 동질성(homogeneity)을 조사하기 위하여 SDS-PAGE를 Bollag 등(1996)의 방법에 따라 수행하였다. 즉, sodium dodecylsulfate polyacrylamide gel(10%)에 분자량 markers(phosphorylase b 97,000; albumin 66,000; ovalbumin 45,000; carbonic anhydrase 30,000, Amersham pharmacia)와 정제된 laccase를 적재하고 25 mA에서 2시간 동안 전개한 후 gel을 coomassie brilliant blue R-250(Sigma)으로 염색했다.

Copper characterization

정제된 laccase의 촉매 중심의 성질을 조사하기 위하여 0.3 mg의 정제된 laccase를 100 mM sodium acetate buffer(pH 5.0)에 용해하고 UV-visible spectrophotometer(Shimadzu UV-1601)을 이용하여 200 nm에서 700 nm까지 흡광도를 조사하였고 copper의 양은 flame technique를 이용하여 atomic absorption spectrometry(Shimadzu AAS-6800)로 측정하였다.

N-말단의 아미노산 서열분석

정제된 laccase의 N-말단 아미노산의 서열분석은 한국기초과학지원연구원의 단백질 자동서열 분석기(Perkin Elmer model 491A)를 사용하여 분석하였고 얻어진 N-말단의 아미노산의 서열은 NCBI의 BLAST Search 프로그램을 이용하여 동정과 유사성을 조사하였다.

결과 및 고찰

T. hirsuta S1의 생장과 효소 생산

T. hirsuta S1를 기본배지에서 10일간 진탕배양(150 rpm, 28°C) 했을 때 균주의 생장량, 탄수화물 소비량, 세포외로 분비되는 몇몇 효소와 단백질 양을 조사한 결과(Fig. 1), 균주의 생장은 배양 6일까지 급격히 증가하였고 탄소원인 포도당은 배양 9일에 완전고갈 되었다. 그리고 단백질 양은 배양 10일까지 계속 증가하였다. Laccase의 활성은 배양 2일부터 나타나기 시작하여 배양 5일에 최대값(8.89 U/mg protein)을 나타냈고 그 이후에는 활성이 급격히 감소하였다. MnP의 활성은 배양 3일부터 나타났으나 활성도는 매우 낮았고 Lip와 VAO의 활성은 배양기




Fig. 1. Time course of enzyme activities, glucose and protein in the extracellular fluid of *T. hirsuta* S1 culture grown in the basal medium. -●- : Laccase, -○- : Dry weight (mg/ml), -■- : Protein (μ g/ml), -□- : Glucose (mM), -▲- : MnP.

간 동안 전혀 나타나지 않았다.

유도원의 영향

T. hirsuta S1를 기본배지에서 2일간 배양한 후 laccase 생산 유도원으로 추정되는 몇몇 유도원을 배지에 각각 첨가하여 laccase 활성을 측정한 결과(Fig. 2), 균주배양 8일에 laccase생산 유도원의 효과는 2,5-xylidine > veratryl alcohol > syringaldehyde > hydro quinone > veratic acid > protocatechuic acid 순으로 나타났다. 그러나 vanillic acid, ferulic acid 그리고 tannic acid는 control(대조구) 보




Fig. 2. Stimulation of laccase production in cultures of *T. hirsuta* S1 by addition of inducers. The arrow indicates the time of inducer addition. -○- : control, -*-* : feruric acid, -▲- : hydroquinon, -◆- : protocatechuic acid, -□- : syringaldehyde, -◇- : tannic acid, -■- : vanillic acid, -×- : veratic acid, -△- : veratryl alcohol, -●- : xylidine.

Table 1. Purification of laccase from the culture liquid of *T. hirsuta* S1

Purification step	Volume (ml)	Total protein (mg) ^a	Total activity (U)	Specific activity (U/mg)	Fold (%)	Purification (folds)
Filtrate	970	112	3125	27.9	100	1
Ultra-filtrate	6	16.3	1950	119.6	62.4	4.3
DEAE-cellulose	4	1.29	1416	1097.6	45.3	39.2
Hydroxyapatite	5	0.85	1060	1247.1	33.9	44.7

^aProtein was measured by Lowry's method (1951).

다 낮은활성을 나타냈다. Haars(1981) 등은 *Fomes annosus* 균주의 세포 외 laccase(extracellular laccase)는 dihydroxybenzoic acid, gallic acid, hydroquinone, 그리고 protocatechic acid 등으로 유도됨을 관찰하였고, Bollag 와 Leonowicz(1984)는 여러 종류의 담자균류와 불완전균류, 그리고 자낭균류에 대하여 2,5-xylidine의 laccase 생산 유도 효과를 조사했는데 2,5-xylidine은 일반적으로 담자균류에 대하여 유도효과가 있고 몇몇의 담자균류에 있어서는 laccase 동위효소를 생산한다고 보고하였다. 그리고 Coll 등(1993)은 세지공장의 폐수에서 분리한 *Basidiomycete* PM1(CECT 2971) 균주는 laccase 생산 유도원으로 알려진 2,5-xylidine, gallic acid, toluidine, guaiacol 그리고 veratryl alcohol과 같은 화합물에 대하여 laccase가 전혀 유도 되지 않음을 보고하였다. 위와 같은 보고들은 담자균류들이 laccase 생산 유도원에 대하여 다양하게 반응함을 나타내 주고 있다.

Laccase의 kinetic constants

Laccase의 정제는 Table 1에 표시된 과정에 따라 수행하였다. 정제된 효소의 kinetic constants는 100 mM sodium tartrate 완충액(pH 3.0)으로 완충시킨 ABTS를 기질로 사용하여 laccase의 활성을 측정한 후 이중역수도식(double reciprocal plot)한 결과, K_m 값은 51.2 μM , V_{max}

값은 56.8 $\mu\text{mole} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{mg}^{-1}$ 이었다.

Laccase의 분자량 및 탄수화물량

정제된 laccase의 분자량과 동질성을 확인하기 위하여 SDS-PAGE를 실시한 결과(Fig. 3), 정제된 laccase는 단일의 polypeptide로 분자량은 약 66 KDa 이었다. 그리고 laccase에 포함된 탄수화물의 양을 포도당을 표준물질로 사용하여 anthron법(Yemm and Wills, 1954)으로 측정한 결과, 약 12%의 탄수화물을 포함하였다. Thurston(1994)은 대부분 균류의 laccase는 당단백질로 된 단량체로서 분자량이 50 KDa와 80 KDa 사이에 있음을 보고하였다. 본 균주의 laccase는 전형적인 균류의 laccase임을 보여주고 있다.

Copper characterization

T. hirsuta S1 배양액으로부터 정제된 laccase의 촉매 중심의 성질을 조사하기 위하여 laccase의 UV-visible spectrum을 조사한 결과(Fig. 4), 흡수 peak가 610 nm 부근(type I blue copper atom)에서 나타났고 어깨(shoulder)가 330 nm(type III binuclear copper)에서 나타났다. 그리고 copper의 양은 단백질 1 mol당 3.4 mol의 copper를 포함하고 있었다. 이와 같은 분광학적인 자료는 본 균주의 laccase에는 전형적인 균류의 laccase와 같이 Cu(II) 이




Fig. 3. SDS-PAGE of *T. hirsuta* S1 laccase purified by affinity chromatography (lane L). Molecular size markers are shown in lane M.




Fig. 4. Absorbance spectrum of laccase from *T. hirsuta* S1 (0.3 mg in 100 mM sodium acetate, pH 5.0) at 25°C. The arrows indicate the characteristic absorbance peak corresponding to type I (ca. 610 nm) and III (ca. 330 nm).




Fig. 5. pH profile of purified *T. hirsuta* S1 laccase. Using 0.5 mM ABTS (100 mM sodium tartrate buffer, pH 3.0) as the substrate. -●- : sodium tartrate (pH 2.5~4.5), -■- : sodium acetate (pH 4.5~6.0), -◆- : sodium phosphate (pH 6.0~7.0).

온이 존재함을 강력히 제시하고 있다(Thurston, 1994). 그러나 균류가운데 *Phlebia radiata*(Karhunen et al., 1990)와 *Phellinus ribis*(Min et al., 2001)의 laccase는 type III와 type I의 copper을 각각 결여하고 있다는 보고도 있다.

최적 pH

T. hirsuta S1의 laccase는 pH 3.0에서 가장 높은 활성을 나타냈고, pH 6.5 이상에서는 효소의 활성이 나타나지 않았다(Fig. 5). 이와 같은 결과는 리그닌을 분해하는 균류의 배양액으로부터 분리한 대부분의 laccase가 갖는 최적 pH 범위 내에 속한다(Thurston, 1994). 그러나 담자균류 가운데 *Agaricus bisporus*의 laccase는 두 개의 뚜렷한 최적의 pH(3.6과 5.6)를 갖는 경우도 있다(Wood, 1980).

온도의 영향

T. hirsuta S1 균주로부터 정제된 laccase를 50°C 미만에서 60분 동안 처리하였을 때 효소는 대체로 안정적이었으나, 70°C에서 약 20분간 처리하였을 때 효소의 활성이




Fig. 6. Activity of purified *T. hirsuta* S1 laccase after preincubation at different temperature. One hundred percent activity refers to 30 U/ml. Using 5 mM ABTS (100 mM sodium tartrate buffer, pH 3.0) as the substrate. -○- : 30°C, -●- : 40°C, -▲- : 50°C, -■- : 60°C, -◆- : 70°C, -□- : 80°C.

약 절반으로 감소하였다(Fig. 6). 본 실험균주의 laccase는 대부분의 목재 백색부후균류의 laccase가 50°C 미만에서 안정된 활성을 나타낸다는 보고와 일치한다(Coll et al., 1993).

기질 특이성

Laccase의 기질로 생각되는 몇몇 페놀 화합물을 시험한 결과(Table 2), ABTS가 가장 우수한 기질로 밝혀졌고, tyrosine에 대해서는 전혀 활성을 나타내지 않았다.

Inhibitor의 영향

Laccase 활성에 영향을 미칠 것으로 추정되는 몇몇 효소저해제의 저해효과를 조사한 결과(Table 3), copper를 포함하고 있는 산화효소들의 활성을 저해하는 물질로 알려져 있는 sodium azide(0.1 mM), thioglycolic acid(0.1 mM), diethyldithiocarbamic acid(1.0 mM)는 효소의 활성을 완전히 저해했으나 metal chelator인 EDTA(1.0 mM)는 효소활성을 저해하지 않았다.

Table 2. Activity of laccase from *T. hirsuta* S1 assessed against different substrates^a

Substrate	Conc. (mM)	ϵ_{max} ($M^{-1}cm^{-1}$)	Wavelength (nm)	Activity (U/ml)	Relative activity (%)
ABTS	5.0	36,000	420	30.8	100
2,6-dimethoxyphenol	5.0	35,645	470	19.9	64.6
Hydroquinone	5.0	17,252	248	8.8	28.6
4-methylcatechol	5.0	2,091	420	8.0	36.0
Guaiacol	5.0	6,400	436	3.1	10.1
Pyrogallol	5.0	4,400	450	1.5	4.9
Catechol	5.0	2,211	450	0.2	0.6
Ferulic acid	5.0	12,483	287	ND	-
Tyrosine	3.0	ND ^b	280	ND	-

^aAssays were done in 100 mM sodium tartrate buffer (pH 3.0).

^bND, not determined.

Table 3. Effect of putative laccase inhibitors on the oxidation of ABTS by the purified *T. hirsuta* S1 laccase^a

Compounds	Concentration (mM)	Inhibition (%)
NaN ₃	0.01	91
	0.02	96
	0.05	99
	0.1	100
TGA	0.01	10
	0.1	96
	1.0	100
	2.0	100
DDC	0.1	69
	1.0	100
	2.0	100
L-cystein	0.5	47
	1.0	87
EDTA	1.0	0

^aABTS was used at 5 mM in 100 mM sodium tartrate buffer (pH 3.0). Zero inhibititon refer to 30 U of laccase activity per ml, using 5 mM ABTS in a control assay.

TGA : Thioglycolic acid, DDC : Diethyldithiocarbamic acid, EDTA : Ethylenediaminetetraacetic acid.

Table 4. Comparison of N-terminal amino acid sequences of *T. hirsuta* S1 laccase and other fungal laccase

Microorganism	N-terminal amino acid sequence
<i>T. hirsuta</i> S1	A I G P T A D L T I S N A E V S P D G F
<i>C. hirsutus</i> ^a	A I G P T A D L T I S N A E V S P D G F A
<i>T. versicolor</i> I ^b	A I G P V A S L V V A N A P V S P D G
<i>P. cinnabarinus</i> PB ^c	A I G P V A D L T L T N A A V S P D G F S

^aKojima et al. (1990).

^bBourbonnais et al. (1995).

^cEggert et al. (1996).

N-말단 아미노산 서열

분리 정제된 laccase의 N-말단 아미노산 서열을 측정하여 다른 균주의 laccase와 비교한 결과(Table 4), *T. hirsuta* S1의 laccase는 *C. hirsutus*의 laccase(Kojima et al., 1990)와 100%의 상동성을 나타냈고, *P. cinnabarinus* PB의 laccase(Eggert et al., 1996b)와는 80%, *T. versicolor*의 laccase I과는 68%의 상동성을 각각 나타냈다.

적  요

한국산 흰구름버섯(*Trametes hirsuta* S1)로부터 배지 내로 분비된 laccase를 ultrafiltration과 anion exchange chromatography, adsorption chromatography를 이용하여 분리·정제하고 정제된 효소의 특성을 조사하였다. Laccase는 균주의 일차 대사 과정에서 주로 생산되는 세포외 폐놀 산화효소였다. 흰구름버섯을 기본 배지에서 배양하였을 때 생장은 배양 6일까지 급속히 이루어졌고, laccase의 활성은 배양 5일에 최대활성을 나타냈으며 배양액에서 LiP와 VAO의 활성은 측정되지 않았다. Laccase

의 생산에 미치는 유도원의 영향을 조사하기 위하여 배양 중인 흰구름버섯에 몇몇 유도원을 첨가한 결과, 2,5-xylidine은 대조구에 비하여 laccase의 생산을 약4배 증가시켰다. 정제된 laccase는 SDS 젤 전기영동에서 대략 66 kDa의 분자량을 가지는 단일 폴리펩타이드(single polypeptide)였고, 탄수화물 함량은 12%였다. 정제된 laccase의 K_m과 V_{max}를 ABTS[2,2-azino-bis(3-ethylbenzthiazole line-6-sulfonic acid)]를 기질로 사용하여 조사한 결과 각각 51.2 μM과 56.8 μmole·min⁻¹·mg⁻¹로 측정되었다. Laccase 활성의 최적 pH는 3.0이며, 이 효소는 50°C 미만에서 1시간 동안 처리하였을 때 안정적이었고 70°C에서 20분간 처리하였을 때 효소의 활성이 반감되었다. Laccase의 분광학적 특성을 조사한 결과 구리를 포함하는 단백질로 나타났다. 일반적으로 알려진 laccase의 기질들에 대한 특이성을 조사한 결과, 5 mM ABTS에서 가장 높은 활성을 나타내었으며 tyrosine에서는 laccase의 활성이 나타나지 않았다. 저해제의 영향을 조사한 결과, 일반적으로 구리를 포함하는 단백질의 저해제인 NaN₃, TGA, DDC를 일정 농도로 처리한 실험구에서는 효소의 활성이 완전하게 억제되었으며, EDTA 처리구에서는 효소의 활성이 억제되지 않았다. 한국산 흰구름버섯 S1 균주로부터 생산되는 laccase의 N-말단의 아미노산의 서열은 *Coriolus hirsutus*의 laccase와 100%의 상동성을 나타냈고, *T. versicolor*의 laccase I과는 68%의 상동성을 나타냈다.

감사의 글

본 연구에 사용된 균주를 동정 해주신 서울대학교 미생물학과의 정학성 교수님과 임영운 박사님께 감사를 드리는 한편 laccase의 N-말단의 아미노산 서열을 밝혀주신 한국기초과학 지원연구원의 김승일 박사님과 실험을 도와주신 박은혜 선생께도 감사를 드립니다.

참고문헌

- Barr, D. P. and Aust, S. D. 1994. Pollutant degradation by white-rot fungi. *Rev. Environ. Contam. T.* **138**: 49-72.
- Bollag, J. M. and Leonowicz, A. 1984. Comparative studies of extracellular fungal laccase. *Appl. Environ. Microbiol.* **48**: 849-854.
- Bourbonnais, R. and Paice, M. G. 1990. Oxidation of non-phenolic substrates. An expended role for laccase in lignin biodegradation. *FEBS Lett.* **167**: 99-102.
- Bourbonnais, R. and Paice, M. G. 1992. Demethylation and delignification of kraft pulp by *Trametes versicolor* laccase in lignin biodegradation. *Appl. Microbiol. Biotechnol.* **36**: 823-827.
- Bourbonnais, R., Paice, M. G., Reid, I. A., Lanthier, P. and Yaguchi, M. 1995. Lignin oxidation by laccase isozymes from *Trametes versicolor* and role of the mediator 2,2'-azinobis(3-ethylbenzthiazolin-6-sulfonate) in kraft lignin depolymerization. *Appl. Environ. Microbiol.* **61**: 1876-1880.

- Camarero, S., Sarkar, S., Ruiz-Duenas, F. J., Martinez, M. J. and Martinez, A. T. 1999. Description of a versatile peroxidase involved in natural degradation of lignin that has both Mn-peroxidase and lignin-peroxidase substrate binding sites. *J. Biol. Chem.* **274**: 10324-10330.
- Cleland, W. W. 1967. Enzyme kinetic. *Ann. Rev. Biochem.* **36**: 77-122.
- Coll, P. M., Fernandez-Abalos, J. M., Villanueva, J. R., Santamaria, R. and Perez, P. 1993. Purification and characterization of a phenoloxidase (laccase) from the lignin-degrading basidiomycete PM1 (CECT 2971). *Appl. Environ. Microbiol.* **59**: 2607-2613.
- Collins, P. J., Kotterman, M. J. J., Field, J. A. and Dobson, A. D. W. 1996. Oxidation of anthracene and benzo[a]pyrene by laccase from *Trametes versicolor*. *Appl. Environ. Microbiol.* **62**: 4563-4567.
- De Vries, O. M. H., Kooistra, W. H. C. F. and Wessels, J. G. H. 1986. Formation of an extracellular laccase by *Schizophyllum commune* dicaryon. *J. Gen. Microbiol.* **132**: 2817-2826.
- Eggert, C., Temp, U., Dean, J. F. D. and Eriksson, K. E. L. 1996a. A fungal metabolite mediates degradation of nonphenolic lignin structures and synthetic lignin by laccase. *FEBS Letter.* **391**: 144-148.
- Eggert, C., Temp, U. and Eriksson, K. E. L. 1996b. The ligninolytic system of the white rot fungus *Pycnoporus cinnabarinus*: purification and characterization of the laccase. *Appl. Environ. Microbiol.* **62**: 1151-1158.
- Field, J. A., De Jong, E., Feijoo-Costa, G. and De Bont, J. A. M. 1993. Screening for ligninolytic fungi applicable to the biodegradation of xenobiotics. *Trends Biotechnol.* **11**: 44-49.
- Guillen, F., Martinez, A. T. and Martinez, M. J. 1990. Production of hydrogen peroxide arylalcohol oxidase from the ligninolytic fungus *Pleurotus eryngii*. *Appl. Microbiol.* **32**: 465-469.
- Haars, A., Chet, I. and Huttermann, A. 1981. Effect of phenolic compounds and tannin on growth and laccase activity of *Fomes annosus*. *Eur. J. Forest Pathol.* **11**: 67-76.
- Higuchi, T. 1990. Lignin biochemistry: biosynthesis and biodegradation. *Wood Sci. Technol.* **24**: 23-63.
- Hoshida, H., Nakao, M., Kubo, K., Hakukawa, T., Morimasa, K., Akada, R. and Nishizawa, Y. 2001. Isolation of five laccase gene sequences from the white-rot fungus *Trametes sanguinea*. *J. Biosci. Bioeng.* In press.
- Johannes, C. and Majcherczyk, A. 2000. Natural mediators in the oxidation of polycyclic aromatic hydrocarbons by laccase mediator system. *Appl. Environ. Microbiol.* **66**: 524-528.
- Karhumen, E., Niku-Paavola, M.-E., Viikari, L., Haltia, T., Van Der Meer, R. A. and Duine, J. A. 1990. A novel combination of prosthetic group in a fungal laccase, PQQ and two copper atoms. *FEBS Lett.* **267**: 6-8.
- Kersten, P. J. and Kirk, T. K. 1987. Involvement of a new enzyme, glyoxal oxidases in extracellular H_2O_2 production by Phanerochaete chrysosporium. *Arch. Microbiol.* **149**: 2195-2201.
- Kirk, T. K. and Farrell, R. L. 1987. Enzymic "Combustion": the microbial degradation of lignin. *Annu. Rev. Biochem.* **41**: 465-505.
- Kojima, Y., Tsukuda, Y., Kawai, Y., Tsukamoto, A., Sugiura, J., Sakaino, M. and Kita, Y. 1990. Cloning, sequence analysis, and expression of lignolytic phenoloxidase gene of the white-rot basidiomycete *Coriolus hirsutus*. *J. Bacteriol.* **265**: 15224-15230.
- Laemmli, U. K. 1970. Cleavage of the structural protein during the assembly of the head of bacteriophage T4. *Nature* **227**: 680-685.
- Leontievsky, A. A., Vares, T., Lankinen, P., Shergill, J. K., Pozdnjakova, N. N., Myasoedova, N. M., Kalkkinen, N., Golovelva, L. A., Cammack, R., Thurston, C. F. and Hatakka, A. 1997. Blue and yellow laccases of ligninolytic fungi. *FEMS Microbiol. Lett.* **156**: 9-14.
- Lowry, O. H., Rosebrough, N. J., Farr, A. L. and Randall, R. J. 1951. Protein measurement with the folin phenol reagent. *J. Biol. Chem.* **193**: 265-267.
- Min, K.-L., Kim, Y.-H., Kim, Y. W., Jung, H. S. and Hah, Y. C. 2001. Characterization of a novel laccase produced by the wood-rotting group *Phellinus ribis*. *Arch. Biophys. Biophys.* **392**: 279-286.
- Niku-Paavola, Karhunen, M.-L., Salola, E. P. and Raunio, V. 1988. Lignolitic enzymes of the white-rot fungus *Phlebia radiata*. *Biochem. J.* **254**: 877-884.
- Niku-Paavola, Karhunen, M.-L. and Viikari, L. 2000. Enzymatic oxidation of alkenes. *J. Mol. Cat. B Enzymol.* **10**: 435-444.
- Paszczynski, A., Crawford, R. L. and Huynh, V. B., 1988. Manganese peroxidase of Phanerochaete chrysosporium: purification. *Methods Enzymol.* **161**: 264-270.
- Paszczynski, A. and Crawford, R. L., 1995. Potential for bioremediation of xenobiotic compounds by the white-rot fungus *P. chrysosporium*. *Biotechnol. prog.* **11**: 368-379.
- Saparatt, M. C. N., Guillen, F., Arambarri, A. M., Martinez, A. T. and Martinez, M. J. 2002. Induction, isolation and characterization of two laccases from the white rot basidiomycete *Coriolopsis rigida*. *Appl. Environ. Microbiol.* **68**: 1534-1540.
- Sarkanen, K. V. 1971. Occurrence, formation, structure and reactivity. Pp 95-163. In Lignin. Sarkanen, K. V. and Ludwig, C. H. Eds. Wiley-Interscience. New York.
- Schoemaker, H. E. 1990. On the chemistry of lignin degradation. *Rec. Travaux Chim. Pays-Bas.* **109**: 255-272.
- Srinivasan, C., D'Souza, T. M., Boominathan, K. and Reddy, C. A. 1995. Demonstration of laccase in white rot basidiomycete Phanerochaete chrysosporium BKM-F1767. *Appl. Environ. Microbiol.* **61**: 4274-4277.
- Sugiura, J., Sakaino, M., Kojima, Y., Tsujioka, K., Mutoh, Y., Shinohara, Y. and Koide, K. 1987. Purification and properties of phenol oxidase produced by white-rot fungi and molecular cloning of phenol oxidase gene, Pp 317-320. In International Seminar on Lignin Enzymic and Microbial Degradation. International Symposium on Wood and Pulping Chemistry, Paris. INRA Publication. Versailles, France.
- Tien, M. and Kirk, T. K. 1983. Lignin-degrading enzyme from the hymenomycete *Phanerochaete chrysosporium*. *Science* **326**: 520-523.
- Tien, M. and Kirk, T. K. 1984. Lignin-degrading enzyme from *Phanerochaete chrysosporium*: purification, characterization, and catalytic properties of a unique H_2O_2 -requiring oxygenase. *Proc. Natl. Acad. Sci. USA* **81**: 2280-2284.
- Thurston, C. F. 1994. The structure and function of fungal laccase. *Microbiology* **140**: 19-26.
- Volc, J., Kubatova, E., Daniel, G. and Prikrylova, V. 1996. Only C-2 specific glucose oxidase activity is expressed in ligninolytic cultures of the white rot fungus *Phanerochaete chrysosporium*. *Arch. Microbiol.* **165**: 421-424.
- Wood, D. A. 1980. Production, purification and properties of extracellular laccase of *Agaricus birporus*. *J. Gen. Microbiol.* **117**: 327-338.
- Yemm, E. W. and Willis, A. J. 1954. The estimation of carbohydrates in plant extracts by anthrone. *Bi. Chem.* **57**: 508-514.