

東醫壽世保元 인용문에 대한 연구

이필우 · 尹暢烈*

關於對『東醫壽世保元』中所引用之文的研究

無論是李濟馬在自己的論述中所表明的，還是將『傷寒論·藏厥證』的內容以朱宏的活人書的形式所進行引用的情況來看，都可看出是從『東醫寶鑑』中所選用的。分析從『東醫寶鑑』中所引用文章，可以看出大多是從『寒門』所摘取的，還有就是從『瘟疫，津液，黃疸，燥，消渴，大便，虛勞，嘔吐』等門引用的。綜上可知，李濟馬是通過對『東醫寶鑑』進行研究創立『體質論』的，他在『醫源論』所論及的“少陰人 病證藥理 張仲景 庶幾乎昭詳發明而 宋元明諸醫 盡乎昭詳發明 少陽人 病證藥理 張仲景 半乎昭詳發明而 宋元明諸醫 庶幾乎昭詳發明 太陰人 病證藥理 張仲景 略得影子而 宋元明諸醫 大半乎昭詳發明 太陽人 病證藥理 朱震亨 略得影子而 本草 略有藥理”的內容，以及“六條病證中 三陰病證 皆少陰人病證也 少陽病證 卽 少陽人病證也 太陽病證 陽明病證則 少陽人 少陰人 太陰人病證 均有之而少陰人病證 居多也”的內容，亦是在研究『東醫寶鑑』的基礎上所提出的。

I. 緒論

東醫修世保元은 李濟馬가 傷寒 및 雜病에 대하여 체질론적으로 새롭게 접근한 서적이다. 그러나 어떻게 이러한 체질론을 만들게 됐는지에 대해서는 의견들이 많다. 혹은 東醫修世保元의 醫論編에 나타나는 傷寒論 條文을 보고 傷寒이 그 원류임을 말하고, 혹은 性命論이나 四端論의 太陽, 太陰, 少陰, 少陽人의 용어를 보고 周易에서 근원한 醫易學적으로 판단하는 경우도 있었다.

최근에 東醫修世保元 甲午本이 복원되면서 그 출전에 대한 단서를 찾을 수 있었다. 甲午本 少陰人편 첫머리에 “因許浚東醫寶鑑所載 摘取張仲景傷寒論文及諸家所論 抄集一通 別附疑難 以爲太少陰陽四象人 傷寒時氣表裏病論¹⁾”이라 하여 東醫寶鑑의 내용을 근거로 논술을 전개 했음을 분명히 하였고, 甲午本 少陰人外感病論 에 “古人之桂枝湯 有證有方而 執證分明 後人之香蘇散 藿香正氣散

有證有方而 執證未分明 今茲更定 證則必程 古人之證 藥則並用 古人今人之藥²⁾”이라 하여 東醫修世保元의 논술된 편차가 이루어진 배경을 잘 나타내 주고 있다.

이에 본인은 구체적으로 東醫修世保元에 나타난 인용문을 南山堂 출판사의 東醫寶鑑에서 찾아보고 검토 해보고자 한다.

II. 연구 방법

1. 원문은 東醫壽世保元 辛丑本을 근거로 하였다.
2. 동의보감은 南山堂 출판사의 東醫寶鑑으로 비교하였다.
3. 東醫壽世保元의 原文과 東醫寶鑑이 완전히 일치하는 곳을 기록하였다.
4. 李濟馬의 論이 있는 부분을 위주로 특이사항을 고찰하였다.

* 대전대학교 한의과대학 진단학교실

1) 김형태 신편, 復原 東醫壽世保元 甲午本, 2000, p. 1.

2) 김형태 신편, 復原 東醫壽世保元 甲午本, 2000, p. 2.

III. 本 論

1) 少陰人 腎受熱 表熱病論

○ 張仲景 傷寒論曰 發熱 惡寒 脈浮者 屬表 卽太陽證也

☞ 東醫寶鑑, 寒, 太陽形證用藥³⁾

○ 太陽傷風 脈陽浮而陰弱 陽浮者 熱自發 陰弱者 汗自出 藹藹惡寒 淅淅惡風 翕翕發熱 鼻鳴乾嘔 桂枝湯主之

☞ 東醫寶鑑, 寒 太陽形證用藥, 太陽傷風⁴⁾

○ 危亦林 得效方曰 四時瘟疫 當用 香蘇散

☞ 東醫寶鑑, 瘟疫, 瘟疫治法, 處方⁵⁾

○ 龔信 醫鑑曰 傷寒 頭痛 身疼 不分表裏證 當用 藿香正氣散

☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒表證, 處方⁶⁾

고찰)

상기 조문은 太陽傷風에 대한 인용문으로 寒門의 太陽條와 처방은 瘟疫門에서 상기 내용인 있었으며, 중심 내용이 太陽傷風에 대한 내용으로 李濟馬의 論에서도 '太陽傷風'이라 언급하였다.

○ 張仲景曰 太陽病 脈浮緊 發熱 無汗而靨者 自愈也

☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒血證⁷⁾

○ 太陽病 六七日 表證因在 脈微而沈 反不結胸 其人如狂者 以熱在下焦 小腹當滿

小便自利者 下血乃愈 抵當湯主之

☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒血證⁸⁾

○ 太陽證 身黃 發狂 小腹硬滿 小便自利者 血證宜抵當湯

傷寒 小腹滿 應小便不利 今反小便自利者 以有血也

☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒血證⁹⁾

○ 太陽病 不解 熱結膀胱 其人如狂 血自下者 自愈 但 小腹急結者 宜攻之 宜桃仁承氣湯

☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒血證¹⁰⁾

○ 太陽病 外證未除而 數下之 遂下利不止 心下痞硬 表裏不解 人蔘桂枝湯主之

☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒痞氣¹¹⁾

고찰)

상기 조문은 少陰人 腎陽困熱과 大陽怕寒에 대한 내용으로 傷寒血證과 傷寒痞氣에서 상기 인용문이 보이며, 주로 傷寒血證의 내용으로 李濟馬의 論에서도 '下焦血證'이라 언급하고 있는 것으로 보아 東醫寶鑑에서 인용한 것으로 볼 수 있다.

○ 張仲景曰 婦人傷寒 發熱 經水適來斷 晝日明了 夜則譫語 如見鬼狀

此爲熱入血室 無犯胃氣及上二焦 必自愈

☞ 東醫寶鑑, 寒, 熱入血室¹²⁾

○ 陽明病 口燥 嗽水 不欲嚥 此必衄 不下

☞ 東醫寶鑑, 寒, 陽明形證用藥, 陽明病禁忌¹³⁾

○ 陽明病 不能食 攻其熱 必滅 傷寒 嘔多 雖有陽明 不可攻

胃家實 不大便 若 表未解 及 有半表者 先以桂枝,柴胡和解 乃可下也

☞ 東醫寶鑑, 寒, 陽明形證用藥, 陽明病禁忌¹⁴⁾

고찰)

상기 내용은 寒門의 熱入血室과 陽明形證用藥에서 보인다.

○ 張仲景曰 陽明之爲病 胃家實也 問曰 緣何得陽明病

答曰 太陽病 發汗 若下 若利小便者 此 亡津液 胃中乾燥 因轉屬陽明 不更衣 內實 大便難者 此名陽明病也

3) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 379.

4) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 380.

5) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 526.

6) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 386.

7) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 397.

8) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 397.

9) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 397.

10) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 397.

11) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 396.

12) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 400.

13) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 381.

14) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 381.

- ☞ 東醫寶鑑, 寒, 陽明形證用藥, 陽明病有三¹⁵⁾
- 傷寒 轉屬陽明 其人 澼然微汗出也
- ☞ 東醫寶鑑, 寒, 陽明形證用藥, 陽明外證¹⁶⁾
- 傷寒 若吐 若下後 不解 不大便 五六日至十餘日 日晡所發潮熱 不惡寒 狂言 如見鬼狀
若劇者 發則 不識人 循衣摸床 惕而不安 微喘 直視 脈弦者 生 脈澹者 死
- ☞ 東醫寶鑑, 寒, 陽明形證用藥, 陽明病惡候¹⁷⁾

고찰)

陽明病에 대한 내용으로 東醫寶鑑의 寒門의 陽明形證用藥에서 보인다.

- 許叔微 本事方曰
一人 病傷寒 大便秘利 日晡發潮熱 手循衣縫 兩手撮空 直視喘急 諸醫皆走
此 誠惡候 仲景 雖有證而無法 但 脈弦者生 脈澹者死
謾且救之 與小承氣湯 一服而 大便利 諸疾漸退 脈且微弦 半月愈
- ☞ 東醫寶鑑, 寒, 陽明形證用藥, 陽明病惡候¹⁸⁾
- 王好古 海藏書曰
一人 傷寒 發狂欲走 脈虛數 用柴胡湯 反劇 以參, 芪, 歸, 朮, 陳皮, 甘草 煎湯 一服 狂定 再服 安睡而愈
- ☞ 東醫寶鑑, 寒, 陽明形證用藥, 陽明虛證宜補¹⁹⁾
- 醫學綱目曰
嘗治循衣摸床者 數人 皆用大補氣血之劑 惟一人 兼潤振脈代 遂於補劑中 略加桂 亦振止 脈和而愈
- ☞ 東醫寶鑑, 寒, 陽明形證用藥, 陽明虛證宜補²⁰⁾
- 成無己 明理論曰
潮熱 屬陽明 必於日晡時發者 乃爲潮熱也
陽明之爲病 胃家實也 胃實則 譫語 手足澼然 微汗出者 此 大便已硬也

- ☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒潮熱²¹⁾
譫語有潮熱 承氣湯下之 熱不潮者 勿服
- ☞ 東醫寶鑑, 寒, 陽明形證用藥, 陽明實證宜下²²⁾
- 朱震亨 丹溪心法曰
傷寒壞證 昏沈垂死 一切危急之證 好人 蓼一兩 水煎一服而盡 汗自鼻梁上出 涓涓如水
- ☞ 東醫寶鑑, 寒, 壞證, 處方 奪命散²³⁾

고찰)

상기 내용은 陽明病의 大便秘利에 역대 醫家들이 치료한 경험을 인용한 것으로 모두 東醫寶鑑의 陽明形證用藥, 傷寒潮熱, 壞證에 나타난다.

- 張仲景曰
陽明病 外證 身熱 汗自出 不惡寒 反惡熱
- ☞ 東醫寶鑑, 寒, 陽明形證用藥, 陽明外證²⁴⁾
- 傷寒 陽明病 自汗出 小便數則 津液內竭 大便必難 其脾爲約 麻仁丸主之
- ☞ 東醫寶鑑, 大便, 脾約證²⁵⁾
- 陽明病 自汗出 小便自利者 此 爲津液內竭 大便雖硬 不可攻之 宜用蜜導法 通之
- ☞ 東醫寶鑑, 寒, 陽明形證用藥, 陽明病禁忌²⁶⁾
- 陽明病 發熱汗多者 急下之 宜大承氣湯
- ☞ 東醫寶鑑, 寒, 陽明形證用藥, 陽明外證²⁷⁾
- 李梴 醫學入門曰
汗多不止 謂之亡陽 如心痞胸煩 面青膚潤者 難治 色黃手足溫者 可治
凡 汗漏不止 眞陽脫亡 故 謂之亡陽 其身必冷 多成痲寒 四肢拘急 桂枝附子湯 主之
- ☞ 東醫寶鑑, 津液, 亡陽證²⁸⁾

고찰)

亡陽病에 대한 내용으로 東醫寶鑑의 寒門의 陽

15) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 381.
16) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 381.
17) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 381.
18) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 381.
19) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 381.
20) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 381.

21) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 395.
22) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 381.
23) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 398.
24) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 381.
25) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 196.
26) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 381.
27) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 381.
28) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 125.

明形證用藥과 大便門의 脾約證, 津液門의 亡陽證에 나타나고 있다.

○ 張仲景曰 陽明病 有三病 太陽陽明者 脾約是也 正陽陽明者 胃家實是也 少陽陽明者 發汗利小便 胃中燥煩實 大便難是也

☞ 東醫寶鑑, 寒, 陽明形證用藥, 陽明病有三²⁹⁾

고찰)

陽明病의 세 가지에 대한 내용으로 東醫寶鑑 寒門의 陽明形證用藥에 나타난다.

○ 張仲景曰

厥陰證 手足厥冷 小腹痛 煩滿囊縮 脈微欲絕 宜當歸四逆湯

☞ 東醫寶鑑, 寒, 厥陰形證用藥, 厥陰病煩滿囊縮³⁰⁾

○ 凡厥者 陰陽氣 不相順接 便爲厥 厥者 手足逆冷是也

☞ 東醫寶鑑, 寒, 厥陰形證用藥, 厥陰病手足厥冷³¹⁾

○ 傷寒 六七日 尺寸脈微緩者 厥陰受病也 其證 小腹痛滿而囊縮 宜用承氣湯 下之

☞ 東醫寶鑑, 寒, 厥陰形證用藥, 厥陰病煩滿囊縮³²⁾

○ 六七日 脈至皆大 煩而口噤不能言 躁擾者 必欲解也

☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒欲解³³⁾

○ 朱肱 活人書曰

厥者 手足逆冷 是也

手足指頭微寒者 謂之清 此疾 爲輕

陰厥者 初得病 便四肢厥冷 脈沈微而不數 足多攣

☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒陰厥³⁴⁾

○ 傷寒 六七日 煩滿囊縮 尺寸俱微緩者 足厥陰

經 受病也

其脈微浮 爲欲愈 不浮 爲難愈

脈浮緩者 必囊不縮 外證 必發熱惡寒 爲欲愈 宜桂麻各半湯

若 尺寸俱沈短者 必囊縮 毒氣入腹 宜承氣湯 下之 速用承氣湯 可保五生一死

六七日 脈微浮者 否極泰來 水升火降 寒熱作而 大汗解矣

☞ 東醫寶鑑, 寒, 厥陰形證用藥³⁵⁾

○ 諸手足逆冷 皆屬厥陰 不可汗下

然 有須汗須下者 謂手足雖逆冷 時有溫時 手足掌心 必煖 非正厥逆 當消息之

☞ 東醫寶鑑, 寒, 厥陰形證用藥, 厥陰病手足厥冷³⁶⁾

○ 李梴曰

舌卷厥逆 冷過肘膝 小腹絞痛 三味蓼萸湯 四順湯主之

囊縮 手足乍冷乍溫 煩滿者 大承氣湯主之

☞ 東醫寶鑑, 寒, 厥陰形證用藥³⁷⁾

고찰)

少陰人 厥陰病에 대한 내용으로 東醫寶鑑의 寒門의 厥陰形證用藥과 傷寒欲解, 傷寒陰厥에서 나타난다.

2) 少陰人 胃受寒 裏寒病論

○ 張仲景曰

太陰之證 腹滿而吐 食不下 自利益甚 時腹自痛

☞ 東醫寶鑑, 寒, 太陰病形證用藥³⁸⁾

○ 腹滿時痛 吐利不渴者 爲太陰 宜四逆湯 理中湯 腹滿不減 減不足言 宜大承氣湯

☞ 東醫寶鑑, 寒, 太陰病形證用藥³⁹⁾

○ 傷寒 自利不渴者 屬太陰 以其臟有寒故也 當溫之 宜用四逆湯

29) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 381.

30) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 385.

31) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 385.

32) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 385.

33) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 402.

34) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 388.

35) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, pp. 384~385.

36) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 385.

37) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 384.

38) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 382.

39) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 382.

☞ 東醫寶鑑, 寒, 太陰病形證用藥⁴⁰⁾
 ○ 太陰證 腹痛自利不渴 宜理中湯 理中丸 四順
 理中湯丸 亦主之
 ☞ 東醫寶鑑, 寒, 太陰病形證用藥⁴¹⁾
 고찰)
 少陰人 太陰病에 대한 내용으로 東醫寶鑑 寒門
 의 太陰病形證用藥에 모두 나타난다.

○ 張仲景曰
 病發於陰而反下之 因作痞
 傷寒 嘔而發熱者 若心下滿 不痛 此爲痞 半夏
 瀉心湯主之 胃虛氣逆者 亦主之
 ☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒痞氣⁴²⁾
 ○ 下後下利 日數十行 穀不化 腹雷鳴 心下痞硬
 乾嘔心煩
 此 乃結熱 乃胃中虛 客氣上逆故也 甘草瀉
 心湯主之
 ☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒痞氣⁴³⁾
 ○ 太陰證 下利清穀 若發汗則 必脹滿 發汗後腹
 脹滿 宜用厚朴半夏湯
 ☞ 東醫寶鑑, 寒, 太陰病形證用藥, 太陰病腹脹
 滿⁴⁴⁾
 ○ 汗解後 胃不和 心下痞硬 脇下有水氣 腹中雷
 鳴 下利者 生薑瀉心湯主之
 ☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒痞氣⁴⁵⁾
 ○ 傷寒 下利 心下痞硬 服瀉心湯後 以他藥下之
 利不止 與理中湯 利益甚 赤石脂禹餘糧湯主之
 ☞ 東醫寶鑑, 寒, 少陰病形證用藥, 少陰病自利⁴⁶⁾

고찰)
 少陰人 傷寒 痞證에 대한 내용으로 東醫寶鑑의
 寒門의 傷寒痞氣와 少陰形證用藥에 나타난다.
 ○ 張仲景曰

傷寒陰毒之病 面青 身痛如被杖 五日可治 七
 日不治

☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒陰毒⁴⁷⁾
 ○ 李梴曰
 三陰病深 必變爲陰毒
 其證 四肢厥冷 吐利不渴 靜躄而臥
 甚則 咽痛鄭聲 加以頭痛 頭汗 眼睛內痛
 不欲見光 面脣指甲青黑 身如被杖
 又 此證 面青白黑 四肢厥冷 多睡
 ☞ 東醫寶鑑, 寒 傷寒陰毒⁴⁸⁾

고찰)
 少陰人 陰毒證에 대한 내용으로 東醫寶鑑의 寒
 門의 傷寒陰毒에 나타난다.

○ 張仲景曰
 傷寒直中陰經 初來 無頭痛 無身熱 無渴 怕寒
 躄臥 沈重欲眠 脣青厥冷
 脈微而欲絕 或脈伏 宜四逆湯 四逆者 四肢
 逆冷也
 ☞ 東醫寶鑑, 寒 少陰病形證用藥, 少陰四逆證有
 二⁴⁹⁾

고찰)
 少陰人 直中陰經證에 대한 내용으로 東醫寶鑑
 寒門의 少陰形證用藥에 나타난다.

○ 張仲景曰 少陰病 脈微細 但欲寐
 ☞ 東醫寶鑑, 寒, 少陰病形證用藥⁵⁰⁾
 ○ 傷寒 欲吐不吐 心煩 但欲寐 五六日 自利而渴
 者 屬少陰 小便色白 宜四逆湯
 ☞ 東醫寶鑑, 寒, 少陰病形證用藥⁵¹⁾
 ○ 少陰病 身體痛 手足寒 骨節痛 脈沈者 附子湯
 主之
 ☞ 東醫寶鑑, 寒, 少陰病形證用藥⁵²⁾

40) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 382.
 41) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 382.
 42) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 396.
 43) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 396.
 44) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 382.
 45) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 396.
 46) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 383.

47) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 389.
 48) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, pp. 388-389.
 49) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 383.
 50) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 383.
 51) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 383.
 52) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 383.

○ 下利 腹脹滿 身體疼痛 先溫其裏 乃攻其表 溫裏 宜四逆湯 攻表 宜桂枝湯

☞ 東醫寶鑑, 寒 少陰病形證用藥⁵³⁾

고찰)

少陰人 少陰病에 대한 내용으로 東醫寶鑑의 寒門의 少陰形證用藥에 나타난다.

○ 張仲景曰

少陰病 始得之 反發熱 脈沈者 麻黃附子細辛湯主之

☞ 東醫寶鑑, 寒, 少陰病形證用藥⁵⁴⁾

○ 少陰病一二日 口中和 背惡寒 宜附子湯

☞ 東醫寶鑑, 寒, 少陰病形證用藥⁵⁵⁾

○ 少陰病二三日 用麻黃附子甘草湯 微發之 以二三日 無證故 微發汗也

無證 謂無吐利厥證也

☞ 東醫寶鑑, 寒, 少陰病形證用藥⁵⁶⁾

○ 下利 脈沈而遲 其人 面小赤 身有微汗 下利清穀 必鬱冒汗出而解 病人 必微厥

所以然者 其面戴陽 下虛故也

☞ 東醫寶鑑, 寒, 少陰病形證用藥⁵⁷⁾

○ 少陰病 脈細沈數 病爲在裏 不可發汗

少陰病 但厥 無汗而 強發之 必動其血 或從口鼻 或從目出 是爲下厥上瀉 難治

☞ 東醫寶鑑, 寒, 少陰病形證用藥, 少陰病禁忌⁵⁸⁾

고찰)

少陰人 少陰病에 대한 내용으로 東醫寶鑑 寒門의 少陰形證用藥에 나타난다.

○ 張仲景曰 少陰病 自利純青水 心下痛 口燥乾者 宜大承氣湯

☞ 東醫寶鑑, 寒, 少陰病形證用藥, 少陰病自利⁵⁹⁾

○ 朱肱曰 少陰病 口燥咽乾而渴 宜急下之 非若

陽明 宜下而可緩也

☞ 東醫寶鑑, 寒, 可下不可下證, 急下兩證⁶⁰⁾

○ 李杲 東垣書曰 少陰證 口中辨 口中和者 當溫 口中乾燥者 當下

少陰證 下利辨 色不青者 當溫 色青者 當下

☞ 東醫寶鑑, 寒, 少陰病形證用藥, 少陰病自利⁶¹⁾

○ 李梴曰 舌乾口燥 或下利青水 譫語 便閉 宜小承氣湯

脣青 四肢厥冷 指甲青黑 宜藏附湯

☞ 東醫寶鑑, 寒, 少陰病形證用藥⁶²⁾

고찰)

少陰人 少陰病에 대한 내용으로 東醫寶鑑 寒門의 少陰形證用藥과 可下不可下證에 나타난다

○ 朱肱曰 躁無暫定而厥者 爲藏厥

☞ 東醫寶鑑, 寒, 厥有藏厥蛔厥⁶³⁾

○ 李梴曰 藏厥者 發躁無休息時 發熱七八日 脈微 膚冷而躁

或吐 或瀉 無時暫安者 乃厥陰眞藏氣 絕 故曰 藏厥

仲景 無治法而 四逆湯 冷飲救之

又 少陰病 厥而吐利發躁者 亦不治而 三味蓼萸湯救之

☞ 東醫寶鑑, 寒, 厥有藏厥蛔厥⁶⁴⁾

고찰)

상기 조문은 藏厥證에 대한 것인 바 본래 藏厥證은 傷寒論辭典⁶⁵⁾에 보면 傷寒論에 “傷寒, 脈微而厥, 至七八日膚冷, 其人躁無暫安時者 此爲藏厥”이라 하여 藏厥의 名이 傷寒論에 처음 나오는데, 朱宏의 活人書에서 인용한 것으로 되어 있다. 이 조문은 東醫寶鑑의 寒門의 厥有藏厥蛔厥에 朱肱과 李梴의 인용문이 나타나는데, 이것으로 보아 李濟

53) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 383.
54) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 383.
55) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 383.
56) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 383.
57) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 383.
58) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 383.
59) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 383.

60) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 403.
61) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 383.
62) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 383.
63) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 388.
64) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 388.
65) 劉渡舟, 傷寒論辭典, 北京, 解放軍出版社, 1988, p.580.

馬가 東醫寶鑑에서 조문을 인용하였다는 결정적 증거가 된다.

○ 朱肱曰 病人 身冷 脈沈細而疾 煩躁而 不飲水者 陰盛隔陽也 若飲水者 非此證也

☞ 東醫寶鑑, 寒, 陰盛隔陽⁶⁶⁾

厥陰病 渴欲飲水者 小小與之 愈

☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒煩渴⁶⁷⁾

○ 成無己曰 煩 謂心中鬱煩也

躁 謂氣外熱躁也

但煩不躁 及 先煩後躁者 皆可治

但躁不煩 及 先躁後煩者 皆不可治

先躁後煩 謂怫怫然 更作躁悶 此 陰盛隔陽也

雖大躁 欲於泥水中臥 但水不得入口 是也

此 氣欲絕而爭 譬如燈將滅而暴明

☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒煩燥, 煩燥吉凶⁶⁸⁾

○ 李梴曰 傷寒 陰盛隔陽 其證 身冷反躁 欲投井中 脣青面黑 渴欲飲水復吐

大便自利黑水 六脈沈細而疾 或無脈

陰盛隔陽 大虛證也 宜霹靂散

☞ 東醫寶鑑, 寒, 陰盛隔陽⁶⁹⁾

又曰 厥逆煩躁者 不治

☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒陰厥⁷⁰⁾

고찰)

少陰人 陰盛隔陽에 대한 내용으로 東醫寶鑑 寒門의 陰盛隔陽, 傷寒煩渴, 傷寒煩躁, 傷寒陰厥에 나타난다.

○ 張仲景曰 傷寒七八日 身黃如梔子色 小便不利 腹微滿 屬太陰 宜茵陳蒿湯

傷寒 但頭汗出 餘無汗 劑頸而還 小便不利 身必發黃

☞ 東醫寶鑑, 寒, 太陰形證用藥, 太陰病發黃⁷¹⁾

○ 李梴曰 天行疫癘 亦必發黃 謂之溫黃 殺人最急 宜瘴疽丸

☞ 東醫寶鑑, 黃疸, 疫癘發黃⁷²⁾

고찰)

少陰人 太陰病發黃에 대한 내용으로 東醫寶鑑 太陰形證用藥과 黃疸門의 疫癘發黃에 나타난다.

○ 醫學綱目曰 但結胸 無大熱者 此爲水結 但頭汗出 名曰 水結胸 小半夏湯主之

☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒結胸⁷³⁾

○ 龔信曰 寒實結胸 無熱證者 宜三物白散

☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒結胸⁷⁴⁾

고찰)

少陰人 結胸證에 대한 내용으로 東醫寶鑑의 寒門 傷寒結胸에서 나타난다.

○ 張仲景曰 病有結胸 有藏結 其狀如何

曰 按之痛 寸脈浮 關脈沈 名曰 結胸也

何謂藏結

曰 如結胸狀 飲食如故 時時下利 寸脈浮 關脈細小沈緊 名曰 藏結

舌上白苔滑者 難治

病人胸中 素有痞 連在臍傍 引入小腹 入陰筋者 此名 藏結 死

☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒藏結⁷⁵⁾

○ 朱肱曰 藏結 狀如結胸 飲食如故 時時下利 舌上白苔

歌曰 飲食如常 時下利 更加舌上白苔 時連膈腹痛引陰筋 此疾 元來死 不醫

☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒藏結⁷⁶⁾

66) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 390.
67) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 395.
68) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 392.
69) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 390.
70) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 388.

71) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 382.
72) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 514.
73) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 396.
74) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 396.
75) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 396.
76) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 396.

고찰)

少陰人 藏結證에 대한 내용으로 東醫寶鑑의 寒門 傷寒藏結에 나타난다.

○ 張仲景曰

黃疸之病 當以十八日 爲期 十日以上 宜差 反劇 爲難治

發於陰部 其人 必嘔 發於陽部 其人 振寒而發熱

☞ 東醫寶鑑, 黃疸(77)

○ 諸疸 小便黃赤色者 爲濕熱 當作濕熱治

小便色白 不可除熱者 無熱也 若有虛寒 證 當作虛勞治

☞ 東醫寶鑑, 黃疸, 黃疸治法(78)

○ 腹脹滿 面萎黃 躁不得睡

☞ 東醫寶鑑, 黃疸, 黃疸之因(79)

○ 黃家 日晡時 當發熱 反惡寒 此爲女勞得之

膀胱急 小腹滿 一身盡黃 額上黑 足下熱 因作黑疸 腹脹如水狀 大便黑 或時澹

此 女勞之病 非水也 腹滿者 難治

☞ 東醫寶鑑, 黃疸, 黑疸難治(80)

○ 朱肱曰 陰黃 煩躁 喘嘔不渴 宜用 茵陳橘皮湯

一人 傷寒發黃 脈微弱 身冷 次第用藥 至茵陳四逆湯 大效

一人 傷寒發黃 脈沈細遲無力 次第用藥 至茵陳附子湯 大效

☞ 東醫寶鑑, 黃疸, 陰黃-處方(81)

○ 醫學綱目曰 濕家之黃 色暗不明 一身不痛

熱家之黃 如橘子 一身盡痛

☞ 東醫寶鑑, 黃疸, 黃疸治法(82)

○ 王好古曰 凡病 當汗而不汗 當利小便而不利 亦生黃

☞ 東醫寶鑑, 黃疸, 黃疸之因(83)

○ 朱震亨曰 黃疸 因食積者 下其食積 其餘 但利小便 小便利白 其黃自退

☞ 東醫寶鑑, 黃疸, 黃疸治法(84)

○ 李梴曰 黃疸十日以上 入腹 喘滿煩渴 面黑者 死

☞ 東醫寶鑑, 黃疸, 可治不可治證(85)

○ 王叔和 脈經曰 黃家 寸口脈 近掌無脈 口鼻冷 黑色 竝不可治

☞ 東醫寶鑑, 黃疸, 可治不可治證(86)

고찰)

少陰人 黃疸에 대한 내용으로 東醫寶鑑의 黃疸門의 黃疸之因, 黃疸治法, 黑疸難治, 陰黃, 可治不可治證에서 나타난다.

이상의 소음인편을 살펴보면 모든 인용문이 동의보감에 출전과 인용문이 모두 나타나며 寒門의 太陽證, 陽明證, 厥陰證, 太陰證, 少陰證, 傷寒血證, 傷寒痞氣, 熱入血室 傷寒潮熱, 壞證, 傷寒欲解, 傷寒陰厥, 傷寒陰毒, 陰盛隔陽, 傷寒煩渴, 傷寒煩躁, 傷寒結胸, 傷寒藏結, 藏厥, 可下不可下證과, 大便門의 脾約證, 津液門의 亡陽證, 瘟疫門, 黃疸門에서 모두 찾을 수 있었다.

특히 藏厥證에서 傷寒論 조문을 朱肱의 活人書에서 인용한 것은 실제로 李濟馬가 傷寒論에서 인용한 것이 아니라 東醫寶鑑에서 인용한 것임을 확증하게 해준다.

3)少陽人 脾受寒 表寒病論

○ 張仲景曰 太陽病 脈浮緊 發熱 惡寒 身痛 不汗出而 煩躁者 大青龍湯主之

☞ 東醫寶鑑, 寒, 太陽形證用藥, 太陽兩傷風寒(87)

고찰)

少陽人 外感病의 내용으로 東醫寶鑑의 太陽形證 用藥에 같은 내용이 있다.

○ 張仲景曰 少陽之爲病 口苦 咽乾 目眩

☞ 東醫寶鑑, 寒, 少陽形證用藥(88)

77) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 515.

78) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 512.

79) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 512.

80) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 514.

81) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 514.

82) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 512.

83) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 512.

84) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 512.

85) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 515.

86) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 515.

87) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 380.

○ 眩而 口苦 舌乾者 屬少陽

☞ 東醫寶鑑, 寒, 少陽形證用藥⁸⁸⁾

○ 口苦 耳聾 胸滿者 少陽傷風證也

☞ 東醫寶鑑, 寒, 少陽形證用藥⁹⁰⁾

○ 口苦 咽乾 目眩 耳聾 胸脇滿 或 往來寒熱而嘔 屬少陽 忌吐下 宜小柴胡湯和之

☞ 東醫寶鑑, 寒, 可和不可和證⁹¹⁾

고찰)

少陽人 少陽病에 대한 내용으로 東醫寶鑑의 少陽形證用藥과 可和不可和證에 상기 내용이 나타난다.

○ 朱肱曰 凡發汗 腰以上 雖淋漓而 腰以下至足 微潤則 病終不解

☞ 東醫寶鑑, 寒, 可汗不可汗證, 發汗法⁹²⁾

고찰)

東醫寶鑑 寒門의 可汗不可汗證에 같은 내용이 나타난다.

○ 張仲景曰 少陽證 濇濇汗出 心下痞硬滿 引脇下痛 乾嘔 短氣 不惡寒

表解裏未和也 宜十棗湯

若 合下不下 令人脹滿 遍身浮腫

☞ 東醫寶鑑, 寒, 少陽形證用藥, 少陽病脇痛⁹³⁾

○ 傷寒 表未解 醫反下之 腸內拒痛 手不可近 心下滿而 硬痛 此爲結胸 宜大陷胸湯

☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒結胸⁹⁴⁾

○ 渴欲飲水 水入即吐 名曰水逆 五苓散 主之

☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒煩渴⁹⁵⁾

○ 杜壬曰 裏未和者 蓋 痰與燥氣 壅於中焦故 頭痛 乾嘔 汗出 痰隔也 非十棗湯 不治

☞ 東醫寶鑑, 寒, 少陽形證用藥, 少陽病脇痛⁹⁶⁾

○ 龔信曰 心下硬痛 手不可近 燥渴譫語 大便實 脈沈實有力 爲大結胸

大陷胸湯下之 反加煩躁者 死

小結胸 正在心下 按之則痛 宜小陷胸湯

☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒結胸⁹⁷⁾

고찰)

少陽人 結胸病에 대한 내용으로 東醫寶鑑 少陽形證用藥과 傷寒結胸, 傷寒煩渴에 상기 인용서와 인용문이 나타난다.

○ 李子建 傷寒十勸論曰 傷寒腹痛 亦有熱證 不可輕服溫煖藥

又曰 傷寒自利 當觀陰陽證

不可例服 溫煖及止瀉藥

☞ 東醫寶鑑, 寒⁹⁸⁾

○ 朱震亨曰 傷寒陽證 身熱 脈數 煩渴引飲 大便自利 宜柴苓湯

☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒自利⁹⁹⁾

고찰)

少陽人 自利에 溫煖藥을 사용치 않아야 한다는 내용으로 東醫寶鑑에 나타난다.

○ 張仲景曰

太陽病不解 轉入少陽者 脇下硬滿 乾嘔不能食 往來寒熱者

尙未吐下 脈沈緊者 與小柴胡湯

若已吐下 發汗 譫語 柴胡證 證罷 此爲壞病 依壞法治之

☞ 東醫寶鑑, 寒, 少陽形證用藥, 少陽病壞證¹⁰⁰⁾

○ 傷寒 脈弦細 頭痛 發熱者 屬少陽 不可發汗 發汗則 譫語

☞ 東醫寶鑑, 寒, 少陽形證用藥, 少陽病不可發汗¹⁰¹⁾

88) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 382.

89) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 382.

90) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 382.

91) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 403.

92) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 402.

93) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 382.

94) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 396.

95) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 395.

96) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 382.

97) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 396.

98) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 404.

99) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 397.

100) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 382.

고찰)

少陽人 傷寒으로 發狂譫語證이 되는 내용으로
東醫寶鑑에 少陽形證用藥에 나타난다.

4) 少陽人 胃受熱 裏熱病論

○ 張仲景曰 太陽病 八九日 如瘧狀 發熱惡寒 熱
多寒少 脈微而惡寒者 此 陰陽
俱虛

不可更發汗 更下更吐 面色 反有熱色
者 未欲解也 不能得小汗出 身
必痒

宜桂麻各半湯

☞ 東醫寶鑑, 寒, 太陽形證用藥, 太陽病似瘧¹⁰²⁾

○ 太陽病 似瘧 發熱惡寒 熱多寒少 脈微弱者 此
亡陽也 身不痒 不可發汗 宜桂婢各半湯

☞ 東醫寶鑑, 寒, 太陽形證用藥, 太陽病似瘧¹⁰³⁾

고찰)

少陽人 熱多寒少證에 대한 내용으로 東醫寶鑑
太陽形證用藥에 나타난다.

○ 張仲景曰 陽明證 小便不利 脈浮而渴 猪苓湯
主之

☞ 東醫寶鑑, 寒, 陽明形證用藥, 處方¹⁰⁴⁾

○ 三陽合病 頭痛面垢 譫語遺尿 中外俱熱 自汗
煩渴 腹痛身重 白虎湯主之

☞ 東醫寶鑑, 寒, 陽明形證用藥, 陽明證汗渴¹⁰⁵⁾

고찰)

少陽人 陽明證에 대한 내용으로 東醫寶鑑의 陽
明形證用藥에 나타난다.

○ 朱肱曰 陽厥者 初得病 必身熱頭痛 外有陽證
至四五日 方發厥 厥至半日 却身熱

蓋 熱氣深 方能發厥 若 微厥 却發熱
者 熱甚故也

其脈 雖伏 按之滑者 爲裏熱

或飲水 或揚手擲足 或煩躁 不得眠 大
便秘 小便赤 外證 多昏憤 用白虎湯

☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒陽厥¹⁰⁶⁾

고찰)

少陽人 陽厥證에 대한 내용으로 東醫寶鑑의 寒
門 傷寒陽厥에 상기 인용서와 인용문이 나타난다.

○ 王好古曰 渴病有三 曰消渴 曰消中 曰消腎

熱氣上騰 胸中煩躁 舌赤脣紅 此渴 引飲常
多 小便數而少 病屬上焦 謂之消
渴

熱蓄於中 消穀善飢 飲食倍常 不生肌肉 此
渴 亦不甚煩 小便數而恬 病屬中焦 謂
之消中

熱伏於下 腿膝枯細 骨節痠疼 飲水不多 隨
卽尿下 小便多而濁 病屬下焦 謂之消腎
又有五石過度之人 眞氣既盡 石勢獨留 陽道
興強 不交精泄 謂之強中

消渴 輕也 消中 甚焉 消腎 尤甚焉 若 強中則
其斃可立而待也

☞ 東醫寶鑑, 消渴, 消渴有三¹⁰⁷⁾

○ 朱震亨曰 上消者 舌上赤裂 大渴引飲 白虎湯
主之

中消者 善食而瘦 自汗 大便硬 小便
數 黃連猪肚丸主之

下消者 煩躁引飲 小便如膏 腿膝枯
細 六味地黃湯主之

☞ 東醫寶鑑, 消渴, 消渴形證¹⁰⁸⁾

○ 醫學綱目曰 渴而多飲 爲上消

消穀善飢 爲中消

渴而尿數 有膏油 爲下消

☞ 東醫寶鑑, 消渴, 消渴形證¹⁰⁹⁾

○ 危亦林曰 因耽嗜色慾 或服丹石 眞氣既脫 熱

101) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 382.

102) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 380.

103) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 380.

104) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 381.

105) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 381.

106) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 388.

107) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 506.

108) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 506.

109) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 506.

邪獨盛 飲食如湯消雪 肌膚日削
小便如膏油 陽強興盛 不交精泄 三
消之中 最爲難治

☞ 東醫寶鑑, 消渴, 強中證¹¹⁰⁾

고찰)

少陽人 消渴病에 대한 내용으로 東醫寶鑑의 消渴門에 상기 내용의 인용문이 나타난다.

○ 危亦林曰 消渴 預防發癰疽 忍冬藤 不拘多少 根莖花葉 皆可服

☞ 東醫寶鑑, 消渴, 消渴須豫防癰疽¹¹¹⁾

○ 李杲曰 消渴之疾 能食者 未傳 必發腦疽背瘡 不能食者 必傳 中滿鼓脹

☞ 東醫寶鑑, 消渴, 消渴傳變證¹¹²⁾

○ 東醫醫方類聚曰 消渴之病 變成發癰疽 或成水病 或雙目失明

☞ 東醫寶鑑, 消渴, 消渴傳變證¹¹³⁾

고찰)

少陽人 消渴의 變症에 대한 내용으로 東醫寶鑑의 消渴門에 상기 인용문이 나타난다.

○ 王好古曰 一童子 自嬰至童 盜汗七年 諸藥不效 服涼膈散三日 病已

☞ 東醫寶鑑, 津液, 盜汗, 童子盜汗¹¹⁴⁾

○ 東醫醫方類聚曰 夫渴者 數飲水 其人 必頭面眩 背寒而嘔 因虛故也

☞ 東醫寶鑑, 消渴, 消渴形證¹¹⁵⁾

○ 龔信曰 凡 陰虛證 每日午後 惡寒發熱 至晚亦得微汗而解 誤作瘧治 多致不救

☞ 東醫寶鑑, 消渴, 陰虛用藥¹¹⁶⁾

○ 孫思邈 千金方書曰 消渴 宜慎者 有三 一飲酒 二房勞 三鹹食及麵

能慎此三者 雖不服藥 亦可自愈

☞ 東醫寶鑑, 消渴, 禁忌法¹¹⁷⁾

고찰)

少陽人의 消渴에 대한 치험례를 인용한 것으로 東醫寶鑑의 津液과 消渴門에 나타난다.

이상에서 살펴보면 少陽人編의 인용문은 寒門의 太陽證, 少陽證, 陽明證, 傷寒結胸, 傷寒煩渴, 傷寒自利, 傷寒陽厥과 消渴門, 津液門에서 찾아볼 수 있었다.

5) 太陰人 胃脘受寒 表寒病論

○ 張仲景曰 太陽傷寒 頭痛發熱 身疼腰痛 骨節皆痛 惡寒無汗而喘 麻黃湯 主之

☞ 東醫寶鑑, 寒, 太陽形證用藥, 太陽傷寒¹¹⁸⁾

○ 註曰 傷寒 頭痛身疼腰痛 以至牽連百骨節俱痛者 此 太陽傷寒 榮血不利故也

☞ 東醫寶鑑, 寒, 太陽形證用藥, 太陽傷寒¹¹⁹⁾

고찰)

太陰人 外感病에 대한 내용으로 東醫寶鑑 寒門의 太陽形證用藥에 상기 인용문이 나타난다.

○ 張仲景曰 傷寒 四五日而厥者 必發熱 厥深者 熱亦深 厥微者 熱亦微

傷寒 厥四日 熱反三日 復厥五日 厥多熱少 其病 爲進

傷寒 發熱四日 厥反三日 厥少熱多 其病 當自愈

☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒陽厥, 陰陽厥輕重¹²⁰⁾

고찰)

太陰人 厥證에 대한 내용으로 東醫寶鑑의 寒門의 傷寒陽厥에 상기 인용문이 나타난다.

110) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, pp. 509~510.

111) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 510.

112) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 510.

113) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 510.

114) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 124.

115) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 506.

116) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 445.

117) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 510.

118) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 380.

119) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 380.

120) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 388.

6)太陰人 肝受熱 裏熱病論

○ 朱肱曰 陽毒 面赤斑 斑如錦紋 咽喉痛 唾膿血
宜葛根解肌湯 黑奴丸
陽毒 及 壞傷寒 醫所不治
精魄已竭 心下尚煖 幹開其口 灌黑
奴丸 藥下咽 卽活

☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒陽毒¹²¹⁾

○ 李挺曰 微惡寒 發熱 宜葛根解肌湯
目疼 鼻乾 潮汗 閉澁 滿渴 狂譫 宜調
胃承氣湯
熱在表則 目疼 不眠 宜解肌湯
熱入裏則 狂譫 宜調胃承氣湯

☞ 東醫寶鑑, 寒, 陽明形證用藥¹²²⁾

○ 龔信曰
陽明病 目疼 鼻乾 不得臥 宜葛根解肌湯

☞ 東醫寶鑑, 寒, 陽明形證用藥, 處方-葛根解肌湯¹²³⁾

○ 三陽病深 變爲陽毒 面赤眼紅 身發斑黃 或下
利黃赤 六脈洪大 宜黑奴丸

☞ 東醫寶鑑, 寒, 傷寒陽毒¹²⁴⁾

고찰)

太陰人 陽毒證에 대한 내용으로 東醫寶鑑의 寒
門의 陽明形證用藥과 傷寒陽毒에 상기 인용문이
있다.

○ 靈樞曰 尺膚熱深 脈盛躁者 病瘟也

☞ 東醫寶鑑, 瘟疫, 脈法¹²⁵⁾

○ 王叔和曰 瘟病脈 陰陽俱盛 病熱之極 浮之而
滑 沈之散澁

☞ 東醫寶鑑, 瘟疫, 脈法¹²⁶⁾

○ 脈法曰 瘟病二三日 體熱 腹滿 頭痛 食飲如故
脈直而疾 八日死
瘟病四五日 頭痛 腹滿而吐 脈來細而

強 十二日死

八九日 頭身不痛 目不赤 色不變
而 反利

脈來澁 按之不足 舉時大
心下堅 十七日死

☞ 東醫寶鑑, 瘟疫, 脈法¹²⁷⁾

○ 龔信曰

瘟病 穰穰大熱 脈細小者 死 瘟病 下利 痛甚
者 死

☞ 東醫寶鑑, 瘟疫, 脈法¹²⁸⁾

○ 萬歷丙戌 余寓大梁 瘟疫大作 士民多斃
其證 增寒壯熱 頭面項頰赤腫 咽喉腫痛 昏憤
余發一秘方 名 二聖救苦丸 大黃四兩 豬牙皂
角二兩 麵糊和丸 綠豆大 五七十九

一服卽 汗 一汗卽 愈 裏壯者 百發百中
皂角 開關竅 發其表 大黃 瀉諸火 通其裏

☞ 東醫寶鑑, 瘟疫, 大頭瘟治法, 處方-二聖救苦丸¹²⁹⁾

○ 感四時不正之氣 使人 痰涎壅盛 煩熱 頭疼 身
痛 增寒壯熱 項強 睛疼
或飲食如常 起居依舊 甚至聲啞 或赤眼口瘡
大小腮腫 喉痺 咳嗽稠粘 噴嚏

☞ 東醫寶鑑, 瘟疫, 瘟疫形證¹³⁰⁾

고찰)

太陰人 瘟疫病에 대한 내용으로 東醫寶鑑의 瘟
疫門에 상기 내용이 있다.

○ 內經曰 諸澁 枯涸皴揭 皆屬於燥

☞ 東醫寶鑑, 燥, 燥因血少¹³¹⁾

○ 靈樞曰 二陽結 謂之消 飲一溲二 死不治
註曰 二陽結 謂胃及大腸 熱結也

☞ 東醫寶鑑, 消渴, 消渴之源¹³²⁾

121) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, pp. 389~390.

122) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 380.

123) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 381.

124) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 389.

125) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 525.

126) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 525.

127) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 525.

128) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 525.

129) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 528.

130) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 525.

131) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 416.

132) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 506.

○ 扁鵲難經曰 消渴脈 當得緊實而數 反得沈澹而微者 死

☞ 東醫寶鑑, 消渴, 脈法¹³³⁾

○ 張仲景曰 消渴病 小便反多 如飲水一斗 小便亦一斗 腎氣丸主之

☞ 東醫寶鑑, 消渴, 消渴有三¹³⁴⁾

고찰)

太陰人 消渴病에 대한 내용으로 東醫寶鑑의 消渴門에 상기 인용문이 있다.

○ 危亦林曰

陰血耗竭 耳聾 目暗 脚弱 腰痛 宜用 黑元丹

☞ 東醫寶鑑, 虛勞, 肝虛證, 處方¹³⁵⁾

○ 凡 男子 方當壯年而 眞氣猶怯 此乃稟賦素弱 非虛而然

滋益之方 群品稍衆 藥力細微 難見功效

但 固天元一氣 使水升火降則 五臟自和 百病不生 宜用 拱辰丹

☞ 東醫寶鑑, 虛勞, 肝虛證, 處方¹³⁶⁾

고찰)

太陰人 虛勞에 대한 내용으로 東醫寶鑑의 虛勞門에 상기 인용문이 있다.

이상에서 살펴보면 태음인의 인용문은 동의보감의 寒門의 太陽證, 傷寒陽厥, 傷寒陽毒과 瘟疫門, 燥門, 消渴門, 虛勞門에서 찾아볼 수 있었다.

7) 太陽人 外感 腰脊病論

○ 內經曰 尺脈緩澁 謂之解休

釋曰 尺爲陰部 肝腎主之 緩爲熱中 澁爲亡血 故 謂之解休

解休者 寒不寒 熱不熱 弱不弱 壯不壯 寡不可名 謂之解休也

☞ 東醫寶鑑, 虛勞, 解休證¹³⁷⁾

○ 靈樞曰 髓傷則 消燥筋痠 體解休然 不去矣 不去 謂不能行去也

☞ 東醫寶鑑, 虛勞, 解休證¹³⁸⁾

고찰)

太陽人 解休病에 대한 내용으로 東醫寶鑑의 虛勞에서 상기 인용문이 있다.

8) 太陽人 內觸 小腸病論

○ 朱震亨曰

噎膈反胃之病 血液俱耗 胃脘乾槁

其槁 在上近咽則 水飲可行 食物難入 入亦不多 名之曰 噎

其槁 在下近胃則 食難可入 難盡入胃 良久復出 名之曰 膈 亦曰 反胃

大便秘少 若羊屎然 名雖不同 病出一體

又曰

上焦噎膈 食下則 胃脘當心而痛 須臾吐出 食出 痛乃止

中焦噎膈 食物可下 難盡入胃 良久復出

下焦噎膈 朝食暮吐 暮食朝吐

☞ 東醫寶鑑, 嘔吐, 噎膈反胃病因¹³⁹⁾

氣血俱虛者 口中 多出沫 但見沫多出者 必死

大便 如羊屎者 難治 不淡飲食者 難治

☞ 東醫寶鑑, 嘔吐, 難治不治證¹⁴⁰⁾

○ 張鷟峯曰 噎 當是神思間病 惟內觀自養 可以治之

☞ 東醫寶鑑, 嘔吐, 噎膈反胃病因¹⁴¹⁾

○ 龔信 醫鑑曰 反胃也 膈也 噎也 受病皆同

噎膈之證 不屬虛 不屬實 不屬冷 不屬熱 乃神氣中 一點病耳

☞ 東醫寶鑑, 嘔吐, 噎膈反胃病因¹⁴²⁾

133) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 506.

134) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 506.

135) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 448.

136) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 448.

137) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 454.

138) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 454.

139) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 462.

140) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 465.

141) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 463.

142) 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1987, p. 463.

고찰)

太陽人 嘔噎證에 대한 내용으로 東醫寶鑑의 嘔吐門에 상기 인용문이 모두 있다. 그리고 龔信의 嘔噎之證 이하의 내용은 東醫寶鑑에 '醫林'이라 되어 있는 바, '醫林'은 '醫林撮要'를 말하는 것으로 조선의 鄭敬先이 撰하고 楊禮壽가 校定한 것이다. 李濟馬가 인용하며 착각을 하였거나 출전을 밝히지 못한 듯 하다.

이상에서 살펴보면 太陽인편의 인용문은 동의보감의 虛勞門과 嘔吐門에서 모두 찾아 볼 수 있었다.

IV. 結 論

이상에서 살펴본 결과 아래의 결론을 낼 수 있었다.

1. 東醫修世保元에 인용된 문장은 모두 동의보감에서 찾아 볼 수 있었다.
2. 李濟馬의 論에서 언급한 것을 보거나 傷寒論 藏厥證의 내용을 朱宏의 活人書로 인용한 것을 보아 모두 東醫寶鑑에서 인용되었음을 알 수 있다.
3. 東醫寶鑑에서 인용된 문장을 분류하면 대부분이 寒門에서 발췌되어 있고, 기타 瘟疫, 津液, 黃疸, 燥, 消渴, 大便, 虛勞, 嘔吐에서 인용하였다.
4. 동의수세보원이 동의보감을 근거로 체질론을 정립한 것이므로 동의보감의 다른 부분도 체질론적으로 재 해석될 가치가 있다고 사료된다.

參 考 文 獻

1. 김형태, 新編 東醫壽世保元, 서울, 정담, 1999.
2. 김형태, 復元 甲午本 東醫壽世保元, 서울, 2000.
3. 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂 1987.
4. 劉渡舟, 傷寒論辭典, 北京, 解放軍出版社, 1988,