

여성과 에이즈

:: 이주열 남서울대학교 보건행정학과 교수

세계적으로 에이즈에 감염된 4,000만 명 가운데 여성이 절반을 차지하며 아프리카 사하라사막의 남부 지역에는 성인 감염자의 58%가 여성이다. 또 아시아 태평양권에서는 파푸아뉴기니의 여성 에이즈 감염자가 남성과 같은 수준에 도달했고 신규 감염자는 여성이 남성보다 많다. 세계 최대 에이즈 국가로 알려진 태국의 경우 성인 에이즈 감염자 가운데 여성의 비율은 지난해에 35.7%였다.

여성이나 아동은 에이즈 감염의 희생자로 간주된다. 일반적으로 남성 감염자가 여성에게 에이즈를 전파하고 감염된 아이가 출생하기 때문이다. 최근 태국에서 열린 여성과 에이즈 회의에서 유엔 아시아-태평양 경제사회위원회(ESCAP)는 “여성들은 예방 서비스를 충분히 받을 수 없고 남성에게 안전한 성을 요구하기 힘들기 때문에 에이즈에 취약하다”고 말했다.

자료에 따르면 세계적으로 에이즈에 감염된 4,000만 명 가운데 여성이 절반을 차지하며 아프리카 사하라사막의 남부 지역에는 성인 감염자의 58%가 여성이다. 또 아시아 태평양권에서는 파푸아뉴기니의 여성 에이즈 감염자가 남성과 같은 수준에 도달했고 신규 감염자는 여성이 남성보다 많다. 세계 최대 에이즈 국가로 알려진 태국의 경우 성인 에이즈 감염자 가운데 여성의 비율은 지난해에 35.7%였다. 국내의 총 에이즈 감염인은 2,540명이며 이 중에서 여성은 264명으로 10.4%를 차지하고 있다. 외국과 비교하면 여성의 비율이 높지 않으나 최근 신규 감염인 중 여성의 비율이 계속 증가하



여 분제가 되고 있다.

여성 감염의 주요경로는 부인이 남편으로부터 감염되는 경우와 윤락 등 특수업에 종사하는 여성들이 남성으로부터 감염되는 경우인데, 안전한 성을 위한 콘돔사용을 남성에게 요구하기 어렵기 때문에 에이즈 감염의 위험으로부터 자신을 보호하기 어려운 실정이다. 특히 에이즈 예방사업에서 관심의 대상은 에이즈 감염에 노출될 위험이 높은 각종 특수업에 종사하는 여성이다. 이들은 노출된 위험으로부터 자신을 보호하기 어려운 것이 현실이다.

더 심각한 문제는 이들 여성의 상당수는 자신이 위험에 노출되어 있다는 사실조차 모른다는 것이다. 성매매가 은밀하게 이루어지기 때문에 보건당국에서 이 문제를 해결하기에는 어려움이 많다. 보건당국이 특수업에 종사하는 여성에 대한 에이즈 검사의 활성화, 조기치료 등의 사업을 추진할 수 있지만 근본적인 예방활동은 되지 못한다. 여성 스스로 자신을 보호하는 것이 가장 중요하고 확실한 예방법이다. 모든 여성은 남성에게 안전한 성을 요구할 수 있는 당연한 권리가 있다. 여성이 에이즈의 위험으로부터 자유롭게 위해서는 기본적인 여성의 권리를 인식하고 실현해야 한다. 기본적인 권리의 실현이 현실적인 장애요인 때문에 힘들다고 포기한다면 그것은 자신의 건강을 포기하는 것이다. 건강한 성은 건전한 성과 안전한 성이 실현될 때 가능하다.