

東醫寶鑑 中 木通이 主藥으로 配伍된 處方의 活用에 대한 考察

이상민¹, 권택현², 육인수³, 윤용갑¹

원광대학교 한의과대학 방제학교실¹, 삼성한의원², 공덕한의원³

Abstract

Study on Application of Lignum akebiae Main Blended Prescription from Dongeuybogam

Lee, Sang-Min¹, Kwon, Taek-Hyun², Ok, In-Soo, Yun³, Young-Gab¹

Dept. of Oriental Medicine Graduate School of Wonkwang University¹

Samsung oriental clinic², Gongduk oriental clinic³

This report describes the remedial fields, symptoms, pathology, dosage, prescriptive constitution of 46 studies related to the use of *Lignum akebiae* main blended prescriptions from *Dongeubogam*.

The following conclusions were reached through investigations on the prescriptions that use *Lignum akebiae* as a key ingredient.

Lignum akebiae blended prescriptions are utilized 17.4% of prescriptions appear in the chapter of urine.

Prescriptions that utilize *Lignum akebiae* as the main ingredient are used commonly in the treatment of the symptoms of a urine and a cystic disease related to the urinary organs , or the diseases of eye, ear, nose, throat and the symptoms of a tumor, abscess.

Lignum akebiae is utilized for an etiological and pathogenic fators related to heat, dampness, phlegm and summer heat such as excessive fever of heart and bladder, fever of small intestine, lower energizer dampness and heat, fever due to blood deficiency,

교신저자 : 윤 용 갑

원광대학교 한의과대학 방제학교실

Tel : 063)850-6834 E-mail : yunyg@wonkwang.ac.kr

접수 : 2005/ 06/ 13 수정 : 2005/ 06/ 16 채택 : 2005/ 06/ 20

phlegm fire, affection by summer heat and dampness etc.

The clinical dosage of *Lignum akebiae* is 1 don(about 3.75gram), according to symptoms, it has ranged at a wide variety of amounts from 3 pun(about 1.13gram) to 1.5 don(about 11.25gram).

Lignum akebiae is widely applied with base prescriptions such as Dozuksan, Moktongchajuntang, Manjunmoktongtang, etc.

Key Word : *Lignum akebiae*, Dongeuybogam

I. 緒 論

木通(*LIGNUM AKEBIAE*)은 木通科(으름덩굴과 ; *Lardizablaceae*)에 속한 낙엽 혹은 半常綠纏繞藤本인 으름덩굴 및 여덟잎 으름의 木質莖을 말하며, 개화기는 4~5月이며, 성숙기는 9~10月이다. 木通은 황해도 이남에 분포하며 산기슭에서 자생한다. 通草라고 부르기도 하며 가을에 채취하여 外皮를 제거하고 헛빛에 말리거나 불어 말려서 사용한다^{1~5)}.

性味는 淡 苦 凉 하며, 心 小腸 膀胱으로 歸經하는 것으로 알려져 있으며¹⁾ 效能으로는 清熱降火, 利尿通淋, 通經下乳, 活血通脈의 작용이 있으며^{6~8)}, 安心除煩, 止渴退熱, 明耳目, 治鼻塞, 下水, 破積聚, 排膿, 治瘡癧, 止痛, 催生下胞, 女人血閉, 月後不均 및 浮腫, 關節鼻痛, 小便不利, 小便不通, 經閉, 口舌生瘡, 脚氣, 瘡痛, 乳汁分泌不足症 등에 活用하여 왔다^{1, 6, 8~10)}.

또한 木通에는 Akeboside 11종 및 betulin, myoinositol, stigniasteral β -sitosterol, aristolochic acid, olednolic acide, hederagenin 等이 함유된 것으로 알려져 있다^{4, 5, 7, 11)}.

木通의 樂理作用으로는 利水作用, 심근 수축작용증가, 탐식작용세포의 활성을 증가시키고, 抗菌 抗癌 抗消炎 鎮靜作用등이 보고되고 있다^{5, 9, 11~13)}.

한편 木通은 배합되는 약물에 따라 다양한 효과를 발휘하는 바^{6~8, 14~17)}, 滑石 車前子 瞽麥 生地黃등과 配伍되면 萬全木通散 導赤散에서와 같이 清熱利水作用이 있어 小便病 淋病 口舌生瘡에 活用하고, 石菖蒲 細辛 甘菊등과 配伍되면 通竅作用이 있어 蕁菊散(2) 蔿菊子散 犀角飲子 荊蘇湯 通經湯에서와 같이 鼻塞 腫耳 耳鳴 失音에 活用한다. 또한 猪苓 澤瀉 白朮 茯苓과 配伍되면, 利水作用이 강화되어 있어 澤瀉湯 加減香薷散에서와 같이 水腫이나 囊腫 夏泄에 활용한다. 그밖에도 배합되는 약물에 따라 黃疸, 惡瘍, 脢風, 脹滿, 結核등 다양한 痘症에 활용되고 있다.

이에 저자는 東醫寶鑑에 수록된 木通이 主藥으로 配伍된 方劑 46종에 대한 문헌적 자료를 통하여 木通의 治療領域, 治療病症 및 主治, 痘因病理, 使用量, 處方構成 内容을 관찰한 결과 木通의 臨床活用에 대한 일정한 方劑學的 見地를 얻었기에 보고하는 바입니다.

II. 本 論

調査方法은 東醫寶鑑 中 木通이 主藥으로 活用된 46方劑^{18~28)}의 内容을 data base化하여 文獻的 資料分析 및 研究內容을 정리하였으며, 處方名은 同一하나 構成內容이 다른 경우 處方에 (2)를 表記하여 區分하였다. 본 논문에서 主藥이라 함은 處方構成에서 木通의 역할이나 使用量이 君臣藥으로 作用하거나 혹은 여러 가지 藥物과 等分으로 構成되어 있는 경우로 하였다.

1. 木通이 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域에 대한 調査

표(1)

病 門	處 方	빈도수	백분율
小便	導赤湯, 木香湯, 生附湯, 宣氣散, 猪苓湯, 八正散, 必效散, 增味導赤散	8	17.4
小兒	加味四聖散, 四聖散, 人參蟬蛻散, 紫草木通湯 調解散, 通心飲	6	13.0
耳	蔓荊子散, 復聰湯, 牛角飲子, 磁石羊腎丸	4	8.7
小腸腑	導赤散, 赤茯苓湯	2	4.3
諸瘡	消風化痰湯, 連翹飲	2	4.3
婦人	安榮散, 澤瀉湯(2)	2	4.3
癰疽	涼血飲, 榮衛返魂湯(2)	2	4.3
黃疸	茵陳吳茱萸湯, 退黃散	2	4.3
浮腫	苓桂丸(2), 澤瀉散	2	4.3
聲音	杏仁煎, 荊蘇湯	2	4.3
前陰	加減香薷散	1	2.2
鼻	芍藥散(2)	1	2.2
膀胱腑	葵子湯	1	2.2
氣	導氣枳殼丸	1	2.2
脹滿	消脹飲子	1	2.2

표(1)

病 門	處 方	빈도수	백분율
嘔吐	神奇散	1	2.2
風	神痛飲	1	2.2
心臟	十味導赤散	1	2.2
眼	羚羊角散(4)	1	2.2
血	清腸湯	1	2.2
下	通膈丸	1	2.2
大便	通苓散	1	2.2
暑	通苓散(2)	1	2.2
火	黃芩湯(5)	1	2.2
합 계		46	100

2. 木通이 主藥으로 配伍된 方劑의 痘症 및 主治 調査

木通이 主藥으로 配伍된 方劑를 疾患別로 區分하고, 이에 대한 痘症 및 主治를 調査하였다.

1) 小便病

표 (2-1)

區分	病 症	處 方	主 治
小便病	小便不通	神奇散	噎膈反胃 血虛有火 三陽枯竭
		猪苓湯	熱結 小便不通
		八正散	膀胱熱積 小便閉 不通
	冷淋	木香湯	冷淋 小便淋澁 身體清冷
		生附湯	冷淋 小便澁痛 增寒凜凜
	小便不利	導赤散	小腸熱小便不利
		赤茯苓湯	小腸熱 面赤多汗 小便不利
	子淋	安榮散	子淋
		澤瀉湯(2)	子淋
	血淋	增味導赤散	血淋澁痛
	諸淋通治	必效散	一切淋
	尿血	清腸湯	尿血
	尿澁	人參蟬蛻散	尿澁
		紫草木通湯	尿澁
	小便赤白濁	導赤湯	尿如米泔色不過 二服愈
	膀胱病通治	葵子湯	膀胱實熱 小便不通

2) 眼耳鼻咽喉病

亞 (2-2)

區分	病 症	處 方	主 治
耳 鼻 咽 喉 病	耳痛·膿耳	蔓荊子散 犀角飲子	腎經 有風熱 耳中熱痛 出膿汁 或鳴 或聾 風熱耳聾 肿痛及出膿水
	耳鳴	復聰湯	痰火上攻耳鳴耳聾
	耳聾	磁石羊腎丸	諸般耳聾 補虛開竅 行鬱散風 去濕
	卒然失音	荊蘇湯	感風寒卒 及失音通用
	雜病失音	杏仁煎	咳嗽 失音聲不出
	鼻塞	芎藭散(2)	鼻塞爲癪
	外障	羚羊角散(4)	蟹睛疼痛

3) 癰疽諸瘡, 內傷病, 其他病

(2-3)

區分	病 症	處 方	主 治
癰疽諸瘡	痘瘡	加味四聖散 四聖散	痘出 不快 或 陷伏倒鬱 一切 惡候 痘瘡出不快及倒鬱
	心癰	涼血飲	心癰退潮 止渴 解熱 能內消
	流注骨疽	榮衛返魂湯(2)	主一切痰飲爲患 專治痰腫 又治癰疽發背 流注腫毒
	結核	消風化痰湯	結核 因風痰鬱結
	惡瘡	連翹飲	惡瘡遍身 痛痒及血風瘡
	倒鬱	調解散	痘形陷伏
內傷病	嘔吐	神奇散	噎膈反胃 血虛有火 三陽枯竭
	脹滿	消脹飲子	蠭脹 單腹脹
	暑泄	通苓散	暑濕泄瀉 分水穀解 煩熱
浮腫	浮腫	澤瀉散	水腫 二便濁
	陰卵偏墜	加減香薷散	偏墜氣 初起壯熱 憎寒 乃發表分利藥也 一服而愈
其他病	黃疸	茵陳吳茱萸湯 退黃散	陰黃 曾服薑附諸藥未愈 脉尚遲者 黃疸 身面女金 小便如黃柏汁
	氣逆	導氣枳殼丸	逆氣上攻 心胸痞痛
	歷節風	神痛飲	歷節風
	下藥	通膈丸	下濕熱通利二便
	暑熱煩渴	通苓散(2)	傷暑 煩渴 泄瀉 尿澁
	上焦熱	黃芩湯(5)	心肺蘊熱口瘡咽痛小便淋濁
	噤口撮口臍風證	通心飲	旋螺 風赤腫 而 痛甚 清心火 通小便 退潮熱
	心病	十味導赤散	心藏實熱 口舌生瘡 驚悸煩渴

3. 木通이 主藥으로 配伍된 方劑의 痘因 · 痘理 調查

木通이 主藥으로 配伍된 方劑中 痘因 · 痘理가 기록된 內容을 調査하여 有形別呈 分類하여 整理하였다.

표(3)

구분	病 理	病 症	處 方	비고
臟腑	膀胱實熱	小便不通	葵子湯	
		小便閉不通	八正散	
	小腸熱	小便不利	導赤散	
		面赤多汗 小便不利	赤茯苓湯	
	腎經 有風熱	耳中熱痛 出膿汁 或鳴或聾	蔓荊子散	
		耳聾 腫痛及出膿水	犀角飲子	
痰	心藏實熱	口舌生瘡 驚悸煩渴	十味導赤散	
	痰火上攻	耳鳴耳聾	復聰湯	
	因風痰鬱結	結核	消風化痰湯	
六氣	主一切痰飲	爲患 專治 痰腫 又治癰疽發背 流注腫毒	榮衛返魂湯(2)	
	熱結	小便不通	猪苓湯	
	下濕熱	通利二便	通膈丸	
	暑濕	泄瀉 分水穀解 煩熱	通苓散	
	傷暑	煩渴 泄瀉 尿澁	通苓散(2)	
血	感風寒卒	及失音通用	荆蘇湯	
	血虛有火 三陽枯竭	噎膈反胃	神奇散	
七情	逆氣上攻	心胸痞痛	導氣枳殼丸	

4. 木通의 使用量에 대한 調査

木通의 각 處方別 一回 使用量을 調査하여 표(4)에 整理하였다.

표(4)

用 量	病 症	處 方	비 고	반도수
三分	倒懶	調解散		
四分	出痘三朝	加味四聖散		
	尿澁	紫草木通湯		
	噤口撮口臍風證	通心飲		
五分	蠱脹	消脹飲子		
	噎膈反胃治法	神奇散		
	心病治法	十味導赤散		
	尿澁	人參蟬蛻散		
	水腫治法	葶藶丸(2)	一兩(제제환산)	
七分	陰卵偏墜	加減香苓散		
	鼻塞	芎藶散(2)		
	耳痛成膿耳	蔓荊子散		
	冷淋	木香湯		
	有名無名諸惡瘡	連翹飲		
	小便不通	猪苓湯		
	尿血	清腸湯		
	諸淋通治	必效散		
七分半	因雜病失音	杏仁煎	一兩半 (제제환산)	
八分	心癱	涼血飲		
一錢	膀胱病通治	葵子湯		
	小腸病通治	導赤散, 赤茯苓湯		
	赤白濁	導赤湯		

표(4)

用 量	病 症	處 方	비 고	빈도수
一錢	耳鳴	復聰湯		
	耳痛成膿耳	犀角飲子		
	結核	消風化痰湯		
	子淋	安榮散		
	外障	羚羊角散		
	流注骨疽	榮衛返魂湯(2)		
	陰黃	茵陳吳茱萸湯		
	血淋	增味導赤散		
	暑泄	通苓散		
	暑熱煩渴	通苓散(2)		
	黃疸通治藥	退黃散		
	小便不通	八正散		
	卒然無音	荊蘇湯		
	歷節風治法	神痛飲	二兩(제재환산)	
一錢 二分	冷淋	生附湯		
一錢半	子淋	澤瀉湯(2)		
	小便不通	宣氣散	三錢(제재환산)	
	耳聾	磁石羊腎丸	三兩(제재환산)	
等分	氣逆	導氣枳殼丸		
	出痘王朝	四聖散		
	水腫治法	澤瀉散		
	下藥	通膈丸		

5. 木通이 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內容 調査

木通이 主藥으로 配伍된 方劑를 疾患別로 區分하고, 이에 대한 處方構成 内容을 調査하여 分析하였다.

1) 小便病

(5-1)

病症	處 方	構 成 內 容	비 고
小便不通	神奇散	當歸 川芎 白芍藥 生地黃並酒炒 陳皮 縮砂 半夏 白茯苓 白朮土炒 香附子 枳實 烏梅肉 薑香 赤茯苓 檳榔 木通 豬苓 黃芩炒 黃柏人乳炒 知母人乳炒 赤芍藥 天門冬 麥門冬 甘草 各五分	導赤散 赤茯苓湯 知柏四物湯類 二陳湯 越鞠丸類
	猪苓湯	猪苓 木通 澤瀉 滑石 枳殼 黃柏酒浸 牛膝 麥門冬 瞿麥 蒲蓄 車前子 各七分 甘草 三分	六一散 木通車前湯 萬全木通湯類
	八正散	大黃 木通 瞿麥 蒲蓄 滑石 桔子 車前子 甘草 各一錢	木通車前湯 萬全木通湯類
冷 淋	木香湯	木通 木香 當歸 白芍藥 青皮 茴香 檳榔 澤瀉 陳皮 甘草 各七分 肉桂 三分	
	生附湯	木通 半夏製 瞿麥各一錢二分 附子生 滑石 各七分	
小便不利	導赤散	木通 滑石 黃柏 赤茯苓 生地黃 桔子仁 甘草梢 各一錢 枳殼 白朮 各五分	導赤散 六一散
	赤茯苓湯	木通 赤茯苓 檳榔 生地黃 黃芩 赤芍藥 麥門冬 甘草各一錢	導赤散
子淋	安榮散	人參 川芎 麥門冬 木通 滑石 當歸 燈心 甘草 各一錢	六一散 芎歸湯

五 (5-1)

病症	處 方	構 成 內 容	비 고
子淋	澤瀉湯(2)	澤瀉 桑白皮 赤茯苓 枳殼 檳榔 木通 各一錢半	
血淋	增味導赤散	生乾地黃 木通 黃芩 車前子 梔子仁 川芎 赤芍藥 甘草 各一錢	木通車前湯 導赤散 四物湯類
諸淋 通治	必效散	當歸 生地黃 赤茯苓 滑石 牛膝 山梔仁 麥門冬 枳殼 菖蒲 木通 知母 黃柏酒炒各七分 甘草五分	導赤散 坎離丸
尿血	清腸湯	當歸 生地黃 梶子炒 黃連 赤芍藥 黃柏 瞿麥 赤茯苓 木通 菖蒲 知母 麥門冬 各七分 甘草 五分	導赤散 知柏四物湯類 黃連解毒湯類
尿澁	人參蟬蛻散	人參 蟬殼 木通 白芍藥 赤茯苓 紫草茸 甘草 各五分	四君子湯類
	紫草木通湯	紫草茸 木通 人參 赤茯苓 糯米 各四分 甘草二分	四君子湯類
小便 赤白濁	導赤湯	木通 滑石 黃柏 赤茯苓 生地黃 梔子仁 甘草梢 各一錢 枳殼 白朮 各五分	導赤散 六一散
膀胱病 通治	葵子湯	葵子 赤茯苓 猪苓 枳實 瞿麥 滑石 木通 黃芩 車前子 甘草 各一錢	木通車前湯 宣氣散 萬全木通散

2) 眼耳鼻咽喉病

豆 (5-2)

病症	處 方	構 成 內 容	비 고
耳痛 瞓耳	蔓荊子散	蔓荊子 赤茯苓 甘菊 前胡 生地黃 麥門冬 桑白皮 赤芍藥 木通 升麻 甘草 各七分	導赤散
	犀角飲子	犀角屑 木通 石菖蒲 玄參 赤芍藥 赤小豆 甘菊 各一錢 甘草 五分	
耳鳴	復聰湯	半夏 赤茯苓 陳皮 甘草 蘭蓄 木通 瞿麥 黃柏鹽炒 各一錢	二陳湯
耳 聾	磁石羊腎丸	磁石三兩煅再用 葱白 木通 各三兩 剉同水煮 一伏時取石 研水飛二兩 川芎 白朮 川椒 穀肉 防風 白茯苓 細辛 山藥 遠志 川烏 木香 當歸 鹿茸 兔絲子 黃芪 各一兩 肉桂 六錢半 熟地黃 二兩 石菖蒲 一兩半	四物湯類 雙補丸 聰明湯
卒然 失音	荊蘇湯	荊芥穗 紫蘇葉 木通 橘紅 當歸 辣桂 石菖蒲 各一錢	
雜病 失音	杏仁煎	杏仁 泥白蜜 砂糖屑 生薑汁 各一盞 桑白皮 木通 貝母炒 各一兩半 紫菀 五味子 各一兩 石菖蒲 五錢	
鼻 塞	芎藭散(2)	芎藭 檳榔 麻黃 肉桂 防己 木通 細辛 白芷 菖蒲 各七分 木香 川椒 甘草 各三分半	
外 障	羚羊角散(4)	羚羊角屑 黃連 赤芍藥 蘆根 木通 旋覆花 桑白皮 各一錢 大黃 七分 甘草 三分	

3) 癰疽諸瘡

豆 (5-3)

病症	處 方	構 成 內 容	비 고
痘 瘡	加味四聖散	紫草茸 木通 木香 黃芪 川芎 人參 甘草 各四分 蟬殼 二分	
	四聖散	紫草茸 木通 枳殼 甘草 各等分	
心 癱	涼血飲	木通 罂麥 荊芥 薄荷 白芷 天花粉 赤芍藥 麥門冬 生乾地黃 桔子 車前子 連翹 甘草 各八分	木通車前湯 通心飲類
流注 骨疽	榮衛返魂湯(2)	赤芍藥 木通 白芷 何首烏 枳殼 茴香 烏藥 當歸 甘草 各一錢	
結 核	消風化痰湯	白附子 木通 各一錢 南星 半夏 赤芍藥 連翹 天麻 白僵蠶 蒼耳子 金銀 花 天門冬 桔梗各七分 白芷 防風 羌活 皂角 各五分 全蝎 陳皮 各四 分 甘草 二分	牽正散 溫白丸
惡 瘡	連翹飲	連翹 赤芍藥 當歸 荆芥 防風 惡實 川芎 梔子 黃芩 罂麥 木通 生乾地黃 瓜蔞根 麥門冬 甘草 各七分	通心飲 生料四物湯類
倒 盤	調解散	青皮 陳皮 桔梗 枳殼 當歸 紫蘇葉 半夏 川芎 紫草茸 木通 乾葛 甘草 各三分 人 參一分半	四聖散 芎歸湯 桔梗枳殼湯

4) 内傷病

豆 (5-4)

病症	處 方	構 成 內 容	비 고
嘔吐	神奇散	當歸 川芎 白芍藥 生地黃並酒炒 陳皮 縮砂 半夏 白茯苓 白朮土炒 香附子 枳實 烏梅肉 薑香 赤茯苓 檳榔 木通 猪苓 黃芩炒 黃柏人乳炒 知母人乳炒 赤芍藥 天門冬 麥門冬 甘草 各五分	導赤散 赤茯苓湯 知柏四物湯類 二陳湯 越鞠丸類
脹滿	消脹飲子	猪苓 澤瀉 人參 白朮 赤茯苓 半夏 陳皮 青 皮 厚朴 紫蘇葉 香附子 縮砂 木香 檳榔 大 腹皮 木通 蘿蔔子 甘草 各五分	君苓湯 六君子湯 不換金正氣散類
暑泄	通苓散	澤瀉 白朮 猪苓 赤茯苓 木通 茵陳 瞿麥 車前子 各一錢	四苓散 木通車前湯

5) 浮腫

豆 (5-5)

病症	處 方	構 成 內 容	비 고
浮腫	澤瀉散	澤瀉 赤茯苓 枳殼 猪苓 木通 檳榔 黑牽牛頭末 各等分	四苓散
陰卵偏墜	加減香苓散	枳殼 陳皮 香附子 蒼朮 麻黃 猪苓 澤瀉 木通 滑石 車前子 三棱 蓬朮 川棟子 玄胡索 甘草 各七分	木通車前湯 六一散

6) 其他病

五 (5-6)

病症	處 方	構 成 內 容	비 고
黃 疸	茵陳吳茱萸湯 退黃散	茵陳一物湯 加 吳茱萸 附子炮 乾薑炮 木通 當歸 各一錢 柴胡 升麻 草龍膽 茵陳 黃連 黃芩 桔子 黃柏 木通 滑石 各一錢 甘草 五分	
氣 逆	導氣枳殼丸	枳殼炒 木通炒 青皮 陳皮 桑白皮炙 蘿蔔子炒 白丑炒頭末 黑丑炒頭 末 蓬朮煨 三稜煨 茴香炒 各等分	黃連解毒湯 荊蓬煎元類
歷節風	神痛飲	木通 二兩	
下藥	通膈丸	黑丑頭末 大黃 木通 各等分	
暑熱 煩渴	通苓散(2)	澤瀉 白朮 猪苓 赤茯苓 木通 茵陳 瞿麥 車前子 各一錢	木通車前湯 四苓散
上焦熱	黃芩湯(5)	澤瀉 桔子 黃芩 麥門冬 木通 生地黃 黃連 甘草	導赤散 黃連解毒湯類
噤口 撮口 臍風證	通心飲	連翹 木通 瞿麥 桔子仁 黃芩 甘草 各四分	
心病	十味導赤散	黃連 黃芩 麥門冬 半夏 地骨皮 茯神 赤芍藥 木通 生地黃 甘草 各五分	導赤散

III. 考 察

木通이 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域에 대한 조사를 해보면 표(1)에서 보는 바와 같다. 小便門, 小兒門, 耳門, 小腸門, 諸瘡門, 婦人門, 瘰疽門, 黃疸門, 浮腫門, 聲音門, 前陰門, 鼻門, 膀胱腑門, 氣門, 脹滿門, 嘔吐門, 風門, 心臟門, 眼門, 血門, 下門, 大便門, 暑門, 火門등 24개 영역에서 木通을 主藥으로 한 方劑를 사용하고 있다. 이들中 處方引用 빈도수를 조사해보면 小便門영역이 전체의 17.4%로 가장 많이 활용하고 있고, 다음이 小兒門영역이 13.0%로 두 번째로 많이 활용하고 있고, 耳門영역이 8.7%로 3번째로 많이 활용되고 있다. 기타 치료영역에 대한 빈도수는 표(1)에서와 같다.

木通이 主藥으로 配伍된 方劑의 痘症 및 主治調査를 하여 표로 정리해보면 표(2-1) 표(2-2) 표(2-3)과 같다. 木通이 主藥으로 配伍된 方劑는 주로 小便病에서 활용하고 있으며, 小便不通, 冷淋, 子淋, 血淋, 諸淋, 血燥, 尿澁, 小便赤白濁, 膀胱病通治등 주로 膀胱이나 泌尿器 尿路疾患으로 생기는 痘症에 사용하고 있다. 여기에 활용된 方劑는 神奇散, 猪苓湯, 八正散, 木香湯, 生附湯, 安榮散, 澤瀉湯, 增味導赤散, 清腸湯, 人參蟬蛻散, 紫草木通湯, 導赤散, 萊子湯 등이 조사되었다 표(2-1).

또한 眼耳鼻咽喉科疾患에 木通이 主藥으로 配伍된 方劑로 많이 사용하고 있는데, 여기에 관련된 痘症은 耳鳴, 耳聾, 失音, 鼻塞, 外障 등이 있다. 위와 같은 痘症이 사용된 方劑는 蔓荊子散, 犀角飲子, 復聰湯, 磁石羊腎丸, 荊蘇湯, 杏仁煎, 蒜鬚散(2), 羚羊角散(4) 등이 조사되었다 표(2-2).

그밖에도 痘瘡, 心癱, 流注骨疽, 結核, 恶瘡, 倒臘등 瘰疽나 諸瘡에도 木通을 主藥으로 配伍한 方劑로 활용하고 있으며, 嘔吐 脹滿 暑泄등 內傷病과 浮腫 陰囊偏墜등 內傷病, 口舌生瘡, 歷節風, 暑熱煩渴 등 다양한 痘症에 木通을 主藥으로 配伍한 方劑를 활용하고 있다. 여기에 활용된 方劑로는 加味四聖散, 四聖散, 凉血飲, 榮衛返魂湯(2), 消風化痰湯, 連翹飲, 調解散, 神奇散, 消脹飲子, 通苓散, 澤瀉散, 加減香薷散, 茵陳吳茱萸湯, 退黃散, 導氣枳殼丸, 神痛飲, 通膈丸, 通苓散(2), 黃芩湯(5), 通心飲, 十味導赤散등이 조사되었다 표(2-3).

木通이 主藥으로 配伍된 方劑의 痘因病理조사를 해보면 표(3)에서와 같이 膀胱 實熱, 小腸熱, 腎經有風熱, 心藏 實熱등 臟腑에서 實熱이 있는 경우가 가장 많이 활용되고 있다. 따라서 心・小腸, 腎・膀胱의 臟腑의 表裏와 깊은 연관성이 있음을 알 수 있다. 그 밖에도 痰飲病理에 관련된 痰火上攻, 風痰鬱結 이 활용되기도 하였으며, 血虛有火, 熱結, 下焦濕熱, 暑濕, 傷暑, 感風寒卒等의 痘因・病理가 활용되고 있다.

木通이 主藥으로 配伍된 方劑에서 木通의 1회 使用量을 조사해 보면 표(4)에서 보는 바와 같다. 즉 木通의 1회 使用量은 三分에서부터 一錢半까지 다양한 분량을 사용하고 있으며, 使用量은 정하지 않고 비율로 활용하는 경우도 있다. 가장 많이 사용하고 있는 常用量은 七分에서 一錢으로 이를 사용한 빈도수가 전체의 절반 이상을 차지하고 있으며, 그중 一錢이 가장 많이 활용되고 있음을 알 수 있다. 三分에서 四分을 사용한 경우는 小兒疾病 경우이고, 一錢半을 사용한 경우는 子淋 小便不通 耳聾등 急性病이 있는 경우로 조사되었

다.

一錢을 사용하고 있는 경우 이에 해당하는 병증과 처방을 조사해 보면 다음과 같다. 즉 膀胱病 通治方의 菓子湯, 小腸病 通治方의 導赤散 赤茯苓湯, 小便赤白濁에 導赤湯, 耳鳴에 復聰湯, 耳痛膿耳에 犀角飲子, 結核에 消風化痰湯, 子淋에 安榮散, 外障에 羚羊角散, 流注骨疽에 荘衛返魂湯(2), 陰瘡에 茵陳吳茱萸湯, 血淋에 增味導赤散, 肇泄에 通靈散, 歷節風 通治에 사용한 神痛飲에서 木通의 使用量을 一錢으로 하고 있다.

木通이 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內容을 조사해보면, 표(5-1)에서 표(5-6)와 같다. 즉 小便病 중 小便不通, 小便不利, 血淋, 子淋, 諸淋通治, 尿血, 小便赤白濁, 膀胱病 通治에 가장 많이 활용된 기본方은 導赤散(生地黃 木通 甘草), 木通車前湯(木通 車前子), 六一散(滑石 甘草), 四苓散(猪苓 澤瀉 赤茯苓 白朮)등 이며, 표(5-1), 또한 浮腫病 중 陰囊偏墜 및 浮腫에서 四苓散, 木通車前散, 六一散을 기본方으로 사용하고 있다 표(5-5).

이는 木通의 清熱 利水作用을 효율적으로 돋기위한 약물의 기본배합임을 알 수 있으며, 그밖에도 痘症에 따라 萬全木通散, 知柏四物湯, 坎離丸, 四君子湯類등이 활용되고 있음을 알 수 있다.

眼耳鼻咽喉科疾患中에서 耳痛, 耳鳴, 耳聾, 失音, 鼻塞, 外障등에 蔓荊子散, 犀角飲子, 復聰湯, 磁石羊腎丸, 荊蘇湯, 杏仁煎, 肖蔚散(2), 羚羊角散(4)등에서 木通을 主藥으로 사용하고 있는 것으로 보아, 木通의 利瘀作用을 임상적으로 활용한 경우임을 알 수 있다 표(5-2).

한편, 여러유형의 瘡과 癰疽에서는 四聖

散(紫草茸 木通 枳殼 甘草), 通心飲類(連翹 木通 瞿麥 梶子仁 黃芩 甘草)를 基本方으로 배합한 加味四聖散, 涼血飲, 連翹散, 調解散을 활용하고 있는 것으로 보아, 木通이 상처의 浮腫을 없애주거나 치유에도 일정한 역할을 하고 있음을 알 수 있다 표(5-3).

그밖에도 脹滿에 사용한 消脹飲子나, 暑泄에 사용한 通苓散, 黃疸에 사용한 茵陳吳茱萸湯, 退黃散, 下藥에 사용한 通苓散, 暑熱煩渴에 사용한 通苓散(2), 上焦熱에 사용한 黃芩湯(5), 噴口撮口臍風證에 사용한 通心飲, 心病의 十味導赤散에서와 같이 木通은 消積, 止渴, 退黃, 獥下, 清熱등에도 일정한 역할을 하고 있음을 알 수 있다 표(5-4) 표(5-6).

IV. 結論

東醫寶鑑中 木通이 主藥으로 配伍된 46處方에 대한 治療領域, 痘症, 痘理, 使用量, 方劑構成 등의 文獻的 資料調査를 통하여 다음과 같이 要約할 수 있었다.

1. 木通이 사용된 치료영역별 처방 빈도수를 조사해보면, 小便門이 17.4%로 가장 많이 활용하고 있다.
2. 木通은 泌尿器에 관련된 小便, 膀胱病症이나 眼耳鼻咽喉科 疾患, 癰疽, 諸瘡病症에 常用하고 있다.
3. 木通은 心 膀胱實熱이나 小腸熱, 下焦濕熱, 血虛有火, 痰火上攻, 傷暑濕等 熱, 濕, 痰, 暑에 관련된 痘因 痘理에 活用하

고 있다.

4. 木通의 常用量은 一錢이며, 痘症에 따라 三分에서 一錢半까지 活用하고 있다.
5. 木通이 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內容을 보면, 導赤散 木通車前湯 萬全木通湯이 基本方으로 가장 많이 응용되고 있다.

參 考 文 獻

1. 辛民敎 編著, 原色 臨床本草學, 永林出版社, 서울, 1988年, p.596-597
2. 이영노, 韓國植物圖鑑, 교학사, 서울, 2002年, p.211
3. 安德均 著, 原色 韓國本草圖鑑, 教學社, 서울, 1999年, p.496
4. 정보섭 외, 圖解鄉藥大事典, 영림사, 서울, 1990年, p.521
5. 김창민 외, 完譯中藥大辭典, 정담출판사, 서울, 1999年, p.1379-1384
6. 田代華 主編, 實用中藥辭典, 人民衛生出版社, 北京, 2002年, p.285
7. 國家中醫藥管理局 <中華本草>編委會, 中華本草, 上海科學技術出版社, 上海, 1996年, p.569
8. 雷載權 張廷模 主編, 中華臨床中藥學, 人民衛生出版社, 北京, 1998年, p.868-869
9. 鄭虎占, 中藥現代研究與應用, 學苑出版社, 北京, 1998, p.945
10. 李時珍, 本草綱目, 人民衛生出版社, 北京, 1982年, p.1316-1317
11. 苗明三 主編, 法定 中藥藥理與臨床, 世界圖書出版公司, 西安, 1998年, p. 483-484
12. 박영순, 韓方의 藥理解說, 아카데미서적, 서울, 2002年, p.130
13. 김형균 외; 漢藥의 藥理, 고려의학, 서울, 2000年, p.273
14. 康秉秀 金永坂 編著, 臨床配合本草學, 永林社, 서울, 1994年, p.536-537
15. 田代華 主編, 實用中醫對藥方, 人民衛生出版社, 北京, 2000年, p.416, 960
16. 진유화 외, 藥對論, 일중사, 1996年, p.101
17. 楊濟 外, 臨證用藥配伍指南, 中國醫藥科技出版社, 北京, 1996年, p.710-711
18. 許浚, 東醫寶鑑, 범인문화사, 서울, p.163, 170, 171, 223, 246, 247, 251, 313, 344, 351, 360, 401, 402, 403, 406, 413, 415, 416, 417, 418, 419, 422, 437, 440, 446, 544, 576, 577, 578, 579, 581, 582, 583, 593, 594, 603, 642, 662, 687, 779, 782, 808, 810, 813, 814, 815, 824, 835, 942, 982, 1068, 1080, 1083, 1084, 1085, 1104, 1108, 1112, 1217, 1222, 1305, 1307, 1308, 1309, 1320, 1322, 1352, 1353, 1354, 1435, 1443, 1445, 1470, 1471, 1472, 1478, 1484, 1497, 1508, 1518, 1580, 1612, 1615, 1618, 1636, 1637, 1669, 1715, 1716, 1718, 1728, 1729, 1748, 1749, 1756, 1783
19. 龔信, 古今醫鑑, 中國中醫藥出版社, 北京, 1997年, p.81, 135, 153, 167, 211, 256, 276, 296, 299, 341, 371, 431, 439, 447
20. 李撰, 安秉國譯, 偏註醫學入門, 南山堂, 서울, 1974年,

- 3-368, 4-609, 4-631, 4-643, 4-652,
4-619, 4-697, 4-721, 4-733, 4-867,
5-589, 5-552, 5-592, 5-595, 6-189,
6-249
21. 巖廷賢, 萬病回春, 人民衛生出版社, 北京, 1984年, p.208, 241, 242, 243
22. 虞搏, 醫學正傳, 成輔社, 서울, 1986年, p.144, 201, 229, 305, 381
23. 錢乙, 小兒藥證直訣, 의성당, 서울, p.112, 224
24. 陳言, 三因極一病證方論, 一中社, 서울, 1992年, p.226, 255
25. 危亦林, 世醫得效方, 醫聖堂, 서울, 1990年, p.254, 324, 336, 374, 415, 430, 434, 524, 550, 640
26. 朱震亨, 丹溪心法附餘, 五州出版社, 1985年, p. 481, 441, 445, 384
27. 陳師文, 太平惠民和劑局方, 人民衛生出版社, 北京, 1985年, p.175, 173, 216, 229, 244
28. 樓英, 醫學綱目, 一中社, 下冊, 서울, 1984年, p.1092