

# 東醫寶鑑 中 貝母가 主藥으로 配伍된 方劑의 活用에 대한 考察

임대환, 윤용갑

원광대학교 한의과대학 방제학 교실

## Abstract

### Study on Applications of Bulbus Fritillariae Main Blended Prescription from Donguibogam

Lim Dae Hwan, Yun Young Gab

Dept. of Oriental Medicine, Graduate School of Wonkwang University

This report describes 48 studies related to the use of Bulbus Fritillariae main blended prescriptions from Donguibogam. The following conclusions were reached through investigations on the prescriptions that use Bulbus Fritillariae as a key ingredient.

All kinds of infection in a cough and the malignant tumor recorded the largest number of clinical frequency of the prescriptions in therapeutic use when Bulbus Fritillariae was taken as a principle medicine.

The Prescriptions are compounded with Bulbus Fritillariae as a principle medicine can apply to respiratory disease, eye disease, nose and ear disease, throat disease, a boil.

Various pathogenic factors such as consumptive disease, phlegm, phlegm-fire, invasion by wind, affective by cold, fire, dyspepsia-fire are put to practical use.

The dosage of Bulbus Fritillariae is 5 bun(about 1.88g) to 1 lyang(about 37.5g), however 1 jeon(about 3.75g) has been taken the most for clinical application.

With examination the formulae of prescriptions containing Bulbus Fritillariae, I found

---

교신저자 : 윤용갑

원광대학교 한의과대학 방제학교실

Tel : 063) 850-6834 E-Mail : [yunyg@wonkwang.ac.kr](mailto:yunyg@wonkwang.ac.kr)

접수 : 2005/ 11/ 5 채택 : 2005/ 11/ 15

the basic prescriptions as well as the medicines are in conjunction with Bulbus Fritillariae and the theoretic grounds of formula in combining Bulbus Fritillariae as a group of medicine for prescription through this research.

**Key Word : *Bulbus Fritillariae*, Donguibogam**

## I. 緒 論

貝母(BULBUS FRITILLARIAE)는 백합과에 속하는 多年生本草인 貝母 및 同屬近緣植物의 鱗莖을 말하며 우리나라 북부의 산지에 많이 나는 多年草이다. 키는 25cm정도이며 開花期는 5月이고, 비늘줄기를 사용하는데 비늘줄기는 흰색, 비늘조각은 5~6개, 다육질이며 둥근 모양 밑에 수염뿌리가 있다. 여름·가을에 채취하여 햇볕에 말려 사용하며, 우리나라 각지에서 재배한다. 중국에서는 천폐모(川貝母, *Fritillaria cirrhosa* D. DON.)의 비늘줄기를 藥으로 사용한다<sup>1)~3)</sup>.

貝母의 性味는 甘·苦·微寒, 無毒하고, 肺·心에 歸經하며, 효능은 清熱潤肺, 化痰止咳, 散結消腫 등의 효능이 있어 肺虛久咳, 虛勞咳嗽, 燥熱咳嗽, 肺癰, 瘰癧, 癰腫, 乳癰 등의 치료에 사용하는 것으로 알려져 있다<sup>4)~6)</sup>.

貝母에 함유된 性分으로는 fritimine, sipeimine, sipermine 등이 알려져 있으며, 鎮咳·祛痰작용이 있으며, 血壓降下, 升高血糖, 抗菌, 抗血管收縮, 氣管支運動促進, 平喘 등의 藥理作用이 보고되고 있다<sup>6)~8)</sup>.

한편 貝母는 知母와 配伍하면 二母丸에 서와 같이 痰熱咳嗽에 使用하며, 杏仁, 麦

門冬, 紫菀 등과 配伍하면 貝母散에서와 같이 肺虛로 인한 久嗽에 使用하였으며, 玄蔴, 牡蠣 등과 配伍하면 消癰丸에서와 같이 瘰癧에 使用하였으며, 天花粉, 連翹, 蒲公英 등과 配伍하면 消癰解毒湯과 같이 癰腫에 使用하여 왔다<sup>9)~12)</sup>.

이와 같이 貝母가 配伍되는 藥物에 따라 다양한 效能을 발휘하고 있는 바, 이에 저자는 東醫寶鑑 中 貝母가 主藥으로 配伍된 方劑 48處方에<sup>13)~20)</sup> 대한 治療領域, 痘症 및 主治, 痘因·病理, 使用量, 處方構成 등의 문헌적 자료 분석을 통하여 貝母의 활용에 대한 方劑學의 知見를 얻었기에 報告하는 바이다.

## II. 本 論

調査方法은 東醫寶鑑 中 貝母가 主藥으로 活用된 48方劑의 内容을 data base化하여 文獻的 資料分析 및 研究內容을 정리하였으며, 處方名은 同一하나 構成內容이 다른 경우 處方에 (2)를 表記하여 區分하였다. 본 논문에서 主藥이라 함은 處方構成에서 貝母의 역할이나 使用量이 君臣藥으로 作用하거나 혹은 여러 가지 藥物과 等分으로 構成되어 있는 경우로 하였다.

## 1. 貝母가 主藥으로 配伍된 方劑의 治療領域에 대한 調查

豆 (1)

病 門	處 方	빈도수	백분율
咳嗽	加味二母丸, 加味人蔘紫菀散, 潤肺丸(2), 玉液散, 玉華散, 橘蘇散, 杏蘇湯, 鷄鳴丸(2), 款冬花散, 蟻煎散, 二母散(2), 紫菀散, 紫菀草湯, 澄清飲, 清金湯, 清金丸, 清化丸, 貝母散, 貝母湯	19	39.6
癰疽	桔梗湯, 內消沃雪湯, 二仙散(2), 還魂散	4	8.3
聲音	杏仁煎, 人蔘清肺散, 柴胡升麻湯	3	6.3
諸瘡	貝母膏, 海帶丸	2	4.2
血	清唾湯, 清咳湯	2	4.2
耳	通明利氣湯, 玄蔘貝母湯	2	4.2
積聚	瓜萎枳殼湯, 六鬱湯	2	4.2
風	瓜萎枳實湯(2), 清痰順氣湯	2	4.2
乳	加味芷貝散, 芷貝散	2	4.2
虛勞	保和湯	1	2.1
痰飲	瓜萎枳實湯	1	2.1
火	團魚散	1	2.1
婦人	百合散	1	2.1
諸傷	補氣生血湯	1	2.1
傷寒	三物白散	1	2.1
面	連翹散	1	2.1
痃瘡	爭功散	1	2.1
浮腫	葶苈丸	1	2.1
胞	清白散	1	2.1
합 계		48	100.0

## 2. 貝母가 主藥으로 配伍된 方劑의 痘症 및 主治 調査

## 1) 呼吸器疾患

표 (2-1)

病 症	處 方	主 治	비고
咳 嗽	勞嗽	加味二母丸 加味人蔴紫菀散 潤肺丸(2)	久嗽 劳嗽 食積嗽 虛勞咳嗽 燥痰 乾嗽 劳嗽
	寒嗽	橘蘇散 杏蘇湯	傷寒咳嗽 身熱 有汗 脉浮數 服杏子 湯不得者 宜服此
	風嗽	款冬花散	傷風寒咳嗽痰盛
	痰嗽	澄清飲	痰嗽 服他藥不效者
	食積嗽	清金丸	食積火鬱嗽劫藥也
	鬱嗽	清化丸	肺鬱痰嗽 睡不安
	久嗽	貝母湯	諸般久嗽
	四時早晏嗽	二母散(2)	諸般咳嗽 兼治痰喘
	子嗽	百合散	下疳濕瘡
喘 證	火喘	玉液散 玉華散	喘嗽 口乾煩渴 咳嗽上喘 清肺氣 利咽膈
	久喘	蠟煎散	虛勞 久喘嗽 或咯膿血
	氣喘	清金湯	咳嗽喘急 胸滿 氣逆 坐臥不安
	痰喘	貝母散	熱嗽及痰喘 辰時服 酉時可安 卽 上二母散也
	喘嗽通治	鷄鳴丸(2)	喘嗽
	諸傷發喘	紫菀茸湯	過食煎燂 邪熱傷肺 咳嗽 咽痒痰多 喘急脹痛
咳嗽咯唾血	清唾湯	唾血	
	清咳湯	咳血	
肺痿證	紫菀散	肺痿 咳唾膿血 欲變成癰	
傷寒結胸	三物白散	寒實結胸	
痃瘡	爭功散	熱瘡多效	

## 2) 眼·耳·鼻·咽喉科 疾患

豆 (2-2)

病 症	處 方	主 治	비 고
失音	杏仁煎	咳嗽 失音聲不出	
	人蔘清肺散	痰嗽 咽乾 聲不出	
耳鳴	通明利氣湯	虛火痰氣鬱於耳中或閉或鳴痰火熾盛痞滿煩躁	
	玄蔘貝母湯	耳熱出汁作痒乃痰火也	
聲嘶	柴胡升麻湯	傷寒咳嗽聲嘶 或咽痛	
口眼喎斜	清痰順氣湯	風中經絡 口眼喎斜	

## 3) 諸瘡病

豆 (2-3)

病 症	處 方	主 治	비 고
惡瘡	貝母膏	諸惡瘡	
結核	海帶丸	痰核 氣久不消	
面上雜病	連翹散	面生穀嘴瘡 俗名粉刺	
結核久成痃癥	芷貝散	乳房結核	

## 4) 其他病

豆 (2-4)

病 症	處 方	主 治	비 고
虛勞	保和湯	虛勞 勞嗽 肺痿 唾膿血	
食鬱	瓜萎枳殼湯	痰鬱	
六鬱	六鬱湯	開諸鬱火便	
骨蒸熱	團魚散	骨蒸潮熱 咳嗽	
杖傷	補氣生血湯	杖瘡潰爛 久不愈	
水腫	葶藶丸	肺氣喘促 面目浮腫	
帶下	清白散	白帶	
破傷風	瓜萎枳實湯(2)	痰火痙	
鬱痰	瓜萎枳實湯	痰結 咳吐不出 胸膈作痛 不能轉側 或痰結胸滿 氣急 或痰迷心竅不能言	

## 3. 貝母가 主藥으로 配伍된 方劑의 病因病理 調査

並 (3)

구 분	病 理	病 症	處 方	비 고
虛勞	虛勞	咳嗽	加味人蔘紫菀散	
		久喘嗽 或咯膿血	蠟煎散	
		勞嗽 肺痿 唾膿血	保和湯	
	勞	嗽	加味二母丸	
痰	痰	嗽 咽乾 聲不出	人蔘清肺散	
		嗽	澄清飲	
	痰迷心竅	不能言	瓜萎枳實湯	
	痰鬱		瓜萎枳殼湯	
	肺鬱痰		清化丸	
	燥痰	乾嗽 勞嗽	潤肺丸(2)	
	痰結	咯吐不出 胸膈作痛 不能轉側 胸滿 氣急	瓜萎枳實湯	
痰火	痰火	痙	瓜萎枳實湯(2)	
		熱出汁作痒	玄蔘貝母湯	
	痰火熾盛	痞滿煩躁	通明利氣湯	
傷風 傷寒	傷風	寒咳嗽痰盛杏仁	杏蘇湯	
	傷寒	咳嗽 身熱 有汗 脉浮數	橘蘇散	
		咳嗽聲嘶 或	柴胡升麻湯	
	寒實	結胸	三物白散	
	寒雍相交 肺氣不利	咳嗽痰盛	款冬花散	
火	虛火痰氣 鬱於耳中	或閉或鳴	通明利氣湯	
	鬱火		六鬱湯	
	食積	食積火鬱	清金丸	
		食積	加味二母丸	
기타	風中經絡	口眼喎斜	清痰順氣湯	
	過食煎燙 邪熱傷肺	咳嗽 咽痒痰多 喘急脹痛	紫菀茸湯	

## 4. 貝母의 使用量에 대한 調査

豆 (4)

用 量	病 症	處 方	비 고
二分半	咳嗽	二母散(2)	一兩
五 分	水腫	葶苈丸	一兩
	鬱嗽	清化丸	一兩
七 分	聲嘶	柴胡升麻湯	
	面上雜病	連翹散	
	氣喘	清金湯	
七分半	火喘	玉液散	一兩
八 分	破傷風	瓜萎枳實湯(2)	
一錢	勞嗽	加味人蔘紫菀散	
	乳癰	加味芷貝散	
	食鬱	瓜萎枳殼湯	
	鬱痰	瓜萎枳實湯	
	寒嗽	橘蘇散	
	子嗽	百合散	
	杖傷	補氣生血湯	
	虛勞	保和湯	
	火喘	玉華散	
	積聚癥瘕痃癖	六鬱湯	
	諸傷發喘嗽	紫菀芎湯	
	痃瘈	爭功散	
	痰嗽	澄清飲	
	口眼喎斜	清痰順氣湯	
	帶下	清白散	
	咳血嗽血唾血咯血	清唾湯, 清咳湯	
	寒嗽	杏蘇湯	
	耳痒	玄蔘貝母湯	
	疔疽	還魂散	

用 量	病 症	處 方	비 고
一錢二分	肺癰	桔梗湯	
	耳鳴	通明利氣湯	
一錢半	胃脘癰	內消沃雪湯	
	雜病失音	人蔘清肺散	
	肺痿證	紫苑散	
二錢	風嗽	款冬花散	
三錢	傷寒結胸	三物白散	二分
五錢	食積嗽	清金丸	二錢半
	久嗽	貝母湯	七分
二錢半~ 五錢	癰疽雜證	二仙散(2)	一錢二分半 ~ 二錢
等 分	勞嗽	加味二母丸	
	喘嗽	鷄鳴丸(2)	
	久喘	蠟煎散	
	骨蒸熱	團魚散	
	結核久成痃巖	芷貝散	
	結核	海帶丸	
기타	有名無名諸惡瘡	貝母膏	
	勞嗽	潤肺丸(2)	
	咳嗽	杏仁煎	
	痰喘	貝母散	

## 5. 貝母가 主藥으로 配伍된 方劑의 構成內容 調查

## 1) 呼吸器疾患

茲 (5-1)

病症	處 方	構 成 內 容	비고
勞嗽	加味二母丸	知母 貝母 同 巴豆炒黃色 去巴豆 (同二母散法) 入白礬白芨四味等分	二母散
	加味人蔘 紫菀散	人參 五味子 紫菀草 陳皮 紫蘇葉 貝母 桑白皮 白茯苓 各一錢 杏仁 甘草 各七分半 加川芎 半夏麴 各一錢 阿膠珠 五分	紫菀散類, 異功散
	潤肺丸(2)	貝母 一兩 瓜蔞仁 青黛 各五錢	
咳	橘蘇散	橘紅 紫蘇葉 杏仁 白朮 半夏 桑白皮 貝母 五味子 各一錢 甘草五分	杏蘇湯
嗽	杏蘇湯	杏仁 紫蘇葉 桑白皮 陳皮 半夏 貝母 白朮 五味子 各一錢 甘草 五分	橘蘇散
風嗽	款冬花散	麻黃 貝母 阿膠珠 各二錢 杏仁 甘草灸 各一錢 知母 桑白皮 半夏 款冬花 各五分	二母散, 三拗湯
痰嗽	澄清飲	南星 半夏 並製蚌粉 知母 貝母 白礬 各一錢	二母散
食積嗽	清金丸	貝母 知母 各五錢 巴豆霜 五分	二母散
鬱嗽	清化丸	貝母 一兩 杏仁 五錢 青黛 三錢	

病 症	處 方	構 成 內 容	비 고
咳嗽	久嗽	貝母湯 貝母製 乾薑生 五味子 陳皮 半夏製 柴胡 桂心各五錢 黃芩 桑白皮 各二錢半 木香 甘草 各一錢二分半	二陳湯類
	四時 早晏嗽	二母散(2) 知母 貝母各一兩 巴豆十粒作霜	二母散
	子嗽	百合散 百合 紫菀草 貝母 白芍藥 前胡 赤茯苓 桔梗 各一錢 甘草 五分	甘桔湯
喘	火喘	玉液散 瓜蔞根 知母 貝母炒 各一兩 人參 甘草 各五錢	二母散
		玉華散 葶藶炒 桑白皮炒 天門冬 馬兜鈴 半夏 紫菀 杏仁 貝母 百合 人參 各一錢 百部根 甘草 各五分	
證	久喘	蠟煎散 杏仁 人參 麥門冬 山藥 白茯苓 貝母 百合 鹿角膠(無則阿膠代之) 甘草灸 各等分	
	氣喘	清金湯 陳皮 赤茯苓 杏仁 阿膠珠 五味子 桑白皮 薏苡仁 紫蘇葉 百合 貝母 半夏 麴款冬花 各七分 麽粟殼 人參 甘草 各三分	六君子湯類
	喘嗽 通治	鷄鳴丸(2) 知母酒炒 貝母炒 陳皮去白 桑白皮蜜炒 款冬花 旋覆花 天門冬 麥門冬 人參 葶藶子炒 桔梗 杏仁麪炒 半夏薑製 阿膠珠 甘草 各等分	二母散

病 症		處 方	構 成 內 容	附 记
喘證	諸傷發喘	紫菀茸湯	紫菀茸經霜 桑葉 款冬花 百合 杏仁 阿膠珠 貝母 蒲黃炒 半夏 各一錢 犀角 人參 甘草 各五分	
咳嗽咯唾血		清唾湯	知母 貝母 桔梗 黃柏鹽水炒褐色 熟地黃 玄參 遠志 天門冬 麥門冬 各一錢 乾薑炒黑 五分	二母散, 二冬二母湯
		清咳湯	當歸 白芍藥 桃仁 貝母炒 各一錢 白朮 牡丹皮 黃芩 梔子炒黑 各八分 青皮 桔梗 各五分 甘草 三分	丹梔逍遙散類, 甘桔湯
肺痿證		紫菀散	紫菀 知母 貝母 各一錢半 人參 桔梗 赤茯苓 各一錢 阿膠珠 甘草 各五分 五味子 三十粒	二母散, 甘桔湯
傷寒結胸		三物白散	桔梗 貝母各三錢 巴豆去皮 心熬研如脂一錢	
癰瘍		爭功散	知母 貝母 柴胡 常山 梔子 檳榔 地骨皮 甘草各一錢 蟬退二七箇	二母散

## 2) 眼·耳·鼻·咽喉科 疾患·諸瘡病

豆 (5-2)

病症	處方	構成內容	비고
失音	杏仁煎	杏仁泥 白蜜 砂糖屑 生薑汁各一盞 桑白皮 木通 貝母炒 各一兩半 紫菀 五味子各一兩 石菖蒲 五錢	
	人蔘	人蔘 陳皮 貝母炒 各一錢半 半夏 桔梗 茯苓 桑柏皮 知母 枳殼 杏仁 黃連 各一錢	二母散, 瀉肺散,
	清肺散	款冬花七分 麥門冬 地骨皮 甘草 各五分 五味子二十箇	六君子湯類, 生脉散
耳鳴	通明 利氣湯	貝母一錢二分 陳皮一錢 黃連 黃芩並酒浸 豬膽汁拌炒 黃柏酒炒 梓子炒 玄參酒洗 各七分 蒼朮鹽水炒 白朮 香附子便炒 生乾地黃薑汁炒 檳榔各五分 川芎 四分 木香 二分半 甘草 二分	黃連解毒湯, 越鞠丸類
	玄蔘 貝母湯	防風 貝母 天花粉 黃柏鹽水炒 白茯 玄參 白芷 蔓荊子 天麻 半夏製各一錢 甘草五分	芷貝散
聲嘶	柴胡 升麻湯	柴胡 黃芩 半夏 升麻 乾葛 枳實 桔梗 知母 貝母 玄參 桑白皮 甘草 各七分	二母散, 小柴胡湯類
口眼 喎斜	清痰 順氣湯	南星 瓜萎仁 荊芥穗 貝母 陳皮 蒼朮 官桂 防風各一錢 黃連 黃芩並酒炒 甘草 各六分	
惡瘡	貝母膏	貝母三錢半 半夏(生用) 南星(生用) 五倍子 白芷 黃柏 苦參 各二錢半 黃丹一錢半 雄黃一錢	芷貝散
結核	海帶丸	海帶 青皮 貝母 陳皮各等分	
面上 雜病	連翹散	連翹 川芎 白芷 片芩 黃連 沙參 荆芥 桑白皮 梓子 貝母 甘草 各七分	芷貝散
結核久 成瘍巖	芷貝散	白芷 貝母 等分	

## 3) 기타병

症 (5-3)

病 症	處 方	主 治	비 고
虛勞	保和湯	知母 貝母 天門冬 款冬花 各一錢 麥門冬 天花粉 薏苡仁 杏仁 五味子 各七分 馬兜鈴 紫菀 百合 桔梗 阿膠 當歸 生乾地黃酒炒 甘草灸 各三分半 紫蘇葉 薄荷 各二分	二母散, 二冬二母湯
食鬱	瓜蔞枳殼湯	瓜蔞仁 枳殼 桔梗 川芎 蒼朮 香附 杏仁 片芩酒炒 貝母炒 陳皮 各一錢 縮砂 木香 各五分 甘草 三分	桔梗枳殼湯, 越鞠丸類
六鬱	六鬱湯	香附 蒼朮 神麴 梔子 連翹 陳皮 川芎 赤茯苓 貝母 枳殼 紫蘇葉 各一錢 甘草五分	越鞠丸, 香蘇散
骨蒸熱	團魚散	貝母 前胡 知母 杏仁 柴胡 各等分 團魚 二箇(鱉也)	二母散
杖傷	補氣生血湯	人參 白朮 白茯苓 白芍藥 當歸 陳皮 香附子 貝母 桔梗 熟地黃 甘草各一錢	八珍湯類
水腫	葶藶丸	葶藶子 防己 木通 杏仁 貝母 各一兩	
帶下	清白散	當歸 川芎 白芍藥 生地黃酒洗 黃柏鹽水炒 貝母 檉根白皮酒炒各一錢 乾薑炒黑 甘草各五分	知柏四物湯類
破傷風	瓜蔞 枳實湯(2)	瓜蔞仁 枳實 貝母 桔梗 片芩 陳皮 梔子 茯苓 麥門冬 人參 當歸 蘇子 各八分 甘草 三分	
鬱痰	瓜蔞枳實湯	瓜蔞仁 枳實 桔梗 赤茯苓 貝母炒 陳皮 片芩 梔子 各一錢 當歸 六分 縮砂 木香 各五分 甘草 三分	

### III. 考 察

貝母가 主藥으로 配伍된 方劑 48種에 대한 치료영역을 조사해 보면 표 (1)에서 보는 바와 같다. 즉 咳嗽門에서 癰疽, 聲音, 諸瘡門에 이르기까지 20개 영역에서 활용되고 있으며, 그 중 咳嗽門이 處方의 활용빈도수가 39.6%로 가장 많은 비중을 차지하고 있음을 알 수 있다. 그 다음 순이 癰疽門, 聲音門이었다.

貝母가 主藥으로 配伍된 方劑의 痘症과 主治를 조사해 보면 표 (2-1) (2-2) (2-3) (2-4)와 같다. 호흡기질환에 관련된 痘證으로는 표 (2-1)에서와 같이 咳嗽·喘證·肺痿·結胸 등의 痘症이 조사되었다. 그 중 咳嗽에는 勞嗽·寒嗽·風嗽·痰嗽·食積嗽·鬱嗽·久嗽·四時早晏嗽·子嗽 등의 痘證에 貝母가 主藥으로 配伍된 方劑로 使用하고 있는 것으로 조사되었다. 喘證에서는 火喘·久喘·氣喘·痰喘·喘嗽·諸傷發喘 등 痘因病理 痘情에 따라 貝母가 主藥으로 配伍된 方劑를 활용하고 있다. 그 밖에도 咳血·肺痿·結胸 등에서도 貝母를 主藥으로 한 方劑를 활용하고 있다.

耳鼻咽喉科 疾患에 관련된 痘證으로는 표 (2-2)에서와 같이 失音·耳鳴·聲嘶·口眼喎斜나 諸瘡病에 관련된 痘證으로는 惡瘡·結核·面上雜病·痃巖 등에 貝母가 主藥으로 配伍된 方劑를 활용하고 있다.

또한 虛勞·食鬱·六鬱·骨蒸熱·杖傷·水腫·帶下·破傷風·鬱痰의 痘症에도 貝母를 主藥으로 사용하고 있다.

貝母가 主藥으로 配伍된 方劑의 痘因病理를 조사해보면 표 (3)에서 보는 바와 같이 内傷虛勞·痰·痰火·傷風傷寒·火

등이 관련된 것으로 조사되었다. 痰에서는 痰嗽·痰迷心竅·痰鬱·肺鬱痰·燥痰·痰結·痰火의 痘因病理가 적용되고 있으며, 傷風傷寒에 관련된 痘因으로는 傷風·傷寒·寒實·寒雍相交 肺氣不利가 적용되고 있는 것으로 조사되었으며, 火에 관련된 것으로는 虛火痰氣鬱·鬱火 등의 痘理가 적용하고 있고, 그밖에도 食積·虛勞·風中經絡·過食煎燉 邪熱傷肺 등의 痘因病理가 적용되고 있다.

貝母의 一回 使用量에 대한 調査하여 정리하여 보면 표 (4)에서 보는 바와 같다. 즉 貝母는 五分에서 二錢까지의 用량을 使用하고 있는데, 이중 一錢을 使用하고 있는 경우가 전체의 41.6%로 가장 많은 비중을 차지하고 있다. 여기에 활용된 痘證은 勞嗽·乳癰·食鬱·鬱痰·寒嗽·子嗽 등이 있었다. 특히 風嗽에 활용한 款冬花散에서 二錢을, 食積嗽에 활용한 清金丸에서 二錢半을 활용하고 있는 것이 특징이다.

貝母가 主藥으로 配伍된 方劑의 구성내용을 조사해보면 표 (5-1) (5-2) (5-3)에서 보는 바와 같다.

呼吸器疾患과 관련성이 있는 咳嗽에 활용한 각종 方劑들에서 가장 많이 활용하고 있는 기본方은 二母散(知母, 貝母)이었으며, 異功散, 紫菀散, 杏蘇湯, 三拗湯 등도 痘因病證에 따라 基本方으로 合方하여 使用하고 있다. 喘證에서도 역시 二母散, 甘桔湯, 六君子湯, 二陳湯을 基本方으로 配合하여 활용하고 있으며, 咳血, 肺痿, 痊瘍에서는 二母散·二冬二母湯·甘桔湯·丹梔逍遙散 등을 基本方으로 사용하고 있다.

그 밖에도 失音에서는 二母散·小柴胡湯·瀉肺散·六君子湯·生脉散을, 耳鳴에

서는 黃連解毒湯 · 越鞠丸 · 芍貝散을, 結核 · 惡瘡과 面上雜病에서는 芍貝散을 基本方으로 活用하고 있으며, 痘證에 따라 桔梗枳殼湯 · 香蘇散 · 八珍湯 · 知柏四物湯 등도 配合하여 使用하고 있다.

종합하여 보면, 貝母는 呼吸器疾患 · 眼耳鼻咽喉科疾患 · 諸瘡病에서 主藥으로 使用하고 있어 止咳 · 祛痰 · 潤肺 · 利竅 · 消腫 · 上止血作用등이 있음을 알 수 있으며, 그 밖에도 虛勞 · 食鬱 · 六鬱 · 骨蒸熱 · 水腫 · 帶下 · 破傷風 등 여러 가지 痘證에 使用할 수 있음을 시사하고 있다.

#### IV. 결론

東醫寶鑑 中 貝母가 主藥으로 配伍된 48개 處方에 대한 治療領域, 痘症, 痘因, 痘理, 使用量, 方劑構成 등의 文獻的 자료 조사를 통하여 다음과 같이 要約할 수 있었다.

1. 貝母가 主藥으로 構成된 方劑의 治療領域은 咳嗽門과 癰疽門이 가장 많은 빈도수를 차지하였다.
2. 貝母가 主藥으로 構成된 方劑의 痘症은 呼吸器疾患, 眼耳鼻咽喉科疾患, 諸瘡病 등이며, 그 밖에도 9개 痘證에 사용되었다.
3. 貝母가 主藥으로 構成된 方劑에 사용된 痘因 · 痘理는 虛勞, 痰, 痰火, 傷風, 火, 食積 등으로 조사되었다.
4. 貝母의 一回 使用量은 五分에서 一兩까지이며, 그 중 一錢을 가장 많이 사용하

고 있었다.

5. 貝母가 主藥으로 配伍된 方劑에 대한 調査를 통하여 貝母와 配伍되는 基本處方들과 藥物群을 파악할 수 있었고, 方劑構成의 原理에 대한 理論的 根據를 제시할 수 있었다.

#### 參 考 文 獻

1. 辛民敎, 臨床本草學, 南山堂, 서울, 1986, pp.763~765
2. 安德均 著, 原色 韓國本草圖鑑, 教學社, 서울, 1999年, p.580
3. 李永魯, 韓國植物圖鑑, 教學社, 서울, 2002年, p.919
4. 박영순, 韓方의 藥理解說, 아카데미서적, 서울, 2002年, p.166
5. 정보섭 외, 圖解鄉藥大事典, 永林社, 서울, 1990年, pp.170~171
6. 國家中醫藥管理局<中華本草>編委會, 中華本草, 上海科學技術出版社, 上海, 1996年, p.2039
7. 苗明三 主編, 法定 中藥藥理与臨床, 世界圖書出版公司, 西安, 1998年, pp.277, 357, 358
8. 張日武 外, 東洋醫藥科學大典 I, 서울대학교 천연물과학연구소, 서울, 2003, pp.434, 435
9. 康秉秀 金永坂 編著, 臨床配合本草學, 永林社, 서울, 1994年, pp.598~600
10. 楊濟 外, 臨證用藥配伍指南, 中國醫藥科技出版社, 北京, 1996年, pp.331~336
11. 雷載權 張延模 主編, 中華臨床中藥學,

- 人民衛生出版社, 北京, 1998年,  
pp.1320~1325
12. 鄭虎占, 中藥現代研究與應用, 學苑出版社, 北京, 1998, pp.692~708
13. 許浚, 東醫寶鑑, 서울, 南山堂, 1966,  
pp.110, 119, 120, 130, 161, 211, 233,  
236, 272, 273, 365, 374, 396, 422, 453,  
468, 469, 470, 471, 472, 473, 476, 477,  
478, 479, 482, 487, 488, 498, 520, 544,  
545, 551, 553, 562, 564, 574, 581, 616,  
619
14. 朱震亨, 丹溪醫集, 서울대학교 출판부,  
서울, 2000, pp.269, 272, 273
15. 太平惠民和劑局編, 太平惠民和劑局方,  
中國中醫藥出版社, 北京, 1996,  
pp.93, 94
16. 朱震亨, 新編丹溪心法附餘, 대성문화사,  
서울, 1993,  
pp.164, 205, 217, 332, 366, 945
17. 危亦林, 世醫得效方, 醫聖堂, 서울,  
1990,  
pp.38, 158, 163, 165, 484, 523, 632, 659
18. 龔延賢, 校正增補 萬病回春, 醫聖堂, 서울, 1993, pp.113, 214
19. 樓英, 醫學綱目(中華醫書集成 第24冊),  
中醫古籍出版社, 北京, 1999, p.749
20. 李梃, (國譯)編註醫學入門, 南山堂, 서울, 1988,  
p.3권 356, pp.4권 314, 646, 697, pp.6권  
212, 374, 453
21. 漢英, 漢法, 漢德, 漢日, 漢俄醫學大詞典編纂委員會, 漢英醫學大詞典, 人民衛生出版社, 北京, 1993,