

이것이 알고 싶다

방사성옥소치료

◎ 질 의 : \*\*\*

이번에 방사성옥소치료를 받고 퇴원 예정에 있습니다.

그런데 집에 신생아가 있는데 어느 정도 아기와 떨어져 있어야 문제가 없을까요? 너무나 걱정이 되서요. 꼭 답변 주시기 바랍니다.

약 용량은 150이라고 합니다.

◎ 답 변 : 장재권(한국원자력안전기술원 방사선평가실)

건강이 좋지 않군요.

1. 신생아가 환자의 자녀분인지 아니면 손주인지 알 수 없지만 자녀의 경우라면 당분간 모유를 주시지 않는 것이 좋겠습니다.
2. 가족과 공동체 생활을 하시더라도 가족에게 미치는 방사선의 위험은 매우 적겠지만 퇴원을 하신 후에는 약 5일 정도(특히 퇴원전후 2일정도)는 독립된 공간에서 생활 하시는 것이 좋겠습니다. 특히, 주무실 때는 혼자 주무시고, 아이를 안는다는가의 행동은 하지 않는 것이 좋을 듯 합니다.
3. 사용하시거나 만지는 물품(수건 등)의 경우에도 며칠간은 개별적으로 사용하시는 것이 좋겠습니다.
4. 그러나 전체적으로 큰 위험은 아니므로 위에서 말씀드린 장시간 같이 근거리에 계시는 것은 피하시는 것과 개별 물품 사용을 권고 드립니다.
5. 아울러 물, 주스 등을 많이 드시고, 샤워도 자주 하십시오.

가족에게 미치는 방사선 영향은 크지 않으므로 장시간의 접촉과 개별 물품 사용을 약 5일 정도만 하시면 될 것 같습니다.

방사선으로 인한 가족의 위험에 대한 마음 고생은 하시지 마시고 빠른 쾌유를 기원 드립니다.

혹 좀더 궁금한 사항이 있으시면 아래의 전화로 연락 주십시오. 042-868-0593