

진균증을 치료하는 한방외용약의 제형과 약물 분류

김용찬 · 강정수*

대전대학교 한의과대학 생리학교실

Study on The Herbs and Forms of Oriental Applications to Treat Mycoses

Yong Chan Kim, Jung Soo Kang*

Department of Oriental Medical Physiology, Daejeon University

Human fungal infections are uncommon in normally healthy persons, being confined to conditions such as candidiasis (thrush) and dermatophyte skin infections such as athlete's foot. However, in the immunocompromised host, a variety of normally mild or nonpathogenic fungi can cause potentially fatal infections. Furthermore, the relative ease with which people can now visit "exotic" countries provides the means for unusual fungal infections to be imported into this country. Mycoses appear in many different forms and areas. Fungal infections or mycoses are classified depending on the degree of tissue involvement and mode of entry into the host. These are Cutaneous, Subcutaneous, Systemic, and Opportunistic. Cutaneous mycoses specially appears symptoms on the skin. They are treated by amphotericinB, nystatin, grycfulvin, micronazole and ketoconazole, etc, but these medicines are been careful about using, because most of them have serious side effects and toxicities. So, on the purpose of finding safe novel medicines, we have researched oriental medicines and search them to treat mycoses. In oriental medicines treating mycoses, we pay attention to orient applications that directly have an effect on disorder lesions. Oriental applications consists of various herbs and have a lot of forms, so we try to classify them as herbs and forms

Key words : fungi, mycoses, oriental application.

서 론

진균의 병원성은 진균이 1차적으로 정착하는 장소에 따라 특징을 나타낸다. 피부 사상균들의 감염은 표피, 모발 및 손톱, 발톱 등 각질화된 부위에 한정되고, 피하 진균증을 나타내는 진균들은 일반적으로 낮은 감염력을 가지며 주로 외상의 상처를 통해 감염된다. 전신성 감염을 일으키는 진균들은 대부분 호흡기계를 통해 감염되며 감염 진균이 숙주내에서 생존할 수 있는 능력, 숙주의 면역상태, 감염된 진균의 수에 따라 질병이 성립된다.

최근 들어 AIDS나 장기 이식, 화학요법이 발달하면서 면역 억제 치료가 늘어남에 따라 세포 매개 면역능이 저하되어 진균 감염 환자의 수가 실체적으로 증가추세에 있어, 대단히 드물었던

진균감염도 앞으로는 흔히 볼 수 있을 것이다. 하지만 진균증은 진균의 기생력과 생명력, 그리고 강한 번식력에 의하여 치료가 어려울 뿐 아니라, 현재 사용되어지는 진균치료제는 독성이나 부작용으로 사용에 많은 제한을 받고 있다.

한의학의 外治療法은 한의학적인 이론을 바탕으로 약을 피부나 호흡기 등의 九竅에 다양한 자극의 방법을 통하여 치료효과를 유발하는 방법으로, 여기에는 기공, 침구치료, 기타 물리요법이 모두 포함된다. 국부질환에 있어서 약물을 환부에 사용하면 약물이 소화흡수를 거치지 않고 직접적으로 작용하고 그 부위에만 집중적으로 작용하므로 치료효과가 비상하고 신속하다. 그리고 독성이 강한 약물을 사용하는 경우에 내복하는 것 보다 인체에 미치는 악영향이 적다. 또한 인체는 表裏相通하고 表裏相應하며 表裏相融하므로 內治의 효과도 거둘 수 있다.

오랜 시간 속에서 검증된 한의학에서 보다 독성이 적은 진균증 치료법을 찾을 수 있을 것이라는데 착안하여 진균치료제 대한

* 교신저자 : 강정수, 대전시 동구 용운동 96-3 대전대학교 한의과대학

· E-mail : omdkjs@dju.ac.kr, · Tel : 042-280-2617

· 접수 : 2006/08/21 · 수정 : 2006/09/12 · 채택 : 2006/10/02

연구를 진행하던 중, 진균증의 증상을 치료하는 한방의용약의 제형과 약물에 대한 지견이 있어 이에 보고하는 바이다.

본 론

1. 연구방법

1) 외용방법에 따른 처방분류

외용방법에 따라 바르기(塗·抹·傅·布·著·搽·糊 등), 닦아내기(洗·沐·浴·淨·滌·掠·拭 등), 쪄기(熏·薰·燻·燒·煙 등), 쪄고 닦아내기(薰洗), 담그기(漬·浸 등), 끼워넣기(挿·塞·挾·懷·內 등), 문지르기(摩·掠·揉·擦 등), 붙이기(貼 등)로 분류하였다. 바르는 약은 종류가 많아 형태에 따라 점성을 가지는 膏·糊, 가루로 사용하는 散, 액체만 사용하는 液·油로 구분하였고, 닦아내기는 洗, 쪄기는 熏, 쪄고 닦아내기는 薰洗, 담그기는 漬, 끼워넣기는 揿, 문지르기는 摩, 붙이기는 貼의 대표명칭을 사용하였다. 해당하는 외용방법에 따른 처방들을 분류하여 기록하였다.

2) 약물분류

외용방법에 따른 처방들에 각각 어떤 약물이 사용되었는지 식물성·동물성·광물성 약물과 액상성분으로 나누어 분류하였다.

2. 두부 진균증

두부 진균증은 한의학에서 鬚鬚, 瘡頭瘡, 瘡頭, 梅花瘡, 頭上瘡, 頭禿瘡, 穀瘡 등의 범주에 속한다.

1) 처방분류

(1) 膏·糊

- ① 月黃膏 : 川椒 9g, 藤黃末 25g, 黃蠟·白蠟 각 6g, 참기름 30mL.
- ② 禿瘡膏 : 紫草·黃蠟 각 60g, 百部 125g, 朴硝 50g, 硫黃末 15g, 樟腦 6g, 참기름 370mL.
- ③ 番木鼈子膏 : 番木鼈子, 真輕粉 一錢, 枯礬 三分.
- ④ 肥油膏 : 番木鼈 六錢, 當歸 藜蘆 各五錢, 黃柏 苦蔴 杏仁 狼毒 白附子 各三錢, 香油 十兩에 끓여서 黑黃色이 되면 찌꺼기를 걷어내고 黃蠟 一兩二錢을 넣는다.
- ⑤ 潤肌膏 : 麻油 四兩, 當歸 五錢, 紫草 一錢, 黃蠟 五錢.
- ⑥ 小蝦蟆膏 : 小蝦蟆 100마리. 두들겨 膏狀으로 만들어 바른다.
- ⑦ 常用拔髮方 : 雄黃 0.3g 石灰 1.2g 물에 개어서 糊狀으로 만든다.
- ⑧ 蝎蜂丹 : 蝎牛 10개, 黃蜂窠 二錢, 生甘草 一錢, 白礬 一錢. 돼지기름에 개서 붙인다. 熊油로 개서 붙이면 더욱 묘하다.
- ⑨ 頭面肥瘡方 : 輕粉 一錢, 飛血丹 枯白礬 雄黃 各二錢. 곱게 갈고 龜版灰 一兩을 다시 갈아서 茶油로 개서 바른다.
- ⑩ 諸瘡一掃光 : 苦蔴 黃柏 各一斤, 烟膠 一升, 木鼈肉 蛇牀子 点紅椒 明礬 硫黃 風子肉 猪脂 水銀 輕粉 各二兩, 白砒 五錢, 猪油 二斤四兩. 이 약 一錢에 倒挂塵 二分을 넣고 등의 묵은 기름에 개어서 바른다.
- ⑪ 又方 : 川棟子 百部根 15g, 巴SEL린.
- ⑫ 又方 : 蜂房 적당량, 돼지기름.
- ⑬ 又方 : 煅白礬 青礬(生用) 각 30g 石硫黃(生用) 生石膏 15g, 식용유(麻油, 콩기름 혹은 채종유) 120g.
- ⑭ 又方 : 할미새糞 적당량을 갈아서 麻油 혹은 茶油에 간다.

⑮ 頭癬外敷藥糊 : 百草霜 45g, 麻油 또는 茶油 90g, 소양감이 심한 자는 茜草粉 15g을 가한다. 麻油에 개서 바른다.

(2) 散

- ① 雄黃散 : 雄黃 水銀 一錢, 輕粉 五分, 烟膠 五錢, 枯礬 五分. 돼지기름에 개서 바르거나, 馬脂油.
- ② 粘瘡妙方 : 海螵蛸 二錢, 白膠香 輕粉 各五分. 함께 같아서 清油豆 瘡을 촉촉하게 하고 약으로 건조하게 바른다.
- ③ 連床散 : 黃連 五錢, 蛇牀子 二錢五分, 五倍子 三錢五分, 輕粉 一錢五分. 곱게 같아서 清油에 개서 붙인다.
- ④ 麥錢散 : 小麥 一升, 硫黃 四兩, 白砒 一兩, 烟膠 半斤, 川椒 三兩, 生礬 枯礬 各二兩. 麻油에 개서 사용.
- ⑤ 百草霜散 : 百草霜을 곱게 갈고 脂粉을 조금 넣어 生油에 개서 바른다.
- ⑥ 白頭翁根散 : 白頭翁根.
- ⑦ 菊粉散 : 黃菊花 五錢(燒灰), 烟膠 二錢, 輕粉 枯礬 一錢, 黃丹 二錢. 合하면 마를정도로 건조하면 돼지기름으로 고아서 바른다.
- ⑧ 豬蹄散 : 胡黃蓮 輕粉 雄黃 각 0.9g 膽礬 0.6g 枯礬 3g 豬蹄鞋 3개(煅存性).
- ⑨ 海螵蛸散 : 海螵蛸 6g 白膠香 輕粉 각 1.5g.
- ⑩ 又方 : 紫草 没藥 淮鹽(炒) 각 10g 木柏油 60g 膽礬 3g 石乳 6g 檀腦 6g. 柏油로 개서 바른다.
- ⑪ 又方 : 雄黃 10g 枯礬 12g 六一散 15g 氷片 1g 硫黃 6g. 香油에 개어서 바른다.
- ⑫ 連床散 : 黃連 15g 蛇牀子 7.5g 五倍子 4.5g 輕粉 3g. 清油에 개서 바른다.
- ⑬ 液·油
- ① 蹤躅花油 : 蹤躅花根 四兩을 香油 한사발에 넣고 고아서 찌꺼기를 버리고 黃蠟을 약간 넣고 맑게 여과.
- ② 鮮苦棟子油 : 鮮苦棟子(破碎)를 級油로 가열하여 기름을 바른다.
- ③ 五倍子醋 : 五倍子 30g 煎汁, 米醋 120g.
- ④ 銅綠松香油 : 銅綠 松香 10g 黃蠟 6g 香油 45g, 藥油만 바른다.
- ⑤ 香薷煎 : 陳香薷 60g 胡粉 30g 猪脂 15g. 물에 달여 汁을 취하여 胡粉·猪脂를 넣고 바른다.
- ⑥ 巴豆油 : 巴豆 1매 去殼, 茶油 적당량. 으깨서 바른다.
- ⑭ 洗
- ① 용액제 : 苦棟子 20g 苦蔴 百部 각 15g 雄黃 10g. 물에 달여 汁을 취하여 닦아낸다.
- ② 又方 : 黑桑椹子. 물에 타서 닦아낸다.
- 2) 약물분류

膏·糊에서 사용된 식물성 약물은 川椒 藤黃 紫草 百部 樟腦 番木鼈子 當歸 藜蘆 黃柏 苦蔴 杏仁 狼毒 白附子 生甘草 苦蔴 風子肉 川棟子 蛇牀子 茜草粉이 있고, 동물성 약물은 小蝦蟆 蝎牛 黃蜂窠 龜版灰 할미새糞이 있고, 광물성 약물은 黃蠟 白蠟 朴硝 硫黃 輕粉 枯礬 雄黃 石灰 白礬 明礬 水銀 青礬 石膏 白砒가 있고, 액상성분은 참기름 香油 麻油 돼지기름 熊油 茶油 猪油 식용유 麻油 콩기름 채종유가 있다. 散에서 사용된 식물성 약물은 白

膠香 黃連 蛇牀子 小麥 川椒 白頭翁根 黃菊花 胡黃蓮 紫草 没藥
樟腦 冰片 百草霜이 있고, 동물성 약물은 海螵蛸 五倍子 豬蹄鞋
烟膠가 있고, 광물성 약물은 雄黃 水銀 輕粉 枯礬 硫黃 白砒 生礬
黃丹 膜礬 淮鹽(炒) 石乳 滑石 石膏가 있고, 액상성분은 鮐지기름
馬脂油 清油 麻油 生油 柏油 香油가 있다. 液·油에서 사용된 식물
성 약물은 蹤躅花根 鮐苦棟子 松香 陳香薷 巴豆가 있고, 동물성 약
물은 五倍子가 있고, 광물성 약물은 黃蠟 銅綠이 있고, 액상성분은
香油 綿油 米醋 茄油 鮐지기름이 있다. 洗에서 사용된 식물성 약
물은 苦棟子 苦蔴 百部 黑桑椹子가 있고, 광물성 약물은 雄黃
있고, 액상성분은 물이 있다.

3. 수부 진균증

수부 진균증은 한의학에서 鵝掌風, 鵝掌癬, 鵝掌風에 해당한다.

1) 처방분류

(1) 膏·糊

① 膏藥(『濟生』) : 凤仙花(單衣·꽃·잎까지 曙乾) 蒼耳葉(嫩頭)
각 四兩, 血餘 三兩, 鹿角屑(生刮) 絡石 虎骨 百部 茜草 剪草 각
二兩, 人指甲 五錢, 穿山甲 羌活 虎骨 麻黃 薦艾 威靈仙 각 一兩.
위의 약을 麻油 1근, 鉛粉 四兩, 銀珠 四兩, 黃蠟 二兩, 乳香 二兩.
② 熊脂膏 : 熊油 一兩, 瓦松 三錢, 輕粉 一錢, 檀腦 一錢, 熊油
에 개서 바르고 불을 쬐서 말린다.

③ 又方 : 五倍子를 갈아서 桐油에 개서 炭火에 烘.

④ 又方 : 朱砂 明雄黃 각 一錢, 輕粉 五分. 桐油. 바르고 微火
로 烘.

⑤ 又方 : 牡蠣(煅) 密陀僧 각 二錢. 가루내어 桐油로 개서 바
른다.

⑥ 又方 : 川烏 白附子 草烏 僵蠶 銅綠 密陀僧 輕粉 明礬 각
一錢, 鮐香 三分. 葱汁으로 개서 불인다.

⑦ 복합방 : 土木鼈 苦蔴 各一兩, 白附子 五錢, 輕粉 三錢. 각
각을 곱게 갈아서 섞어 生桐油에 개어서 사용한다. 馬齒莧 煎濃
湯을 써서 煎洗, 檀木屑, 絡瓜藤, 大蒜秸, 大皂莢을 태워 煎, 煎을
한 다음에는 紅升丹, 川貝母末 各一錢을 桐油로 개서 불임.

⑧ 水輕疏爐膏 : 輕粉, 水片, 硫黃, 龍骨, 爐甘石(1:2:3:4:5). 바
셀린으로 膏藥을 만든다.

(2) 散

① 又方 : 瓦花와 頭髮을 빻아서 손으로 문지른다.

(3) 液·油

① 灰條草汁

② 紅砒油 : 麻油 一兩, 紅砒 一錢. 기름만 바른다.

(4) 洗

① 又方 : 鮐核桃 바깥의 青皮를 鴿子屎과 함께 煎水하여 洗.

② 又方 : 鮐嫩芭蕉葉을 煎하여 洗한다.

③ 又方 : 豆腐沫로 뜨겁게 씻는다.

④ 又方 : 穀樹葉 煎湯에 溫洗하고 불에다 건조하게 말리고
柏油을 써서 문지른다.

(5) 熏

① 鵝掌風(鄧重光) : 大麥芒을 태워서 熏.

② 又方 : 薦艾 四五兩을 水煎하여 熏.

③ 又方 : 生桐油를 바르고 松毛를 태운 연기에 煎.

④ 二簪湯 : 白簪 自簪 各四兩, 孩兒茶 五錢, 柏葉 半斤. 물 10
대접에 끓여 훈증.

(6) 煙洗

① 陳蒿艾薰洗 : 川烏 首烏 蒼朮 赤芍 地丁 防風 花粉 荊芥 각
30g 陳蒿艾 120g을 달여서 薰洗한다.

② 又方 : 凤仙花 1棵, 猪薑草 一兩, 蟬蛻 三錢. 煎하여 洗 훈
熏洗.

③ 又方 : 白豌豆 一升을 棟樹子와 함께 煎湯하여 薰洗.

④ 又方 : 葱 5~6 뿌리, 花椒 한줌, 醋 한대접을 넣고 다시 瓢
인 물에 冲하여 薰洗.

(7) 潟

① 膜子百部液 : 鴉膽子 20g 生百部 30g 소주·醋 각 250ml. 담
근다.

② 煙常山漬 : 油核桃로 마찰. 煙常山 1근과 물속에 담근다.

③ 漬泡法 : 頭漿 2대접 川椒 透骨草 15g을 끓여 담근다.

(8) 摩

① 又方 : 猪胰 한개, 花椒 三錢을 溫酒 담갔다가 꺼내서 문지
르고 微火로 烘한다.

2) 약물분류

膏·糊에 사용된 식물성 약물은 凤仙花 蒼耳葉 百部 茜草 剪
草 羌活 麻黃 薦艾 威靈仙 乳香 瓦松 檀腦 川烏 白附子 密陀僧
土木鼈 苦蔴 草烏 馬齒莧 檀木屑 絡瓜藤 大蒜秸 大皂莢 川貝母가
있고, 동물성 약물은 鹿角屑 虎骨 人指甲 穿山甲 虎骨 熊油 五倍
子 牡蠣 鮐香 僵蠶 龍骨 血餘가 있고, 광물성 약물은 絡石 鉛粉
銀珠 黃蠟 輕粉 朱砂 明雄黃 輕粉 明礬 銅綠 水片 硫黃 爐甘石이
있고, 액상성분은 麻油 桐油 葱汁이 있다. 散에 사용된 식물성 약
물은 瓦花가 있고, 동물성 약물은 頭髮이 있다. 液·油에 사용된
식물성 약물은 灰條草가 있고, 광물성 약물은 紅砒가 있고, 액상
성분은 麻油가 있다. 洗에 사용된 식물성 약물은 鮐核桃 青皮 鮐
嫩芭蕉葉 豆腐沫 穀樹葉 柏油가 있고, 동물성 약물은 鴿子屎가
있고, 액상성분은 물이 있다. 煙에 사용된 식물성 약물은 大麥芒 薦
艾 生桐油 松毛 孩兒茶 柏葉이 있고, 광물성 약물은 白簪 自簪
이 있고, 액상성분은 물이 있다. 熏洗에 사용된 식물성 약물은 川烏 首
烏 蒼朮 赤芍 地丁 防風 花粉 荆芥 陳蒿艾 凤仙花 猪薑草 白豌豆
棟樹子 葱 花椒가 있고, 동물성 약물은 蟬蛻가 있고, 액상성분은
醋 물이 있다. 潟에 사용된 식물성 약물은 鴉膽子 生百部 油核桃
煙常山 頭漿 川椒 透骨草가 있고, 액상성분은 소주 醋 물이 있다.
摩에 사용된 식물성 약물은 花椒가 있고, 동물성 약물은 猪胰가
있고, 액상성분은 溫酒가 있다.

4. 족부 진균증

족부 진균증은 한의학에서 脚氣, 脚濕氣, 臭田螺, 田螺皰, 爛
脚丫, 脚指縫爛瘡, 爛瘡, 爛脚風, 風痒脚瘡, 脚疣, 香港脚, 脚爛瘡
에 해당한다.

1) 처방분류

(1) 膏·糊

① 龍馬丹 : 馬齒莧 二錢 黃柏 五錢 陳年石灰 二錢 輕粉 一

錢 地龍龜 三錢 伏龍肝 二錢 黃丹 赤石脂 三錢. 갈아서 꿀에 개서 붙인다.

②一方 : 柏子油 一兩, 明雄黃末 五錢을 개어서 바른다.

③ 蟑酥餅 : 蟑酥 二錢(酒化), 輕粉 五分, 枯礬 寒水石(煅) 銅綠 乳香 没藥 脂肪 翴香 各一錢, 雄黃 二錢, 蝦牛 21개, 砂砂 三錢. 이상의 약을 가루내어 蝦牛를 갈아놓고 蟑酥를 넣고 갈아서 붙인다.

④ 眞君妙貼散 : 明淨硫黃(爲末) 十斤, 麥面 白面 五斤. 물에 개서 쓴다.

⑤ 五美散 : 皮硝 一兩(炒末), 東丹 一兩(炒研), 硫黃 雄精 三錢, 輕粉 一錢. 이상의 약을 곱게 갈아서 밀린 후 기름에 간다.

⑥ 朴硝 : 朴硝 9g을 桐油에 개어서 바른다.

⑦ 足癬方 : 密陀僧 60g, 硫黃 30g, 砂砂 75g. 細末하여 바셀린에 섞어 바른다.

(2) 散

① 密陀僧散 : 密陀僧煅.

② 青雲散 : 牡蠣 45g 寒水石 66g 青黛 輕粉 15.

③ 腳氣散 : 煅石膏 30g 煅甘石 15g 輕粉 15g 炒鉛粉 9g.

④ 散 : 花蕊石散, 龍骨散

⑤ 枯礬散 : 石膏 輕粉 黃丹 각 三錢 枯白礬 五錢.

⑥ 另方(濟生) : 五倍子(炒枯) 一兩, 松香 枯白礬 水銀 鉛 각 五錢, 雄黃 三錢. 먼저 茄枝草 煎湯으로 세척하고 바른다.

⑦ 密陀僧散 : 密陀僧 一兩, 石膏 枯白礬 각 二錢 輕粉 一錢. 桐油에 개서 바르고, 습하면 가루로 바른다.

⑧ 另方 : 鵝掌皮焙하고 가루내어 바르거나 香油로 개서 붙인다.

⑨ 另方 : 松夢茶葉를 焙하고 곱게 갈아서 바른다.

⑩ 密陀散 : 密陀 一兩, 輕粉 一錢, 熟石膏 枯礬 二錢. 가루내어 습하면 마르도록 붙이고, 말랐으면 桐油에 개서 붙인다.

⑪ 試驗方 : 好黃丹 三錢, 花蕊石 一錢. 갈아서 바른다.

⑫ 枯礬散 : 枯礬 五錢, 石膏(煅) 輕粉 黃丹 各三錢. 이상의 약을 가루내어 溫湯으로 닦은 후에 약을 바르면 낫는다.

⑬ 珍珠散 : 青缸花 珍珠 一錢, 真輕粉 一兩.

⑭ 另方 : 黃丹

⑮ 散劑 : 石膏 輕粉 각등분, 烏 青黛 15g 海螵蛸 36g 石膏面 120g 冰片 3g, 烏 六一散 9g 枯礬 3g, 烏 五倍子 海螵蛸 각등분.

⑯ 陳疏散 : 동단 15g, 硫黃 50g, 花椒 15g. 바른다.

⑰ 沙蟲丹 : 黃丹 五倍子(煅) 각등분. 가루내어 바른다.

(3) 液·油

① 蝦尿藤黃漿 : 青蝦尿, 藤黃 適量. 藥液을 바른다.

② 土槿樹皮根酒 : 土槿樹皮根 90g을 白酒 250ml. 바른다.

③ 醋劑 : 側柏葉 200g, 褐은 黃精 500g, 褐은 蕁香 枯礬 각 9g 大黃 黃精 각 15g. 米醋. 여과하여 바른다.

(4) 熏

① 另方 : 稻草把를 태워서 연기로 熏한다.

(5) 潑

① 醋制足癬洗劑 : 大風子 皂角 각 30g 白礬 地骨皮 각 20g 蕁香 15g 茉莉 防風 각 10g 식초 1,000ml에 潑

② 潑 : 乾葛水洗劑, 漏蘆湯, 一枝黃花. 王不留行 30g 明礬 9g 끓인 汁. 石榴皮水洗劑

③ 另方 : 臭樹花를 煎湯하여 浸洗한다.

④ 浸液 : 苦蔴 30g 烏 黃精 120g, 烏 鮮馬齒莧 車前草 30~60g, 烏 苦蔴 石菖蒲 野艾. 임의로 하나를 선택하여 달인 즙에 潑.

⑤ 牡黃二子煎 : 牡蠣 大黃 地膚子 蛇牀子 각 50g. 전탕액에 潟.

2) 약물분류

膏·糊에 사용된 식물성 약물은 馬齒莧 黃柏 乳香 没藥 密陀僧이 있고, 동물성 약물은 地龍龜 蟑酥 翴香 蝦牛가 있고, 광물성 약물은 陳年石灰 輕粉 伏龍肝 黃丹 赤石脂 明雄黃 枯礬 寒水石 銅綠 脂肪 砂砂 硫黃 東丹 朴硝 硼砂가 있고, 액상성분은 꿀 柏子油 기름 桐油 바셀린이 있다. 散에 사용된 식물성 약물은 密陀僧 青黛 松香 茄枝草 松夢茶葉 青缸花 青黛 水片 花椒가 있고, 동물성 약물은 牡蠣 龍骨 五倍子 鵝掌皮 珍珠 海螵蛸가 있고, 광물성 약물은 寒水石 輕粉 石膏 爐甘石 鉛粉 黃丹 枯白礬 水銀 雄黃 花蕊石 滑石 동단이 있고, 액상성분은 桐油 香油가 있다. 液·油에 사용된 식물성 약물은 藤黃 土槿樹皮根 側柏葉 黃精 蕁香 大黃이 있고, 동물성 약물은 青蝦尿가 있고, 광물성 약물은 枯礬이 있고, 액상성분은 白酒 米醋가 있다. 熏에 사용된 식물성 약물은 稻草 把가 있다. 潑에 사용된 식물성 약물은 大風子 皂角 地骨皮 蕁香 茉莉 防風 乾葛 漏蘆 一枝黃花 王不留行 石榴皮 臭樹花 苦蔴 黃精 鮮馬齒莧 車前草 石菖蒲 野艾 大黃 地膚子 蛇牀子가 있고, 동물성 약물은 牡蠣이 있고, 광물성 약물은 白礬 明礬이 있고, 액상성분은 식초 물이 있다.

5. 조갑 진균증

조갑 진균증은 한의학에서 灰指甲, 鵝爪風, 油灰指甲, 油炸甲에 해당한다.

1) 처방분류

(1) 膏·糊

① 白鳳仙花 : 白鳳仙花를 찔어서 조갑 위에 놓는다.

② 摻甲膏 : 蕤麻子 蛇蛻 天南星 皂角 地膚子 千金子 五加皮 地骨皮 각 46g 川椒 烏梅 杏仁 威靈仙 僵蠶 生川烏 生草烏 각 31g 急性子 125g 凤仙花 62g 硼砂(나중에 넣는다) 62g 鉛丹 700g 참기름 1,500ml. 고야처럼 만든다(참기름 500ml에 鉛丹 220g을 넣는다). 조감이 빠지고 새로난다.

③ 白鳳仙花 : 白鳳仙花 및 白礬을 찔어서 붙인다.

④ 布爪法 : 凤仙花 30g 明礬 9g 褐은 土大黃 3g 凤仙花梗 1棵 枯礬 6g을 찔어서 붙인다.

(2) 液·油

① 生半夏汁 : 生半夏(外皮를 벗김) 5개 米醋 한술 汁을 바른다.

② 木蘭葉汁 : 木蘭葉을 석회수에 넣고 발효시켜 汁을 바른다.

③ 另方 : 大風子肉 花椒 烟膏 五加皮 각 9g 明礬 12g 皂莢 土槿皮 각 15g 鮮鳳仙花 15條, 醋 500~1,000ml를 浸泡하여 외용한다.

④ 另方 : 鴉膽子 20g 生百部 30g 白酒 醋 각 25g 10일정도 浸泡하여 外用한다.

⑤ 鴉膽子油 : 鴉膽子仁을 눌러 기름을 내어 조갑에 바른다.

(3) 潑

① 蕁香醋 : 蕁香 30g 黃精 大黃 皂莢 각 12g 식초 500ml. 潟

(4) 貼

① 猪苦膽 : 猪苦膽를 불이고 米醋를 바른다.

2) 약물분류

膏·糊에 사용된 식물성 약물은 凤仙花 蕁麻子 天南星 皂角 地膚子 千金子 五加皮 地骨皮 川椒 烏梅 杏仁 威靈仙 生川烏 生草烏 急性子 土大黃 凤仙花梗이 있고, 동물성 약물은 蛇蛻 僵蠶 이 있고, 광물성 약물은 硼砂 鉛丹 白礬 枯礬이 있고, 액상성분은 香油가 있다. 液·油에 사용된 식물성 약물은 半夏 木蘭葉 大風子 肉 花椒 五加皮 皂莢 土槿皮 凤仙花 鴉膽子 生百部가 있고, 광물성 약물은 明礬이 있고, 액상성분은 米醋 石회수 醋 白酒가 있다. 漬에 사용된 식물성 약물은 藿香 黃精 大黃이 있고, 광물성 약물은 皂礬이 있고, 액상성분은 紫草가 있다. 貼에 사용된 동물성 약물은 猪苦膽이 있고, 액상성분은 米醋가 있다.

6. 체부 진균증

체부 진균증은 한의학에서 環癬, 金錢癬, 錢癬, 筆管癬, 荷葉癬, 雀眼癬, 圈癬, 荷錢癬瘡, 銅錢癬에 해당한다.

1) 처방분류

(1) 膏·糊

① 祖傳秘方 : 斑蝥 3마리 枯礬 硼黃 密陀僧 각 3g 三仙丹 2.5g 冰片 1g 白砒 1.5g 硼砂 2g 蜜香 0.15g 글리세린 50g.

② 木籠子糊 : 식초 10cc, 木籠子仁 5g 바른다.

③ 癬癩膏 : 荊芥 防風 苦蔴 斑蝥 白芷 甘草 大黃 當歸 檳榔 鶴虱 瓦松 花椒 生地黃 小茴香 木籠子 巴豆 蒼朮 蛇牀子 牙皂莢 白鮮皮 木槿皮 生薑 葱 松香 檉腦 大風子 杏仁 白及 羊蹄根 白糖 荷葉 川烏 草烏 紅花 狼毒 黃柏 蕪荑 血蝎이 있고, 동물성 약물은 斑蝥 麝香 全蝎 蟬衣 白僵蠶 蛭虫 五倍子가 있고, 광물성 약물은 枯礬 硼黃 白砒 硼砂 信石 廣丹 輕粉 明礬 食鹽 火硝 雄黃이 있고, 액상성분은 글리세린 식초 麻油 猪油 陳醋 巴셀린이 있다. 散에 사용된 식물성 약물은 밀타승 巴豆 木槿皮 生南星 氷片이 있고, 동물성 약물은 斑蝥 麝香이 있고, 광물성 약물은 枯白礬 硼黃 信石 硼砂가 있고, 액상성분은 초 白茶油 甘油가 있다. 液·油에 사용된 식물성 약물은 黃連 花椒 土槿皮 紫荊皮 苦蔴 檉腦 苦棟皮 生地榆 千金子 生半夏 大黃 生大柏 紅花 青皮 丁香 生大黃 羊蹄根 苦棟子 蛇牀子 百部가 있고, 동물성 약물은 斑蝥 蛭虫이 있고, 광물성 약물은 輕粉 硼黃이 있고, 액상성분은 알콜 초 白酒가 있다.

④ 硫腦膏 : 硫黃 5g, 檉腦 2g, 大風子 杏仁 각 6g, 輕粉 2g, 猪油 적당량. 찔어서 풀처럼 만들어 바른다.

⑤ 五味消毒膏 : 花椒 明礬 각 30g, 硼黃 食鹽 火硝 각 120g, 猪油 적당량. 猪油를 넣어 膏를 만들어 바른다.

⑥ 五倍子膏 : 白及 30g, 五倍子 60g, 陳醋 적당량. 煎熱하여 풀처럼 만들어 바른다.

⑦ 深師療癩方 : 硫黃 雄黃 羊蹄根 白糖 荷葉 각 32g. 泥狀을 만들어 바른다.

⑧ 滅癩藥膏 : 川烏 草烏 紅花 大風子 木籠子 狼毒 血蝎 雄黃 9g, 檳榔 蒼朮 黃柏 蕴荑 12g. 巴셀린 20% 연고를 만들어 바른다.

(2) 散

① 密陀僧粉 : 밀타승(焦)에 초를 넣고 세말. 白茶油에 섞어 바른다.

② 療頑癩方 : 巴豆 적당량, 木槿皮 15g, 生南星 0.15g, 巴豆기름을 바른 후 가루를 바른다.

③ 頑癩散 : 斑蝥 3개, 枯白礬 硼黃 密陀僧 각 5g, 三仙丹 4g, 冰片 0.3g, 信石 0.5g, 硼砂 0.6g, 蜜香 0.2g, 甘油 54g. 細末하여 甘油에 섞어서 붙인다.

(3) 液·油

① 黃連酊 : 黃連 25g 花椒 10g 75%의 알콜 100ml. 알콜에 약물을 담갔다가 약액을 바른다.

② 皮癬水 : 土槿皮 620g 紫荊皮 苦蔴 檉腦 각 310g 苦棟皮 生地

榆 각 150g 千金子 50알 斑蝥 100마리(쌀 것) 蛭虫 30마리. 檉腦 외 약물을 굽게 가루내어 75%의 알콜 5,000ml에 1~2주일간 담가 두었다가 짜서 찌꺼기를 버리고 거기에 檉腦를 넣어 녹여서 바른다.

③ 鮮生半夏汁 : 生半夏(去皮), 초 약간. 汁을 낸다.

④ 斑黃液 : 木槿皮 苦蔴 각 9g, 斑蝥 7개, 大黃 6g, 生大柏 9g, 紅花 6g, 輕粉 檉腦 각 3g. 75%의 알콜 200~250cc에 침포하여 바른다.

⑤ 斑貓酒 : 斑蝥 30개, 青皮 6g, 白酒 250g. 침포하여 바른다.

⑥ 又方 : 丁香 9g 生大黃 15g 食醋 90ml. 약액을 바른다.

⑦ 又方 : 鮮羊蹄根의 汁을 바른다.

⑧ 又方 : 苦蔴 土槿皮 각 15g 苦棟子 蛇牀子 각 10g 百部 30g 硼黃 6g 米醋 100ml 白酒 400ml. 담갔다가 汁을 바른다.

2) 약물분류

膏·糊에 사용된 식물성 약물은 密陀僧 冰片 荊芥 防風 苦蔴 白芷 大黃 當歸 檳榔 鶴虱 瓦松 花椒 生地黃 小茴香 木籠子 巴豆 蒼朮 蛇牀子 牙皂莢 白鮮皮 木槿皮 生薑 葱 松香 檉腦 大風子 杏仁 白及 羊蹄根 白糖 荷葉 川烏 草烏 紅花 狼毒 黃柏 蕴荑 血蝎이 있고, 동물성 약물은 斑蝥 麝香 全蝎 蟬衣 白僵蠶 蛭虫 五倍子가 있고, 광물성 약물은 枯礬 硼黃 白砒 硼砂 信石 廣丹 輕粉 明礬 食鹽 火硝 雄黃이 있고, 액상성분은 글리세린 식초 麻油 猪油 陳醋 巴셀린이 있다. 散에 사용된 식물성 약물은 밀타승 巴豆 木槿皮 生南星 氷片이 있고, 동물성 약물은 斑蝥 麝香이 있고, 광물성 약물은 枯白礬 硼黃 信石 硼砂가 있고, 액상성분은 초 白茶油 甘油가 있다. 液·油에 사용된 식물성 약물은 黃連 花椒 土槿皮 紫荊皮 苦蔴 檉腦 苦棟皮 生地榆 千金子 生半夏 大黃 生大柏 紅花 青皮 丁香 生大黃 羊蹄根 苦棟子 蛇牀子 百部가 있고, 동물성 약물은 斑蝥 蛭虫이 있고, 광물성 약물은 輕粉 硼黃이 있고, 액상성분은 알콜 초 白酒가 있다.

7. 대퇴 진균증

대퇴 진균증은 한의학에서 陰癬, 腹癬에 해당한다.

1) 처방분류

(1) 膏·糊

① 松烏膏 : 松香 15g, 烏洛托品 10g, 花椒 4g, 硼黃 15g, 巴셀린 적당량. 연고로 하여 바른다.

② 又方 : 硼黃 吳茱萸 각등분을 식용유에 개어서 바른다.

(2) 散

① 花蕊石散 : 花蕊石 30g 硼砂 10g 枯礬 20g 滑石粉 40g.

② 顛倒散 : 大黃 硼黃 각등분. 물이나 찻물에 반죽하여 바른다.

③ 又方 : 生明礬 黎明礬 각 3g 輕粉 6g 銀硝 0.9g, 土地黃根을 가루내어 바른다.

④ 又方 : 枯礬 黃柏 五倍子 烏賊骨 각등분을 가루내어 바른다.

(3) 液·油

① 羊蹄根酒 : 羊蹄根 土槿皮 각 180g 制川烏 檳榔 百部 海桐 皮 白鮮皮 苦蔴 각 30g 蛇牀子 千金子 地膚子 馬錢子 大風子 蛭 각 15g 蛭虫末 9g 白砒 6g 斑蝥 6g(쌀 것). 소주 2,500ml에 담갔다가 약액을 바른다.

② 又方 : 十大功勞葉을 식초에 담갔다가 여과하여 바른다.

③ 殺蠶酒 : 苦棟子 10g 土槿皮 羊蹄根 각 15g 千金子 百部 각 12g 大風子 6g 樟腦 3g 米醋 200ml 白酒 400ml. 담갔다가 汁 을 바른다.

④ 土槿皮酒 : 土槿皮 15g을 露水 鏡面燒酒 각 120ml에 浸泡 하였다가 汁 을 바른다.

2) 약물분류

膏·糊에 사용된 식물성 약물은 松香 花椒 吳茱萸가 있고, 광 물성 약물은 硫黃이 있고, 액상성분은 巴셀린 식용유가 있다.

散에 사용된 식물성 약물은 大黃 土地黃根 黃柏이 있고, 동 물성 약물은 烏賊骨 五倍子가 있고, 광물성 약물은 硼砂 枯礬 滑石粉 硫黃 生明礬 熟明礬 輕粉 銀硝 花蕊石이 있고, 액상성분은 豆腐 둘이 있다. 液·油에 사용된 식물성 약물은 羊蹄根 土槿皮 制川烏 檳榔 百部 海桐皮 白鮮皮 苦蔴 蛇牀子 千金子 地膚子 馬錢子 大風子 十大功勞葉 苦棟子 樟腦가 있고, 동물성 약물은 蛇蛻 蛭蛻末 斑蝥가 있고, 광물성 약물은 白砒가 있고, 액상성분은 소주 식초 米醋 白酒 露水 鏡面燒酒가 있다.

8. 음부 진균증

음부 진균증은 한의학에서 陰痒, 陰門痒, 陰痒脫, 帶下, 陰痒 등의 범위에 속한다.

1) 처방분류

(1) 膏·糊

① 銀杏散 : 雄黃 乾白果 朝腦 生礦子灰 各等分. 가루내어 소 주에 개서 붙인다.

② 蠶蟲 : 蠶蟲 2~3錢을 가열하고 가루내어 솔에 개어 청소.

③ 又方 : 高昌白禁 一小兩을 끓여 빵과 麻仁을 等分하여 데 지 기름 一合으로 膏를 만들고 槐白皮를 끓여 닦아내고, 건조시킨 다음 膏를 위에 바른 다음 椅葉을 붙인다.

④ 陰囊頑癬方 : 蜂殼(煅) 五倍子 각 60g, 氷片 소량. 細末하여 茄油에 개서 바른다.

(2) 散

① 又方 : 硫黃 杏仁을 가루내어 붙인다.

② 又方 : 銀花 甘草 五倍子 각등분, 혹은 柴花地丁 野菊花 半枝蓮 黃柏 각등분을 같아서 바른다.

(3) 洗

① 蛇牀子煎劑 : 닦아낸다

② 又方 : 小薑나 혹은 蒜, 혹은 仙鶴草, 혹은 桃仁. 물에 끓여거나 찧어서 외용한다.

③ 又方 : 明礬 野菊花 각 20g으로 外洗한다.

④ 三黃山 : 大黃 黃柏 蛇牀子 苦蔴 黃精 地膚子 白鮮皮 枯礬 五倍子 각등분을 가루내어 물에 끓여 닦아낸다.

⑤ 蛇牀子洗方(瘡醫大全) : 蛇牀子 花椒 明礬. 물에 달여 씻는다.

⑥ 柏草椒芷湯 : 黃柏 100g 甘草 川椒 白芷 각 50g. 물에 달여 좌욕.

⑦ 蛇牀子洗方 : 蛇牀子 30g 百部 15g 鶴虱 苦蔴 雄黃 각 12g. 물에 달여 씻는다.

(4) 煎

① 柴蛇湯 : 蛇牀子 柴草 각 30g 花椒 10g 苦蔴 五倍子 각 15g

枯礬 10g. 물에 달이면서 김을 쏘이고 씻는다.

② 消腫止痒湯 : 苦蔴 黃柏 각 30g 大青葉 25g 花椒 6g. 물에 달이면서 김을 쏘이고 씻는다.

③ 艾葉湯 : 艾葉 蓼麻葉 槐葉 柳葉 白及 防風 白芷 升麻 各等分. 翼香을 조금 넣고 煎한다.

(5) 煎洗

① 草麻湯 : 扁柏葉 槐葉 青蒿葉 柳葉 草麻葉 桃葉 金銀花 艾葉 各等分. 煎湯하여 煎洗한다.

(6) 捌

① 又方 : 蛇牀子를 煎湯하여 煎洗하고 다시 桃仁을 같아서 膏로 만들어 雄黃末과 鷄肝을 섞어 餅을 만들어 陰中에 넣으면 그 蟲이 제거된다.

② 桃仁散 : 桃仁 二十一粒(빵을 것), 雄黃末 白薇末 二錢 炙甘草 五分. 가루내어 鷄肝 안에 담갔다가 陰戶에 넣는다.

③ 鷄肝 : 鷄肝을 익혀서 구멍을 내고 產門의 안에 넣는다.

④ 又方 : 陳大蒜頭末 9g 山苦蔴 蛇牀子 6g 白糖 3g을 캡슐에 넣는다. 먼저 葱白 8~10뿌리를 전탕하여 좌욕을 하고 캡슐 2개를 陰都 안에 넣는다.

(7) 貼

① 又方 : 生大豆黃卷을 씹어 바른다.

② 又方 : 小薑나 혹은 蒜, 혹은 仙鶴草, 혹은 桃仁. 물에 끓여거나 찧어서 외용한다.

2) 약물분류

膏·糊에 사용된 식물성 약물은 乾白果 麻仁 槐白皮 椹葉 氷片 生礦子灰가 있고, 동물성 약물은 蠶蟲 五倍子가 있고, 광물성 약물은 雄黃 高昌白禁 蜂殼이 있고, 액상성분은 소주 술 醬지기 를 茶油가 있다. 散에 사용된 식물성 약물은 杏仁 銀花 甘草 柴花 地丁 野菊花 半枝蓮 黃柏이 있고, 동물성 약물은 五倍子가 있고, 광물성 약물은 硫黃이 있다. 洗에 사용된 식물성 약물은 蛇牀子 小薑 蒜 仙鶴草 桃仁 野菊花 大黃 黃柏 苦蔴 黃精 地膚子 白鮮皮 花椒 甘草 川椒 白芷 鶴虱이 있고, 동물성 약물은 五倍子가 있고, 광물성 약물은 明礬 枯礬 雄黃이 있고, 액상성분은 물이 있다. 煎에 사용된 식물성 약물은 蛇牀子 紫草 花椒 苦蔴 黃柏 大青葉 艾葉 蓼麻葉 槐葉 柳葉 白及 防風 白芷 升麻가 있고, 동물성 약물은 五倍子 翼香이 있고, 광물성 약물은 枯礬이 있고, 액상성분은 물이 있다. 煎洗에 사용된 식물성 약물은 扁柏葉 槐葉 青蒿葉 柳葉 草麻葉 桃葉 金銀花 艾葉이 있고, 액상성분은 물이 있다. 插에 사용된 식물성 약물은 蛇牀子 桃仁 白薇 炙甘草 陳大蒜頭末 山苦蔴 白糖 葱白이 있고, 동물성 약물은 鷄肝이 있고, 광물성 약물은 雄黃이 있다. 貼에 사용된 식물성 약물은 生大豆黃卷 小薑 蒜 仙鶴草 桃仁이 있다.

9. 전풍

전풍은 한의학에서 紫白癬風, 夏日斑, 汗斑에 해당한다.

1) 처방분류

(1) 膏·糊

① 花斑癬煤油塗藥 : 雄黃 硫黃 각 9g 煅明礬 4g 密陀僧 6~15g 紅砒石 2g 輕粉 3g 蛇牀子 6g 海浮石 4g. 가루내어 석유에

넣어서 바른다.

② 又方 : 密陀僧散을 초에 섞어 외용한다.

(2) 散

① 二銀黃末 : 雌黃 石硫黃 각 9g, 枯白礬 海浮石 각 5g, 密陀僧 蛇牀子 각 6g, 水銀 3g, 紅砒石 1.5g. 바른다.

② 雄雄四黃散 : 石黃 雄黃 硫黃 白附子 雌黃 川槿皮 各等分. 가루내어 바른다.

③ 肥皂方 : 角甘松 山奈 白芷 各二錢 密陀僧 白附子 朝腦各一錢 楮實子 綠豆粉 各三錢, 弦肥皂 한근. 가루내어 바른다.

④ 密陀僧散 : 硫黃 雄黃 蛇牀子 各二錢, 石黃 密陀僧 各一錢 輕粉 五分.

(3) 液·油

① 癜藥水 : 土槿皮 1,250g 千金子 6g, 斑蝥 40마리, 소주 500ml. 소주에 담갔다가 바른다.

② 又方 : 土槿皮 10g 丁香 10g을 50~70% 알콜 100ml에 담갔다가 바른다.

2) 약물분류

膏·糊에 사용된 식물성 약물은 密陀僧 蛇牀子가 있고, 광물성 약물은 雄黃 硫黃 煅明礬 紅砒石 輕粉 海浮石이 있고, 액상성분은 석유 초가 있다. 散에 사용된 식물성 약물은 密陀僧 蛇牀子 白附子 川槿皮 角甘松 山奈 白芷 楮實子 綠豆粉 弦肥皂이 있고, 광물성 약물은 雄黃 枯白礬 海浮石 水銀 紅砒石 石黃 雄黃 硫黃 輕粉이 있다. 液·油에 사용된 식물성 약물은 土槿皮 千金子 丁香이 있고, 동물성 약물은 斑蝥가 있고, 액상성분은 소주 알콜이 있다.

10. 백선진

백선진은 한의학에서 脚丫毒, 足扱發에 해당한다.

1) 치방분류

(1) 散

① 大黃散 : 大黃 蒼朮 黃柏 각등분. 가루내어 참기름에 섞어서 바른다.

(2) 洗

① 三黃洗劑 : 大黃 黃柏 黃芩 虎杖 각등분. 가루내어 10g을 취하여 증류수 100ml 석탄산 1ml 박하뇌 1g을 넣어 바른다.

2) 약물분류

散에 사용된 식물성 약물은 大黃 蒼朮 黃柏이 있고, 액상성분은 참기름이 있다. 洗에 사용된 식물성 약물은 大黃 黃柏 黃芩 虎杖 박하뇌가 있고, 액상성분은 증류수 석탄산이 있다.

11. 스포로트리콤증

스포로트리콤증은 한의학에서 陳肝瘡, 蟻蛄串에 해당한다.

1) 치방분류

(1) 膏

① 又方 : 松香 500g 麻油 45ml 燒酒 60ml 百草霜 少許, 膏를 만들어 환처에 붙인다.

2) 약물분류

膏에 사용된 식물성 약물은 松香 百草霜이 있고, 액상성분은 麻油 燒酒가 있다.

12. 아구창

아구창은 한의학에서 鵝口瘡, 雪口病, 燕口瘡 등의 범위에 속한다

1) 치방분류

(1) 膏·糊

① 又方 : 黃丹을 곱게 간 것을 竹瀝에 개서 바른다.

② 又方 : 馬牙硝의 분말과 桑白皮汁를 사용한다.

(2) 散

① 青液散(『錦囊』) : 青黛 朴硝 각 一錢, 龍腦 一字. 가루내어 바른다.

② 四寶丹(『湯氏』) : 雄黃 三錢, 硼砂 二錢, 甘草 一錢, 冰片 三分五厘. 가루내서 바르거나 꿀풀에 개서 바른다.

③ 驅腐丹(『奎光秘方』) : 五倍子(去蛀 打碎 炒黑), 硼砂 각 二錢. 갈아서 불어넣는다.

④ 冰硼散 : 冰片 五分, 朱砂 六分, 玄明粉 硼砂 各五錢. 가루내어 바른다.

⑤ 珍珠散을 자주 불어 넣는다.

⑥ 又方 : 冰硼散, 青黛散, 五倍子散을 吹藥.

(3) 液·油

① 又方(『正傳』) : 白楊樹枝를 태운 濾을 바른다.

(4) 洗

① 又方 : 鵝糞泡湯으로 입안을 닦아내면 낫는다.

② 又方 : 甘草 黃連 各一錢을 진하게 끓인 것으로 닦는다.

③ 又方 : 黃連·金銀花·甘草를 물에 달여서 양치질을 하거나 들장미 꽃잎을 물에 담갔다가 그 물로 입안을 닦아준다.

④ 又方 : 兒茶·青黛를 물에 달여서 입안을 닦아준다.

(5) 貼

① 又方 : 天南星末을 米醋에 개서 脚心에 붙인다.

② 又方 : 吳茱萸末을 米醋에 개서 足心에 바른다.

2) 약물분류

膏·糊에 사용된 식물성 약물은 桑白皮汁 馬牙硝가 있고, 광물성 약물은 黃丹이 있고, 액상성분은 竹瀝이 있다. 散에 사용된 식물성 약물은 青黛 甘草 冰片 龍腦가 있고, 동물성 약물은 五倍子 珍珠가 있고, 광물성 약물은 朴硝 雄黃 硼砂 朱砂 玄明粉이 있고, 액상성분은 꿀풀이 있다. 液·油에 사용된 식물성 약물은 白楊樹枝瀝이 있다. 洗에 사용된 식물성 약물은 甘草 黃連 金銀花 들장미 꽃잎 兒茶 青黛가 있고, 동물성 약물은 鵝糞이 있고, 액상성분은 물이 있다. 貼에 사용된 식물성 약물은 天南星 吳茱萸가 있고, 액상성분은 米醋가 있다.

13. 진균성 각막염

진균성 각막염은 한의학에서 花翳白陷, 凝脂翳 등의 범위에 속한다.

1) 치방분류

(1) 膏·糊

① 點眼金華水 : 黃連 砂 乳香 銅綠 脾粉 등을 井水에 浸하여 滴劑로 쓴다.

(2) 散

① 磨翳膏 : 豆仁口含去皮殼 1兩, 片腦 3錢, 空青 2錢을 곱게 가루내어 點眼한다.

② 龍腦散 : 龍腦 1錢 朴硝 5錢을 세분말하여 點眼한다.

(3) 洗

① 又方 : 金銀花 連翹 蒲公英 魚腥草 黃芩 등을 水煎하여 맑은 것만 여과한 후에 洗眼을 하거나 혹은 濕熱敷를 한다.

2) 약물분류

膏·糊에 사용된 식물성 약물은 黃連 乳香 砂가 있고, 광물성 약물은 銅綠이 있고, 액상성분은 井水가 있다. 散에 사용된 식물성 약물은 豆仁 片腦 龍腦가 있고, 광물성 약물은 朴硝 空青이 있다. 洗에 사용된 식물성 약물은 金銀花 連翹 蒲公英 魚腥草 黃芩이 있고, 액상성분은 물이 있다.

14. 이진균증

耳竅內에 참기가 어려울 정도의 기이한 소양감이 일어나 긁어도 자주 나타나고 때로는 耳脹悶感과 경미한 耳痛 및 流水가 있는 耳竅內의 소양증인 耳痒에 해당한다.

1) 처방분류

(1) 洗

① 又方 : 黃連煎湯液으로 세척.

(2) 插

① 求痒丹 : 龍骨 一錢 氷片 三分, 皂角刺 一條(燒灰存性)를 분말하여 雄鼠膽 1매를 불과 人乳에 타서 耳竅에 넣는다.

② 胡桃肉方 : 求痒丹과 胡桃肉을 불에 익혀서 耳內삽입한다.

③ 又方 : 生烏頭 1매를 生薑汁에 담갔다가 囊核대로 삽입한다.

2) 약물분류

洗에 사용된 식물성 약물은 黃連이 있고, 액상성분은 물이 있다. 插에 사용된 식물성 약물은 氷片 皂角刺 胡桃肉 生烏頭가 있고, 동물성 약물은 龍骨 雄鼠膽이 있고, 액상성분은 물 人乳 生薑汁이 있다.

15. 방선균병

방선균병은 한의학에서 金腮瘡, 煙腮瘡, 煙車癰, 腮頸發 含腮瘡 痘腮, 髭髮, 煙瘡兩腮腫 등에 해당한다.

1) 처방분류

(1) 膏·糊

① 又方 : 細辛 草烏 等分 가루를 蜂粉을 넣고 霉지기름으로 개서 불인다.

(2) 散

① 二金散 : 雞內金 麻金 一錢. 가루내서 바른다.

2) 약물분류

膏·糊에 사용된 식물성 약물은 細辛 草烏가 있고, 액상성분은 霉지기름이 있다. 散에 사용된 식물성 약물은 麻金이 있고, 동물성 약물은 雞內金이 있다.

결 론

한의학에서는 진균증을 따로 분류하지 않아 여러 곳에 산재

되어 있으므로 痘因과 痘證에 비추어 한의학 痘名을 역추적하였다. 두부 진균증은 羽翳, 瘰頭瘡, 瘰頭, 梅花瘡, 頭上瘡, 頭禿瘡, 禿瘡에 해당하고, 수부 진균증은 鵝掌風, 鵝掌瘡, 鵝掌風에 해당하며, 족부 진균증은 脚氣, 脚濕氣, 臭田螺, 田螺炮, 爛脚丫, 脚指縫爛瘡, 爛瘡, 爛脚風, 風痒脚瘡, 脚癆, 香港脚, 脚爛瘡에 해당하며, 조갑 진균증은 灰指甲, 鵝爪風, 油灰指甲, 油炸甲에 해당하고, 체부 진균증은 環鮮, 金錢鮮, 錢鮮, 筆管鮮, 荷葉鮮, 雀眼鮮, 圈鮮, 荷錢鮮瘡, 銅錢鮮에 해당하며, 서혜부 진균증은 陰鮮, 腫鮮에 해당하고, 진균성 외음소양증은 陰痒, 陰門痒, 陰痒脫에 해당하며, 전풍은 染白蠍風, 夏日斑, 汗斑에 해당하고, 백선진은 脚丫毒, 足扱發에 해당하며, 스포로트리콤증은 陳肝瘡, 蟻蛄串에 해당하며, 아구창은 鵝口瘡, 雪口病, 燕口瘡에 해당하고, 진균성 각막염은 花翳白陷, 凝脂翳에 해당하며, 이진균증은 耳痒에 해당하고, 방선균병은 金腮瘡, 煙腮瘡, 煙車癰, 腮頸發 含腮瘡 痘腮, 髭髮, 煙瘡兩腮腫에 해당한다.

이상의 진균증 치료에 사용된 약을 구분해 보면 크게 내복약과 외용약으로 구분할 수 있다. 국부질환에 있어서 약물을 환부에 사용하면 약물이 소화흡수를 거치지 않고 직접적으로 작용하고 그 부위에만 집중적으로 작용하므로 치료효과가 비상하고 신속하다. 증상의 특징과 발병한 부위, 약물의 종류에 따라 膏·糊·散·液·油·洗·熏·蒸·煮·漬·插·摩·貼 등의 다양한 외치방법이 사용되었다.

사용된 약물의 종류도 다양한데, 그 중 식물성 약물은 甘草 苦蔴 大風子 大黃 密陀僧 白附子 木鼈子 凤仙花 氷片 蛇牀子 松香 檀脂 土槿皮 花椒 黃連 黃柏 黃精 등이 다용되었고, 동물성 약물은 牡蠣 斑貓 獅香 五倍子가 다용되었고, 광물성 약물은 輕粉 枯礬 銅綠 明礬 朴硝 白礬 白砒 剥砂 水銀 雄黃 硫黃 黃丹이 다용되었고, 액상성분은 桐油 霉지기름 麻油 물 米醋 白酒 소주 食醋 茄油 香油가 다용되었다.

참 고 문 헌

1. 김영권 외. 임상진균학(2판). 서울, 고려의학, 2000.
2. 김장수 역. 알기쉽게 이해하는 임상미생물학. 서울, 대한의학 서적, 2003.
3. 申光浩. 韓醫外治療法學. 대성의학사, 서울, 2000.
4. 김갑성 외. 實用 東西醫學 臨床總書 6권. 서울, 정담, 2001.
5. 申拱辰. 外科辟玄(中醫外科傷科名著集成). 北京, 華夏出版社, 1997.
6. 徐德鉉. 外科選要. 北京, 中國中醫藥出版社, 1996.
7. 陳實功. 外科正宗. 北京, 人民衛生出版社, 1983.
8. 徐宜厚 外. 皮膚病中醫診斷學. 北京, 人民衛生出版社, 1997.
9. 陣士鐸. 洞天奧旨 外科秘錄. 서울, 의성당, 1993.
10. 申拱辰. 外科辟玄(中醫外科傷科名著集成). 北京, 華夏出版社, 1997.
11. 葛洪. 葛洪肘後備急方. 北京, 人民衛生出版社, 1996.
12. 顧世澄. 瘡醫大全. 北京, 中國中醫藥出版社, 1996.
13. 王維德. 外科證治全生集(中醫外科傷科名著集成). 北京, 華夏出版社, 1997.

14. 許克昌. 外科證治全書(中醫外科傷科名著集成). 北京, 華夏出版社, 1997.
15. 張志禮 主編. 中西醫結合皮膚性病學. 北京, 人民衛生出版社, 2000.
16. 祁坤. 外科大成(中醫外科傷科名著集成). 臺北, 文光圖書有限公司, 1979.
17. 김갑성 외. 實用 東西醫學 臨床總書 8권. 서울, 정답, 2001.
18. 노석선. 原色 眼耳鼻咽喉科學. 대전, 주민출판사, 2003.
19. 김갑성 외. 實用 東西醫學 臨床總書 7권. 서울, 정답, 2001.
20. 王永炎·庄曾淵. 今日中醫眼科. 北京, 人民衛生出版社, 2000.
21. 吳謙. 醫宗金鑑(下). 北京, 人民衛生出版社, 1996.
22. 차은이, 강정수. 피부진균증의 한의학적 고찰. 동의생리병리 학회지 20(4):799-806, 2006.
23. 郭林根. 家庭中藥外治療方. 南昌, 江西科學技術出版社, 1998.
24. 허경자. 『외대비요』에 기재된 외치료법에 관한 연구. 대구한의대학교 대학원 석사학위논문, 2005.