

# Question & Answer

**Question** 결핵성 늑막염을 앓고 있습니다. 처음 진단받은 곳은 개인병원이었는데, 큰병원에 가보라고 해서 그곳에서 입원을 했습니다. 주는 약 먹고 검사라곤 엑스레이 찍어본 것 뿐이구요. 사진도 찍을 때마다 조금씩 물이 찬다고 했는데, 약 먹는 것 외엔 한 것이 없습니다. 그리고 이번에 폐유착이라는 진단을 받았습니다. 정말 가능한 진단이 그것 뿐인지, 왜 이런 상황까지 된 것인지 궁금합니다.

**Question** 결핵약 복용중 3개월째부터 약이 줄었는데 일반적인 약 복용이 궁금합니다. 1개 월은 병원에서, 그리고 3개월은 보건소 약을 먹고 있습니다.

평상시는 괜찮다가 가끔 피곤하면 기침을 심하게 해서 치료가 잘 되고 있는지 걱정입니다. 가끔 원쪽가슴에 약간의 통증도 있고요. 사진상으로 거의 변화가 없다는데요, 혹시 내성이라도 생긴 것은 아닐까요?

**Question** 병원에서 아버님이 결핵이라는 진단을 받았습니다. 평소 폐쇄성폐질환으로 계속 약을 드시고 계셨구요, 2달전부터 기침 거래가 심해 폐렴소견으로 항생제 처방을 받아 2주정도 복용하였으나 별 차도가 없었는데, CT검사와 기관지 내시경을 한 후, 결핵으로 진단받고 1주일 전부터 약을 복용하고 계십니다. 하지만 조직검사에서 나 객담검사에서 결핵균이 나오지 않은 상태인데 약을 계속 복용해야 할까요

**Answer** 결핵성늑막염의 경우 흉부엑스레이, 흉수검사 또는 흉막조직검사 등으로 진단합니다. 다른 원인이 없다고 판단되면 엑스레이만으로 진단할 수도 있습니다.

결핵약을 복용하면서 물(흉수)이 서서히 흡수되며, 개인에 따라서는 흉막유착이 남을 수 있는데 이것은 흉막에 생긴 흉터라고 생각하시면 됩니다. 흉막유착이 심하면 수술을 하지만 대부분 생활을 하는데 지장이 없으므로 수술을 하지 않습니다.

**Answer** 대부분의 결핵환자들이 처방받는 4제 단기치료처방에서는 3개월째부터 피라진아마이드라는 약제를 빼고 복용합니다. 치료 중에도 약간의 흉통이나 기침은 있을 수 있으며 규칙적으로 꾸준히 약복용을 하면 결핵은 완치됩니다.

본인이 스스로 느끼는 증상으로는 내성여부를 알 수 없고 약제감수성검사를 통해서 알 수 있습니다. 현재 구역, 구토 등 특별한 증상이 없다면 일반적인 증상이므로 병원에 가서 별도로 검사하지 않아도 될 것 같습니다.

**Answer** 결핵균배양에서 균이 안 나올 수도 있습니다. 그렇다고 결핵이 아니라고 단정지을 수는 없습니다.

현재 CT촬영과 임상경과로 진단을 받은 것으로 생각되며 향후 X-ray나 CT촬영으로 경과를 알아볼 것으로 예측됩니다.

약을 계속 복용하시면서 담당선생님과 상의하시는 것이 지금으로선 가장 좋은 방법인 것 같습니다.